

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



		•	
	·		
	,		



Zeitschrift

für

Mathematik und Physik

herausgegeben

unter der verantwortlichen Redaction

von

Dr. O. Schlömilch, Dr. E. Kahl

und

Dr. M. Cantor.

田

医心色缓和 化对抗 机物 抗流霉菌

XXX. Jahrgang.

Mit 7 lithographirten Tafeln.

Leipzig,


Verlag von B. G. Teubner.

1885.

1

Inhalt.

s	eite
Zum Schwering'schen Liniencoordinatensystem. Von W. Krimphoff	253
Bemerkungen zum Pascal'schen Satze über Kegelschnittsechs-	
ecke. Von Prof. Dr. Heger	279
Ueber einen von Steiner entdeckten Satz und einige verwandte Eigenschaften	
der Flächen zweiter Ordnung. Von Dr. Gino Loria	291
Ueber gewisse Schaaren von Dreieckskreisen. Von 0. Schlömilch	301
Näherungsformeln für Inhalt und Oberfläche niedriger Flächen-	
abschnitte. Von Dir. Dr. Geisenheimer	325
Wann besitzt die cubische Parabel eine Directrix? Von Dr. F. Meyer	345
Die Ortsfläche der Spitzen gleichseitiger Tetraeder zu gegebener Geraden der	
Zeichenebene. Von F. Graberg	
Notiz über Ungleichungen. Von 0. Schlömilch	351
Kinematik.	
Ueber die Bewegung ähnlich-veränderlicher ebener Systeme. Von	
P. Somoff	193
Die Ebene als bewegtes Element. Von F. Wittenbauer	216
Ueber einen Satz von Burmester. Von P. Semoff	
Ueber die relative Bewegung eines Punktes in einem in continuir-	
licher Bewegung begriffenen Medium. Von Prof. Dr. Bobylew .	336
Potentialtheorie.	
Ueber die Vertheilung der inducirten Elektricität auf einem un-	
begrenzten elliptischen Cylinder. Von Dr. R. Besser	257
Schluss der Abhandlung	305
Optik.	
Geometrische Beweise des Satzes von der Minimalablenkung im Prisma. Von H. Vogt	111
Magnetismus.	
Zur Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus. Von Dr. Th. Habler .	119





Die Curven vierter Ordnung mit drei doppelten Inflexionsknoten.

Von Dr. C. BEYEL in Zürich.

Hierzu Taf. 1 Fig. 1-8.

1. Erzeugung aus einer Strahleninvolution und einem Kegelschnitte.

Sats. Gegeben sei eine Strahleninvolution J_1 mit dem Scheitel M_1 und ein Kegelschnitt K^2 . Construiren wir in den Schnittpunkten eines Strahles x_1 der Involution J_1 mit K^2 die Tangenten an diesen Kegelschnitt, so schneiden sie den Strahl x_1 , welcher x_1 in der Involution J_1 correspondirt, in zwei Punkten einer Curve vierter Ordnung — C^4 .

Beweis.* (Fig. 1.) Wir zeigen, dass auf jeder Geraden g der Ebene vier Punkte des durch den Satz bestimmten Ortes liegen. Sei mit J_{1k} die Involution harmonischer Polaren um M_1 und mit m_1 die Polare von M_1 in Bezug auf K^2 bezeichnet.** Dann gehört zu jeder Geraden durch M_1 ein Strahl der Involution J_{1k} und ein Strahl der Involution J_1 . Letztere Strahlen sind somit einander eindeutig zugeordnet und bilden eine Projectivität P_{1k} . Schneiden wir nun m_1 mit den Strahlen der Involution J_{1k} und g mit den entsprechenden in der Projectivität P_{1k} , so erhalten wir in m_1 und g zwei projectivische Reihen T_{1k} und T_1 . Die Verbindungslinien ihrer correspondirenden Punkte sind Tangenten eines Kegelschnittes K_g^2 . Ist dann t eine gemeinsame Tangente der beiden Kegelschnitte K^2 , K_g^2 , so verbindet t ein Punktepaar T_{1k} T_1 . Berührt t

^{*} Der Beweis Hast sich auch mit Hilfe des Satzes von Jonequières führen. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint die angegebene Erzeugungsweise als specieller Fall der von A. Ameseder entwickelten von Curven vierter Ordnung mit drei Doppelpunkten. (Sitzungsber, der kaiser). Akad. d. Wissensch., Bd. 79 II. Abth. 8. 241.) Vergl. auch: Hossfeld. Ceiter Unieursaleurven vierter Ordnung. (Schlömilch, Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXVIII. S. 256, 1883. Dengleichen meine Dissertation: Centrische Collineation sie Ordnung in der Etene Vierteijahrsschrift der Züricher naturf. Gesellsch., Bd. XXVI S. 257, 1861. wo die Erzeugung von C. U.: 4m Fall behandelt ist, in welchen J. eine Rechtwickeinvollzien ist.

^{*} In Fig. 1 int K² als Kreis augenommen. Die Involutionen um M₄ sind und sim Hillstein H² durch M₄ Speringer und ihre Pole sind mit J. J., verwichsten. Mittele L. Michaelle z. Physik XXX. 1.

den Kegelschnitt K^2 in D_i , so ist M_1D_1 , M_1T_{1k} ein Strahlenpaar der Involution J_{1k} , und weil M_1T_{1k} , M_1T_1 ein Paar der Projectivität P_{1k} ist, so folgt, dass M_1D_1 , M_1T_1 ein Paar der Involution J_1 ist. Also ist T_1 ein Punkt unseres Ortes. Seine Punkte auf g sind mithin zugleich auf den gemeinsamen Tangenten von K^2 und K_g^2 gelegen. Da es vier solcher Tangenten giebt, so folgt, dass der in Rede stehende Ort eine Curve vierter Ordnung ist.

Wir ziehen aus dem Gesagten einige Schlüsse über die Curve C^4 .

3) Die Punkte der C^4 , welche auf einer beliebigen Geraden g liegen, sind paarweise reell oder imaginär.

Denken wir uns durch K^2 die Ebene in zwei Theile zerlegt, in deren einem die Involution harmonischer Polaren um jeden Punkt herum elliptisch ist und in deren anderem sie reelle Doppelstrahlen hat, so liegen die reellen Tangenten von K^2 im hyperbolischen Felde der Ebene. Mithin befindet sich in demselben auch der reelle Theil unserer C^4 . Also kann dieser K^2 nicht schneiden. Umgekehrt kann der imaginäre Theil der C^4 aus dem elliptischen Felde der Ebene nicht in das hyperbolische übertreten. Bemerken wir dann weiter, dass infolge der angegebenen Erzeugungsweise K^2 mit C^4 die vier Punkte gemeinsam hat, in denen die Doppelstrahlen (g_1h_1) der Involution J_1 den Kegelschnitt K^2 treffen, so folgt, dass C^4 in diesen vier Punkten von K^2 berührt wird.

b) Auf jeder Geraden durch M_1 liegen zwei Punkte von C^4 . Also ist M_1 ein Doppelpunkt von C^4 .

Sei $m_2 m_3$ das gemeinsame Paar der Involutionen $J_1 J_{1k}$ und treffe dasselbe m_1 in den resp. Punkten M_3 , M_2 , so sind auch diese Punkte Doppelpunkte von C^4 . Mithin hat C^4 drei Doppelpunkte.

Ist M_1 reell, so muss auch m_1 stets reell sein. Dagegen können $m_2 m_3$ — also auch $M_3 M_2$ — imaginär werden oder zusammenfallen. Dementsprechend werden wir bei den folgenden Untersuchungen stets zuerst den Fall besprechen, in welchem $M_2 M_3$ reell sind, und dann die Modificationen angeben, welche für imaginäre Punkte $M_2 M_3$ eintreten. Das Zusammenfallen von $M_2 M_3$ wird uns weiterhin zu den degenerirten Formen der C^4 führen. Lassen wir K^2 imaginär werden, so gelangen wir zu einer neuen interessanten Form der C^4 .

c) Durch die gegebene Erzeugungsweise sind die Punkte $(A_1...)$ des Kegelschnittes K^2 den Punkten $(A'_1...)$ der Curve C^4 eindeutig zugeordnet und diese Zuordnung wird durch die Tangenten an K^2 vermittelt.

Wir können dies auch so ausdrücken: Zu jedem Punkte von C^4 gehört die Tangente an K^2 , auf welcher der zugeordnete Punkt von K^2 liegt. Ausgezeichnete Punkte dieser Zuordnung sind $M_1 M_2 M_3$. Ihnen correspondiren je die zwei Berührungspunkte der Tangenten, welche von $M_1 M_2 M_3$ aus an K^2 gehen.

2. C4 als Leitcurve einer quadratischen Transformation.

Aus dem in 1 gegebenen Beweise folgt, dass zu jeder Geraden g der Ebene ein Kegelschnitt K_g^2 gehört. Er berührt m_1 und g — die Träger der Reihen $T_{1k}T_1$. Ferner muss er m_2m_3 — die Doppelstrahlen der Projectivität P_{1k} — zu Tangenten haben. Die Geraden g und die Kegelschnitte K_g^2 stehen also in der Beziehung einer quadratischen Transformation. Dieselbe ist dadurch specialisirt, dass jede Gerade den Kegelschnitt berührt, dem sie entspricht.

Wenn ein Kegelschnitt K_g^2 den Kegelschnitt K^2 berührt, so schneidet die Tangente im Berührungspunkte aus der zu K_g^2 gehörenden Geraden g zwei zusammenfallende Punkte von C^4 , d. h.: g ist Tangente an C^4 . Daraus schliessen wir, dass unsere Curve vierter Ordnung die Enveloppe aller der Geraden g ist, deren entsprechende Kegelschnitte den Kegelschnitt K^2 berühren.

Die Kegelschnitte K_g^2 , welche in der quadratischen Transformation den Geraden eines Büschels entsprechen, dessen Scheitel T_1 sei, bilden eine Kegelschnittschaar; denn sie haben ausser $m_1 m_2 m_3$ noch die Tangente gemeinsam, welche T_1 mit dem entsprechenden Punkte T_{1k} in m_1 verbindet. Unter den Kegelschnitten dieser Schaar heben wir diejenigen hervor, welche K^2 berühren. Ihre correspondirenden Geraden g müssen Tangenten aus T an K^2 sein. Nun ist bekanntlich die Zahl der Kegelschnitte einer Schaar, welche leinen gegebenen Kegelschnitt berühren gleich 6. Mithin gehen durch einen Punkt der Ebene sechs Tangenten an G^4 , d. h.: G^4 ist von der sechsten Classe.

Betrachten wir speciell das Büschel von Geraden g, dessen Scheitel ein Punkt A'_1 von C^4 ist, so correspondirt diesem Büschel in der quadratischen Transformation eine Kegelschnittschaar, welche — ausser $m_1 m_2 m_3$ — die zu A'_1 gehörende Tangente a_1 [1c] von K^2 zur gemeinsamen Tangente hat. Unter den Kegelschnitten dieser Schaar ist einer, der K^2 in A_1 — dem Berührungspunkte von a_1 — tangirt. Diesem Kegelschnitt K_g^2 entspricht in der quadratischen Transformation eine Gerade — a'_1 —, welche in A'_1 die Curve C^4 berührt. Aus dieser Bemerkung ergiebt sich eine Construction der Tangente a'_1 in einem Punkte A'_1 von C^4 . Wir bestimmen die zu A'_1 gehörende Tangente a_1 an K^2 und ihren Berührungspunkt A_1 . Dann ist durch $m_1 m_2 m_3 a_1 A_1$ ein Kegelschnitt K_g^2 gegeben. An ihn geht durch A'_1 — ausser a_1 — eine zweite Tangente. Sie ist a'_1 .

Wir erwähnen weiterhin unter den Kegelschnitten K_g^2 diejenigen, welche in der quadratischen Transformation den Tangenten an K^2 enterprechen. Sei a_1 eine solche Tangente und schweide sie m_1 in T_{1k} , so correspondirt dem Pankte T_{1k} ein Punkt T_1 in a_1 . Derselbe wird mit Hilfe der Projectivität P_{1k} gefunden. Er ist der entsprechende zum

Schnittpunkte der Träger der Reihen T_{1k} , T_1 ; folglich muss er der Berührungspunkt von a_1 an den Kegelschnitt K_g^2 sein, welcher durch die erwähnten Reihen hervorgebracht wird und welcher a_1 correspondirt. Zugleich ist aber — nach Construction — T_1 ein Punkt der Curve C^4 . Somit erscheint C^4 als der Ort derjenigen Punkte, in denen die Tangenten an K^2 ihre correspondirenden Kegelschnitte K_g^2 berühren.

3. Darstellung der C^4 von den Punkten $M_1 M_2 M_3$ aus.

Wir wenden uns zu den Kegelschnitten K_g^2 , welche in der quadratischen Transformation den Geraden durch M_2 M_3 zugeordnet sind. Sei x_2 eine Gerade durch M_2 , so erhalten wir den zu x_2 gehörenden Kegelschnitt K_g^2 , indem wir die projectivischen Reihen T_{1k} , T_1 auf m_1 und x_2 construiren, also letztere Geraden resp. mit der Projectivität P_{1k} schneiden. Da aber diese Projectivität m_2 m_3 zu Doppelstrahlen hat und da M_2 in m_3 liegt, so sind die Reihen T_{1k} , T_1 zu einander perspectivisch und ihr Perspectivcentrum — S_2 — liegt in m_2 . Daraus folgt, dass der Kegelschnitt K_g^2 in die zwei Punkte M_2 und S_2 degenerirt. Ziehen wir durch S_2 die Tangenten an K^2 , so sind diese K^2 und K_g^2 gemeinsam und schneiden daher x_2 in zwei Punkten von C^4 . Die Berührungspunkte dieser Tangenten mit K^2 liegen auf einer Geraden x_2 durch M_2 , weil S_2 in m_2 — der Polaren von M_2 — sich befindet.

Drehen wir die Gerade x_2 um M_2 , so gehört zu jeder ihrer Lagen ein Punkt S_2 und mithin ein Strahl x'_2 . Folglich ist das Büschel der x_2 zu dem der x'_2 projectivisch. In beiden Büscheln entsprechen sich aber $m_1 m_3$ vertauschbar; also sind die Büschel involutorisch. Es werden daher nicht nur die Tangenten in den Schnittpunkten von x'_2 mit K^2 aus x_2 Punkte von C^4 schneiden, sondern auch die Tangenten in den Schnittpunkten von x_2 mit K^2 aus x'_2 .

Wir erkennen hieraus, dass C^4 durch K^2 und die letzterwähnte Involution — sie sei mit J_2 bezeichnet — auf ganz analoge Weise hervorgebracht wird, wie durch K^2 und J_1 . Stellen wir nun die analoge Ueberlegung für die Geraden durch M_3 an, so finden wir, dass auch die ihnen correspondirenden Kegelschnitte K_g^2 in je zwei Punkten degeneriren. Wir werden auf eine Involution J_3 geführt, welche $m_1 m_2$ zu einem Paare hat und mit deren Hilfe wir C^4 aus K^2 erzeugen können.

Wir sind somit zu zwei neuen Involutionen — J_2 , J_3 — gelangt, welche in Bezug auf K^2 und C^4 dieselbe Rolle spielen wie J_1 . Die Doppelstrahlen dieser drei Involutionen müssen sich also viermal zu dreien in den vier Punkten schneiden, in welchen K^2 von C^4 berührt wird.

Denken wir uns die eindeutige Zuordnung der Punkte von K^2 und C^2 [1c] durch zwei dieser Involutionen — etwa durch J_1 , J_2 — vermittelt, so können wir sagen: Lassen wir den Schnittpunkt zweier

Strahlen durch $M_1 M_2$ einen Kegelschnitt K^2 durchlaufen, so bewegt sich der Schnittpunkt der in $J_1 J_2$ entsprechenden Strahlen auf einer Curve C^4 .

Dabei ist J_1J_2 in der Weise von K^2 abhängig, dass der Schnittpunkt der entsprechenden Strahlen zum Verbindungsstrahl der Scheitel mit diesen ein Tripel harmonischer Pole in Bezug auf K^2 bildet.

Uebertragen wir die Involutionen J_1 , J_2 , J_3 auf einen Kegelschnitt H^2 , der durch die Scheitel der drei Involutionen geht, so können wir beweisen, dass die Pole dieser Involutionen in Bezug auf H^2 in einer Geraden liegen. Denn sei J_1 J_1 ein correspondirendes Punktepaar von K^2 und C^4 , so sind die Strahlen aus $M_1M_2M_3$ nach J_1 entsprechende Paare der Involutionen J_1 , J_2 , J_3 . Sie schneiden H^2 in sechs Punkten $P_1P_2P_3$, $P_1P_2P_3$, Vorbinden wir diese in der Reihenfolge P_1P_1 , P_2P_2 , P_3P_3 , so bilden diese Verbindungslinien ein Dreieck, welches — wie wir anderen Ortes* bewiesen — zu dem Dreieck $M_1M_2M_3$ perspectivisch liegt. Also schneiden sich P_1P_1 und P_2P_2 und P_3P_3 and P_3 in Punkten einer Geraden. Diese Schnittpunkte sind aber die Pole der resp. Involutionen J_1 , J_2 , J_3 .

Nun kann eine Gerade das Dreieck $m_1m_2m_3$ entweder in drei Punkten schneiden, welche in Bezug auf H^2 hyperbolisch sind, oder in einem hyperbolischen und in zwei elliptischen Punkten. Dementsprechend sind entweder alle drei Involutionen J_1 , J_2 , J_3 hyperbolisch und ihre Doppelstrahlen schneiden sich in vier reellen Punkten von C^4 , oder nur eine dieser Involutionen ist hyperbolisch. Auf ihren reellen Doppelstrahlen liegen die vier imaginären Punkte, in welchen die Doppelstrahlen der drei Involutionen sich schneiden und in welchen K^2 C^4 berührt.

Wenn eine Gerade x_1 durch M_1 den Kegelschnitt K^2 in zwei imaginären Punkten schneidet, so sind diese durch die Involution harmonischer Pole in x_1 gegeben. Die Tangenten in diesen Punkten an K^2 gehen durch den Pol von x_1 in Bezug auf K^2 und werden durch die elliptische Involution J_t bestimmt, welche diesen Pol zum reellen Scheitel hat und zur Involution harmonischer Pole auf x_1 perspectivisch liegt. Diese Tangenten treffen x_1' — den zu x_1 in J_1 gehörenden Strahl — in zwei Punkten der C^4 . Diese sind imaginär und durch die Punktinvolution definirt, welche x_1' aus der Involution J_t schneidet.

Die Strablen der Involutionen J_2 , J_3 , welche M_2 resp. M_3 mit den imaginären Punkten auf K^2 und C^4 verbinden, sind nach dem Gesagten bestimmt und werden paarweise imaginär. Ihre Zuordnung in den Involutionen J_1 , J_3 wird durch K^2 und C^4 ebenso vermittelt, wie die von reellen Strablen. Im Kegelschnitt H^2 , auf den die Involutionen über-

Vergl. Bemerkungen über perspectivische Dreiecke, XXIX. Jahrg. dieser.
 Zeitschrift S. 250.

tragen sind, macht sich diese Zuordnung in folgender Weise bemerkbar. Sei s. B. das Strahlenpaar aus M_2 über den imaginären Punkten von K^2 in x_1 durch eine Involution gegeben, deren Pol J_k ist, und habe das entsprechende Strahlenpaar, dessen bestimmende Involution perspectivisch zur Punktinvolution auf x_1' ist, zum Pole J_c , so müssen $J_k J_c$ auf einer Geraden liegen, welche durch den Pol der Involution J_2 geht.* In gleicher Weise finden wir, dass auch die Involutionen J_3 , J_1 imaginäre Paare besitzen, und wir schliessen allgemein: Die imaginären Punkte der C^4 liegen paarweise auf reellen Geraden durch ein M und auf imaginären Geraden durch die beiden anderen M.

Wir setzen nun voraus, dass $M_2 M_3$ imaginär werde. Dann sind J_1 , J_{1k} hyperbolische Involutionen und ihre Doppelstrahlen trennen sich. Sie sind also Paare einer elliptischen Involution und diese bestimmt das imaginäre Paar $m_2 m_3$ resp. $M_3 M_2$. Haben wir dann aus K^2 und J_1 die Curve C^4 gezeichnet, und übertragen wir die eindeutige Zuordnung der Punkte von K^2 und C^4 auf die Involutionen J_2 , J_3 , so sind damit zwei Involutionen definirt, welche imaginäre Scheitel haben. Die reellen Punkte von K^2 und C^4 sind reelle Scheitel der imaginären Strahlen dieser Involutionen.

4. Inflexionstangenten.

Sei g_{1k} ein Doppelstrahl der Involution J_{1k} . Ihm entspreche in der Involution J_1 der Strahl i_1 . Construiren wir nun auf i_1 die Punkte von C^4 nach der in 1 gegebenen Methode, so finden wir, dass diese Punkte in M_1 liegen. i_1 hat also in M_1 mit C^4 vier Punkte gemeinsam. Folglich ist i_1 eine Inflexionstangente von C^4 . Indem wir dieselben Schlüsse für alle Doppelstrahlen der Involutionen J_{1k} , J_{2k} , J_{3k} und ihre entsprechenden Strahlen in den Involutionen J_1 , J_2 , J_3 ziehen, erhalten wir sechs Inflexionstangenten — entsprechend der Zahl von Inflexionstangenten, welche eine C^4 mit drei Doppelpunkten besitzt. Zugleich erkennen wir aber, dass diese Doppelpunkte in unserem Falle doppelte Inflexionsknoten sind.

Die Punkte M_1 , M_2 , M_3 bilden, wie wir gesehen, ein Tripel harmonischer Pole in Bezug auf K^2 . Daraus folgt, dass in zweien dieser Punkte die Involutionen J_k hyperbolisch sind. Dementsprechend müssen die Inflexionstangenten an C^4 in zwei Punkten M stets reell sein. Ist $M_2 M_3$ imaginär, so muss J_{1k} hyperbolisch sein und die Inflexionstangenten in M_1 sind reell.

Wir wollen nun den degenerirten Kegelschnitt K_g^2 untersuchen, welcher in der unter 2 besprochenen quadratischen Transformation einer

^{*} Nach dem allgemeinen Satze: Construiren wir zu den Strahlen einer Involation die oorrespondirenden in einer zweiten, so bilden diese eine dritte Involution und die Pole dieser drei Involutionen liegen in einer Geraden.

Inflexionstangente — sagen wir i_2 durch M_2 — correspondirt. Er besteht aus M_2 und einem Punkte S_2 auf m_2 . Von S_2 gehen zwei Tangenten an K^2 , welche i_2 in zwei Punkten von C^4 treffen. Diese fallen — weil i_2 Inflexionstangente ist — in M_2 zusammen. Also müssen auch die erwähnten Tangenten aus S_2 sich decken. Dies ist nur dann möglich, wenn S_2 einer der Punkte ist, in denen m_2 den Kegelschnitt K^2 schneidet. Da es zwei solche Punkte giebt, bemerken wir, dass derjenige zu i_2 gehört, welcher Perspectiveentrum der Reihen ist, welche die Projectivität P_{1k} aus m_1 resp. i_2 schneidet.

Bezeichnen wir nun (Fig. 2)* die Doppelstrahlen der Involution J_{1k} mit $g_{1k}g_{1k}$, mit S_1S_1 * die Schnittpunkte von $g_{1k}g_{1k}$ * mit m_1 — also auch mit K^2 — und seien i_1 , i_1 * die Inflexionstangenten in M_1 , so sind $g_{1k}i_1$ und $g_{1k}^*i_1^*$ Paare der Projectivität P_{1k} . Bezeichnen wir weiter die Schnittpunkte von i_2 mit i_1 durch T_{12} und von i_1 mit i_1 * durch T_{1*2} , so sind S_1 * T_{12} und S_1 T_{1*2} Paare der perspectivischen Reihen auf m_1 und i_2 . Sie hahen S_2 zum Perspectivcentrum. Also liegen S_1 * T_{12} sowohl wie S_1 T_{1*2} auf Geraden durch S_2 .

Führen wir den analogen Gedankengang für i_2^* — die zweite Inflexionstangente in M_2 an C^4 — durch, so finden wir, dass $S_1^*T_{12}^*$ und $S_1T_{1^*2^*}$ auf Geraden durch S_2^* — dem zweiten Schnittpunkt von m_2 mit K^2 — liegen. Wir schliessen daher:

Das Viereck, welches die Geraden $m_1 m_2$ aus dem Kegelschnitt K^2 schneiden, ist dem Viereck der Punkte umschrieben, in denen sich die Inflexionstangenten in M_1 und M_2 schneiden.

Dieselbe Figur zeigt uns noch, dass S_2 S_2^* durch M_1 m_1 harmonisch getrennt sind, folglich auch T_{12} und T_{12^*} . Also bilden i_2 $i_2^*m_1$ m_3 eine harmonische Gruppe. In analoger Weise folgt, dass auch i_1 $i_1^*m_2$ m_3 eine harmonische Gruppe ist. Daraus ergiebt sich weiter, dass die Punkte T_{12} $T_{1^*2^*}$ und T_{12^*} T_{1^*2} auf Geraden durch M_3 liegen. Wir können dies kurz so ausdrücken:

Das Viereck der S hat mit dem Viereck der T den Diagoaslpunkt Ma gemein.

Wir haben bis jetzt stillschweigend vorausgesetzt, dass $M_1 M_2$ in Bezug auf H^2 hyperbolische Punkte seien. Dann ist M_3 ein elliptischer Punkt und K^2 wird von m_3 in bestimmten imaginären Punkten geschnitten. Also sind auch die Vierecke, welche $m_1 m_3$ und $m_2 m_3$ aus K^2 schneiden, bestimmt und ebenso die Vierecke, in welchen die Inflexionstangenten in M_1 und M_2 die in M_3 treffen. Auch diese Vierecke sind ein-

^{*} In Fig. 2 sind die Involutionen auf einen Kegelschnitt H2 übertragen, der durch M, M, M, M, geht.

ander resp. umschrieben und je einer der Punkte M ist für dieselben gemeinsamer Diagonalpunkt.

Werden M_2M_3 imaginär, so sind nach der oben gegebenen Interpretation von J_2J_3 auch in diesem Falle die Inflexionstangenten in M_2 und M_3 definirt, wenn wir sie als die entsprechenden zu den Strahlen dieser Involutionen auffassen, welche nach den Schnittpunkten von K^2 mit m_2m_3 gehen.

5. Doppeltangenten.

Einer Doppeltangente von C^4 correspondirt in der quadratischen Transformation 2 ein Kegelschnitt K_g^2 , welcher K^2 doppelt berührt. Zahl und Construction dieser Kegelschnitte giebt uns somit Aufschluss über Zahl und Construction der Doppeltangenten von C^4 . Nun giebt es bekanntlich vier Kegelschnitte, welche drei Gerade — m_1 , m_2 , m_3 — zu Tangenten haben und einen Kegelschnitt K^2 doppelt berühren. Dementsprechend hat C^4 vier Doppeltangenten.

Wir construiren nun bekanntlich die Kegelschnitte (K_g^2) , welche einen Kegelschnitt (K^2) doppelt berühren und drei Gerade (m_1, m_2, m_3) zu Tangenten haben, auf folgende Weise. Wir betrachten zwei der Tangenten — sagen wir m_2 , m_3 — als Doppelpaar einer Involution J_{1m} . Eine zweite Strahleninvolution am Scheitel M_1 ist die Involution J_{1k} . Von beiden Involutionen bestimmen wir das gemeinsame Paar. Die analogen Constructionen führen wir an den Scheiteln $M_2 M_3$ durch und erhalten so drei gemeinsame Paare, welche sich viermal zu dreien in vier Punkten schneiden. Diese sind die Pole der Berührungssehnen zwischen K^2 und den gesuchten Kegelschnitten K_g^2 . Somit sind letztere bestimmt-

Nun ist $M_1 M_2 M_3$ ein Tripel harmonischer Pole in Bezug auf K^2 . Ist dasselbe reell, so muss in zweien der Punkte M die Involution J_k hyperbolisch sein. Die Involutionen J_m sind aber sämmtlich hyperbolisch. Ihre Doppelstrahlen sind Paare der resp. Involutionen J_k , werden also durch die Doppelstrahlen der Involutionen J_k harmonisch getrennt. Daraus folgt, dass ein gemeinsames Paar zwischen einer Involution J_m und einer Involution J_k nur dann reell sein kann, wenn die Involution J_k elllptisch ist. Finde dies am Scheitel M_3 statt und sei $h_3 h_3^*$ das gemeinsame Paar, so liegen auf ihm paarweise die Pole P, P^* der gesuchten Berührungssehnen und sind bestimmte imaginäre Punkte. Die Berührungssehnen selbst sind also bestimmte imaginäre Gerade, welche durch die reellen Pole von $h_3 h_3^*$ gehen. Da $h_3 h_3^*$ ein Paar der Involution J_{1k} ist, so sind diese Pole die Schnittpunkte von $h_3 h_3^*$ mit m_3 .

Construiren wir jetzt aus den imaginären Punkten PP* die Tangenten an K³, so berühren diese K² in den Schnittpunkten dieses Kegelschnittes mit den erwähnten imaginären Berührungssehnen. Diese Tangenten müssen rein imaginäre Gerade sein; denn enthielte eine solche einen reellen

Punkt, so würde die Polare desselben reell sein und durch den Berührungspunkt der Tangente mit K^2 gehen. Also wäre letzterer reell, was nach dem Gesagten ausgeschlossen ist. Auf diesen rein imaginären Geraden liegen die Punkte von C^4 , welche Berührungspunkte der Doppeltangenten sind. Also müssen letztere imaginär sein. Wir schliessen also:

Sind die doppelten Inflexionsknoten von C4 reell, so werden die vier Doppeltangenten imaginär.

Wir untersuchen jetzt den Fall, in welchem Mo, Mo imaginär sind. Wir beginnen - wie oben - die Construction von Kg2 damit, dass wir das gemeinsame Paar - h, h,* - der Involutionen Jik, Jim bestimmen. Dasselbe ist stets reell, weil Jim elliptisch ist. Auf h, h,* liegen die Pole der gemeinsamen Berührungssehnen zwischen den Kegelschnitten Kg2 und K2. Die Berührungssehnen selbst gehen durch die Pole von hihit in Bezng auf K2, d. h. durch die Punkte H,* H, in denen h, h,* die Gerade m, schneiden. Folgender Gedankengang führt zur weiteren Bestimmung dieser Sehnen. Wir ziehen durch H, (Fig. 3) ein Geradenpaar w, w'1, welches durch h,*m, harmonisch getrennt wird, also einer Involution J1w angebort, für welche h,*m, die Doppelstrahlen sind. w, w', schneide K2 resp. in OP, OP'. Construiren wir dann die Kegelschnitte Kw2, Kw2, welche K" resp. in OP, O'P' berühren und welche m, zur Tangente haben, so sind diese zu einander centrisch collinear in einer Collineation, für welche M, das Centrum und m, die Axe ist. Folglich gehen durch M, ein Paar gemeinsamer Tangenten t,t', an diese Kegelschnitte. Ferner erkennen wir, dass sowohl Kn2 als Kn2 mit sich selbst in centrischer Involution stehen für H, als Centrum und h, als Axe. Folglich müssen die Tangenten t, t', durch h, h, * harmonisch getrennt werden.

Lassen wir nun das Paar $w_1 w_1'$ die Involution J_{1w} durchlaufen und construiren wir die entsprechenden Werthe t_1 , t_1' , so bilden letztere eine Involution J_{1t} , für welche h_1 , h_1^* die Doppelelemente sind. Die Paare der Involution J_{1w} sind also denen der Involution J_{1t} eindeutig zugeordnet. Zur Involution J_{1t} gehört auch das Paar $m_2 m_3$, weil dieses durch $h_1 h_1^*$ harmonisch getrennt wird. Construiren wir daher zu $m_2 m_3$ das correspondirende Paar in der Involution J_{1w} , so bestimmt dasselbe zwei Kegelschnitte K_w^2 , welche K^2 doppelt berühren und m_1 , m_2 , m_3 zu Tangenten haben. Es stellt also zwei der gesuchten Berührungsebenen vor. Die anderen zwei erhalten wir, indem wir die analoge Construction — von H_1^* ausgehend — durchführen.

Wir bemerken noch, dass von diesen zwei Paaren von Berührungssehnen nur das eine reell sein kann, wenn M_2M_3 imaginär sein soll; denn wären beide reell, so müssten ihre Pole reell sein, also die Verbindungslinien der letzteren sich in reellen Punkten M_2 , M_3 schneiden. Nun bilden die Pole dieser Sehnen auf einer der Geraden h mit den resp. Schnittpunkten der Sehnen Paare der Involution harmonischen

Pole auf h in Bezug auf K^2 . Weil aber $m_1h_1h_1^*$ ein Tripel harmonischer Polaren in Bezug auf K^2 ist und weil m_1 den Kegelschnitt K^2 in reellen Punkten schneidet, so muss auch eine — und nur eine — der Linien h aus K^2 zwei reelle Punkte schneiden. Auf dieser Linie h ist folglich die Involution harmonischer Pole hyperbolisch, auf der andern elliptisch. Nun enthält aber nur die hyperbolische Involution der Pole imaginäre Paare. Daraus folgt, dass unter den in Rede stehenden Berührungssehnen diejenigen imaginär sind, welche durch den hyperbolischen Punkt H gehen. Die anderen müssen reell sein.

Gehen wir jetzt von den Berührungssehnen zu den Doppeltangenten der C^4 über, so schliessen wir:

Hat C^4 einen reellen und zwei imaginäre Inflexionsknoten, so müssen von den vier Doppeltangenten zwei reell und zwei imaginär sein.

6. Involutorische Lage der C^4 .

Sei $x_1 x_1'$ ein Paar der Involution J_1 . x_1 treffe K^2 in $A_1 B_1$. Construiren wir in diesen Punkten die Tangenten an K^2 , so schneiden diese sich in S_1 auf m_1 und werden durch m_1 und $S_1 M_1$ harmonisch getrenut. x_1' trifft diese Tangenten in zwei Punkten — A_1' , B_1' — der C^4 . Also werden auch diese durch M_1 resp. m_1 harmonisch getrenut. Das Analoge gilt für Punkte von C^4 , welche auf Geraden durch $M_2 M_3$ liegen. Wir sagen daher:

C4 ist in dreierlei Weise zu sich selbst involutorisch. Centra dieser Involutionen sind die doppelten Inflexionsknoten. Ihre Verbindungslinien sind die resp. Axen der Involutionen.

Kennen wir also von C^4 einen Punkt A'_1 und ferner $M_1M_2M_3$, so können wir drei weitere Punkte B'_1 , C'_1 , D'_1 bestimmen. Dieselben bilden mit A'_1 ein Viereck, für welches die Punkte M die Diagonalpunkte sind. Wir wollen dasselbe als ein Quadrupel von Punkten der C^4 bezeichnen. Der duale Gedanke führt uns zu vier Tangenten a'_1 , b'_1 , c'_1 , d'_1 — einem Quadrupel von Tangenten— der C^4 , welche ein Vierseit bilden, das $m_1m_2m_3$ zu Diagonalen hat.

Im Allgemeinen hat ein Kegelschnitt mit einer Curve vierter Ordnung acht Punkte gemein. Denken wir uns nun durch ein Quadrupel von Punkten der C^4 einen Kegelschnitt gelegt, so ist für denselben $M_1 M_2 M_3$ ein Tripel harmonischer Pole. Sei dann E_1 ein weiterer gemeinsamer Punkt dieses Kegelschnittes und der Curve C^4 , so müssen die drei übrigen gemeinsamen Punkte F_1 , G_1 , H_1 mit E_1 ein Quadrupel von Punkten bilden. Wir schliessen daher:

Hat ein Kegelschnitt — K_q^2 — mit C^4 ein Quadrupel von *Punkten gemeinsa*m, so liegt auf ihm ein zweites Quadrupel von *Punkten*.

C⁴ ist von der sechsten Classe, hat also mit einem Kegelschnitte zwölf Tangenten gemeinsam. Wird dieser von einem Quadrupel von Tangenten der C⁴ berührt, so schliessen wir — analog wie oben —, dass seine weiteren gemeinsamen Tangenten mit C⁴ zwei Quadrupel bilden.

Construiren wir in einem Punkte A'_1 von C^4 die Tangente a'_1 , so wird durch $A'_1 a'_1$ und die Punkte, welche mit A'_1 ein Quadrupel bilden, ein Kegelschnitt K^2 bestimmt, der C^4 in den Punkten dieses Quadrupels berührt. Nun liegen auf C^4 unendlich viele Quadrupel von Punkten. Wir sagen daher:

Die Curve C4 wird von unendlich vielen Kegelschnitten K2 berührt, und zwar von jedem in den Punkten eines Quadrupels.

Für den Fall, dass $M_1 M_2 M_3$ reell sind, werden die Elemente eines Quadrupels der C^4 entweder alle reell oder alle imaginär sein. Sind aber $M_2 M_3$ imaginär, so können von den Elementen eines Quadrupels nur zwei reell sein und diese liegen auf einer reellen Geraden aus einem M_1 resp. sie schneiden sich in einem reellen Punkte einer Geraden m_1 .

7. Kegelschnitte K2.

Wir wenden uns zu den Kegelschnitten K^2 , welche C^4 in den Punkten eines Quadrupels berühren. Sei K_x^2 ein solcher Kegelschnitt, der das Punktquadrupel $A'_1B'_1C'_1D'_1$ und das in diesen Punkten berührende Tangentenquadrupel $a'_1b'_1c'_1d'_1$ enthält, so suchen wir — von K_x^2 ausgehend — einen Kegelschnitt K^2 , vermittelst dessen wir nach der in 1 angegebenen Methode die Curve C^4 erzeugen können, welche von K_x^2 in $A'_1B'_1C'_1D'_1$ berührt wird.

Zu diesem Zwecke knüpfen wir an die Tangentenconstruction in einem Punkte A'_1 von C^4 an, welche unter 2 entwickelt wurde. Dort bestimmten wir die Tangente a'_1 in A'_1 unter Zuhilfenahme der Tangente a_1 in A_1 an K^2 . Jetzt suchen wir A_1a_1 und kennen $A'_1a'_1$. Nehmen wir an, es sei eine beliebig durch A'_1 gezogene Gerade a_1 die Tangente an einen Kegelschnitt K^2 , so müssen die Linien m_1 , m_2 , m_3 , a'_1 , a_1 einen Kegelschnitt K_2 umhüllen Zeichnen wir in ihm für a_1 den Berührungspunkt A_1 , so wird durch a_1A_1 ein Kegelschnitt K^{*2} bestimmt, welcher $M_1M_2M_3$ zum Tripel harmonischer Pole hat. Wir können nun zeigen, dass dieser Kegelschnitt K^{*2} in Bezug auf C^4 die Eigenschaften des gesuchten Kegelschnittes K^2 besitzt.

Bezeichnen wir nämlich mit B_1b_1 , C_1c_1 , D_1d_1 (Fig. 4) die Punkte und Tangenten von K^{*2} , welche von A_1a_1 durch die Punkte und Geraden Mm harmonisch getrennt werden, und liege A_1B_1 auf einer Geraden x_1 durch M_1 , C_1D_1 auf einer Geraden y_1 durch M_1 , so bilden x_1y_1 mit m_2m_3 eine harmonische Gruppe Seien dann $x_1'y_1'$ die Geraden durch M_1 , welche A_1' , B_1' resp. C_1' , D_2' mit einander verbinden, so sind auch diese durch m_2m_3 harmonische

nisch getrennt: Darans folgt nach einem bekannten Gesetze, dass die Paare x_1x_1' , y_1y_1' , m_2m_3 einer und derselben Involution J_1 angehören. Weiter bemerken wir, dass b_1 zu a_1 und B'_1 zu A'_1 centrisch collinear liegen in einer Collineation, deren Centrum M_1 und deren Axe m_1 ist. Da wir nun vorausgesetzt haben, dass a, durch A', geht, so muss infolge der angedeuteten Lage auch b_1 durch B'_1 gehen. In analoger Weise können wir zeigen, dass C'_1 in c_1 und D'_1 in d_1 liegt. Mithin sind die Punkte A'_1 , B'_1, C'_1, D'_1 und ihre Tangenten $a'_1, \ldots a'_1$ mit Hilfe von K^{*2} und J_1 nach der in 1 resp. 2 entwickelten Methode gefunden. Nun giebt es aber nur eine C^4 , welche durch $M_1 M_2 M_3$ und die acht Elemente $A'_1, \ldots D'_1$, $a'_1 \dots a'_1$ geht. Bestimmen wir also aus K^{*2} und J_1 nach der Methode von 1 weitere Punkte einer C4, so müssen diese auch auf der Curve vierter Ordnung liegen, welche in $A'_1 \dots D'_1$ von $a'_1 \dots a'_1$ berührt wird. Mithin fällt K*2 mit dem gesuchten Kegelschnitt K2 zusammen. Er berührt C4 in den Punkten eines Quadrupels, das auf den Doppelstrahlen der Involution J_1 liegt.

Drehen wir jetzt a_1 um A'_1 , so gehört zu jeder Lage von a_1 ein Kegelschnitt K^2 und wir gelangen so zu den unendlich vielen Kegelschnitten, welche C^4 in den Punkten eines Quadrupels berühren. Jeder dieser Kegelschnitte K^2 mit zugehöriger Involution J_1 kann den Kegelschnitt K^2 und die Involution J_1 in 1 ersetzen. Berücksichtigen wir, dass sich analoge Resultate für die Scheitel M_2 M_3 ergeben, so schliessen wir:

Aus jedem der unendlich vielen Kegelschnitte K^2 , welche C^4 in den Punkten eines Quadrupels berühren, lässt sich diese Curve nach der in 1 angegebenen Methode erzeugen und zwar je mit Hilfe einer Involution J_x (x=1,2,3), deren Doppelstrahlen die Verbindungslinien von M_x mit den Quadrupelpunkten auf K^2 sind.

Durch jeden der jetzt gefundenen Kegelschnitte K^3 wird eine quadratische Transformation von der Art geleitet, wie die unter 2 betrachtete war. Construiren wir in allen diesen Transformationen die Kegelschnitte K_g^2 , welche einer Geraden g correspondiren, so bilden diese eine Schaar, welche g, m_1 m_2 m_3 zu gemeinsamen Tangenten hat. Durchläuft g die Ebene, so repräsentiren sämmtliche Kegelschnitte K_g^2 ein Netz, für welches m_1 , m_2 , m_3 die Grundtangenten sind. Greifen wir aus diesen Kegelschnitten K_g^2 irgend einen heraus und sei g eine seiner Tangenten, so correspondirt er g in einer quadratischen Transformation, deren Leitcurve auf folgende Weise gefunden wird. Wir ziehen aus den Punkten, in welchen g die Curve C^4 schneidet, die zweiten Tangenten an K_g^2 . Diese müssen auch K^2 berühren, und da überdies die Punkte M_1 , M_2 , M_3 ein Tripel harmonischer Pole für K^2 sind, so ist dieser Kegelschnitt, bestimmt.

Es ist also ein Kegelschnitt K_g^2 jeder seiner Tangenten in Bezug auf einen Kegelschnitt K^2 zugeordnet. Wir können dies auch so ausdrücken: Jede Tangente eines Kegelschnittes K_g^2 correspondirt einem Kegelschnitt K^2 und C^4 erscheint als der Ort der Schnittpunkte dieser Tangenten mit den gemeinsamen Tangenten von K_g^2 und den resp. Kegelschnitten K^2 .

8. Zusammenhang zwischen den Kegelschnitten K^2 und den Involutionen J.

Wir untersuchen nun, in welcher Weise die Kegelschnitte K^2 von den Involutionen J abhängen. Zuerst heben wir hervor, dass m_2m_3 ein gemeinsames Paar für alle Involutionen J_1 und für alle Involutionen J_{1k} in Bezug auf die verschiedenen Kegelschnitte K^2 ist. Also schneiden letztere m_1 in Paaren einer Involution, für welche M_2 , M_3 die Doppelpunkte sind. Den Strahlen aus M_1 nach den Schnittpunkten von K^2 mit m_1 correspondiren in den Involutionen J_1 die Inflexionstangenten i_1 , i_1^* in M_1 an C^4 . Sind letztere reell, so müssen also auch die Schnittpunkte der Kegelschnitte K^2 mit m_1 reell sein. Da das Analoge für die Involutionen an den Scheiteln M_2 , M_3 und für die Schnittpunkte von K^2 mit m_4 , m_3 gilt, so schliessen wir:

Eine Gerade m schneidet entweder sämmtliche Kegelschnitte K2 reell oder imaginär.

Das Viereck der Schnittpunkte eines Kegelschnittes K^2 mit zweien der Geraden m ist, wie wir oben (4) gesehen, dem Viereck der Schnittpunkte der Inflexionstangenten in zwei resp. Punkten M eingeschrieben. Nun ist das letztere Viereck nur von C^4 abhängig. Ziehen wir daher durch eine seiner Ecken — sagen wir T_{12} in Fig. 2 — eine beliebige Gerade, so trifft diese m_1 resp. m_2 in zwei Punkten — S_1 , S_1^* — eines Kegelschnittes K^2 und derselbe ist durch diese zwei Punkte bestimmt. Zugleich erkennen wir, dass stets zwei Vierecke der S gezeichnet werden können, welche dem Vierecke der T eingeschrieben sind und welche sich in zwei Punkten auf einer Linie m schneiden. Zu jedem dieser Vierecke gehört ein Kegelschnitt K^2 und es berühren sich also diese Kegelschnitte paarweise in je zwei Punkten einer Linie m.

Für die Involution J_1 ist $M_1 A_1$, $M_1 A'_1$ (Fig. 4) ein Paar. Lassen wir nun A'_1 fest, so hängen die verschiedenen Werthe der Involutionen J_1 nur vom Orte der Punkte A_1 ab, da wir oben gesehen, dass $m_2 m_3$ allen Involutionen J_1 gemeinsam ist. Wir untersuchen also den Ort der Punkte A_1 . A_1 wurde gefunden als Berührungspunkt eines Kegelschnittes K_g^2 , der m_1 , m_2 , m_3 , a_1 , a'_1 zu Tangenten hatte. Drehen wir nun a_1 um A'_1 , so bilden sämmtliche Kegelschnitte K_g^2 eine Schaar, für welche m_1 , m_2 , m_3 , a'_1 die Grundtangenten sind. Construiren wir nach dem Satze von Brianchon — Fig. 5 — auf dem Büschel der a_1 in den Kegelschnitten von Brianchon — Fig. 5 — auf dem Büschel der a_1 in den Kegelschnitten von Grundtangenten sind.

بالمنافرة والمنافرة المنافرة والمراوا والماء والماروات والمناور والماروات

Legen wir durch zwei Punkte A'_1 , E'_1 von C^4 und durch $M_1 M_2 M_3$ einen Kegelschnitt K_m^2 , so sind die Geraden, welche $A'_1 E'_1$ mit einem beliebigen Punkte von K_m^2 verbinden, Tangenten eines Kegelschnittes K^2 , der C^4 in den Punkten eines Quadrupels berührt.

Jeder Kegelschnitt durch $M_1 M_2 M_3$ enthält ausser diesen Inflexionsknoten noch zwei Punkte der C^4 , also muss er von der Art der Kegelschnitte K_m^2 sein. Diese repräsentiren mithin das Netz der Kegelschnitte, welche $M_1 M_2 M_3$ zu Grundpunkten haben. Ist A'_1 dem E'_1 unendlich henachbart, so berührt der zugehörige Kegelschnitt K_m^2 die Curve C^4 . Er ist von der Art der in 8 besprochenen Kegelschnitte K_s^2 .

Gehen wir nun zu den Involutionen J_1 , J_2 , J_3 über und übertragen wir dieselben auf einen Kegelschnitt K_m^2 , so wissen wir, dass ihre Pole (3) in einer Geraden liegen. Diese Geraden gehen durch einen Punkt T. Denn construiren wir z. B. die Pole der Involutionen J_1 , J_2 , so liegen diese auf m_1 resp. m_2 . Jedem Kegelschnitt K^2 ist ein Pol in m_1 und einer in m_2 zugeordnet. Also bilden diese Pole projectivische Reihen. In denselben entspricht sich der Punkt M_3 selbst; also sind diese perspectivisch und die Verbindungslinien entsprechender Punkte gehen durch einen Punkt T. Auf diesen Verbindungslinien liegen aber auch die Pole der Involutionen J_3 und unsere Behauptung ist damit bewiesen.

Wir erhalten nun T durch folgende Ueberlegung. Der Strahl aus M_1 nach A'_1 ist ein Doppelstrahl einer Involution J_1 . Diese gehört zu dem Kegelschnitt K^2 , welcher in A'_1 die Curve C^4 berührt. Zu dem gleichen Kegelschnitt K^2 gehören aber auch die Involutionen J_2 resp. J_3 , für welche M_2 A'_1 resp. M_3 A'_1 je ein Doppelstrahl ist. Also liegen die Pole von J_1 , J_2 , J_3 in der Tangente, welche K_m^2 in A'_1 berührt. In analoger Weise schliessen wir, dass die Involutionen, für welche M_1 E'_1 , M_2 E'_2 , M_3 E'_3 je ein Doppelstrahl ist, ihre Pole auf der Tangente haben, welche in E'_1 an K_m^2 geht. Folglich muss der Schnittpunkt der Tangenten in A'_1 und E'_1 an K_m^2 der gesuchte Pol sein. Wir sagen daher:

Construiren wir die Pole der zu den Kegelschnitten K^2 gehörigen Involutionen J_1 , J_2 , J_3 in Bezug auf einen Kegelscnitt K_m^2 , so liegen diese Pole in den Geraden eines Büschels. Dasselbe hat zum Scheitel den Pol derjenigen Geraden, welche die Schnittpunkte $A'_1E'_1$ von C^4 und K^2 verbindet.

Es ist durch das Gesagte jedem Kegelschnitt A^3 eine Tangente a_1 durch A'_1 und eine Gerade t durch T zugeordnet. Also bilden die Geraden a_1 und die Geraden t zwei zu einander projective Büschel und der Ort der Schnittpunkte entsprechender Strahlen ist ein Kegelschnitt. Derselbe geht durch A'_1 TM_1 M_2 M_3 . Er berührt in A_1 die Curve C^4 . Denn betrachten wir die Tangente in A'_1 an K_m^2 als eine Gerade des Büschels

Sind $M_1 M_2 M_3$ reell, so erkennen wir leicht mit Hilfe des Kegelschnittes K_s^2 , ob ein Kegelschnitt K'^2 die Curve C^4 in einem reellen oder imaginären Quadrupel berührt. Ersteres wird eintreten, wenn die Doppelstrahlen der Involutionen J_1 , J_2 , J_3 , welche zu K^2 gehören, alle reell sind. Dies hängt von der gegenseitigen Lage der Punkte A_1 , A'_1 ab und wird immer stattfifiden, wenn A_1 und A'_1 zwischen den nämlichen zweien der drei Punkte M gelegen sind. Dann trifft a_1 die Geraden m in Punkten, für welche die Involutionen harmonischer Polaren in Bezug auf K_s^2 hyperbolisch sind. Dementsprechend werden auch $J_1 J_2 J_3$ hyperbolisch sein.

In jedem andern Falle ist das Quadrupel imaginär, liegt aber, da eine der drei Involutionen J_1 , J_2 , J_3 stets hyperbolisch ist, auf den zwei reellen Geraden dieser hyperbolischen Involution und überdies auf einem reellen Kegelschnitt K^2 . Daher ist es durch reelle Elemente vollkommen definirt.

Jeder Punkt A_1 der Curve C^4 führt auf die angegebene Weise zu einem Kegelschnitt K_2 . Wir können denselben als Ort aller der Punkte A_1 auffassen, welche dem Punkte A_1' in Bezug auf sämmtliche Kegelschnitte K^2 zugeordnet sind. Daraus schliessen wir aber, dass jeder Kegelschnitt, der durch $M_1M_2M_3$ und zwei in Bezug auf einen Kegelschnitt K^2 einander zugeordnete Punkte A_1 , A_1' geht, ein Kegelschnitt K_2 ist und also C^4 in A_1' berührt. Kennen wir daher $M_1M_2M_3A_1A_1'$, so können wir den Kegelschnitt K_2 benutzen, um in A_1' die Tangente an C^4 zu construiren. Wir erhalten dann eine Construction, welche der in 2 entwickelten dual gegenübersteht.

9. Netz der Kegelschnitte durch M, M, M,

Wir können die Kegelschnitte K_s^2 einer allgemeinen Gruppe von Kegelschnitten unterordnen und gehen zu diesem Zwecke von zwei Punkten A_1' , E_1' der C^4 aus. Jedem derselben entspricht in Bezug auf einen Kegelschnitt K^2 ein Punkt von K^2 — sagen wir A_1' der Punkt A_1 und E_1' der Punkt E_1 . Dann sind $A_1'A_1$ oder a_1 und E_1' E_1 oder e_1 Tangenten an K^2 . Lassen wir nun K^2 alle möglichen Werthe annehmen, so erhalten wir unendlich viele einander eindentig zugeordnete Tangentenpaare a_1e_1 durch A_1' resp. E_1' , d. h. zwei zu einander projectivische Büschel von Tangenten. Der Ort der Schnittpunkte entsprechender Tangenten dieser Büschel muss also ein Kegelschnitt — K_m^2 — sein. Derselbe geht durch $A_1' E_1'$, weil diese Punkte die Scheitel der erwähnten projectivischen Büschel sind. Er enthält $M_1 M_2 M_3$, da wir diese Punkte — resp. die Inflexionstangenten in ihnen — als degenerirte Kegelschnitte K^2 auffassen müssen. K_m^2 ist also durch $M_1 M_2 M_3 A_1'$ E_1' bestimmt. Nan waren $A_1' E_1'$ beliebige Punkte von E_1' . Wir schliessen daher:

bilden alle Kegelschnitte K_m^2 , welche durch A'_1 gehen, ein Büschel. Mit Hilfe jedes Kegelschnittes dieses Büschels können wir die Tangente in A'_1 an C^4 construiren und erhalten dabei stets denselben Kegelschnitt K_0^2 . Folglich ist dieser der Ort der Pole sämmtlicher Geraden $A'_1 E'_1$ in Bezug auf die resp. Kegelschnitte K_m^2 . Wir können daher die Punkte von C^4 auch nach folgendem Gesetze finden:

Wir gehen aus von einem Kegelschnittbüschel mit den Grundpunkten M_1 , M_2 , M_3 , A'_1 . K_s^2 sei ein Kegelschnitt dieses Büschels. Ziehen wir durch A'_1 eine Gerade und betrachten wir diese als Tangente eines Kegelschnittes — K_m^2 — des Büschels, so ist dieser dadurch individualisirt. Schneidet dann diese Tangente den Kegelschnitt K_s^2 ein zweites Mal in T, so trifft die Polare von T in Bezug auf K_m^2 diesen Kegelschnitt in einem zweiten Punkte — E'_1 — der C^4 . Wir können dies auch so ausdrücken:

Die Punkte des Kegelschnittes K_s^2 sind den übrigen Kegelschnitten K_m^2 des Büschels in der Weise zugeordnet, dass die Polaren dieser Punkte in Bezug auf ihre correspondirenden Kegelschnitte sich in einem Grundpunkte A'_1 des Büschels treffen. Dann liegen die Schnittpunkte dieser Polaren mit ihren resp. Kegelschnitten auf einer C^4 .

Die letzterwähnten Constructionen gestatten uns, C^4 durch Punkte und Tangenten rein linear zu construiren, wenn wir M_1 , M_2 , M_3 und zwei weitere Punkte oder einen Punkt mit seiner Tangente kennen.

11. Erzeugung von C^4 aus Kegelschnittbüscheln und -Schaaren.

Wir gehen aus von den Kegelschnitten K_q^2 , welche zwei Quadrupel von Punkten der C^4 enthalten. Ein Quadrupel — A', B', C', D', — liegt mit jedem andern auf einem solchen Kegelschnitte und die Gesammtheit dieser Kegelschnitte bildet ein Büschel B2, das A', B', C', D', zu Grundpunkten hat. Das Strahlenpaar, welches von einem der Punkte M sagen wir M_1 — ausgeht und das einen Kegelschnitt des Büschels $\mathbf{B^2}$ in den Punkten eines Quadrupels schneidet, wird durch mems harmonisch getrennt. Mithin bilden alle diese Strahlenpaare eine Involution $-J_{1m}$, für welche m2, m3 die Doppelstrahlen sind. Ordnen wir nun jedem Quadrupel den Kegelschnitt des Büschels B² zu, auf welchem dieses Quadrupel liegt, so ist damit auch jedem Strahlenpaare der Involution $oldsymbol{J_{1m}}$ ein Kegelschnitt des Büschels B2 zugeordnet. B2 und J1m sind zu einander projectivisch. In dieser Projectivität correspondiren den Doppelstrahlen der Involution J_{1m} die Kegelschnitte des Büschels B^2 , welche in die Geraden durch M. M. zerfallen. Der Kegelschnitt aber, welcher in den Grundpunkten A'1, ... D'1 des Büschels die Curve C4 berührt, muss den Strahlen durch M, entsprechen, welche die Grundpunkte des Büschels verbinden. Schneiden wir das Büschel B² und die Involution J_{1m} mit m_1 , so erhalten wir in dieser Geraden zwei zu einander projectivische Punktinvolutionen, für welche $M_2 M_3$ sich entsprechende Paare sind. Jedes Quadrupel von Punkten der C^4 führt in Bezug auf einen Punkt M zu einer Projectivität der erwähnten Art.

Eine andere Projectivität erhalten wir, wenn wir irgend zwei Büschel B² durch C^4 auseinander bezogen denken. Seien diese Büschel mit B_1^3 , B_2^3 bezeichnet und haben sie A_1' , B_1' , C_1' , D_1^3 resp. E_1' , F_1' , G_1' , H_1' zu Grundpunkten, so schneidet jeder Kegelschnitt K_1^2 des Büschels B_1^2 die Curve C^4 in einem zweiten Quadrupel von Punkten. Durch dieses und die Grundpunkte des zweiten Büschels B_2^2 geht ein Kegelschnitt L_2^2 . Auf diese Weise sind durch C^4 die Büschel B_1^2 , B_2^2 zueinander projectivisch gemacht. C^4 ist Erzeugniss der projectivischen Büschel.

Untersuchen wir die Projectivität näher, so erkennen wir, dass den drei degenerirten Kegelschnitten des einen Büschels, welche durch M_1 , M_2 , M_3 gehen, die degenerirten Kegelschnitte des andern entsprechen. Unter den Kegelschnitten jedes Büschels ist einer, der C^4 in den Grundpunkten des Büschels berührt. Ihm correspondirt im andern Büschel jeder Kegelschnitt, welcher durch die Grundpunkte des ersteren Büschels geht. Wir können dies auch so ausdrücken: Dem Kegelschnitt durch die acht Grundpunkte beider Büschel entspricht in jedem Büschel der Kegelschnitt, welcher C^4 in den Grundpunkten dieses Büschels berührt.

Haben wir jetzt die Projectivität der Büschel B_1^2 , B_2^2 durch C^4 vermittelt gedacht, so können wir umgekehrt C^4 aus zwei solchen Büscheln erzeugen und dies dahin aussprechen:

Sind zwei Kegelschnittbüschel, deren Grundpunktvierecke dieselben Diagonalpunkte M_1 , M_2 , M_3 haben, in der Weise aufeinander bezogen, dass die degenerirten Kegelschnitte durch denselben Punkt M sich entsprechen, so ist der Ort der Schnittpunkte correspondirender Kegelschnitte beider Büschel seine Curve C^4 , für welche M_1 , M_2 , M_3 doppelte Inflexionsknoten sind.

Ein dualer Gedankengang wie der jetzt durchgeführte ergiebt Erzengungsweisen der C⁴ aus Kegelschnittschaaren. Die Tangenten eines Quadrupels der C⁴ sind Grundtangenten einer Schaar. Dann wird durch C⁴ eine ein zweideutige Projectivität zwischen den Kegelschnitten dieser Schaar und den Paaren einer Involution vermittelt, welche zwei Punkte M zu Doppelpunkten hat; denn jeder Kegelschnitt der Schaar enthält ausser den Grundtangenten noch zwei Quadrupel von Tangenten der C⁴ und diese schneiden die Geraden m in den Paaren der angedeuteten Involutionen.

Weiter kann C4 durch zwei Schaaren erzeugt werden, deren Grundtengentenvierseite dieselben Diagonalen haben und welche so auseinander

i

bezogen sind, dass jedem Kegelschnitt der einen Schaar zwei der andementsprechen. C^4 ist Enveloppe der gemeinsamen Tangenten entsprechementer Kegelschnitte.

12. Büschel der sich doppelt berührenden Kegelschnitte K_a^2 .

Wir wollen nun die Kegelschnitte K_q^2 nach einem neuen Gesichen punkte gruppiren und schicken zu diesem Zwecke eine allgemeine merkung über Kegelschnitte voraus.

Sei K^2 ein beliebiger Kegelschnitt und sei M_1 , m_1 in Bezug auf deselben Pol und Polare. Ziehen wir dann durch M_1 zwei Gerade x_1 , x_2 welche K^2 in $A_1B_1E_1F_1$ treffen sollen, so schneiden sich die Verbindun gelinien dieser Punkte in einem Tripel harmonischer Pole in Bezug auf K^2 . M_1 ist für dasselbe eine Ecke. Die beiden anderen — Z, Z' — liegen in m_1 . Construiren wir sodann die Tangenten in $A_1B_1E_1F_1$ an K^2 , so treffen diese x'_1 resp. x_1 in Punkten — $A'_1B'_1$, $E'_1F'_1$ —, deren Verbindungslinien ebenfalls durch die Tripelecken M_1ZZ' gehen. Mithin haben alle Kegelschnitte, welche durch die vier Punkte A'_1 , B'_1 , E'_1 , F'_1 gehen, mit dem Kegelschnitt K^2 das Tripel M_1ZZ' gemeinsam.

Sei nun K^2 einer der Kegelschnitte, welche C^4 in den Punkten eines Quadrupels berühren, und sei x_1x_1' ein Paar der zu K^2 gehörenden Involution J_1 , so sind A'_1 , B'_1 , E'_1 , F'_1 vier Punkte von C^4 . Zeichnen wir dann zu x_1x_1' die vierten harmonischen y_1y_1' in Bezug auf m_2 m_3 , so liegen auf y_1y_1' die Punkte $C'_1D'_1$ resp. $G'_1H'_1$ der C^4 , welche A'_1 B'_1 resp. $E'_1F'_1$ zu zwei Quadrupeln ergänzen. Durch letztere geht ein Kegelschnitt K_q^2 , der mit K^2 das Tripel $m_1m_2m_3$ gemeinsam hat. Da aber auf K_q^2 auch die Punkte A'_1 , B'_1 , E'_1 , F'_1 liegen, so ist nach der ober gemachten Bemerkung auch M_1ZZ' ein Tripel harmonischer Pole für K' und K_q^2 . Also ist die Involution harmonischer Polaren — J_{1k} — um M'_1 für M'_2 und M'_3 dieselbe. Mithin müssen sich M'_2 und M'_3 in zwei Puziten von m_1 berühren. Heben wir noch hervor, dass y_1y_1' ebenso x_1x_1' ein Strahlenpaar der Involution J_1 ist, so schliessen wir:

Zwei Strahlenpaare einer Involution J_1 , welche dur m_2m_3 harmonisch getrennt sind, enthalten zwei Quadrup der C^4 , die auf einem Kegelschnitte K_q^2 liegen, welcher d zu J_1 gehörenden Kegelschnitt K^2 in zwei Punkten von berührt.

Wir erhalten so ein Büschel sich doppelt berührender Kegelschni K_q^2 , welche zu demselben Kegelschnitt K^2 resp. zu derselben Involuti J_1 gehören. Wir können nun zeigen, dass in diesem Büschel ausser noch ein Kegelschnitt — K^{*2} — vorkommt, der C^4 in den Punkten ein Quadrupels berührt. Wir construiren ihn und seine Involution J_1^* nafolgender Ueberlegung. Es giebt in jeder Involution — also auch in J_1 —stets ein Strahlenpaar, das mit einem gegebenen — sagen wir $m_n m_n$

eine harmonische Gruppe bildet. Haben wir die Involution J_1 auf einen Kegelschnitt H^2 , welcher durch M_1 geht, übertragen (Fig. 6), so finden wir dieses Paar, indem wir $m_2 m_3$ als Doppelstrahlen einer Involution J_{1m} betrachten, ihren Pol J_{1m} mit dem Pole von J_1 verbinden und mit dieser Linie H^2 schneiden. Die Strahlen g_1^* , h_1^* aus M_1 nach diesen Schnittpunkten repräsentiren das gesuchte Paar. Auf ihm liegen vier Punkte A'_1 , B'_1 , E'_1 , F'_1 der C^4 . Ergänzen wir dieselben zu zwei Quadrupeln $A'_1 \dots D'_1$, $E'_1 \dots H'_1$, so fallen $C'_1 D'_1$ mit $E'_1 F'_1$ und $G'_1 H'_1$ mit $A'_1 B'_1$ zusammen. Also muss der Kegelschnitt, welcher durch diese zwei sich deckenden Quadrupel geht, dem Büschel der Kegelschnitte K_q^2 angehören und C^4 in den Punkten A'_1 , B'_1 , E'_1 , F'_1 berühren. Es ist der gesuchte Kegelschnitt K^{*2} (vergl. 8).

Ueber die gegenseitigen Beziehungen von $K^2 K^{*2}$ resp. $J_1 J_1^*$ machen wir noch einige Bemerkungen. Im Hilfskegelschnitt H^2 bilden die Pole der Involutionen J_1 , J_{1m} , J_1^* ein Tripel harmonischer Pole und es werden somit J_1 , J_1^* durch $m_2 m_3$ harmonisch getrennt. Daher kann bei reellem $m_2 m_3$ nur eine der Involutionen J_1 , J_1^* reell sein; dementsprechend wird nur einer der Kegelschnitte K^2 , K^{*2} die C^4 in reellen Punkten eines Quadrupels berühren, wohl aber ist es möglich, dass beide Kegelschnitte mit C^4 imaginären Contact haben.

Ist $m_2 m_3$ imaginär, also J_{1m} elliptisch, so sind die beiden Involutionen J_1 , J_1^* hyperbolisch.

Sei nun A'_1 ein Punkt von C^4 auf x_1 , so gehört zu ihm sowohl ein Punkt A_1 auf K^2 , als ein Punkt A_1^* auf K^{*2} . A_1 , A_1^* sind Berührungspunkte von Tangenten aus A'_1 an K^2 resp. K^{*2} und müssen in den Geraden x'_1 resp. y'_1 liegen, welche x_1 in der Involution J_1 resp. J_1^* entsprechen. Kennen wir daher K^2 , J_1 und haben wir auf angegebene Weise J_1^* bestimmt, so erhalten wir einen Punkt mit Tangente von K^{*2} — unabhängig davon, ob letzterer Kegelschnitt die Curve C^4 reell oder imaginär berührt — nach folgendem Verfahren. Wir gehen aus von A'_1 auf x_1 , suchen zu x_1 den entsprechenden y'_1 in der Involution J_1^* und den entsprechenden in der Involution J_{1k} . Letzterer trifft m_1 im Pole von x_1 in Bezug auf K^{*2} und durch diesen Pol und A'_1 geht die Tangente, welche K^{*2} in einem Punkte A_1^* von y_1 berührt. Damit ist dieser Punkt mit seiner Tangente und also auch K^{*2} gegeben.

Führen wir den analogen Gedankengang durch, indem wir von M_2 resp. M_3 ausgehen, so finden wir, dass sich die Kegelschnitte K_q^2 auch in Büschel gruppiren lassen, für welche die Berührungspunkte in m_2 resp. m_3 liegen. Jedes dieser Büschel enthält zwei Kegelschnitte, die C^4 in einem Quadrupel berühren.

Nun haben wir unter 3 gezeigt, dass eine Gerade m sämmtliche Kegelschnitte K^2 entweder reell oder imaginär schneidet. Jeder Kegelschnitte K^2 wird aber von unendlich vielen Kegelschnitten K_2^2 in dies

Schnittpunkten berührt. Lassen wir K^2 seine unendlich vielen Werthe durchlausen, so erhalten wir ihnen entsprechend unendlich viele Büschel von Kegelschnitten K_q^2 und diese stellen uns die Gesammtheit der Kegelschnitte K_q^2 vor. Es folgt also, dass auch diese von einer Geraden m entweder alle reell oder alle imaginär geschnitten werden.

Ist $M_1 M_2 M_3$ reell, so wird jeder Kegelschnitt K^2 von zweien der drei Linien m reell geschnitten und dann repräsentiren die Kegelschnitte K^2 , K_q^2 die Gesammtheit aller der Kegelschnitte, welche $M_1 M_2 M_3$ zum Tripel harmonischer Pole haben und welche dieselben zwei Linien m reell schneiden. Wird $M_2 M_3$ imaginär, so können alle Kegelschnitte, welche $M_1 M_2 M_3$ zum Tripel harmonischer Pole haben und welche m_1 reell schneiden, als Kegelschnitte K_q^2 resp. K^2 auftreten.

13. Die Tangenten von C^4 .

Wir wenden uns zu den Tangenten der C4 und knüpfen an das an, was wir in 2 und 8 über dieselben sagten. Die Constructionen, welche dort aus J, und K2 entwickelt wurden, lassen sich in analoger Weise mit Hilfe irgend eines der Kegelschnitte K2, welche C4 in den Punkten eines Quadrupels berühren, und der zugehörigen Involutionen J_1 resp. J_2 , J_3 κ_{ij} sführen. Je nachdem wir dazu einen Kegelschnitt K_{g}^{2} oder K_{e}^{2} verwenden, bedienen wir uns des Satzes von Brianchon oder Pascal. In beiden Fällen erhalten wir folgendes Schema der Construction. A'_1 ein Punkt von C^4 , A_1 sein zugehöriger in Bezug auf einen Kegelschnitt K^2 . Dann ist $A'_1 A_1$ oder a_1 die Tangente in a_1 an K^2 . Nun bringen wir M_1A_1 mit M_2A_1 zum Schnitte. (Fig. 7.) Den Schnittpunkt — $T_{1'2}$ — verbinden wir mit S_2 , dem Schnitte von a_1 und m_2 . Ziehen wir $S_2 T_{1'2}$, so schneide diese Gerade m_1 in S'_1 . Letzterer Punkt ist der Schnittpunkt der gesuchten Tangente a'_1 in A'_1 an C^4 mit m_1 . nämlichen Resultat führt auch folgende Construction. Sei T_{12} der Schnittpunkt von M_1A_1 mit M_2A_1 , so verbinden wir diesen Punkt mit S_1 , dem Schnitte von m_1 und a_1 . Diese Verbindungslinie treffe m_2 in S'_2 . Dann ist S', ein Punkt von a'1.

Setzen wir an Stelle von M_1 die Punkte M_2 , M_3 , so erhalten wir vier neue Tangentenconstructionen. Also können wir im Ganzen auf sechs verschiedene Weisen (Fig. 7) die Gerade a_1' bestimmen. Je zweimal gelangen wir dabei zu einem Punkte S'. Nach der eingeführten Bezeichnung liegen in Geraden die Punkte S_1 , S'_2 , T_{12}' , ferner S_1 , S'_3 , T_{13}' u. s. f. S'_1 können wir aber auch finden, indem wir von einem beliebigen Punkte P_2 auf m_2 ausgehen. Wir ziehen P_2S_1 (Fig. 7). Diese Linie schneide $\overline{M_1A_1}$ in A_{1p} . Letzteren Punkt verbinden wir mit M_2 . $\overline{M_2A_{1p}}$ werde von $\overline{M_1A_1'}_1$ oder $\overline{M_1T_{1'2}}$ in $P_{1'2}$ geschnitten. Dann geht die Gerade $P_2P_{1'2}$ durch S'_1 . Wir haben nämlich jetzt zu einer der oben gegebenen Tangentenconstruc-

tionen die centrisch-collineare gezeichnet in einer Collineation, für welche M_1 das Centrum und m_1 die Axe ist. Entsprechende Punkte in dieser Collineation sind: S_2 und P_2 , A_1 und A_{1p} , $T_{1'2}$ und $P_{1'2}$. Also sind $\overline{S_2T_{1'2}}$ und $P_{q}P_{1'2}$ entsprechende Gerade und schneiden sich im Punkte S_1 auf m_1 .

Durchläuft nun der Punkt A'_1 die Curve C^4 und construiren wir sammtliche Punkte S'_1 unter Benutzung des nämlichen Punktes P_2 , so fragen wir nach dem Orte der Schnittpunkte der Geraden $P_2S'_1$ und $M_1A'_{11}$ also nach dem Orte der Punkte $P_{1'2}$. Dieser ist abhängig vom Orte der Punkte A_{1p} und wir untersuchen daher zunächst letzteren. Wir erhalten die Punkte A_{1p} als Schnitte der Geraden P_2S_1 und M_1A_1 . S_1 ist stets Pol von M_1A_1 in Bezug auf den Kegelschnitt K^2 . Folglich sind die Strahlen durch P_2 nach den S_1 und durch M_1 nach den resp. A_1 Linien über den Paaren der Involution harmonischer Pole in m_1 in Bezug auf K^2 . Also liegen die Schnittpunkte dieser resp. Linien auf einem Kegelschnitt K_{1p}^2 , der durch P_2 und M_1 geht. Er ist der Ort der Punkte A_{1p} . M_3 ist in Bezug auf ihn Pol der Geraden m_3 . Er enthält die Punkte, in denen K^2 von m_1 geschnitten wird. (Fig. 8.)

Ziehen wir nun aus M2 nach den Punkten des Kegelschnittes K1p2 Gerade und schneiden wir diese mit den resp. Geraden M, A'1, so erhalten wir Punkte P1'2. Der Ort der letzteren wird also aus K1p2 mit Hilfe der Involution J, nach folgendem Gesetze abgeleitet. Wir ziehen du. .. M_i eine beliebige Gerade x_0 , welche K_{1p}^2 in zwei Punkten x_1, y_1 (Fig. 8) treffe. Ihre Verbindungslinien mit M_1 seien x_1, y_1 , und diesen Geraden sollen in der Involution J_1 die Geraden x'_1, y'_1 entsprechen. Dann schneiden letztere den Strahl x, in zwei Punkten des Ortes der P. Drehen wir x_2 um M_2 und bestimmen wir die Strahlenpaare x_1y_1 , so bilden diese eine Involution J_{1p} , für welche m_2 , m_3 die Doppelstrahlen and. Uebertragen wir diese Involution auf den Kegelschnitt K1p2, so ist M, ihr Pol. Nun ist aber m, m, ein Paar der Involution J, und da m, den Kegelschnitt Kip2 in M, berührt, so liegt der Pol von J, in Bezug auf Kip2 in ma. Wenn wir also zu x, y, die entsprechenden x', y', in J bestimmen und ihre zweiten Schnittpunkte mit K1p2 durch x1 resp. y_1 bezeichnen, so müssen sich x_1x_1 und y_1y_1 im Pole J_1 der Involution In also in einem Punkte auf mo schneiden. Daraus folgt aber, dass z'1 y'1 auf einer Geraden durch M2 liegen. Also sind auch die Strahlen x1, 1/1 ein Paar der Involution J1p und es ist jeder Geraden x2 durch M ein Paar der Involution Jip zugeordnet. Ziehen wir dagegen eine beliebige Gerade x' durch M, so correspondirt ihr in J, ein Strahl x,1. Dieser trifft K_{1p}^2 — ausser in M_1 — noch in einem zweiten Punkte z, -, durch den ein Strahl z2 geht. Also correspondirt einem Strahle I durch M, nur ein Strahl x, durch M.

Zwei Büschel nun, welche in der bemerkten Weise ein-zweideutig

— $C_{1'2}^3$ —, für welche M_1 ein Doppelpunkt und M_2 ein einfacher Punkt ist. Die Tangenten in M_1 und M_2 an $C_{1'2}^3$ sind die resp. correspondirenden zum Verbindungsstrahle der Scheitel M_1 , M_2 . Fassen wir diesen Strahl als einen solchen des Büschels um M_2 auf, so decken sich in unserem Falle seine beiden entsprechenden Strahlen in der Geraden m_2 . Also fallen die Tangenten in M_1 an $C_{1'2}^3$ susammen, d. h. M_1 ist Spitze für diese Curve dritter Ordnung. Gehöre aber $M_1 M_2$ dem Büschel um M_1 an, so correspondirt diesem Strahle im Büschel um M_2 die Gerade $M_2 P_2$. Also tangirt diese $C_{1'2}^3$ in M_2 . Suchen wir ihren dritten Schnittpunkt mit $C_{1'2}^3$, so bemerken wir, dass $M_2 P_2$ den Kegelschnitt K_{1p}^2 berührt. Also muss auch der erwähnte dritte Punkt in M_2 liegen. Daraus folgt, dass $M_2 P_2$ eine Inflexionstangente in M_2 an $C_{1'2}^3$ ist.

Weiter erwähnen wir, dass $x'_1 y'_1$ durch $m_3 m_2$ harmonisch getrennt wird, und schliessen daraus, dass auch die Punkte von $C_{1'2}^3$, welche in diesen Geraden liegen, durch M_2 resp. m_2 harmonisch getrennt werden. Verallgemeinern wir diese Bemerkung, so folgt, dass $C_{1'2}^3$ zu sich selbst centrisch-involutorisch liegt in einer Involution, deren Centrum M_2 und deren Axe m_2 ist. m_1 trifft die Curve $C_{1'2}^3$ in denselben Punkten wie die Inflexionstangenten i_1 , i_1^* in M_1 an C^4 . K_{1p}^2 schneidet $C_{1'2}^3$ in den Punkten, in welchen die Doppelstrahlen der Involution J_1 diesen Kegelschnitt treffen.

Wenn wir jetzt in analoger Weise wie oben P_2 mit $S_3' - dem$ Schnittpunkte der Tangente a_1' und m_3 - verbinden und $\overline{P_2S_3'}$ mit $\overline{M_3A_1'}$ zum Schnitte bringen, so erhalten wir einen Punkt $P_{3'2}$. Der Ort dieses Punktes ist eine Curve dritter Ordnung - $C_{3'2}^3$ -, für welche M_3 eine Spitze ist. m_2 ist Tangente in dieser Spitze, und in M_2 ist eine Inflexionsstelle mit M_2P_2 als Tangente. Analoges gilt für die Punkte P_3 auf P_3 und P_3 . Sei daher mit P_3 ein Punkt auf P_3 bezeichnet und nehme P_3 die Werthe P_3 die Werthe P_3 oder P_3 correspondiren u. s. f., so schliessen wir allgemein:

Ist P_x ein Punkt auf m_x und schneidet die Tangente a'_1 in A'_1 an C^4 die Gerade m_y in S'_y , so treffen sich die Linien $P_x S'_y$ und $M_y A'_1$ in Punkten einer Curve dritter Ordnung $C_{y'x}^3$. Dieselbe hat in M_y eine Spitze mit der Tangente m_x . Sie besitzt in M_x eine Inflexionsstelle und wird in dieser von $P_x M_x$ berührt.

14. Büschel der Curven C3.

Wir wollen jetzt die Gesammtheit der Curven dritter Ordnung zu überblicken suchen, welche nach dem obigen Satze hervorgebracht werden können, und betrachten zuerst die Curven, welche den Punkten P_2 auf m_2 in Bezug auf M_1 zugeordnet sind, d. h. die Curven $C_{1,2}$ 3.

Lassen wir P_2 die Gerade m_2 durchlaufen, so gehört zu jeder Lage dieses Punktes in Bezug auf K^2 ein Kegelschuitt K_{1p}^2 . Alle diese Kegelschuitt K_{1p}^2 werden in M_1 von m_3 berührt, schneiden sich in m_1 mit K^2 and haben M_2m_2 zu Pol und Polare. Sie sind zu einander centrisch-collinear in einer Collineation, deren Centrum M_1 und deren Axe m_1 ist. Aus jedem dieser Kegelschnitte K_{1p}^2 leiten wir mit Hilfe von J_1 eine Curve $C_{1^2}^3$ ab. Alle diese Curven haben dieselbe Spitze M_1 mit der Tangente m_2 und dieselbe Inflexionsstelle M_2 . Sie sind zu einander centrisch-collinear mit M_1 als Centrum, m_1 als Axe und schneiden sich — ausser in M_1 M_2 — noch in den Punkten, in welchen die Inflexionstangenten in M_1 an C^4 die Gerade m_1 treffen.

Durch jeden Punkt X der Ebene geht eine Curve C1.23. Wir erhalten sie, indem wir auf M, X einen Punkt A', der C4 und seine Tangente a bestimmen. Letztere trifft m, in S', S', X aber schneidet m, in P, und zu P, gehört eine Curve C1'23. Wir schliessen daraus, dass die bis jetzt abgeleiteten Curven dritter Ordnung ein Büschel - B1'23 bilden. Lassen wir an Stelle eines Kegelschnittes K2 den Kegelschnitt Ken treten, welcher Ke in zwei Punkten von m, berührt, so führt uns derselbe zu den nämlichen Kegelschnitten K_{1p} wie K*2; denn die Kegelschnitte K_{1p}^2 hängen nur von M_1 , P_2 und der Involution J_{1k} ab, welche für K2 und K2 dieselbe ist. Bestimmen wir dann aus diesen K1p2 mit Hilfe von J_1^* die Curven $C_{1'2}^3$, so müssen sie mit den oben aus K_{1p}^2 and J, construirten zusammenfallen; denn nach ihrer Definition sind sie un von C4 abhängig. Aus demselben Grunde erhalten wir auch keine anderen Curven C1'25, wenn wir von irgend einem der Kegelschnitte K2 oder K*2 ausgehen, welche C4 in den Punkten eines Quadrupels berühren.

In analoger Weise können wir fünf weitere Büschel von Curven dritter Ordnung ableiten. Nach der eingeführten Bezeichnungsweise sind zu die Büschel B3'2³, B2'1³, B3'1³, B1'3⁵, B2'3³. Curven der Büschel, welche denselben ungestrichenen unteren Index haben, gehören zu Punkten P auf der Linie m, welche den gleichen Index hat. Curven der Büschel, die denselben gestrichenen unteren Index haben, sind Punkten S' mit demselben Index zugeordnet.

Wir werden diese Curven C^3 benutzen, wenn es sich darum handelt, die Tangenten zu finden, welche sich aus einem Punkte S'_{π} auf m_{π} an C^4 legen lassen. Dabei bemerken wir, dass unter den Kegelschnitten \tilde{m}_{xy}^{-1} stets ein Kreis ist. Also werden wir zur Construction stets diejenigen Curven C^3 verwenden, welche sich aus den erwähnten Kreisen zeichnen lassen.

Zum Schlusse dieser Gedankenreihe erwähnen wir, dass die besprochenen Curven dritter Ordnung degenerirte Formen von Curven vierter Ordnung sind, welche sich in folgender Weise ergeben. Sei P ein beliebiger Punkt der Ebene, so ziehen wir durch ihn eine heliebige Gerade x, welche m_1 in S'_1 schneide. Dann gehen von S'_1 aus sechs Tangenten an C^4 , deren Berührungspunkte auf drei Geraden x_1 durch M_1 liegen. Es werden also auf diese Weise jeder Geraden x durch P drei Gerade x_1 durch M_1 zugeordnet; dagegen correspondirt jeder Geraden x_1 nur eine Gerade x_1 denn x_1 schneidet C^4 in zwei Punkten, deren Tangenten sich in S'_1 auf m_1 treffen. $S'_1 P$ aber ist der Strahl. der x_1 entspricht. Es folgt mithin, dass das Büschel der x zu dem der x_1 in einer ein-dreideutigen Projectivität steht. Zwei solche Büschel erzeugen bekanntlich eine Curve vierter Ordnung — C_1^A . Für dieselbe ist P ein einfacher und M_1 ein dreifacher Punkt. Auf den Geraden PM_2 und PM_3 fallen in M_2 resp. M_3 je drei Punkte von C_1^A zusammen. Also ist PM_2 Inflexionstangente in M_3 an C_1^A und PM_3 in M_3 .

Liegt nun P in m_2 , so enthält diese Gerade fünf Punkte an C_1 ^A, nämlich den dreifschen Punkt M_1 und die Punkte M_3 und P. Also ist m_2 ein Theil der Curve C_1 ^A, welche zu P gehört, und der Rest ist eine Curve von der Art der Curven C_1 ^A. Ist P in M_3 gelegen, so degenerirt die zu P gehörende Curve in die Gerade m_3 und eine Curve C_1 ^A u. s. f.

Die Curven $C_{1'}^4$ sind stets reell, wenn P reell ist; dagegen werden die Curven $C_{1'}^2$ und $C_{1'}^3$ imaginär, wenn M_2 M_3 imaginär sind. Sie enthalten dann nur als reelle Punkte: M_1 und die Schnittpunkte von m_1 mit i_1 i_1^* . Gleichwohl sind sie nach dem Vorhergehenden definirt und bestimmt.

Analoge Betrachtungen führen uns zu Curven $C_{2'}^4$, $C_{3'}^4$. Ihre degenerirten Formen sind $C_{2'1}^3$, $C_{2'3}^3$ und $C_{3'1}^3$, $C_{3'2}^3$ und je eine der Geraden m.

(Schluss folgt.)

Ueber die Integration linearer, nicht homogener Differentialgleichungen.

Von
WOLD. HEYMANN
in Plauen i. V.

Vorbemerkungen.

Die vorliegende Abhandlung beschäftigt sich damit, für Gleichungen von der Form

1)
$$X_n \frac{d^n y}{dx^n} + X_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \ldots + X_1 \frac{dy}{dx} + X_0 y = X,$$

in welcher X_n bis X_0 ganze Functionen von x sind, das Supplementintegral ohne die Kenntniss der partikulären Integrale der reducirten Gleichung herzuleiten. Unter dem Supplement- oder Ergänzungsintegral einer linearen, nicht homogenen Differentialgleichung verstehen wir diejenige einfachste Function, die dem Integral der reducirten Gleichung additiv beizugehen ist, damit das Integral der nicht reducirten Gleichung entsteht. Das Supplementintegral ist daher ein von willkürlichen Constanten freies partikuläres Integral der nicht homogenen Gleichung.

Wenn in Gleichung 1) die Indices der Functionen zugleich den Grad angeben und X eine Function μ^{ten} Grades bedeutet, so ist

2)
$$\zeta = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \ldots + \alpha_{\mu} x^{\mu}$$

das Supplementintegral. Denn man erkennt leicht, dass sich die Coefficienten α im Allgemeinen so bestimmen lassen, dass ζ der Gleichung partikulär genügt. Natürlich lässt sich das Supplementintegral nicht immer in so einfacher Weise ableiten; doch werden die späteren Untersuchungen zeigen, dass man fast ausnahmslos für alle linearen Differentialgleichungen, die in der reducirten Form integrirt werden können, das Supplement finden kann — und zwar nach einem Verfahren, welches der im bestimmten Falle vorgelegten Differentialgleichung in einer Weise angepasst ist, wie es die Lagrange'sche Methode der Variation der Constanten ihrer Allgemeinheit wegen nie sein kann.

Wollte man das Supplement einer Differentialgleichung, deren rechte Seite eine ganze Function ist, z. B. das der Differentialgleichung der

1

hypergeometrischen Functionen nter Ordnung nach der Lagrange'schen Methode aufstellen, so würde eine sehr complicirte Determinantenverbindung, gebildet aus bestimmten Integralen, entstehen; andererseits würde man, wie bei Gleichung 1), als Supplement

$$\zeta = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots$$

erhalten. Durch Vergleichung der Resultate würde man sonach zu merkwürdigen Integralbeziehungen gelangen, deren Existenz schwerlich auf anderem Wege erkannt und bewiesen werden dürfte. — Die Herleitung des Supplementintegrals für eine nicht homogene Differentialgleichung kann selbstverständlich nicht im Allgemeinen gezeigt werden, sondern man hat sich immer an specielle Fälle zu halten und gewisse Gruppen von Gleichungen zu untersuchen. Nicht selten gelingt es, die Methode, welche bei Integration der reducirten Gleichung in Anwendung kommt, so zu modificiren oder zu erweitern, dass ein Integral für die complete Gleichung gewonnen wird.

Die Abhandlung zerfällt in drei Theile. Sie behandelt

- I. Supplementintegrale linearer, nicht homogener Differentialgleichungen, deren zweiter Theil eine ganze Function ist;
- II. Supplementintegrale linearer, nicht homogener Differentialgleichungen, deren zweiter Theil eine beliebige Function ist;
- III. Supplementintegrale linearer, nicht homogener simultaner Differentialgleichungen.

1)
$$X_{\mu}y^{(n)} + X_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + X_{1}y' + X_{0}y = X_{\mu},$$
worin
$$X_{k} = k_{0} + k_{1}x + k_{2}x^{2} + \dots + k_{k}x^{k}.$$

Wir setzen voraus, dass der Grad einer jeden Function durch ihren Index angegeben ist, und führen nun auf der linken Seite als Ergänzungsintegral die ganze Function*

$$\zeta = \alpha_0 + \alpha_1 x + \ldots + \alpha_{\mu} x^{\mu} + \alpha_{\mu+1} x^{\mu+1}$$

sein muss, so ist $\alpha_{\mu+1}=0$, falls nicht unter den Coefficienten der vorgelegten Gleichung Beziehungen stattfinden, was nicht vorausgesetzt werden soll.

^{*} Da $(\mu+1)$ Potenzen zu identificiren sind, so müssen im Ergänzungsintegral $(\mu+1)$ verfügbare Coefficienten vorkommen; ζ muss also mindestens vom μ^{ten} Grade sein. — Dass diese Function nicht von höherem Grade zu sein braucht, ist unmittelbar klar. Denn wäre sie vom $(\mu+1)^{\text{ten}}$ Grade, so würde sich der Grad auf der linken Seite im Allgemeinen auch bis zum $(\mu+1)^{\text{ten}}$ erheben Nun hätte man aber zuerst den Coefficienten von $x^{\mu+1}$ zum Verschwinden zu bringen, und da dieser proportional dem Coefficienten $\alpha_{\mu+1}$ in

$$\zeta = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \ldots + \alpha_\mu x^\mu$$

ein. Da vorausgesetztermassen

$$X_{\mu} = A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + \ldots + A_{\mu} x^{\mu}$$

ist, so entsteht durch Gleichsetzung der Coefficienten gleicher Potenzen von x folgendes Gleichungssystem zur Berechtung der Zahlen α_0 bis α_{μ} :

Die J enthalten nur linear die Coefficienten der Functionen X_n bis X_n und gewisse aus den Zahlen n und μ gebildete Facultätenverbindungen. Das Gleichungssystem soll zeigen, in welcher Weise die α unter einander verbunden sind: In die Gleichungen tritt der Reihe nach immer eine Unbekannte mehr ein, so dass die Auflösung besonders einfach wird. Von der $(n+1)^{\text{ten}}$ Gleichung bis zur $(\mu+1)^{\text{ten}}$ (letzten Gleichung) finden sich im Allgemeinen in jeder Gleichung (n+1) Unbekannte, in den vorhergehenden aber weniger. Bei der Auflösung des Systems können besondere Fälle eintreten.

Verschwindet nämlich einer der Coefficienten von α in der ersten Verticalreihe, etwa $J_k{}^k$, so lässt sich a_k aus der k^{ten} Gleichung* nicht bestimmen und diese Gleichung ist überhaupt nicht zu befriedigen, da a_k bis a_{k+1} als bestimmt gelten.

In diesem Falle bleibt α_k unbestimmt, und es ist einleuchtend, dass der reducirten Differentialgleichung eine ganze Function k^{ten} Grades partikulär genügen muss. Denn stellt man die Forderung, es soll

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \ldots + \beta_k x^k$$

ein partikuläres Integral der gegebenen Gleichung (ohne zweiten Theil) sein, so wird man bei Bestimmung der β offenbar auf ein Gleichungssystem von der Form

[•] Wir bezeichnen von dieser Stelle ab die Gleichungen nach dem Index, welchen das A der rechten Seite trägt.

$$\begin{split} J_k^k & \beta_k & = 0, \\ J_{k-1}^{k+1} \beta_{k-1} + J_{k-1}^k \beta_k & = 0, \\ J_{k-2}^{k-2} \beta_{k-2} + J_{k-2}^{k-1} \beta_{k-1} + J_{k-2}^k \beta_k & = 0, \end{split}$$

geführt, in welchem die J dieselbe Bedeutung haben wie vorhin. Da $\beta_k \geq 0$, so muss $J_k^k = 0$ sein.

Verschwindet noch ein Coefficient von α in der ersten Verticalreihe, vielleicht $J_A{}^h$, wobei h < k, so lässt sich α_k aus der $h^{\rm ten}$ Gleichung nicht bestimmen. Indessen lässt sich diese Gleichung im Allgemeinen doch befriedigen und zwar mit Hilfe des früher unbestimmt gebliebenen α_k , welches durch die Grössen α_{k+1} bis α_{k+n} in die $h^{\rm te}$ Gleichung linear eingeführt wird. Verschwindet aber der Factor von α_k auch in der $h^{\rm ten}$ Gleichung, so bleibt diese unerfüllbar, und der reducirten Differentialgleichung genügt partikulär eine ganze Function $h^{\rm ten}$ Grades.

Verschwindet weiter J_f , f < h, so lässt sich die f Gleichung durch das früher unbestimmt gelassene α_h befriedigen, falls nicht der Factor von α_h Null wird. Im letzten Falle aber würde der Differentialgleichung ein drittes partikuläres Integral in Form einer Function f Grades genügen. Dieser Vorgang kann sich n-mal wiederholen, weil J_r , welches die Gestalt hat:

$$J_r^r = p_n r(r-1)(r-2) \dots (r-\overline{n-1}) + p_{n-1} r(r-1)(r-2) \dots (r-\overline{n-2}) + \dots + p_2 r(r-1) + p_1 r + p_0,$$

nur für n Werthe des r verschwinden kann.

In einem solchen Falle würde die reducirte Gleichung n partikuläre Integrale besitzen, welche sammt und sonders ganze Functionen wären.

Angenommen nun, es lassen sich q Coefficienten α_k , α_k , ... α_l nicht bestimmen*, so bleibt nichts Anderes übrig, als die Integration einer Gleichung

2) $X_n z^{(n)} + X_{n-1} z^{(n-1)} + \ldots + X_1 z' + X_0 z = B_k x^k + B_k x^k + \ldots + B_f x^f$ zu versuchen. Dieselbe lässt sich jedoch, da q partikuläre Integrale der reducirten Gleichung bekannt sind, auf die $(n-q)^{te}$ Ordnung bringen Das vollständige Integral der Gleichung 1) lautet nun

$$y_1 = \beta_0 + \beta_1 x + \ldots + \beta_k x^k$$

hat, so lautet das allgemeine Integral

$$y = C_1(\beta_0 + \beta_1 x + \ldots + \beta_k x^k) + C_2 y_2 + \ldots + C_n y_n^{(n)} + (\alpha_0 + \alpha_1 x + \ldots + \alpha_\mu x^\mu).$$
 Wegen der Willkürlichkeit des C_1 kann nun immer vom ersten partikulären Integral y_1 ein Theil wie $C'(\beta_0 + \beta_1 x + \ldots + \beta_k x^k)$ abgelöst und in das Ergänzungsintegral $\alpha_0 + \alpha_1 x + \ldots + \alpha_\mu x^\mu$ aufgenommen werden, wodurch sich die Unbestimmtheit erklärt.

^{*} Die Unbestimmtheit gewisser Coefficienten α findet auch in der Form des Integrals ihre Bestätigung. Da nämlich, falls $\alpha_k = 0$, eines der partikulären Integrale, etwa y_i , die Gestalt

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 x + \ldots + \alpha_{\mu} x^{\mu} + z,$$

unter 2 das complete Integral der Gleichung 2) verstanden.

Ein passendes Beispiel zu den Untersuchungen dieses Paragraphen liefert die Gleichung

$$X_n y^{(n)} + X_{n-1} y^{(n-1)} = X_{\mu},$$

für welche sich die Integration vollständig ausführen lässt. Da dieser Gleichung (n-1) ganze Functionen, nämlich

$$y_1 = C_0, y_2 = C_1 x, y_3 = C_2 x^2, \dots y_{n-1} = C_{n-2} x^{n-2}$$

genügen, so tritt hier gerade der Ausnahmefall auf, in welchem das Erginzungsintegral keine vollständige Function μ^{ten} Grades ist. — Denkt man sich X_n in Factoren aufgelöst

$$X_n = \kappa(x - \varepsilon_1)(x - \varepsilon_2) \dots (x - \varepsilon_n),$$

and setzt der Einfachheit halber $X_{n-1} = 0$, so lautet das Integral der reducirten Gleichung

$$y = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + ... + C_{n-1} x^{n-1}$$

und das Ergänzungsintegral

$$\zeta = \alpha_0 (x - \varepsilon_1)^{n-1} l(x - \varepsilon_1) + \alpha_1 (x - \varepsilon_2)^{n-1} l(x - \varepsilon_2) + \dots \\
\dots + \alpha_{n-1} (x - \varepsilon_n)^{n-1} l(x - \varepsilon_n) + \alpha_n x^n + \alpha_{n+1} x^{n+1} + \dots + \alpha_{\mu} x^{\mu}, \\
(\mu > n).$$

§ 2.

Vollständiges Integral von

1)
$$(a_1 + b_2 x + c_2 x^2) y'' + (a_1 + b_1 x) y' + a_0 y = A_0 + A_1 \frac{x}{1!} + A_2 \frac{x^2}{2!} + \dots + A_{\mu} \frac{x^{\mu}}{\mu!}$$

Es soll die Rechnung, welche im vorigen Paragraphen nur schematisch angedeutet werden konnte, an diesem Beispiel in extenso ausgeführt werden und zwar mit Berücksichtigung aller Ausnahmefälle, welche bei der Bestimmung der Coefficienten des Ergänzungsintegrals eintreten können.

Aus Bequemlichkeitsrücksichten nehmen wir $a_2 = 0$, was immer erlaubt ist, sobald nicht vorliegt

$$a_2y'' + (a_1 + b_1x)y' + a_0y = A_0 + A_1\frac{x}{1!} + \dots,$$

welche Gleichung nachträglich betrachtet wird.

Das Ergänzungsintegral sei

$$\zeta = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \alpha_2 \frac{x^2}{2!} + \ldots + \alpha_{\mu} \frac{x^{\mu}}{\mu!}$$

und wir setzen der Kürze halber

$$a_0 + b_1 k + c_2 (k-1) k = M_k, \quad a_1 + b_2 k = N_k;$$

dan lauten die Bestimmungsgleichungen für die a folgendermassen:

- a) Sollte $M_k = 0$ sein, so lässt sich α_k aus der k^{ten} Gleichung nicht bestimmen, und diese Gleichung kann überhaupt nicht befriedigt werden, da α_{μ} bis α_{k+1} als bestimmt gelten. Man berechne nun weiter aus der $(k-1)^{\text{ten}}$ bis nullten Gleichung die Coefficienten α_k bis α_0 . Von diesen bleibt einer unbestimmt.
- b) Ist auch $M_h = 0$, so lässt sich α_k aus der Gleichung (h) nicht bestimmen. Man führe die Rechnung jetzt folgendermassen. Aus Gleichung (k-1) berechne man α_{k-1} ; man findet

$$\alpha_{k-1} = m_{k-1} + n_{k-1}\alpha_k,$$

wobei m_{k-1} und n_{k-1} bekannte Grössen sind. Aus Gleichung (h+1) ergiebt sich unter Benutzung aller früheren Gleichungen

$$\alpha_{h+1} = m_{h+1} + n_{h+1} \alpha_k,$$

und dieses giebt, in die Gleichung (h) eingesetzt, in welcher also $M_h = 0$ ist, Folgendes: $N_h \cdot (m_{h+1} + n_{h+1} \alpha_h) = A_h.$

Lässt sich hieraus α_k bestimmen, so hat die weitere Rechnung keine Schwierigkeiten. Es folgen nämlich aus den Gleichungen (h-1) bis 0 die Coefficienten α_k bis α_0 , doch bleibt von diesen einer unbestimmt.

c) Es lässt sich a_k nicht bestimmen, wenn N_h oder n_{h+1} verschwinden. Dies letztere hat den Werth

$$n_{h+1} = (-1)^{k-h+1} \frac{N_{k-1} N_{k-2} \dots N_{h+1}}{M_{k-1} M_{k-2} \dots M_{h+1}},$$

und da die Grössen M_{k-1} bis M_{k+1} sicher nicht verschwinden können, weil schon $M_k = 0$ und $M_k = 0$, so kann a_k nur dadurch unbestimmbar werden, dass eine der Grössen N_{k-1} bis N_k verschwindet. Wird aber eine dieser Grössen null (und es kann höchstens eine derselben verschwinden, wenn nicht etwa $a_1 = b_2 = 0$), so kann die h^{to} Gleichung findet verfriedigt werden. Aus der $(h-1)^{ten}$ bis nullten Gleichung findet

man, wie bei Fall b), die Coefficienten α_k bis α_0 , von denen einer unbestimmt bleibt. Ausserdem ist jetzt auch, falls N_{k-q} verschwindet, wo q eine der Zahlen 1 bis k-h ist, einer der Coefficienten α_k bis α_{k-q+1} nicht bestimmt.

Bilden wir nun die Integrale der vollständigen Differentialgleichung.

1. Lassen sich sämmtliche Coefficienten des Ergänzungsintegrals bestimmen, so genügt der Gleichung

$$(b_2 x + c_2 a^2) y'' + (a_1 + b_1 x) y' + a_0 y = A_0 + A_1 \frac{x}{1!} + \dots + A_{\mu} \frac{x^{\mu}}{1!}$$

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \zeta_1$$

wobei

$$\xi = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \alpha_{\mu} \frac{x^{\mu}}{1!}$$

und y, und y, die partikulären Integrale der reducirten Gleichung sind.

2. Treten die Ausnahmefälle ein, so gilt Folgendes.

a) Es möge im Gleichungssystem der α $M_k = 0$ sein; dann genügt der reducirten Gleichung partikulär

$$y_1 = \beta_0 + \beta_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \beta_k \frac{x^k}{k!}$$

Denn führt man dieses in die reducirte Gleichung ein, so entsteht

$$\begin{array}{llll} \textit{M}_{k} & \beta_{k} & = 0, \\ \textit{M}_{k-1} \, \beta_{k-1} + N_{k-1} \, \beta_{k} & = 0, \\ \textit{M}_{k-2} \, \beta_{k-2} + N_{k-2} \, \beta_{k-1} & = 0, \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \textit{M}_{k-q} \, \beta_{k-q} + N_{k-q} \, \beta_{k-q+1} = 0, \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \textit{M}_{h} & \beta_{h} & + N_{h} & \beta_{h+1} & = 0, \\ \textit{M}_{h-1} \, \beta_{h-1} + N_{h-1} \, \beta_{h} & = 0, \\ \textit{M}_{h-2} \, \beta_{h-2} + N_{h-2} \, \beta_{h-1} & = 0, \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \textit{M}_{1} & \beta_{1} & + N_{1} & \beta_{2} & = 0, \\ \textit{M}_{0} & \beta_{0} & + N_{0} & \beta_{1} & = 0. \end{array}$$

Dieses System erfordert $M_k = 0$, und nun ergiebt sich der Reihe nach

$$\begin{array}{lll} \beta_{k-1} = n_{k-1}\beta_k, & . & . & . & . \\ \beta_{k-2} = n_{k-2}\beta_k, & \beta_2 = n_2\beta_k, & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & \beta_1 = n_1\beta_k, & . & . & . & . \\ \beta_{k-q} = n_{k-q}\beta_k, & \beta_0 = n_0\beta_k, & . & . & . & . \end{array}$$
 (\$\beta_k\$ unbestimmt),

wobei, wie früher.

$$n_{k-q} = \frac{N_{k-1} N_{k-2} \dots N_{k-q}}{M_{k-1} M_{k-2} \dots M_{k-q}} (-1)^q.$$

Der reducirten Gleichung genügt also partikulär

$$y_1 = \beta_k \left\{ n_0 + n_1 \frac{x}{1!} + \dots + n_{k-1} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} + \frac{x^k}{k!} \right\}$$

Um das allgemeine Integral der vollständigen Gleichung zu bilden, führe man in selbige ein

 $y = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \alpha \mu \frac{x^{\mu}}{\mu!} + z,$

bestimme die α aus dem früher aufgestellten Gleichungssystem ohne Berücksichtigung der k^{ten} Gleichung, so dass zurückbleibt

$$(b_2x + c_2x^2)z'' + (a_1 + b_1x)z' + a_0z = B_k \frac{x^k}{k!},$$

wobei

$$B_k = A_k - N_k \alpha_{k+1}.$$

Die letzte Differentialgleichung integrire man mit Hilfe der Variation der Constanten unter Beachtung, dass

$$z_1 = n_0 + n_1 \frac{x}{1!} + \ldots + n_{k-1} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} + \frac{x^k}{k!}$$

ein partikuläres Integral der reducirten Gleichung ist.

Man findet allgemein aus einer Gleichung

$$X_2 z'' + X_1 z' + X_0 z = X,$$

falls z, der reducirten genügt,

$$z = z_1 \left\{ \int \frac{1}{z_1^2} e^{-\int \frac{X_1}{X_2} dx} \left[C_1 + \int \frac{X}{X_2} z_1 e^{\int \frac{X_1}{X_2} dx} dx \right] dx + C_2 \right\}.$$

b) Es möge ausser $M_k = 0$ auch $M_h = 0$, (k > h) sein. Ist dann in Gleichung (h) $N_h \ge 0$, so muss $\beta_{h+1} = 0^*$, auch (h+1) $N_{h+1} \ge 0$, ... $\beta_{h+2} = 0$,

ist auch in Gleichung (k-1) $N_{k-1} \ge 0$, so muss $\beta_k = 0$ sein. Dagegen ergiebt sich aus Gleichung (k-1) bis (0)

$$\beta_{h-1} = n_{h-1}\beta_h, \quad \beta_{h-2} = n_{h-2}\beta_h, \quad \dots \quad \beta_0 = n_0\beta_h.$$

Sonach genügt der reducirten Differentialgleichung jetzt partikulär

$$y_1 = \beta_h \left\{ n_0 + n_1 \frac{x}{1!} + \dots + n_{h-1} \frac{x^{h-1}}{(h-1)!} + \frac{x^h}{h!} \right\}$$

Von dieser Stelle ab verläuft die Rechnung wie bei Fall a).

c) Verschwindet endlich M_k , M_h und auch N_{k-q} , wo q eine der Zahlen 1 bis k-h bedeutet und k > h, so entnehme man der $(k-1)^{\text{ten}}$ bis $(k-q+1)^{\text{ten}}$ Gleichung

$$\beta_{k-1} = n_{k-1}\beta_k, \quad \beta_{k-2} = n_{k-2}\beta_k, \quad \dots \quad \beta_{k-q+1} = n_{k-q+1}\beta_k.$$

Die $(k-q)^{\text{te}}$ Gleichung verlangt, dass $\beta_{k-q}=0$, und infolge dessen muss auch β_{k-q-1} bis β_{k+1} gleich Null sein. Die \hbar^{te} Gleichung ist von selbst erfüllt und nun ergiebt sich aus der $(k-1)^{\text{ten}}$ bis nullten Gleichung

^{*} Wir bezeichnen die Gleichungen zur Bestimmung der β nach dem Index des M.

$$\beta_{h-1} = n_{h-1}\beta_h, \ldots \beta_0 = n_0\beta_h.$$

Sonach genügen jetzt der reducirten Gleichung

$$y_{1} = \beta_{k} \left\{ n_{0} + n_{1} \frac{x}{1!} + \dots + n_{k-1} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} + \frac{x^{k}}{k!} \right\},$$

$$y_{2} = \beta_{k} \left\{ n_{k-q+1} \frac{x^{k-q+1}}{(k-q+1)!} + \dots + n_{k-1} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} + \frac{x^{k}}{k!} \right\}.$$

Um das allgemeine Integral der vollständigen Gleichung aufzustellen, substituire man in die vorgelegte Differentialgleichung

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \alpha_{\mu} \frac{x^{\mu}}{\mu!} + z,$$

so bleibt zurück

$$(b_2 x + c_2 x^2) z'' + (a_1 + b_1 x) z' + a_0 z = B_k \frac{x^k}{h!} + B_k \frac{x^k}{k!},$$

wobei

$$B_h = A_h - N_h \alpha_{h+1}, \quad B_k = A_k - N_k \alpha_{k+1}.$$

Da nun von der letzten Differentialgleichung, ohne zweites Glied gedacht, zwei partikuläre Integrale z_1 und z_2 bekannt sind, so erledigt sich die vollständige Integration leicht. Man bildet nach Lagrange und Abel für eine Gleichung

$$X_2 z'' + X_1 z' + X_0 z = X$$

ans den partikulären Integralen folgendes complete Integral:

$$z = z_1 \left\{ x \int z_2 \frac{X}{X_2} e^{\int \frac{X_1}{X_2} dx} dx + C_1 \right\} + z_2 \left\{ x \int z_1 \frac{X}{X_2} e^{\int \frac{X_1}{X_2} dx} dx + C_2 \right\}.$$

Im vorliegenden Falle hat z den Werth

$$n = -\frac{(k-q)!}{n_0 n_{k-q+1}} b_2^{q+k-1}, \quad b_2 \gtrsim 0,$$

was aus der Identität

$$z'_{1}z_{2}-z'_{2}z_{1}=\frac{1}{\pi}e^{-\int \frac{X_{1}}{X_{2}}dx}$$

für x = 0 leicht abgeleitet wird.

Anmerkung 1.

Betrachten wir auch kurz den Fall, bei welchem der Grad des Ergänzungsintegrals höher angenommen werden darf als der Grad des zweiten Theiles der Differentialgleichung. Am bequemsten ist es, wenn wir das Ergänzungsintegral wie vorher in der Form

$$\zeta = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \ldots + a_{\mu} \frac{x^{\mu}}{\mu!}$$

voraussetzen, dagegen in X_{μ} den Grad durch Nullsetzen von A_{μ} bis A_{k+1} auf den k^{ten} herabbringen $(k < \mu)$; denn dann können wir den jetzigen Fall als Specialfall des früheren auffassen. Da jetzt nothwendig $M_{\mu} = 0$ sein muss, so genügt der reducirten Differentialgleichung partikulär eine ganze Function μ^{ten} Grades

$$y_1 = \beta_0 + \beta_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \beta_{\mu} \frac{x^{\mu}}{\mu!}$$

und umgekehrt: Nur dann, wenn der reducirten Gleichung eine ganze Function genügt, deren Grad höher ist, als der Grad des zweiten Theiles der Gleichung, hat es Sinn, für das Ergänzungsintegral eine ganze Function anzunehmen, deren Grad höher ist, als der zweite Theil der Gleichung, nämlich so hoch, als der Grad des partikulären Integrals der reducirten Gleichung.

a) Man überzeugt sich nun leicht, dass die Annahme des μ^{ten} Grades statt des k^{ten} Grades im Ergänzungsintegral im Allgemeinen keinen Vortheil gewährt. Wird das complete Integral aufgestellt, so zeigt sich, dass der überflüssige Theil des Ergänzungsintegrals

$$\alpha_{k+1}\frac{x^{k+1}}{(k+1)!}+\ldots+\alpha_{\mu}\frac{x^{\mu}}{\mu!}$$

von dem partikulären Integral y, verschluckt wird.*

- b) Ist jedoch ausser $M_{\mu}=0$ auch $M_k=0$, so ist es vortheilhaft, ξ vom μ^{ten} Grade anzunehmen. Denn da wegen $M_k=0$ die k^{te} Gleichung nicht mit Hilfe von α_k befriedigt werden kann, so findet hierzu der noch unbestimmte Coefficient α_{μ} Verwendung. Stellt man das complete Integral der Differentialgleichung auf, so erscheint auch kein Theil des Ergänzungsintegrals als überflüssig, weil das partikuläre Integral y_1 sich jetzt auf den k^{ten} Grad zusammengezogen hat und keinen Theil des Ergänzungsintegrals in sich aufnehmen kann.
- c) Wird die Bestimmung von α_{μ} im Falle b) dadurch illusorisch, dass der Factor von α_{μ} in der k^{ten} Gleichung verschwindet, so genügt der reducirten Differentialgleichung ausser einer Function μ^{ten} Grades auch eine k^{ten} Grades, und es ist [wie bei Fall a)] nur nöthig, das Ergänzungsintegral vom k^{ten} Grade vorauszusetzen.

Anmerkung 2.

Wir haben im Anfang unserer Betrachtungen den Fall

$$a_{3}y'' + (a_{1} + b_{1}x)y' + a_{0}y = A_{0} + A_{1}\frac{x}{1!} + \dots + A_{\mu}\frac{x^{\mu}}{\mu!}$$

ausgeschlossen. Führt man in diese Differentialgleichung für y

$$\zeta = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \alpha_{\mu} \frac{x^{\mu}}{\mu!}$$

ein, so bestimmen sich die α aus folgendem Gleichungssystem:

Hier kann nur der Ausnahmefall in Betracht kommen, wo

$$a_0 + b_1 k = 0.$$

Dann ist es nicht möglich, die k^{te} Gleichung mittels des Coefficienten α_k zu befriedigen, und die reducirte Differentialgleichung besitzt das partikuläre Integral

$$y_1 = \beta_0 + \beta_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \beta_k \frac{x^k}{k!}$$

Der vollständigen Gleichung genügt nun

$$y = \zeta + z$$

wobei im Ausnahmefalle z aus der Gleichung

$$a_3z'' + (a_1 + b_1x)z' + a_0z = B_k \frac{x^k}{k!}$$

unter Benutzung der bekannten partikulären Lösung zu berechnen ist. B_k hat folgenden Werth:

$$B_k = A_k - \{a_1 \alpha_{k+1} + a_2 \alpha_{k+2}\}.$$

§З

Vollständiges Integral von

1)
$$a_n (a + b x)^n y^{(n)} + a_{n-1} (a + b x)^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 (a + b x) y' + a_0 y = X\mu$$
,
 $X\mu = A_0 + A_1 \frac{x}{1!} + A_2 \frac{x^2}{2!} + \dots + A_{\mu} \frac{x^{\mu}}{\mu!}$

1. Schliessen wir zuerst den Fall, in welchem b=0 ist, aus, so lässt sich diese Differentialgleichung dadurch, dass man für a+bx eine neue Variabele, etwa wieder x setzt, auf die einfachere Form

$$b_n x^n y^{(n)} + b_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + b_1 x y' + b_0 y = X\mu$$

bringen, wobei Xµ wiederum die frühere Form hat.

Sei

$$\zeta = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \alpha \mu \frac{x^{\mu}}{\mu!}$$

das Ergänzungsintegral und φ eine Function von folgender Beschaffenheit:

$$\varphi_{(k)} = k! \left\{ \frac{b_0}{k!} + \frac{b_1}{(k-1)!} + \dots + \frac{b_{k-1}}{(k-n-1)!} + \frac{b_k}{(k-n)!} \right\},\,$$

dann bestimmen sich die a aus folgenden Gleichungen:

$$\varphi(\mu) \alpha \mu = A\mu, \quad \varphi(\mu-1) \alpha \mu_{-1} = A\mu_{-1}, \quad \ldots, \quad ,$$

$$\varphi(k) \alpha_k = A_k, \quad \ldots, \quad \varphi(1) \alpha_1 = A_1, \quad \varphi(0) \alpha_0 = A_0.$$

Das allgemeine Integral der vollständigen Gleichung lautet

$$y = C_1 x^{\lambda_1} + C_2 x^{\lambda_2} + \ldots + C_n x^{\lambda_n} + \zeta,$$

wobei A, bis An die Wurzeln der Gleichung nien Grades

$$\varphi(\lambda) = 0$$

sind.*

Auch hier können sich bei Bestimmung der a Ausnahmefälle ereignen.

a) Es verschwinde der Factor von α_k , es sei also $\varphi(k) = 0$. Dann wird eine der Wurzeln der Gleichung $\varphi(\lambda) = 0$, etwa die Wurzel λ_k , gleich der ganzen positiven Zahl k, und sonach genügt der reducirten Differentialgleichung partikulär die Potenz $y_k = x^k$. In dem Ergänzungsintegral wird hingegen der Coefficient α_k von x^k unendlich gross. Durch eine Grenzbetrachtung lässt sich nun zeigen, dass in ξ an Stelle von x^k der Ausdruck $x^k l x$ zu treten hat.

Sei im Augenblicke λ_k noch von k verschieden, $\lambda_k = k + \delta$, und man greife aus dem vollständigen Integral der Differentialgleichung die in Frage kommenden Glieder, nämlich

$$C_k x^{\lambda_k} + \alpha_k \frac{x^k}{k!} = T,$$

heraus. Nun ist

$$\alpha_k = \frac{A_k}{\varphi(k)}, \quad \varphi(k) = \varphi(\lambda_k - \delta) = \varphi(\lambda_k) - \frac{\delta}{1!} \varphi'(\lambda_k) + \frac{\delta^2}{2!} \varphi''(\lambda_k) - \dots,$$

oder weil $\varphi(\lambda_k) = 0$, so ist

$$\alpha_k = -\frac{A_k}{\delta \left\{ \varphi'(\lambda_k) - \frac{\delta}{2!} \, \varphi''(\lambda_k) + \ldots \right\}}.$$

Bei Veränderung der Constanten C_k kann man aber schreiben

$$T = C'_k x^{k+\delta} + \frac{A_k x^k}{k! \left\{ \varphi'(\lambda_k) - \frac{\delta}{2!} \varphi''(\lambda_k) + \ldots \right\}} \cdot \frac{x^{\delta} - 1}{\delta},$$

oder für $\delta = 0$

$$T = C'_k x^k + \alpha'_k \frac{x^k}{k!} lx$$
, wobei $\alpha'_k = \frac{A_k}{\varphi'(k)}$

Verschwinden noch andere Factoren, etwa die von α_h , α_k , ... α_q , so tritt im Ergänzungsintegral an Stelle von

$$\alpha_k \frac{x^k}{h!} + \alpha_k \frac{x_k}{k!} + \ldots + \alpha_q \frac{x^q}{q!}$$

der Ausdruck

Eine gleiche Behandlungsweise ist anzuwenden, wenn der zweite Theil der Gleichung allgemeiner die Form $X_{\mu} = A_0 x^{\nu_0} + A_1 x^{\nu_1} + \dots$ hat. Das Ergänsung integral lautet dementsprechend $\zeta = \alpha_0 x^{\nu_0} + \alpha_1 x^{\nu_1} + \dots$

$$\left(\alpha'_{h}\frac{x^{h}}{h!}+\alpha'_{k}\frac{x^{k}}{k!}+\ldots+\alpha'_{q}\frac{x^{q}}{q!}\right)lx.$$

Uebrigens kann dieser Fall höchstens n-mal eintreten, weil die vorgelegte Differentialgleichung n^{ter} Ordnung nur n von einander wesentlich verschiedene partikuläre Integrale besitzt, oder auch weil $\varphi(\lambda)$ nur für n Werthe von λ verschwinden kann. Die Gleichung, in welcher dies stattfindet, ist

$$x^n y^{(n)} = A_0^{v} + A_1 \frac{x}{1!} + \ldots + A_{\mu} \frac{x^{\mu}}{u!}$$

und ihr vollständiges Integral

$$y = \begin{cases} C_0 + C_1 x + \dots + C_{n-1} x^{n-1} \\ + \left(\alpha'_0 + \alpha'_1 \frac{x}{1!} + \dots + \alpha'_{n-1} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\right) lx \\ + \alpha_n \frac{x^n}{n!} + \alpha_{n+1} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} + \dots + \alpha_n \frac{x^n}{n!} \end{cases}, \quad (\mu > n).$$

b) Die Bestimmung von α'_k im Falle a) ist unmöglich, wenn $\varphi'(k) = 0$, d. h. wenn $\varphi(\lambda)$ eine mehrfache Wurzel besitzt. Wir beginnen mit dem Falle einer Doppelwurzel; die gleichen Wurzeln mögen λ_k und λ_{k+1} sein. So lange diese noch von k verschieden sind, lautet das vollständige Integral bekanntlich

$$y = C_1 x^{\lambda_1} + C_2 x^{\lambda_2} + \ldots + x^{\lambda_k} (C_k + C_{k+1} lx) + \ldots + C_n x^{\lambda_n} + \zeta,$$
 unter ζ eine reine ganze Function μ^{ten} Grades verstanden.

Um nun den Fall $\lambda_k = \lambda_{k+1} = k$ zu erledigen, setze man, wie früher, $\lambda_k = k + \delta$ und greife aus dem vollständigen Integral die Glieder heraus, welche alterirt werden. Man erhält

$$x^{k+\delta}(C_k+C_{k+1}lx)+\frac{A_k}{\varphi(k)}\frac{x^k}{k!}=T,$$

oder weil

$$\varphi(k) = \varphi(\lambda_k - \delta) = \varphi(\lambda_k) - \frac{\delta}{1!} \varphi'(\lambda_k) + \frac{\delta^2}{2!} \varphi''(\lambda_k) - \frac{\delta^3}{3!} \varphi'''(\lambda_k) + \dots$$

und

$$\varphi(\lambda_k) = 0$$
, $\varphi'(\lambda_k) = 0$,

so ist

$$T = x^{k+\delta} \left\{ C_k + C_{k+1} \left[\frac{x^{\delta} - 1}{\delta} \right]_{\delta = 0} \right\} + \frac{A_k}{\delta^2 \left\{ \frac{\varphi''(\lambda_k)}{2!} - \delta \frac{\varphi'''(\lambda_k)}{3!} + \dots \right\}} \cdot \frac{x^k}{k!}$$

oder, bei Veränderung der Constanten und für $\delta = 0$,

$$T = \left[x^{k+\delta} \left\{ C'_k + C'_{k+1} \frac{x^{\delta} - 1}{\delta} \right\} + \frac{A_k}{\frac{\varphi''(\lambda_k)}{2!} - \delta \frac{\varphi'''(\lambda_k)}{3!} + \cdots} \cdot \frac{x^k}{k!} \left[\frac{x^{\delta} - 1}{\delta} \right]^2 \right]_{\delta = 0}$$

$$= x^k \left\{ C'_k + C'_{k+1} lx \right\} + \frac{2!}{\varphi''(k)} \cdot \frac{x^k}{k!} l^2 x$$

oder

 $T = x^{k} \{C'_{k} + C'_{k+1} lx\} + \alpha''_{k} \frac{x^{k}}{k!} l^{2}x, \quad \alpha''_{k} = \frac{2! A_{k}}{\alpha''(k)}.$

Wie man sich zu verhalten hat, wenn die Gleichung $\varphi(\lambda) = 0$ vielfache Wurzel besitzt, ist jetzt unmittelbar klar. Besitzt sie etw gleiche Wurzeln und sind diese gleich der ganzen positiven Zahl k

$$\lambda_k = \lambda_{k+1} = \ldots = \lambda_{k+s-1} = k,$$

so lautet das vollständige Integral der Differentialgleichung $y = C_1 x^{l_1} + C_2 x^{l_2} + ... + x^k (C_k + C_{k+1} l x + C_{k+2} l^2 x + ... + C_{k+s-1} l^{s-1} x) ... + C_{k-1} x^{l_{k-1}} + C_k x^{l_k} + \zeta,$

$$\zeta = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \alpha_k^{(a)} \frac{x^k}{k!} l^a x + \alpha_{k+1} \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} + \ldots + \alpha_{\mu} \frac{x^{\mu}}{\mu!},$$

wobei jedoch a'k den besondern Werth

$$\alpha_k^{(s)} = \frac{s! A_k}{\varphi_{(k)}^{(s)}}$$

hat.

2. Ist in der Gleichung 1) b=0, so schreibe man ax für x; d liegt vor

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_1 y' + a_0 y = A_0 + A_1 \frac{x}{1!} + \ldots + A_n \frac{x^n}{n!}$$

Die Coefficienten des Ergänzungsintegrals

$$\zeta = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \alpha^{\mu} \frac{x^{\mu}}{\mu!}$$

bestimmen sich aus folgendem Gleichungssystem:

$$\begin{array}{lll}
a_0 \alpha_{\mu} & = A_{\mu}, \\
a_0 \alpha_{\mu-1} + a_1 \alpha_{\mu} & = A_{\mu-1}, \\
a_0 \alpha_{\mu-2} + a_1 \alpha_{\mu-1} + a_2 \alpha_{\mu} & = A_{\mu-2}, \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
a_0 \alpha_0 & + a_1 \alpha_1 & + \dots + a_{n-1} \alpha_{n-1} + a_n \alpha_n = A_0.
\end{array}$$

Das vollständige Integral der Differentialgleichung lautet

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \ldots + C_n e^{\lambda_n x} + \zeta,$$

unter λ_1 bis λ_n die Wurzeln der Gleichung

$$a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \ldots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

verstanden.*

Die Coefficienten a lassen sich nicht bestimmen, falls $a_0 = 0$, $a_0 = a_1 = 0$, oder $a_0 = a_1 = a_2 = 0$ etc. Verschwinden etwa sämmt Factoren von a_0 bis a_{n-1} , so setze man

$$\frac{d\mathbf{e}\,y}{d\,\mathbf{x}\mathbf{e}} = \eta\,,$$

dann geht die Gleichung

^{*} Eine ähnliche Behandlungsweise gestattet die Differentialgleichung, ihr zweiter Theil die Form $A_0 e^{r_0 x} + A_1 e^{r_1 x} + \dots$ hat. Das Ergänzungsint lautet dementsprechend $\xi = \alpha_0 e^{r_0 x} + \alpha_1 e^{r_1 x} + \dots$

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_{\ell} y^{(\ell)} = X_{\ell}$$

$$a_n \eta^{(n-\ell)} + a_{n-1} \eta^{(n-\ell-1)} + \ldots + a_{\ell+1} \eta' + a_{\ell} \eta = X_{\ell},$$

über in

und dieser letzten genügt

$$\eta = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \ldots + C_{n-q} e^{\lambda_n - q x} + \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \alpha_{\mu} \frac{x^{\mu}}{u!}$$

Integrirt man jetzt e-mal hinter einander, so entsteht

$$y = C'_{1}e^{\lambda_{1}x} + C'_{2}e^{\lambda_{2}x} + \dots + C'_{n-\varrho}e^{\lambda_{n-\varrho}x} + C_{n-\varrho+1} + C_{n-\varrho+2}x + \dots + C_{n}x^{\varrho-1} + \alpha_{0}\frac{x^{\varrho}}{\varrho!} + \alpha_{1}\frac{x^{\varrho+1}}{(\varrho+1)!} + \dots + \alpha_{\mu}\frac{x^{\varrho+\mu}}{(\varrho+\mu)!}.$$

Dieses ist das vollständige Integral der vorgelegten Differentialgleichung für den erwähnten Ausnahmefall. Es sei noch bemerkt, dass sich die Annahme eines Supplementintegrals in Form einer ganzen Function für die linearen Differentialgleichungen mit constanten Coefficienten bereits in französischen Lehrbüchern vorfindet. Eine Discussion des Integrals wird aber daselbst nicht gegeben; auch sind meines Wissens andere Gleichungen in dieser Weise nicht behandelt worden. Man vergleiche Moigno, Leçons de Calcul Différentiel et de Calcul Intégral. Paris 1844. T. 2 p. 626; — Sturm, Cours d'Analyse de l'École Polytechnique. Paris 1873. T. 2 p. 133.

§ 4.

Bei den bisher betrachteten Differentialgleichungen genügte es im Allgemeinen, dem Integral der reducirten Gleichung eine ganze Function additiv beizugeben, um das Integral der completen Gleichung hersustellen.

In den Fällen, welche nun zu betrachten sind, gestaltet sich die Sache weniger einfach. Es sei vorgelegt

$$X_n y^{(n)} + X_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + X_1 y' + X_0 y = X_{\mu},$$

unter X_n bis X_0 ganze Functionen beliebigen Grades, unter X_{μ} eine ganze Function μ^{ten} Grades verstanden.

Uebersteigt der Grad der Functionen X_n bis X_0 die Ordnung der mit ihnen multiplicirten Differentialquotienten im Maximum um die Zahl h, und ist $h \leq \mu$, so besteht das Supplementintegral aus einer ganzen Function $(\mu - h)^{\text{ten}}$ Grades und aus einem additiven Bestandtheile z, welcher partikuläre Lösung der Gleichung

$$X_n z^{(n)} + X_{n-1} z^{(n-1)} + \dots + X_1 z' + X_0 z = X_{h-1}$$

ist, wo Xh-1 eine Function vom höchstens (h-1)ten Grade bedeutet.*

Die Bestimmung von z für gewisse Klassen von Differentialgleichungen bildet den Gegenstand dieses und der nächsten Paragraphen.

^{*} Hierbei ist jedoch vorausgesetzt — und das genügt für unsere späteren Untersuchungen —, dass bereits X_0 den h^{ten} Grad besitzt.

Sei vorgelegt die Riccati'sche Gleichung

1)
$$\frac{d^m y}{dx^m} + ax^n y = A_0 + A_1 \frac{x}{1!} + A_2 \frac{x^2}{2!} + \dots + A_{\mu} \frac{x^{\mu}}{\mu!},$$

unter m und n ganze positive Zahlen gedacht.

Man setze, falls $\mu \geq n$,

$$y = z + \zeta$$
, $\zeta = \alpha_0 + a_1 \frac{x}{1!} + ... + \alpha_{\mu - n} \frac{x^{\mu - n}}{(\mu - n)!}$

und wähle die a so, dass Gleichung 1) übergeht in

2)
$$\frac{d^m z}{dx^m} + ax^n z = B_0 + B_1 \frac{x}{1!} + \dots + B_{n-1} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

Eine Bestimmung der α ist immer möglich, und zwar schon aus dem Grunde, als der reducirten Differentialgleichung bei positivem n nie eine Potenz partikulär genügen kann. — Unbestimmtheiten bei Ermittelung der Coefficienten des Ergänzungsintegrals treten nämlich nur dann auf, wenn in dem letzteren gewisse additive Bestandtheile vorkommen, welche sich schon in dem Integrale der reducirten Differentialgleichung finden. In den bisher betrachteten Gleichungen waren diese Bestandtheile Potenzen.

Der Gleichung 2) genügt, falls die B Null sind, wie Kummer im XIX. Bd. von Crelle's Journal gezeigt hat, folgendes n-fache Integral:

$$z = \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{u_1^{y} + \dots + u_n^{y}}{y}} u_2 u_3^{2} u_4^{3} \dots u_n^{n-1} \cdot S du_1 \dots du_n$$

$$S = C_1 e^{\theta_1 u_1 \dots u_n x} + \dots + C_y e^{\varepsilon_y u_1 \dots u_n x}$$

worin v = m + n, und $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \dots \varepsilon_r$ die Wurzeln der Gleichung

$$\varepsilon^{\bullet} + a = 0$$

bedeuten. C_1 bis C_7 sind (m+n) Constante, von denen jedoch nur m willkürlich sind; es unterliegen daher die Constanten noch n Bedingungsgleichungen, welche sofort erhalten werden, wenn man bedenkt, dass für x=0

$$z^{(m)} = 0$$
, $z^{(m+1)} = 0$, ... $z^{(m+n-1)} = 0$.

Es ist nun einleuchtend, dass das oben aufgeschriebene Integral der Gleichung 2) auch dann genügen wird, wenn die rechte Seite derselben nicht verschwindet, sondern der Ausdruck

$$B_0 + B_1 \frac{x}{1!} + \ldots + B_{n-1} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

ist. Man hat nämlich die letzten Bedingungen dahin abzuändern, dass für x=0

$$z^{(m)} = B_0, \quad z^{(m+1)} = B_1, \quad \dots \quad z^{(m+n-1)} = B_{n-1}.$$

$$z_{x=0}^{(k)} = \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{u_1^{\nu} + \dots + u_n^{\nu}}{\nu}} u_2 u_3^2 \dots u_n^{n-1} \cdot S_{x=0}^{(k)} du_1 \dots du_n$$

$$S_{x=0}^{(k)} = \{C_1 \varepsilon_1^k + C_2 \varepsilon_2^k + \dots + C_r \varepsilon_r^k\} \cdot (u_1 u_2 \dots u_n)^k$$

so hat man zur Bestimmung der n überstüssigen Constanten n Gleichungen von der Gestalt

$$\int_{0}^{\infty} e^{-\frac{u_{1}v_{1}+...+u_{n}v_{n}}{v_{n}}} u_{1}^{k} u_{2}^{k+1}...u_{n}^{k+n-1} \{C_{1} \varepsilon_{1}^{k} + C_{2} \varepsilon_{2}^{k} + ... + C_{v} \varepsilon_{v}^{k} \} du_{1}...du_{n}$$

$$= B_{k-m},$$

worin für k der Reihe nach

$$m, m+1, m+2, \ldots m+n-1$$

zu setzen ist.

Gebraucht man folgende Abkürzung:

$$\int_{0}^{\infty} e^{-\frac{u_{1}^{\nu}+...+u_{n}^{\nu}}{2}} u_{1}^{k} u_{2}^{k+1} ... u_{n}^{k+n-1} du_{1} du_{2} ... du_{n} = \vartheta(k),$$

so lautet die letzte Gleichung einfacher

$$C_1 \varepsilon_1^k + C_2 \varepsilon_2^k + \ldots + C_r \varepsilon_r^k = B_{k-m} : \vartheta(k).$$

Das Integral $\vartheta(k)$ kann durch ein Product von Gammafunctionen ausgedrückt werden, denn es ist für $\frac{u^p}{v} = \xi$

$$\int_{0}^{\infty} e^{-\frac{u^{y}}{y}} u^{x} du = v^{\frac{x+1}{y}-1} \int_{0}^{\infty} e^{-\xi \frac{x+1}{y}-1} d\xi = v^{\frac{x+1}{y}-1} \Gamma\left(\frac{x+1}{v}\right),$$

$$x+1 > 0;$$

mithin erhält man durch Multiplication für alle ganzen Zahlen κ von k bis k+n-1

$$\vartheta(k) = v^{\omega} \Gamma\left(\frac{k+1}{v}\right) \Gamma\left(\frac{k+2}{v}\right) \dots \Gamma\left(\frac{k+n}{v}\right), \quad \omega = \frac{n}{2v} [n+1-2(v-k)].$$

Diese Formel benutzt man zur Berechnung der n Ausdrücke $\vartheta(m)$ bis $\vartheta(m+n-1)$; übrigens bedient man sich hierbei noch zweckmässig der Relation

$$\vartheta(k+1) = \nu^{\frac{n}{\nu}} \frac{\Gamma\left(\frac{k+n+1}{\nu}\right)}{\Gamma\left(\frac{k+1}{\nu}\right)} \cdot \vartheta(k),$$

deren Richtigkeit unmittelbar einleuchtet.

Beispiel.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + ax^2y = A_0 + A_1 \frac{x}{11} + \dots + A_n$$

Diese Gleichung kann mittels

$$y = z + \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \alpha_{\mu-2} \frac{x^{\mu-2}}{(\mu-2)!}$$

vereinfacht werden zu

$$\frac{d^2z}{dx^2} + ax^2z = B_0 + B_1 \frac{x}{1!},$$

und weil hier

$$m=2, n=2, \nu=4,$$

so genügt der letzten Differentialgleichung

$$z = \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{u_{1}^{4} + u_{2}^{4}}{4}} u_{3} \{C_{1} e^{\theta_{1} u_{1} u_{2} x} + C_{2} e^{\theta_{2} u_{1} u_{2} x} + C_{3} e^{\theta_{3} u_{1} u_{2} x} + C_{4} e^{\theta_{4} u_{1} u_{2} x} \} du_{1} du_{2}.$$

Für k=2 und k=3 erhält man die beiden Bedingungsgleichungen für die willkürlichen Constanten, nämlich

$$C_{1} \varepsilon_{1}^{2} + C_{2} \varepsilon_{2}^{2} + C_{3} \varepsilon_{3}^{2} + C_{4} \varepsilon_{4}^{2} = B_{0} : \vartheta(2)$$

$$C_{1} \varepsilon_{1}^{3} + C_{2} \varepsilon_{2}^{3} + C_{3} \varepsilon_{3}^{3} + C_{4} \varepsilon_{4}^{3} = B_{1} : \vartheta(3)$$
, $\varepsilon^{4} + a = 0$,

und hier ist

$$\vartheta(2) = \frac{1}{4}\sqrt{2} \Gamma(\frac{3}{4}), \quad \vartheta(3) = \frac{1}{4}\sqrt{2} \Gamma(\frac{1}{4}).$$

Bei denjenigen Integralen, mit welchen Kummer die Riccatischen Gleichungen integrirt, tritt also der eigenthümliche Umstand ein, dass diese Integralformen gewissermassen eine grössere Capacität besitzen, als man ursprünglich von ihnen gefordert hat. Diese Erscheinung erklärt sich in dem Ueberfluss der willkürlichen Constanten, von denen eine bestimmte Anzahl zweckmässig verwendet werden kann.

Uebrigens sind es nicht nur die Riccati'schen Gleichungen, welche sich in der vorgetragenen Weise behandeln lassen. Betrachten wir z. B. die Differentialgleichung*

$$(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)\frac{d^2y}{dx^2} + \begin{cases} (b_2+b_3)(x-a_2)(x-a_3) \\ + (b_3+b_1)(x-a_3)(x-a_1) \\ + (b_1+b_2)(x-a_1)(x-a_2) \end{cases} \frac{dy}{dx}$$

$$-\lambda \begin{cases} b_1(x-a_1) \\ + b_2(x-a_2) \\ + b_3(x-a_3) \end{cases} = X,$$

in welcher

$$1 - (b_1 + b_2 + b_3) = \lambda$$

und X eine ganze Function ist. Mittels der Substitution

$$y = z + \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots$$

bringt man es dahin, dass sich die rechte Seite der Gleichung auf eine Constante B reducirt; es sei daher von Aufang an X = B. Für diesen Fall genügt der Gleichung 3), wenn die Zahlen b_1 , b_2 und b_3 positiv gedacht werden, folgender Ausdruck:

^{*} Diese Gleichung hat Verfasser in einer Arbeit "Ueber Differentialgleichungen, welche durch hypergeometrische Functionen integrirt werden können" aufgestellt: Zeitschrift für Mathematik und Physik, XXIX. Jahrg. 3. Heft.

$$y = C_1 \int_{a_1}^{\infty} R \, du + C_3 \int_{a_2}^{\infty} R \, du + C_3 \int_{a_3}^{\infty} R \, du,$$

wobei

$$R = (u - a_1)^{b_1 - 1} (u - a_2)^{b_2 - 1} (u - a_3)^{b_3 - 1}$$

und die Integrationsconstanten an die Bedingung

$$C_1 + C_2 + C_3 = B : \lambda$$

gebunden sind.

Denn führt man die Werthe von y, y' und y'' in die Differentialgleichung ein, so entsteht

$$\lambda \sum_{k=1}^{k=3} \left[C_k \left\{ (u-a_1)^{b_1} (u-a_2)^{b_2} (u-a_3)^{b_3} (u-x)^{\lambda-1} \right\} \right]_{a_k}^{\infty} = B$$

$$\sum_{k=1}^{k=3} \left[C_k \left\{ \left(1 - \frac{a_1}{u} \right)^{b_1} \left(1 - \frac{a_2}{u} \right)^{b_2} \left(1 - \frac{a_3}{u} \right)^{b_3} \left(1 - \frac{x}{u} \right)^{\lambda - 1} \right\} \right]_{a_k}^{\infty} = B : \lambda,$$

und nach Einführung der Grenzen

$$C_1 + C_2 + C_3 = B:\lambda.$$

§ 5.

Supplementintegral der Laplace'schen Gleichung

1)
$$(a_n + b_n x) y^{(n)} + (a_{n-1} + b_{n-1} x) y^{(n-1)} + \dots + (a_0 + b_0 x) y = X_{\mu},$$

 $X_{\mu} = A_0 + A_1 \frac{x}{1!} + A_2 \frac{x^2}{2!} + \dots + A_{\mu} \frac{x^{\mu}}{\mu!}.$

Man hat nach dem Früheren das Supplement in der Form

$$\zeta = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \ldots + \alpha_{\mu-1} \frac{x^{\mu-1}}{(\mu-1)!} + z$$

orauszusetzen, dann ergeben sich die a nach folgendem Schema:

$$\begin{vmatrix} a_0 \alpha_h & + b_0 h \alpha_{h-1} \\ + a_1 \alpha_{h+1} + b_1 h \alpha_h \\ + a_2 \alpha_{h+2} + b_2 h \alpha_{h+1} \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ + a_n \alpha_{h+n} + b_n h \alpha_{h+n-1} \end{vmatrix} = A_h,$$

. h. man hat

$$b_0 \mu \alpha_{\mu-1} = A_{\mu}, \quad \begin{cases} a_1 \alpha_{\mu-1} + b_0 (\mu - 1) \alpha_{\mu-2} \\ + b_1 (\mu - 1) \alpha_{\mu-1} \end{cases} = A_{\mu-1} \text{ etc.}$$

nd die Bestimmung ist, da $b_0 \ge 0$ vorausgesetzt werden darf, immer nöglich.

Der zweite Bestandtheil z des Supplements ist partikuläre Lösung er vereinfachten Gleichung

2)
$$(a_n + b_n x) z^{(n)} + (a_{n-1} + b_{n-1} x) z^{(n-1)} + \ldots + (a_0 + b_0 x) z = B$$

wo B eine Constante ist, deren Werth sich nach Ermittelung der α selbst ergiebt, nämlich

 $B = A_0 - \sum_{k=0}^{k=n} a_k \alpha_k.$

Um die Gleichung 2) zu integriren, schlagen wir denselben V ein, den Laplace bei der Integration der reducirten Gleichung nal Wir setzen nach dessen Vorgang

$$z = \int_{u_1}^{u_2} e^{ux} V du,$$

dann geht die Gleichung 2) über in

$$\int_{u_1}^{u_2} e^{u \cdot x} (U_0 + U_1 \cdot x) \ V \, du = B$$

oder, nach geringer Reduction, in

$$[e^{ux}U_{1}V]_{u_{1}}^{u_{2}} + \int_{u_{1}}^{u_{2}} e^{ux} [U_{0}V - \frac{d}{du}(U_{1}V)] du = B.$$

Hierbei bedeuten

$$U_0 = a_n u^n + a_{n-1} u^{n-1} + \dots + a_1 u + a_0,$$

$$U_1 = b_n u^n + b_{n-1} u^{n-1} + \dots + b_1 u + b_0.$$

Wählt man V so, dass

$$U_0 V - \frac{d}{du}(U_1 V) = 0,$$

und die Grenzen so, dass

$$[e^{ux}U_1V]_u^{u_2}=B,$$

so ergiebt sich

$$V = \frac{\gamma}{U_1} e^{\int \frac{U_0}{\overline{U}_1} du}, \quad \gamma = const.,$$

und die Gleichung zur Bestimmung der Grenzen erlangt infolge des die Gestalt

$$\gamma \left[e^{u x + \int \frac{\overline{U_0}}{\overline{U_1}} du} \right]_{u_1}^{u_2} = B.$$

Nun ist im Allgemeinen

$$\frac{U_0}{U_1} = m + \frac{\beta_1}{u - \alpha_1} + \frac{\beta_2}{u - \alpha_2} + \dots + \frac{\beta_n}{u - \alpha_n};$$

sonach hat man, wenn $b_n = 1$ genommen wird,*

$$z = \gamma \int_{u_1}^{u_2} e^{u(m+s)} (u - \alpha_1)^{\beta_1 - 1} (u - \alpha_2)^{\beta_2 - 1} \dots (u - \alpha_n)^{\beta_n - 1} du$$

und für die Integrationsgrenzen

 $^{^{}ullet}$ Die Grössen lpha haben in diesem Paragraphen eine doppelte Bedeutz doch kann dies hier nicht zu Verwechslungen führen.

$$\gamma \left[e^{u \cdot (m+x)} \left(u - \alpha_1 \right)^{\beta_1} \left(u - \alpha_2 \right)^{\beta_2} \dots \left(u - \alpha_n \right)^{\beta_n} \right]_{u}^{u_2} = B.$$

Wir haben jetzt zwei Fälle zu unterscheiden.

Es sei α_k kleiner als alle anderen α und

a) β_k resp. sein reeller Bestandtheil positiv.

Dann withle man $u_1 = 0$ und $u_2 = \alpha_k$, wodurch die Gleichung für die Grenzen übergeht in

$$-\gamma(-\alpha_1)^{\beta_1}(-\alpha_2)^{\beta_2}\ldots(-\alpha_n)^{\beta_n}=B$$

und sich die bisher unbestimmte Constante y ergiebt. Man findet

$$\gamma = (-1)^{\beta+1} B \cdot \alpha_1^{-\beta_1} \alpha_2^{-\beta_2} \dots \alpha_n^{-\beta_n}$$
, wobei $\beta = \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n$; auch sei bemerkt, dass sämmtliche α von Null verschieden sind, weil $b_0 \ge 0$.

b) β_k resp. sein reeller Bestandtheil sei negativ.

Dann setze man zunächst

$$z=z,e^{\alpha_k z}$$

und es entsteht

$$z_1 = y \int_{u_k}^{u_2} e^{mu + s(u - u_k)} (u - \alpha_k)^{\beta_k - 1} U_k du,$$

unter Uk das Product

$$(u-\alpha_1)^{\beta_1-1}(u-\alpha_2)^{\beta_2-1}\dots(u-\alpha_n)^{\beta_n-1}$$

verstanden, wenn in selbigem der Factor $(u - \alpha_k)^{\beta_k - 1}$ fehlt. Eine ν -malige Differentiation von z_1 nach x liefert

$$z_1^{(v)} = y \int_{u_1}^{u_2} e^{mu + x(u - a_k)} (u - a_k)^{\beta_k + v - 1} U_k du,$$

und für

$$z_1^{(r)} = z_0 e^{-a_b s}$$

folgt endlich

$$z_2 = \gamma \int_{u_k}^{u_2} e^{u(m+x)} (u-\alpha_k)^{\beta_k+\tau-1} U_k du.$$

Wählt man für ν diejenige ganze positive Zahl, deren Werth unmittelbar dem absolut genommenen β_k folgt, so dürfen dem letzten Integral wieder die Grenzen $u_1 = 0$ und $u_2 = \alpha_k$ ertheilt werden. Rückwärts ergiebt sich jetzt für das Integral der in Rede stehenden Differentialgleichung

$$z = e^{a_k x} \frac{d^{-v}}{d x^{-v}} \{ e^{-a_k x} z_2 \},$$

d. b.

$$z = \gamma e^{\alpha_k x} \int_{0}^{\infty} dx^{\nu} \cdot e^{-\alpha_k x} \int_{0}^{\alpha_k} e^{u(m+x)} (u - \alpha_k)^{\beta_k + \nu - 1} U du.$$

Der Factor y bestimmt sich durch

$$e^{\alpha_k x} \int_{0}^{\infty} dx^{p} \cdot e^{-\alpha_k x} \cdot \gamma(-1)^{\beta+p+1} \alpha_1^{\beta_1} \alpha_2^{\beta_2} \dots \alpha_k^{\beta_k+p} \dots \alpha_n^{\beta_n} = B$$
oder
$$\gamma(-1)^{\beta+1} \cdot \alpha_1^{\beta_1} \alpha_2^{\beta_2} \dots \alpha_k^{\beta_k} \dots \alpha_n^{\beta_n^n} = B;$$

er hat also, wie früher, den Werth

$$\gamma = (-1)^{\beta+1}$$
, $B \cdot \alpha_1^{-\beta_1} \alpha_2^{-\beta_2} \dots \alpha_n^{-\beta_n}$.

Obwohl nun das Supplementintegral für den allgemeinen Fall aufgestellt ist, so bleiben doch noch viele specielle Fälle zur Discussion übrig, welche auftreten, wenn die Gleichung $U_1=0$ mehrfache oder unendlich grosse Wurzeln besitzt. Wir führen nur einen dieser Specialfälle an und zwar den einfachsten. Es sei vorgelegt

3)
$$a_n z^{(n)} + a_{n-1} z^{(n-1)} + \ldots + a_1 z' + (a_0 + b_0 x) z = B.$$

Dann ist, wenn $b_0 = 1$ genommen wird,

$$U_0 = a_n u^n + a_{n-1} u^{n-1} + \ldots + a_1 u + a_0, \quad U_1 = 1,$$

mithin

$$V = e^{a_n \frac{u^{n+1}}{n+1} + a_{n-1} \frac{u^n}{n} + \dots + a_1 \frac{u^2}{2} + a_0 u}.$$

Der Ausdruck zur Bestimmung der Grenzen

$$u x + a_n \frac{u^{n+1}}{n+1} + ... + a_0 u$$

kann in (n+1)-facher Weise zum Verschwinden gebracht werden, nämlich für Werthe von u, welche der Gleichung

$$a_n u^{n+1} = -\infty$$

entnommen sind.

Denken wir uns in die Gleichung 3) die Summe

$$\Phi = C_1 \int_0^{\varepsilon_1 \infty} e^{ux} V du + C_2 \int_0^{\varepsilon_2 \infty} e^{ux} V du + \ldots + C_{n+1} \int_0^{\varepsilon_{n+1} \infty} e^{ux} V du$$

eingeführt, wo ε, bis ε_{n+1} die Wurzeln von

$$a_n \varepsilon^{n+1} = -1$$

bedeuten, so muss sich Folgendes ergeben:

$$\sum_{k=1}^{k=n+1} \left\{ C_k e^{ux+a_n \frac{u^{n+1}}{n+1} + \dots + a_n u} \right\}_0^{\varepsilon_k \infty} = B,$$

oder nach Einsetzen der Grenzen

$$C_1 + C_2 + \ldots + C_{n+1} = -B.$$

Da n Constante willkürlich bleiben, so stellt der vorige Ausdruck für z das complete Integral der gegebenen Differentialgleichung dar. Um diesen Ausdruck noch etwas zu vereinfachen, schreibe man in den (n+1) Quadraturen der Reihe nach

$$\varepsilon_1 u$$
, $\varepsilon_2 u$, ... $\varepsilon_{n+1} u$

statt u. Dann erlangen sämmtliche Integrale als obere Grenze den Werth ∞ , und setzt man noch abkürzend

$$\varepsilon_k e^{\varepsilon_k u x + a_{n-1} \frac{\varepsilon_k^n u^n}{n} + \dots + a_1 \frac{\varepsilon_k^2 u^2}{2} + a_0 \varepsilon_k u = W_k},$$

so gestattet das Integral der Gleichung 3) folgende Schreibweise:

$$z = \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{u^{n+1}}{n+1}} \{C_1 W_1 + C_2 W_2 + \ldots + C_{n+1} W_{n+1}\} du.$$

§ 6.

Supplementintegral von

1)
$$(a_n + b_n x + c_n x^2) y^{(n)} + (a_{n-1} + b_{n-1} x + c_{n-1} x^2) y^{(n-1)} + \dots \dots + (a_0 + b_0 x + c_0 x^2) y = X_{\mu},$$

$$X_{\mu} = A_0 + A_1 \frac{x}{1!} + A_2 \frac{x^2}{2!} + \dots + A_{\mu} \frac{x^{\mu}}{\mu!}.$$

Da in dieser Gleichung der Coefficient des y vom zweiten Grade ist, so kann der algebraische Theil des Ergänzungsintegrals im Allgemeinen höchstens den $(\mu-2)^{\text{ten}}$ Grad erreichen, und es wird sich daher der zweite Theil der Gleichung nur auf eine lineare Function B_0+B_1x reduciren lassen. Die weitere Integration unterliegt deshalb grösseren Schwierigkeiten, als dies bei den früher betrachteten Gleichungen der Fall war, wie dies schon das einfache Beispiel

$$a_{2}y'' + (a_{1} + b_{1}x)y' + (a_{0} + b_{0}x + c_{0}x^{2})y = X_{\mu}$$

zeigen wird.

Setzen wir also das Ergänzungsintegral in der Form

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{x}{1!} + \alpha_2 \frac{x^2}{2!} + \ldots + \alpha_{\mu-2} \frac{x^{\mu-2}}{(\mu-2)!} + z$$

voraus und bestimmen die a nach dem Schema

was immer möglich ist, wenn $c_0 \gtrsim 0$ vorausgesetzt wird, so ist der andere Theil z des Ergänzungsintegrals partikuläre Lösung der vereinfachten Gleichung

1 a) $(a_n + b_n x + c_n x^2) z^{(n)} + \dots + (a_0 + b_0 x + c_0 x^2) z = B_0 + B_1 x$, in welcher B_0 und B_1 bestimmte Zahlen sind, die sich nach Ermittelung

der a von selbst ergeben.

Führt man in die Gleichung 1a) das Integral

$$z = \int_{u}^{u_2} e^{ux} V du$$

ein, so entsteht

. wobei

$$\int_{u_1}^{u_2} e^{ux} V \{ U_0 + U_1 x + U_2 x^2 \} du = B_0 + B_1 x,$$

$$U_0 = a_n u^n + a_{n-1} u^{n-1} + \dots + a_1 u + a_0$$

$$U_1 = b_n u^n + b_{n-1} u^{n-1} + \dots + b_1 u + b_0$$

$$U_2 = c_n u^n + c_{n-1} u^{n-1} + \dots + c_1 u + c_0$$

Nach einiger Reduction findet man weiter

$$\begin{bmatrix} e^{ux} \left\{ x \ U_2 \ V + & U_1 \ V \ -\frac{d}{du} \left(U_2 \ V \right) \right\} \right\}_{u_1}^{u_2} \\ + \int_{0}^{u_2} e^{ux} \left\{ U_0 \ V - \frac{d}{du} \left(U_1 \ V \right) + \frac{d^2}{du^2} \left(U_2 \ V \right) \right\} du \end{bmatrix} = B_0 + B_1 x$$

oder, wenn aus naheliegenden Gründen die Substitution .

 $\begin{aligned} &U_2 \, V = W e^{\int \frac{U_1}{\overline{U}_2} d \, u} \\ &\left[e^{u \, x + \int \frac{\overline{U}_1}{\overline{U}_2} d \, u} \, \left\{ x \, W - \frac{d \, W}{d \, u} \right\} \right]_{u_1}^{u_2} \\ &+ \int_{e}^{u \, x + \int \frac{\overline{U}_1}{\overline{U}_2} d \, u} \frac{1}{\overline{U}_2} \left\{ U_2 \, \frac{d^2 \, W}{d \, u^2} + U_1 \, \frac{d \, W}{d \, u} + U_0 \, W \right\} d \, u \end{aligned} \right\} = B_0 + B_1 \, x.$

Man suche nun W so zu bestimmen, dass

$$U_2 \frac{d^2 W}{d u^2} + U_1 \frac{d W}{d u} + U_0 W = 0,$$

dann ergiebt sich, falls die letzte Differentialgleichung überhaupt vollständig integrirt werden kann,

$$W = \gamma_1 f_1(u) + \gamma_2 f_2(u),$$

worin γ_1 und γ_2 noch unbestimmte Constanten sind. Die vorhergehende Gleichung aber zerfällt in die beiden anderen

$$\left[e^{u\,x+\int \frac{U_1}{U_2}\,d\,u}\,\,W' \right]_{u_1}^{u_2} = -\,B_0\,, \quad \left[e^{u\,x+\int \frac{U_1}{U_2}\,d\,u}\,\,W \right]_{u_1}^{u_2} = B_1\,.$$

Gelingt es, für u_1 und u_2 gewisse constante Zahlen ausfindig zu machen, so dass diese Gleichungen von x unabhängig werden, dann lassen sie sich mit Hilfe der noch unbestimmten Grössen y_1 und y_2 identisch erfüllen.

Wählt man $u_1 = 0$ und wenn möglich u_2 so, dass die linken Seiten der enannten Gleichungen verschwinden, so hat man

$$\gamma_{1}f'_{1}(u) + \gamma_{2}f'_{2}(u) = B_{0}e^{-\int \frac{U_{1}}{U_{2}}du} \begin{cases}
u = 0, \\
\gamma_{1}f_{1}(u) + \gamma_{2}f_{2}(u) = -B_{1}e^{-\int \frac{U_{1}}{U_{2}}du}
\end{cases} (u = 0),$$

und hieraus folgt

$$\gamma_{1} = \frac{B_{0} f_{2}(u) + B_{1} f'_{2}(u)}{f'_{1}(u) f_{2}(u) - f'_{2}(u) f_{1}(u)} e^{-\int \frac{U_{1}}{U_{2}} du}$$

$$\gamma_{2} = -\frac{B_{0} f_{1}(u) + B_{1} f'_{1}(u)}{f'_{1}(u) f_{2}(u) - f'_{2}(u) f_{1}(u)} e^{-\int \frac{U_{1}}{U_{2}} du}$$

$$(u = 0).$$

Nun besteht aber nach Abel zwischen den partikulären Integralen einer linearen Differentialgleichung

$$U_{2}f'' + U_{1}f' + U_{0}f = 0$$

folgende Relation:

$$f'_{1}(u) f_{2}(u) - f'_{2}(u) f_{1}(u) = \frac{1}{\pi} e^{-\int \frac{\overline{U}_{1}}{\overline{U}_{2}} du},$$

wobei z eine gewisse Constante ist, die sich durch Specialisirung des u ergiebt; sonach hat man einfacher

$$y_1 = x \{ B_0 f_2(0) + B_1 f'_2(0) \}, \quad y_2 = -x \{ B_0 f_1(0) + B_1 f'_1(0) \}.$$

Nach diesen Bestimmungen lautet das Ergänzungsintegral der Gleichung 1 a) folgendermassen:

$$z = \int_{u_1}^{u_2} e^{ux} V du = \int_{u_1}^{u_2} \frac{1}{U_2} e^{ux + \int \frac{U_1}{U_2} du} \{ \gamma_1 f_1(u) + \gamma_2 f_2(u) \} du,$$

vorausgesetzt, dass dieser Ausdruck für die ermittelten Grenzen einen Sinn hat.

Im Allgemeinen ist

$$\frac{U_1}{U_2} = m + \frac{\beta_1}{u - \alpha_1} + \frac{\beta_2}{u - \alpha_2} + \dots + \frac{\beta_n}{n - \alpha_n},$$

also

$$e^{ux+\int \frac{U_1}{U_1}du} = e^{u(m+x)} \left(u-\alpha_1\right)^{\beta_1} \left(u-\alpha_2\right)^{\beta_2} \dots \left(u-\alpha_n\right)^{\beta_n},$$

und nennt man a_k das kleinste aller a, so hat man, falls β_k positiv ist, für $u_1 = 0$ und $u_0 = a_k$ das Integral

$$z = \frac{1}{c_2} \int_0^{\alpha_2} e^{u(m+s)} (u-\alpha_1)^{\beta_1-1} \dots (u-\alpha_n)^{\beta_n-1} \{ \gamma_1 f_1(u) + \gamma_2 f_2(u) \} du.$$

Ist β_k negativ, so kommt man mit Hilfe von vielfachen Integralen zum Ziele; ist β_k complex, so bezieht sich die Vorzeichenbestimmung auf den reellen Theil. (Vergl. § 5.)

(Schluss folgt.)

Kleinere Mittheilungen.

I. Construction der von einem beliebigen Punkte der Ebene ausgehenden Normalen einer Ellipse.

(Hierzu Taf. II Fig. 1.)

T.

In der Abhandlung "Ueber die Normalen der Ellipse" (diese Zeitschrift XXVI, 6) gelangte ich mit Hilfe des Satzes:

"Werden unter α , β , γ , δ die excentrischen Winkel der Fusspunkte der Normalen verstanden, welche von einem Punkte der Ebene aus auf eine Ellipse gefällt werden können, dann ist die Summe derselben eine constante Grösse und zwar gleich 180° "

zu einer einfachen Lösung des Joachimsthal'schen Problems: von einem Punkte der Normale einer Ellipse die noch übrigen drei möglichen Normalen auf diese Curve zu fällen.

Ich erlaube mir, im Nachfolgenden den allgemeinen Fall dieses Problems in Betracht zu ziehen, für welchen der Ausgangspunkt der Normalen irgend ein beliebiger Punkt der Ebene ist, seine Lage also nicht durch die Bedingung beschränkt erscheint, er soll einer schon construirten Normale angehören.

1. Wenn wir die Gleichung der Ellipse in der Form

1)
$$b^2 \xi^2 + a^2 \eta^2 = a^2 b^2$$

annehmen, so gehören die Fusspunkte aller Normalen, welche von einem Punkte aus, z. B. P(g, h) (Fig. 1) auf die Ellipse Σ gefällt werden können, einer gleichseitigen Hyperbel an, deren Gleichung

2)
$$a^2gy - b^2hx = c^2xy$$
, $a^2 - b^2 = c^2$

ist. Mit der Construction dieser Hyperbel wäre im Grunde genommen die Lösung unserer Aufgabe sehon herbeigeführt.

Es lässt sich jedoch zeigen, dass man auch ohne Benützung derselben und zwar mit Hilfe eines Kreises die Normalenconstruction durchzuführen vermag, welche Lösung des Problems überdies die Vortheile grösserer Genauigkeit und Eleganz für sich in Anspruch nimmt.

Betrachten wir nämlich die oben citirte Relation

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 180^{\circ}$$

in Verbindung mit der von Joachimsthal angegebenen Gleichung

4)
$$\alpha' + \beta' + \gamma' + \delta' = 2 K.180^{\circ}$$

welche den Zusammenhang von vier Kreispunkten der Ellipse zum Ausdruck bringt und besagt, dass die Summe der excentrischen Winkel dieser Punkte ein gerades Vielfaches von 180° sein muss, so erkennen wir, dass es jederzeit möglich ist, durch geeignete Transformation der Winkel κ , β , γ , δ Systeme von Kreispunkten α' , β' , γ' , δ' auf der Ellipse zu bilden, in der Weise, dass ein jeder Punkt eines solchen Systems mit zinem bestimmten Normalenfusspunkte correspondirt.

Wir haben zu diesem Zwecke nur nothwendig, den excentrischen Winkeln der Normalenfusspunkte derartige Zuwächse zu ertheilen, dass die Gesammtsumme derselben ein ungerades Vielfaches von 180° beträgt; denn dann werden die den neuen Winkeln entsprechenden Punkte wirklich Punkte ein und desselben Kreises sein, da sie ja die Bedingung 4) erfüllen müssen.

Die nachfolgenden Formen a) und b), in welchen für m und n entweder Null oder jede beliebige ganze Zahl gesetzt werden kann, können als der allgemeine Ausdruck dieser Transformation angesehen werden.

a)

$$\alpha' = (2m+1)\alpha + (2n+1)45^{\circ},$$

 $\beta' = (2m+1)\beta + (2n+1)45^{\circ},$
 $\gamma' = (2m+1)\gamma + (2n+1)45^{\circ},$
 $\delta' = (2m+1)\delta + (2n+1)45^{\circ}.$

Der Werth des excentrischen Winkels nach der Transformation setzt sich zusammen aus einem ungeraden Vielfachen des Winkelwerthes in der ursprünglichen Lage, mehr einem ungeraden Vielfachen von 45°.

b)
$$\alpha' = 2(m+1)\alpha + 2n \cdot 45^{\circ}, \\ \beta' = 2(m+1)\beta + 2n \cdot 45^{\circ}, \\ \gamma' = 2(m+1)\gamma + 2n \cdot 45^{\circ}, \\ \delta' = 2(m+1)\delta + 2n \cdot 45^{\circ}.$$

Der Werth des excentrischen Winkels nach der Transformation setzt sich zusammen aus einem geraden Vielfachen des Winkelwerthes in der zusprünglichen Lage, mehr einem geraden Vielfachen von 45°.

In beiden Fällen ergiebt die Addition der Gleichungen

$$\alpha' + \beta' + \gamma' + \delta' = 2(m+n+1)180^{\circ},$$

was der Bedingung für Kreispunkte gleichkommt.

Denken wir uns nun einen Kreis construirt, welcher den Anforderungen einer der beiden Transformationen genügt, dann haben wir in den Schnittpunkten desselben mit der Ellipse ein Mittel, um zu den Normalenfusspunkten zu gelangen, ohne von der erwähnten gleichseitigen Hyperbel Gebrauch machen zu müssen. Und dies ist auch der den wir zunächst einschlagen werden.

2. Wir nehmen an, dass

$$x = a \cos \varphi, \quad y = b \sin \varphi$$

die Coordinatensymbole für die Fusspunkte der von P(g, h) ausgeh-Normalen sind.

Unter Anwendung der Transformation a mit den speciellen Wem=n=0 ergeben sich Coordinatensymbole für die Kreispunkte n

$$\xi = a \cos(45 + \varphi), \quad \eta = b \sin(45 + \varphi)$$

oder

$$\xi = \frac{a(\cos \varphi - \sin \varphi)}{\sqrt{2}}, \quad \eta = \frac{b(\cos \varphi + \sin \varphi)}{\sqrt{2}},$$

die dann auch in der Form

5)
$$\sqrt{2} \frac{\xi}{a} = \frac{x}{a} - \frac{y}{b}, \quad \sqrt{2} \frac{\eta}{b} = \frac{x}{a} + \frac{y}{b}$$

geschrieben werden können. Aus diesen Gleichungen folgen nun y die Werthe

$$\sqrt{2}\frac{x}{a} = \frac{\eta}{b} + \frac{\zeta}{a}, \quad \sqrt{2}\frac{y}{b} = \frac{\eta}{b} - \frac{\zeta}{a},$$

und wenn wir dieselben in 2) substituiren, so gelangen wir schlie zu einer Gleichung zweiten Grades zwischen ζ und η von der Fo

$$c^{2}\left(\frac{\xi^{2}}{a^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}}\right) = \sqrt{2} \, ag\left(\frac{\xi}{a} - \frac{\eta}{b}\right) + \sqrt{2} \, bh\left(\frac{\xi}{a} + \frac{\eta}{b}\right)$$

welche natürlich nur einen Kegelschnitt darstellen kann, der dur vier Kreispunkte geht.

Allgemein wird also, wenn 8 einen constanten Factor bedeu

$$\Theta c^{2} \left(\frac{\xi^{2}}{a^{2}} + \frac{\eta^{2}}{b^{2}} - 1 \right) + c^{2} \left(\frac{\zeta^{2}}{a^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} \right) = \sqrt{2} a g \left(\frac{\zeta}{a} - \frac{\eta}{b} \right) + \sqrt{2} b h \left(\frac{\zeta}{a} + \frac{\eta^{2}}{a^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} \right) = \sqrt{2} a g \left(\frac{\zeta}{a} - \frac{\eta}{b} \right) + \sqrt{2} b h \left(\frac{\zeta}{a} + \frac{\eta^{2}}{a^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} \right) = \sqrt{2} a g \left(\frac{\zeta}{a} - \frac{\eta}{b} \right) + \sqrt{2} b h \left(\frac{\zeta}{a} + \frac{\eta^{2}}{a^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} \right) = \sqrt{2} a g \left(\frac{\zeta}{a} - \frac{\eta}{b} \right) + \sqrt{2} b h \left(\frac{\zeta}{a} + \frac{\eta^{2}}{a^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} \right) = \sqrt{2} a g \left(\frac{\zeta}{a} - \frac{\eta}{b} \right) + \sqrt{2} b h \left(\frac{\zeta}{a} + \frac{\eta^{2}}{a^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} \right) = \sqrt{2} a g \left(\frac{\zeta}{a} - \frac{\eta}{b} \right) + \sqrt{2} b h \left(\frac{\zeta}{a} + \frac{\eta^{2}}{a^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} \right) = \sqrt{2} a g \left(\frac{\zeta}{a} - \frac{\eta}{b} \right) + \sqrt{2} b h \left(\frac{\zeta}{a} + \frac{\eta^{2}}{a^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} - \frac{\eta^{2}}{b^{2}} \right) = \sqrt{2} a g \left(\frac{\zeta}{a} - \frac{\eta}{b} \right) + \sqrt{2} b h \left(\frac{\zeta}{a} - \frac{\eta}{b} \right) + \sqrt{2} b$$

die Gleichung des Büschels der Kegelschnitte sein, welche die vier punkte der Ellipse gemeinschaftlich haben.

Aus dieser Gleichung gewinnen wir durch die Substitution

$$\Theta c^2 = a^2 + b^2,$$

durch welche die Coefficienten der höchsten Potenzen gleiche Verhalten, die Gleichung des gesuchten Kreises

6) (K)
$$2\left(\xi^2 + \eta^2 - \frac{a^2 + b^2}{2}\right) = \sqrt{2} ag\left(\frac{\xi}{a} - \frac{\eta}{b}\right) + \sqrt{2} bh\left(\frac{\zeta}{a} + \frac{\eta}{b}\right)$$

Um diesen Kreis zu construiren, beachten wir, dass derselbe, w seiner Gleichung hervorgeht, die Mittelpunktssehne

$$(s s_1) a g\left(\frac{\zeta}{a} - \frac{\eta}{b}\right) + b h\left(\frac{\zeta}{a} + \frac{\eta}{b}\right) = 0$$

in denselben zwei Punkten trifft, in welchen sie auch von dem

7)
$$(K_1) \xi^2 + \eta^2 = \frac{a^2 + b^2}{2}$$

geschnitten wird.

Die Construction des Kreises K_1 unterliegt keinen Schwierigkeiten; dem bekanntlich hat derselbe mit der Ellipse das Paar conjugirter Durchmesser gemeinschaftlich, welches zu den Verbindungsgeraden der Ellipsenscheitelpunkte parallel läuft. Aber auch die Sehne ss_1 kann leicht bestimmt werden, wie aus nachfolgender Betrachtung hervorgeht.

Durch partielle Differentiation nach ζ und η ergeben sich aus 6) die Coordinaten des Kreismittelpunktes m in der Form

8)
$$2\sqrt{2} a \zeta_0 = bh + ag$$
, $2\sqrt{2} b \eta_0 = bh - ag$.

Dividiren wir diese Gleichungen durch einander, so erhalten wir in

9)
$$(bh - ag) a \zeta_0 - (bh + ag) b \eta_0 = 0$$

die Gleichung der Geraden, welche den Mittelpunkt m des Kreises K mit 0 verbindet.

Offenbar werden wir an der Bedeutung der Gleichung 9) auch nicht du Geringste ändern, wenn wir derselben durch gleichzeitige Addition und Subtraction des Productes abgh die Gestalt

10)
$$bh(a\zeta_0 - b\eta_0 - ag) - ag(a\zeta_0 + b\eta_0 - bh) = 0$$
geben.

Es ist also 10) ebenso wie 9) die Gleichung der die Punkte m und θ verbindenden Geraden; aber in der neuen Gestalt giebt sie uns Anhaltspunkte zu einer einfachen Construction.

Wir bemerken nämlich, dass die erwähnte Gerade auch den Schnittpunkt der durch die Gleichungen

$$a\zeta - b\eta_0 - ag = 0,$$

$$a\zeta_0 + b\eta_0 - bh = 0$$

repräsentirten Geraden in sich enthält, da die Coordinaten

13)
$$2a\xi_1 = bh + ag, \quad 2b\eta_1 = bh - ag$$

desselben die Gleichungen 9) und 10) identisch auf Null führen.

Schreibt man 11) und 12) in der Form

$$\eta_0 = \frac{a}{b}(\zeta_0 - g), \quad \eta_0 - h = -\frac{a}{b}\xi_0,$$

so lisst sich Folgendes aus denselben berauslesen:

Die Gerade 11) geht durch die Horizontalprojection p_2 des Normalenausgangspunktes P und steht senkrecht auf der Verbindungslinie der Ellipsenscheitelpunkte α , β_1 ; die Gerade 12) geht durch die Verticalprojection p_1 von P und steht senkrecht auf der Verbindungsgeraden der Ellipsenscheitelpunkte α_1 , β_1 .

Die beiden Geraden sind demnach leicht zu construiren.

Verbindet man nun den Schnittpunkt p dieser Geraden mit dem Littelpunkte O der Ellipse, so ist die in O auf op errichtete Senkrecht

die Sehne ss_1 und ihre Schnittpunkte mit K_1 sind zwei Punkte des Kreises K.

Es erübrigt uns noch die Construction des Mittelpunktes m von K.

Aus den Gleichungen 8) erfolgt durch Quadrirung und nachherige
Addition

$$2\overline{om}^2 = \frac{(bh + ag)^2}{4a^2} + \frac{(bh - ag)^2}{4b^2};$$

ebenso ergiebt sich aus den Gleichungen 13)

$$op^{2} = \frac{(bh + ag)^{2}}{4a^{2}} + \frac{(bh - ag)^{2}}{4b^{2}},$$

woraus schliesslich

$$2\overline{om^2} = \overline{op^2}$$

folgt.

Die Entfernung des Mittelpunktes m von O ist sonach der Seite eines Quadrates gleich, dessen Diagonale op ist.

Nun sind wir in der Lage, den Kreis Kzu construiren, und unsere Aufgabe besteht weiter darin, von den Schnittpunkten A, B, C, D desselben mit der Ellipse — von welchen ein jeder, wie wir gesehen haben, einem Normalenfusspunkte eindeutig entspricht — zu den letzteren überzugehen.

Zu diesem Ende dividiren wir die in 5) angeführten Gleichungen durch einander und geben der dadurch erhaltenen neuen Gleichung durch Addition und Subtraction des Productes $ab\xi\eta$ die Gestalt

14)
$$a\eta(bx-ay-b\zeta)-b\zeta(bx+ay-a\eta)=0.$$

Sonach repräsentirt 14) die Gleichungen der Geraden, welche die Normalenfusspunkte mit dem Mittelpunkte der Ellipse verbinden. Durch ganz ähnliche Schlussfolgerungen, wie wir sie bei der Construction der Sehne ss, angestellt haben, gelangen wir auch hier wieder zu einem Hilfspunkte, dargestellt durch den Schnitt der Geraden

$$y = \frac{b}{a}(x-\xi),$$

$$16) y-\eta=-\frac{b}{a}x,$$

welcher, wie aus den Gleichungen 15) und 16) erschlossen werden kann, sich folgendermassen finden lässt:

Durch die Horizontalprojection des Kreispunktes führe man eine Gerade parallel zu α_1 , β_1 und bringe dieselbe mit einer zweiten Geraden zum Schnitte, welche parallel zu α , β_1 ist und durch die Verticalprojection des erwähnten Punktes geht.

Nun hat man, um zu dem Normalenfusspunkte zu gelangen, den Hilfspunkt mit dem Mittelpunkte der Ellipse zu verbinden und diese Verbindungslinie in jenem Quadranten mit der Curve zum Schnitte zu bringen, in welchem sich der Hilfspunkt befindet. Fassen wir die gewonnenen Resultate noch einmal in kurzen Worten susammen, so erledigt sich die Aufgabe, von P (Fig. 1) die Normalen auf die Ellipse zu fällen, durch folgende einfache Construction.

Man fälle die Perpendikel Pp_1 , Pp_2 von P aus auf die Axen und bestimme den Punkt p als Schnitt zweier Geraden, von denen die eine durch p_1 geht und normal zu $\alpha_1\beta_1$ ist, die andere durch p_2 geht und auf $\alpha\beta_1$ senkrecht steht. Nun verbinde man p mit o und errichte in O auf op die Senkrechte, welche den Kreis K_1 in s, s_1 schneidet.

Macht man ferner om gleich der Seite eines Quadrates, dessen Diagonale op ist, und beschreibt von m aus mit dem Halbmesser $ms = ms_1$ den Kreis K, der die Ellipse in den Punkten A, B, C, D schneidet, so gelangt man von einem derselben — z. B. A — zu dem ihm entsprechenden Normalenfusspunkte I durch folgende Construction:

$$a_2 \alpha // \alpha_1 \beta_1$$
, $a_1 \alpha // \alpha \beta_1$.

Die Verbindungsgerade oa schneidet Σ in I.

KARL LAUERMANN.

II. Reciproke Maxima und Minima.

,, Sind
$$u = F(x, y), \quad v = f(x, y)$$

Functionen von der Beschaffenheit, dass bei constantem x einer Zu- oder Abnahme von u auch eine Zu- oder Abnahme von v entspricht, so tritt bei constantem v ein Maximum oder Minimum von u unter derselben Bedingung ein, als bei constantem u ein Minimum oder Maximum von v."

Beweis. Eliminirt man y aus den Gleichungen 1) und differentiirt die erhaltene Gleichung

$$\varphi(u,v,x)=0,$$

so ergiebt sich unter Voraussetzung eines constanten x.

$$\frac{\partial v}{\partial u} = -\frac{\frac{\partial \varphi}{\partial u}}{\frac{\partial \varphi}{\partial v}}.$$

Dieser Differential quotient muss wegen des gleichzeitigen Wachsens oder Abnehmens von u und v positiv sein, daher $\frac{\partial \varphi}{\partial v}$ das entgegengesetzte

Vorzeichen haben wie $\frac{\partial \varphi}{\partial u}$. —

Setzt man v = constant, so erreicht u einen Culminationswerth für jene Werthe von x, welche der Gleichung genügen

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0.$$

u wird ein Maximum oder Minimum, je

$$\frac{\partial^3 \varphi}{\partial x^2} - \frac{\partial^3 \varphi}{\partial u}$$

negativ oder positiv ausfällt.

Setzt man jedoch u = constant, so erhält man die Werthe von x, welche v zu einem Maximum oder Minimum machen, aus derselben Gleichung 3) und es entscheidet das Vorzeichen des Ausdrucks

$$-\frac{\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}}{\frac{\partial \varphi}{\partial x}}$$

darüber, ob ein Maximum oder ein Minimum eintritt. Dieses Vorzeichen ist aber nach der eingangsgemachten Bemerkung das entgegengesetzte von dem des Ausdrucks 4). Daraus geht hervor:

- 1. dass die eine der Grössen u, v bei constantem Werthe der andern unter derselben Bedingung 3) einen Culminationswerth erreicht als die andere, und
- 2. dass diese Culminationswerthe stets entgegengesetzter Art sind, so dass also einem Minimum von u ein Minimum von v und umgekehrt entspricht.

Der Beweis lässt sich auch auf elementarem Wege erbringen, wie folgt.

Ев веі

$$6) u = \psi(v, x)$$

die Auflösung der Gleichung 2) und X ein Werth von x, der bei constantem v u zu einem Maximum = U macht; dann besteht für beliebig kleine positive δ und δ_1 die Ungleichung

7)
$$\psi(v, X-\delta) < \psi(v, X) > \psi(v, X+\delta_1).$$

Denken wir uns nun v variabel, so können wir diese Ungleichung in eine Gleichung überführen, indem wir ohne Aenderung der Werthe von x v vergrössern, da hierdurch nach der Voraussetzung auch eine Vergrösserung von u erzielt wird. Ist hiernach

8)
$$\psi(v+\varepsilon, X-\delta) = \psi(v, X) = \psi(v+\varepsilon_1, X+\delta_1) = U,$$

so ist ersichtlich, dass unter den benachbarten Werthen $v + \varepsilon$, v, $v + \varepsilon_1$ der mittlere der kleinste, somit ein Minimum ist und ferner, dass dieses Minimum bei constantem u = U für jenen Werth X eintritt, der bei constantem v = v u zu einem Maximum u = U macht.

Dieser Satz begründet die Reciprocität der Sätze über die Figuren grössten Inhalts und kleinsten Umfangs, und ermöglicht es, aus einem dieser Sätze einen reciproken direct abzuleiten, z. B.:

1. "Unter allen isoperimetrischen Dreiecken über derselben Basis hat das gleichschenklige die grösste Fläche."

Nun sind Fläche wie Umfang eines Dreiecks von gegebener Basis Functionen der beiden Winkel A und B an der Basis.

Bei constantem Winkel A nehmen Fläche und Umfang gleichzeitig zu oder ab, daher gilt auch der reciproke Satz:

"Unter allen Dreiecken über derselben Basis und von gleichem Inhalte hat das gleichschenklige den kleinsten Umfang."

2. "Unter allen gleichseitigen n-Ecken mit gleichem Umfange hat das regelmässige n-Eck den grössten Inhalt."

Fläche und Umfang eines gleichseitigen n-Ecks nehmen bei gleicher Gestalt gleichzeitig zu oder ab; daher der Satz:

"Unter allen gleichseitigen n-Ecken mit gleichem Inhalte hat das regelmässige den kleinsten Umfang."

3. "Unter allen isoperimetrischen Figuren hat der Kreis den grössten Isbalt."

Fläche und Umfang einer Figur nehmen bei unveränderter Gestalt, semit gleichen Krümmungsverhältnissen gleichzeitig zu oder ab. I) araus folgt:

"Unter allen Figuren gleichen Inhalts hat der Kreis den kleinsten Umfang."

Trautenau, 22. Mai 1884.

F. HALUSCHKA.

III. Zur Gleichung von Kegel und Cylinder.

Sind die Gleichungen zweier Ebenen

$$u_1 \equiv a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 = 0$$
, $u_2 \equiv a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 = 0$

and sind die Coefficienten beider Gleichungen constant, so schneiden sich die Ebenen in einer Geraden der Richtung (bc)|(ca)|(ab) und der Stellung (ad)|(bd)|(cd) (vergl. diese Zeitschrift, Jahrg. 1883 S. 315). Im orthogonalen System ist dann, wenn z's die durch s parallel z gelegte Projectionsebene ist,

$$\begin{aligned} qz's^{\lambda}yz &= -(bc):(ca), & tgx's^{\lambda}zx &= -(ca):(ab), & tgy's^{\lambda}xy &= -(ab):(bc) \\ & tgy's^{\lambda}yz: tgx's^{\lambda}tgxz: -1 &= (bc):(ca):(ab). \end{aligned}$$

Ist aber ein Coefficient, z. B. a_1 , ein veränderlicher Parameter, so stellt die erste Gleichung ein Ebenenbüschel, d. h. eine einfache Ebenenserie, welche durch eine Gerade geht, dar. Die feste Gerade erhalten wir, wenn wir die Ebene dem Einfluss des veränderlichen a_1 entziehen und x=0 setzen. Diese Ebene x=0 enthält von der Ebene $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ die Gerade $b_1y+c_1z+d_1=0$, welches die gemeinschaftliche Gerade des Büschels ist. Auf der zweiten Ebene wird durch dies Büschel von Ebenen

ein Strahlenbüschel erzeugt mit dem Centrum
$$0\left|\frac{(c\,d)}{(b\,c)}\right|\frac{-(b\,d)}{(b\,c)}$$
 und

entsprechend, wenn b_1 und c_1 variabel sind. Ist d_1 variabel, so entsteht ein Bündel paralleler Ebenen, deren unendlich ferne Gerade die der Ebene $a_1x + b_1y + c_1z = 0$ ist. Dies Bündel erzeugt auf der zweiten Ebene ein Strahlenbündel mit unendlich fernem Centrum; die Strahlen haben die Richtung (bc):(ca):(ab).

Sind zwei Coefficienten einer Gleichung veränderlich, so erhalten wir eine Doppelserie von Ebenen, vorausgesetzt, dass die beiden Coefficienten von einander unabhängig sind. Das Centrum der Doppelserie wäre z. B. $0 \mid 0 \mid -\frac{d_1}{c_1}$, wenn a_1 und b_1 die Veränderlichen sind.

Ist jedoch je ein Coefficient jeder Gleichung, z. B. a_1 und b_2 , veränderlich, so entsteht als Schnitt beider Ebenenserien eine Doppelserie von Geraden, und, sind beide Coefficienten durch eine Gleichung an einander gebunden, eine einfache Serie von Geraden, eine geradlinige Fläche [Regelfläche]. Diese Regelfläche wird nun zu einem Kegel, wenn alle Geraden durch einen Punkt gehen, zu einem Cylinder, wenn sie parallel sind, d. h. ein unendlich fernes Centrum haben.

Es werde demnach zunächst vorausgesetzt, dass die Coefficienten Einer Gleichung unter einander unabhängig sind, und zwar constant, wenn nicht das Gegentheil durch eine weitere Gleichung hervorgehoben wird; ferner sei f eine Function nten Grades. Dann stellt

$$u_1 = 0$$
, $u_2 = 0$, $f(a_1, a_2) = 0$

stets einen Kegel n^{ter} Ordnung dar mit dem Centrum $0 \left| \frac{(c d)}{(b c)} \right| \frac{-(b d)}{(b c)}$.

Denn zu jedem willkürlich gewählten a_1 gehören n bestimmte a_2 ; zu jeder Ebene $u_1 = 0$ gehören demnach n Ebenen $u_2 = 0$, welche auf u_1 eine besondere Linie n^{ter} Ordnung, bestehend aus n Geraden eines Punktes, erzeugen. Das beweist, dass die Regelfläche, welche entsteht, jedenfalls n^{ter} Ordnung ist. Von den Geraden der Ebenen sind nun unabhängig von den Veränderungen von a_1 resp. a_2 die Geraden

$$x = 0 | b_1 y + c_1 z + d_1 = 0$$
 and $x = 0 | b_2 y + c_2 z + d_2 = 0$;

dieselben liegen beide auf einer Ebene, baben also einen Punkt gemein, und dieser muss auf allen Ebenen, also auch auf allen Geraden der Serie liegen.

Entsprechend stellt

$$u_1 = 0$$
, $u_2 = 0$, $f(b_1 b_2) = 0$ einen Kegel mit dem Centrum $\frac{-(cd)}{(ca)} \left| 0 \right| \frac{(ad)}{(ca)}$ und $u_1 = 0$, $u_2 = 0$, $f(c_1 c_2) = 0$ einen Kegel mit dem Centrum $\frac{(bd)}{(ab)} \left| \frac{-(ad)}{(ab)} \right| 0$ dar. Endlich wird $u_1 = 0$, $u_2 = 0$, $f(d_1 d_2) = 0$

einen Cylinder repräsentiren. Denn die unendlich ferne Gerade der wird die Axe der Serie sein und beide haben einen Schnittpuls mainung: Recurrency wederen ungleich die Renount der Aus die Glober un nämber

le ma une die Legalitäche

$$L = 1$$
 $L = 1$ $L = 1$

product. so ar dieselbe main maisvendig our Logo. The Arms decim

index minimis music moleculary einem Parks generic, sendiren um universitä bedingung $z \, \dot{z} = 0$; due Centrum music auf z = 0 und y = 0 degree. Le mi due z-Axe. Identifie wird van der ensem Gernden in $-\dot{q}_{z} \cdot \dot{q}_{z}$ generalisen, welche Paulie name der Redigning $z \, \dot{z} = 0$ unsammentalisen und due Centrum derives. Obsessed quedend soelle due System

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{\theta}, \quad \mathbf{x}_2 = \mathbf{\theta}, \quad f(\mathbf{x}_1) = \mathbf{\theta}, \quad \mathbf{x}_3 = \mathbf{0}$$

einen Kegeli das mit dem Centram $-\frac{\mathcal{L}_{i}}{\mathcal{L}_{i}} \ll t$

Electe viri un

$$a_1 = 0$$
, $a_2 = 0$, $f(a_1 d_1 = 0)$, $f(a_2 d_2 = 0)$

einen Cyfinder darstellen; denn die Axe der ersten Serie z=0 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0$ hat mit der Axe der zweiten Serie t=0 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0$ dann und nur dann einen Punkt gemein, wenn der unendlich feine Punkt beider auf der Ebene x=0 liegt und derselbe ist, d. h. $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ und $\lambda_2 + \lambda_3 = 0$ gleichzeitig richtig sind. Die Richtung der Axe ist dann in der yz-Ebene $-\frac{c_1}{b_1} = -\frac{c_2}{b_3}$.

Sind nun aber die Coefficienten Einer Gleichung nicht unabhängig von einander, so lassen sich einzelne Fälle auf die vorigen nurückführen.

Es sei $d_1 = \delta_1 - \alpha_1 a_1$ und entsprechend $d_2 = \delta_2 - \alpha_3 a_2$, dann lauten die Gleichungen

$$a_1(x_1-a_1)+b_1y+c_1z+\delta_1=0$$
, $a_2(x-a_2)+b_2y+c_2z+\delta_2=0$.

Sind a_1 and a_2 verschieden, so kann $f(a_1a_2)$ offenbar keinen oder nur einen Kegel mit unendlich fernem Centrum erzeugen, d. h. einen Cylinder unter der Bedingung (bc) = 0, ein Fall, der schon früher behandelt wurde.

Ist entsprechend z. B. $b_1=q_1-p_1a_1$, $b_2=q_2-p_2a_2$, $p_1\geq p_3$, we stellen die Gleichungen

$$a_1(x-p_1y)+q_1y+c_1z+d_1=0$$
, $a_1(x-p_1y)+q_1y+c_1z+d_1=0$, $f(a,a_0)=0$

einen Kegel dar unter der Bedingung (cd) = 0; das Centrum liegt auf der gemeinschaftlichen Geraden von $x - p_1 y = 0$ und $x - p_2 y = 0$, d. l.,

mit der Axenrichtung (bc):(ca):(ab), woraus ersichtlich ist, dass b und in der Gleichung f=0 nur als Constante auftreten dürfen. [Ver Schlömilch a. a. O. Cap. V.]


Hiermit ist der Fall erledigt, dass von den Constanten der Gleinungen $u_1 = 0$, $u_2 = 0$ vier in der Weise variabel waren, dass swei averschiedenen Gleichungen durch eine Gleichung n^{ten} Grades, je staus derselben Gleichung durch eine lineare Gleichung verknüpft die Letztere Bedingung gestattet eine Erweiterung, deren allgemeiner Andruck in den Gleichungen

$$a_{1}(\alpha'_{1} x + \beta'_{1} y + \gamma'_{1} z + \delta'_{1}) + b_{1}(\alpha'_{2} x + \beta'_{2} y + \gamma'_{2} z + \delta'_{2}) + c_{1}(\alpha'_{3} x + \beta'_{3} y + \gamma'_{3} z + \delta'_{3}) + d_{1}(\alpha'_{4} x + \beta'_{4} y + \gamma'_{4} z + \delta'_{4}) = 0,$$

$$a_{2}(\alpha''_{1} x + \beta''_{1} y + \gamma''_{1} z + \delta''_{1}) + b_{2}(\alpha''_{2} x + \beta''_{2} y + \gamma''_{3} z + \delta''_{2}) + c_{3}(\alpha''_{3} x + \beta''_{3} y + \gamma''_{3} z + \delta''_{3}) + d_{2}(\alpha''_{4} x + \beta''_{4} y + \gamma''_{4} z + \delta''_{4}) = 0$$
enthalten ist, für welche die hier befolgte Behandlungsweise zu umstlei lich wird. [Vergl. Joachimsthal, Anwend. d. Diff.-Rechn., S. 16 Sturm, Cours d'Analyse, Nr. 667.]

Berlin, April 1884.


A. THARM.





.

·



da p_1 und p_2 von einander verschieden sind, die z-Axe, ein Fall, der oben erledigt ist. Entsprechend ist z. B.

 $u_1 = 0$, $u_2 = 0$, $f(c_1 c_2) = 0$, $b_1 = q_1 - r_1 c_1$, $b_2 = q_2 - r_2 c_2$, (ad) = 0 das Gleichungssystem eines Kegels mit dem Centrum $-\frac{a_1}{d_1} \begin{vmatrix} 0 \end{vmatrix} 0$.

Es sei nun $d_1 = \delta_1 - \alpha a_1$ und $d_2 = \delta_2 - \alpha a_2$, dann erscheinen die Gleichungen $u_1 = 0$ und $u_2 = 0$ in der Form

 $a_1(x-\alpha)+b_1y+c_1z+\delta_1=0, \quad a_2(x-\alpha)+b_2y+c_3z+\delta_3=0$ und die Zusatzgleichung $f(a_1a_2)=0$ stellt wiederum unbedingt einen Kegel dar mit dem Centrum $\alpha\left|\frac{(c\,\delta)}{(b\,c)}\right|-\frac{(b\,\delta)}{(b\,c)}$. Die Zusatzgleichung $f(a_1b_2)=0$ erfordert noch die Bedingung $(c\,\delta)=0$ und liefert dann das Centrum $\alpha\left|0\right|-\frac{\delta_1}{c_1};$ und die Gleichung $f(a_1\delta_2)=0$ liefert einen Cylinder unter der Bedingung $(b\,c)=0.$

Die Analogien für $d_1 = \delta_1 - \beta b_1$ u. s. w. sind leicht zu bilden.

Ist $b_1 = \beta_1 - \alpha a_1$ und $b_2 = \beta_2 - \alpha a_2$, so stellt

$$a_1(x-\alpha y)+\beta_1 y+c_1 z+d_1=0\,,\quad a_3(x-\alpha y)+\beta_2 y+c_2 z+d_2=0\,,\\ f(a_1\,a_2)=0$$

wiederum unbedingt einen Kegel dar mit dem Centrum $\alpha \frac{(cd)}{(\beta c)} \left| \frac{(cd)}{(\beta c)} \right| \frac{-(\beta d)}{(\beta c)}$. $f(a_1b_2) = 0$ oder $f(a_1\beta_2) = 0$ führt auf die Bedingung (cd) = 0 und das Centrum $0 \left| 0 \right| - \frac{d_1}{c_1}$. $f(a_1c_2) = 0$ verlangt die Bedingung $(\beta d) = 0$; das Centrum ist $-\alpha \frac{d_1}{\beta_1} \left| \frac{-d_1}{\beta_1} \right| 0$. $f(a_1d_2) = 0$ erzeugt einen Cylinder unter der Bedingung $(\beta c) = 0$, dessen Axe parallel der Geraden $x - dy = 0 \mid \beta_1 y + c_1 z = 0$, d. h. $\frac{x}{y} = \alpha$, $\frac{z}{y} = \frac{-\beta_1}{c_1}$.

Die weiteren Zwischenfälle bieten nichts, das sich nicht auf das Vorhergehende reduciren oder auf die folgenden allgemeinen Fälle bringen lässt. Es sei d_1 linear abhängig von $a_1b_1c_1$, d_2 von $a_2b_2c_2$, so werden sich einfache Resultate nur ergeben, wenn die Abhängigkeit durch dieselbe lineare Gleichung $d=\delta-\alpha a-\beta b-\gamma c$ dargestellt wird. Unsere Ebenen haben dann die Gleichung

$$a_1(x-\alpha) + b_1(y-\beta) + c_1(z-\gamma) + \delta_1 = 0, a_0(x-\alpha) + b_0(y-\beta) + c_0(z-\gamma) + \delta_0 = 0,$$

und auf diese Form wird man sie auch bringen, wenn z. B. neben $f(a_1b_2)=0$ nur gegeben $d_1=\delta'_1-\alpha a_1$ und $d_2=\delta'_2-\beta b_2$, indem δ_1 und δ_2 so gewählt werden, dass $\delta'_1=\delta_1-\beta b_1-\gamma c_1$, $\delta'_2=\delta_2-\alpha a_2-\gamma c_2$, was möglich ist und für γ sogar die Wahl noch frei lässt.




Fig.24. K#

Fiġ.26.

,				
•				
	,			
	•			
			•	
			•	
	,			

Die Curven vierter Ordnung mit drei doppelten Inflexionsknoten.

Von
Dr. C. BEYEL
in Zürich.

(Schluss.)

Hierzu Taf. III u. IV Fig. 9-24.

15. Eintheilung der C^4 und Darstellung der Hauptformen.

Wir erhalten eine Uebersicht über die verschiedenen Formen der C^4 , indem wir von den einfachsten derselben ausgehen. Für diese liegt entweder m_1 oder M_1 unendlich ferne und K^2 ist ein Kreis oder eine gleichseitige Hyperbel. Aus diesen speciellen Formen können wir die allgemeinen durch eine centrische Collineation erster Ordnung ableiten.

Ist m_1 unendlich fern, so halbirt M_1 die Strecken, welche zwischen zwei Punkten der C^4 liegen, die sich auf Geraden durch M_1 befinden. C^4 hat in M_1 einen Mittelpunkt. Sämmtliche Kegelschnitte K_{ρ}^2 sind Parabeln (1), und die quadratischen Transformationen (2), welche durch C^4 geleitet werden, zeichnen sich dadurch aus, dass jeder Geraden eine Parabel entspricht.

Ist M_1 unendlich fern, so halbirt m_1 die Strecken zwischen Punkten der C^4 , welche auf Geraden von der Richtung M_1 liegen. C^4 ist zu sich selbst symmetrisch mit m_1 als Axe und $M_1 \infty$ als Richtung der Symmetrie.

In Taf. III Fig. 9—16 sind nun dem Gesagten entsprechend die ein fachsten Typen der C^4 zusammengestellt. Fig. 9—12 zeigen Mittelpunktscurven, Fig. 13—16 Curven, welche zu r orthogonal symmetrisch liegen. In Fig. 9, 10, 13, 14, 15 sind M_1 , M_2 , M_3 reell, in Fig. 11, 12, 16 sind M_1 , M_3 imaginär. Wir fügen den Figuren einige Bemerkungen bei.

Fig. 9 ist so disponirt, dass M_1 ein isolirter Punkt von C^4 ist. Also muss die Involution J_{1k} um M_1 elliptisch sein. Daher ist K^2 ein im Endlichen geschlossener Kegelschnitt, in unserem Falle ein Kreis. J_{1k} ist also eine Rechtwinkelinvolution und folglich sind m_2 , m_3 zu einander normal. C^4 ist zu diesen Geraden orthogonal symmetrisch. Ist J_1 durch g_1h_1 geseben, so schneiden diese Doppelstrahlen K^2 in einem Quadrupel von Estenbalt 2 Mathematik u. Physik XXX. 2.

Nachdem i_1 , i_1^* bestimmt ist, benutzen wir diese Geraden, um aus K^2 und J_1 die Involution J_1^* zu zeichnen. Mit Hilfe von J_1^* finden wir (12) einen Punkt und eine Tangente von K^{*2} . Letzterer Kegelschnitt ist gleichseitige Hyperbel und berührt — wie K^2 — die C^4 in zwei reellen Punkten.

Taf. III Fig. 13 stellt die zu m_1 orthogonal symmetrische Curve C^4 dar, für welche M_1^{∞} ein isolirter Punkt ist. M_1 ist also in Bezug auf K^2 ein elliptischer Punkt und folglich muss jede Gerade durch M_1 den Kegelschnitt K^2 reell schneiden. Unter diese Geraden gehört auch die unendlich ferne und daraus folgt, dass K^2 eine Hyperbel ist. In Fig. 13 ist dieselbe als gleichseitig angenommen. Die unendlich ferne Gerade trifft aber C^4 ausser in M_1 noch in zwei Punkten. Wir erhalten sie, indem wir in der Involution J_1 zur unendlich fernen Geraden die entsprechende — u — bestimmen. Diese liegt in der Mitte von g_1h_1 . Die Tangenten in ihren Schnittpunkten mit K^2 haben die Richtung der gesuchten Punkte. In letzteren zeichnen wir auf bekannte Weise die Tangenten an C^4 . Diese sind Asymptoten — a_1 a^* — der Curve.

In Taf. III Fig. 14 hat $M_{1\infty}$ reelle Inflexionstangenten. K^2 ist als Kreis angenommen. $i_1 i_1^*$ sind ein Paar Asymptoten. Das andere Paar erhalten wir wie bei Fig. 13.

In Taf. III Fig. 15 ist K^2 als gleichseitige Hyperbel angenommen. C^4 hat ausser i_1 , i_1^* keine weiteren Asymptoten. Aus K^2 ist mit Hilfe von T_{12} der Kegelschnitt K^{*2} gezeichnet, der K^2 in zwei Punkten von m_1 und C^4 in den Punkten eines imaginären Quadrupels berührt.

Taf. III Fig. 16 stellt eine zu m_1 orthogonal symmetrische C^4 dar, für welche M_2 , M_3 imaginär sind. K^2 ist als Kreis angenommen. K^{*2} ergiebt sich daraus als Hyperbel. i_1 , i_1^* sind die beiden reellen Asymptoten.

Ein Ueberblick über die bis jetzt erwähnten C^4 ergiebt, dass nur die in Taf. III Fig. 9, 10, 12 und 16 gezeichneten Formen wesentlich von einander verschieden sind. Fig. 14 und 15 kann aus 9 dadurch abgeleitet werden, dass wir eines der bei Fig. 9 im Unendlichen liegenden M ins Endliche rücken lassen. In analoger Weise erhalten wir die in Fig. 13 dargestellte Curve aus der in Fig. 10 gezeichneten. C^4 von Fig. 11 endlich ist eine specielle Form der C^4 von Fig. 12. Aus den Fig. 9, 10, 12, 16 leiten wir die allgemeinen Formen der C^4 mittels einer centrischen Collineation erster Ordnung ab, und zwar die C^4 mit drei reellen Inflexionsknoten aus Fig. 9 oder 10 und die C^4 mit einem reellen Inflexionsknoten aus Fig. 12 oder 16. Wollen wir aber solche Formen direct aus einem Kegelschnitt zeichnen, so bedienen wir uns dazu der in 10 entwickelten Methode, bei der wir von einem Kreise durch $M_1 M_2 M_3$ ausgehen. Mittels derselben sind die Curven vierter Ordnung von Taf. IV Fig. 17, 18, 19 construirt. Es sind dies C^4 mit drei reellen Inflexionsknoten.

Taf. IV Fig. 17 giebt eine C^4 , welche durch die imaginären Punkte des Kreises K_m^2 geht. T muss also der Mittelpunkt von K_m^2 sein. Ueberdies

 g_1 , h_1 — die Doppelstrahlen von J_1 — müssen die Asymptoten a_1 , a_1^* dieser Hyperbel trennen. Für den dargestellten Fall ist J_1 so disponirt, dass g_1 , h_1 die Axen der gleichseitigen Hyperbel K^2 sind. Daraus ergiebt sich, dass m_1 . m_2 die Strahlen nach den imaginären Kreispunkten der Ebene sind. Also geht C^4 durch diese Kreispunkte — $i_1i_1^*$ fällt mit den Asymptoten der Hyperbel zusammen und diese repräsentiren auch den Kegelschnitt K^{*2} , welcher K^2 in m_1 berührt.

Nach der in 5 besprochenen Methode sind die zwei reellen Doppeltangenten von C^4 construirt. H_1 , H_1^* liegen in g_1 resp. h_1 unendlich fern. Wir ziehen dann durch den in g_1 gelegenen und in Bezug auf K^2 elliptischen Punkt H_1^* die Geraden w_1w_1' , w_2w_2' , w_3w_3' . Diese sind Paare der Involutionen J_{1w} und liegen in unserem Falle zu g_1 orthogonal symmetrisch. Wir schneiden sie mit einer beliebigen Geraden g und erhalten dadurch drei Prove einer Punktinvolution. Diese ist auf einen Hilfskegelschnitt H^2 übertragen, der durch M_1 geht und g_1 , g zu Tangenten hat. Dann sind die Verbindungslinien entsprechender Paare parallel zu g_i und schneiden g in den Punkten w_1 , w_2 , w_3 . Nun construiren wir die Kegelschnitte K_{w}^2 , die K^{2} in den Schnittpunkten mit den Geraden w, w' berühren, und bestimmen die Tangenten aus M, an diese Kegelschnitte. Sie sind Paare der Involution J_t . Auch diese übertragen wir auf H^2 und ziehen die Verbindungslinien entsprechender Punkte. Wir erhalten dadurch drei weitere Gerade t_1 , t_2 , t_3 , welche g_1 parallel sind und g in den Punkten T_1 , T_2 , T_3 schneiden. Nun sind die Punktreihen $w_1 w_2 w_3$, $T_1 T_2 T_3$ zu einander projectivisch. In dieser Projectivität construiren wir zu T_{σ} den entsprechenden Punkt w. Er führt uns zu einem Geradenpaare $w_{\infty}w'_{\infty}$, welches die Hyperbel K^2 in Punkten trifft, deren correspondirende auf C^4 mit Hilfe von J_1 gefunden **werden** und die Berührungspunkte der gesuchten Doppeltangenten — d_1 , d_1 * sind. Die Construction in Fig. 11 ist dadurch vereinfacht, dass we im Unendlichen und w_3 in g_1 angenommen wurde.

Sämmtliche Kegelschnitte K^2 sind gleichseitige Hyperbeln und liegen ausserhalb C^4 . Desgleichen sind alle Kegelschnitte K_q^2 gleichseitige Hyperbeln. Die Kegelschnitte K_s^2 und K_m^2 sind Kreise. Aus dieser Bemerkung ergiebt sich die Construction der Tangente in einem Punkte — F'_1 — von C^4 mit Hilfe des berührenden Kreises K_s^2 . Wir legen einen Kreis K_m^2 durch $M_1F'_1$ und einen weiteren Punkt der C^4 . Nehmen wir als letzteren den zu F'_1 orthogonal symmetrischen Punkt E'_1 , so liegt der Mittelpunkt von K_s^2 in g_1 . Nun bestimmen wir den Pol T von $E'_1F'_1$ in Bezug auf K_m^2 . Durch T und $M_1F'_1$ geht ein Kreis — K_s^2 —, der C^4 in F'_1 berührt.

Taf. III Fig. 12 giebt — wie 11 — eine C^4 mit einem reellen und zwei imaginären Inflexionspunkten. Im Gegensatze zu 11 befinden sich aber g_1 , h_1 in allgemeiner Lage, so 'ht durch die imaginären Kreispunkte geht.

Sei dann x_i eine beliebige Gerade durch M_i (Taf. IV Fig. 20). Ihr correspondire in der Involution J_{1k} die Gerade x'_1 . x_1 schneidet den Kegelschnitt K^2 in zwei imaginären Punkten. Dieselben sind durch eine elliptische Involution definirt. für welche M_1 und der Schnittpunkt M'_1 von x_1 mit m_1 ein Paar ist. Sei der Schnittpunkt Z_1 von x_1 mit w_2 als ein Punkt eines zweiten Paares angenommen, so wissen wir, dass die Polare von Z_1 in Bezug auf K2 die Verbindungslinie der Schnittpunkte x', m, und w, m, Sie trifft x_1 in dem zu Z_1 gehörenden Punkte Z'_1 . Nun ist der Pol von x_1 in Bezug auf K^2 der Schnittpunkt X_1 von x_1 mit m_1 . Durch ihn gehen die Tangenten. welche K^2 in zwei Punkten auf x_1 berühren. Diese Tangenten sind also bestimmt durch die Geraden aus x_1 nach $M_1 M_3 Z_1 Z_1'$. Geben wir jetzt die Involution J_1 und entspreche in derselben dem Strahle x_1 ein Strahl x_1^{*} , so schneiden die erwähnten imaginären Tangenten aus x_1^{*} zwei imaginäre Punkte. Diese werden durch eine elliptische Involution definirt, deren eines Paar die Schnittpunkte Z_1^* , $Z_1^{*'}$ der Geraden x_1Z_1 , $x_1Z_1^*$ mit $x_1^{*'}$ sind; das andere Paar besteht aus M_1 und $M_1^{*'}$, dem Schnittpunkte von m_1 mit x_1^{*} . Der Ort aller auf diese Weise construirten Punktepaare in den Geraden x,*' ist eine imaginäre Curve vierter Ordnung -- C4*.

Der Beweis für letztere Behauptung wird analog dem in 1 gegebenen geführt. Eine beliebige Gerade g schneidet den Ort in vier Punkten. Sie liegen auf vier bestimmten imaginären Tangenten, welche dem Kegelschnitt K^2 und einem reellen Kegelschnitt K_g^2 gemeinsam sind. Letzterer wird aus projectivischen Reihen erzeugt, welche die Projectivität P_{1k} aus M_1 resp. q ausschneidet.

Wir ziehen nun einige Schlüsse für die imaginäre Curve C^{4*} , welche analog denen sind, die oben für die reelle Curve C^4 entwickelt wurden.

- a) M_1 ist ein reeller Doppelpunkt von C^{4*} . Zwei weitere Doppelpunkte M_2 , M_3 sind die Schnittpunkte von m_1 mit dem gemeinsamen Paare der Involutionen J_1 . J_{1k} . Dieses gemeinsame Paar ist stets reell. weil J_{1k} elliptisch ist. Also muss auch M_2 und M_3 reell sein. C^{4*} hat mithin drei reelle Doppelpunkte.
- b) Wir haben unter 1a) geschen, dass die Punkte von K^2 und C^4 mittels der Tangenten an K^2 einander eindeutig zugeordnet werden. Diese Zuordnung hat auch dann einen bestimmten Sinn, wenn K^2 und C^4 imaginär werden. Trennen wir nämlich das conjugirt-imaginäre Punktepaar von K^2 , welches auf einer reellen Geraden x_1 durch M_1 liegt, indem wir den Sinn der bestimmenden Involution berücksichtigen, so sind dementsprechend auch die Tangenten an K^2 in diesen imaginären Punkten unterschieden, mithin auch die Punkte von C^{4*} , welche diese Tangenten aus x_1^{**} ansschneiden. Also correspondirt dem Berührungspunkte einer Tangente an K^2 ein ganz bestimmter Punkt von C^{4*} , der auf dieser Tangente gelegen ist. Indem wir nun die auf solche Weise zugeordneten Punkte von K^2 und K^2 mit M_2 resp. M_3 verbinden, erhalten wir um diese Scheitel Büschel.

deren imaginäre Strahlen einander correspondiren. Die Strahlen eines solchen Büschels — sagen wir um M_2 — sind so angeordnet, dass einem Strahlenpaare, welches durch die Geraden aus M_2 nach $M_1 M_2 Z_1 Z_1^*$ definirt ist, ein solches entspricht, das durch die Strahlen aus M_2 nach M_3 M_4 Z_1 * Z_2 * bestimmt wird. Uebertragen wir die Involutionen, durch welche diese Strahlenpeare gegeben sind, auf einen durch $M_1 M_2 M_3$ gehenden Kegelschnitt H^2 , so müssen ihre Pole in m, liegen. Sie bilden in dieser Geraden zwei projectivische Reihen. In denselben entsprechen sich $M_1 M_3$ vertauschbar. Also bilden die projectivischen Reihen eine Involution. Ihr entsprechend können wir auch die Projectivität der Büschel um M_2 als eine Involution — J_3 bezeichnen. Projiciren wir die Involution der erwähnten Pole in m, aus M, so erhalten wir eine Strahleninvolution. Ihr Pol in Bezug auf H^2 sei als Pol der Involution J. definirt. Indem wir den analogen Gedankengang für das Büschel um M_3 durchführen, gelangen wir zu einer Involution J_3 . Es sind also die reellen Strahlen von J_1 durch C^{4*} mit Involutionen J_2 , J_3 verknüpft, deren bis jetzt gefundene Strahlen imaginär sind.

- c) Eine Folge der angegebenen Erzeugungsweise von C^{4*} ist es, dass die reellen Doppelstrahlen g_1 , h_1 der Involutionen J_1 den Kegelschnitt K^2 in vier Punkten schneiden, in denen K^2 von C^4 berührt wird. Diese Punkte sind durch elliptische Involutionen in g_1 , h_1 bestimmt. Weil nun $M_1M_2M_3$ ein Tripel harmonischer Pole in Bezug auf K^2 ist und weil m_1m_3 durch g_1h_1 harmonisch getrennt wird, so folgt, dass die ausser g_1 und h_1 noch möglichen Verbindungslinien der Punkte A, B, C, D paarweise durch M_2 resp. M_3 gehen müssen. Also liegen die elliptischen Involutionen auf g_1h_1 , welche ABCD bestimmen, sowohl zu M_2 als zu M_3 perspectivisch. Bilden wir daher über diesen Involutionen die Strahlenbüschel aus M_2 resp. M_3 , so werden durch dieselben zwei imaginäre Strahlenpaare definirt, welche wir als die Doppelstrahlen der Involutionen J_2 , J_3 zu betrachten haben.
- d) Wie durch die reelle Curve C^4 , so wird auch durch C^{4*} eine quadratische Transformation geleitet. In derselben correspondirt jeder Geraden g ein Kegelschnitt K_g^2 . Geht diese durch einen der Punkte M sagen wir M_2 —, so finden wir, dass ihr zugehöriger Kegelschnitt K_g^2 in M_2 und einen Punkt S_2 auf m_2 degenerirt. Ziehen wir aus S_2 die Tangenten an K^2 , so sind diese imaginär, berühren aber K^2 in zwei Punkten einer reellen Geraden x_2^{**} der Polaren von S_2 und schneiden jene Gerade x_2 durch M_2 in zwei imaginären Punkten von C^{4*} . Die Geraden x_2 , x_2^{**} bilden eine Involution, deren Strahlenpaare sich nach demselben Gesetze correspondiren, wie die imaginären Strahlenpaare der oben besprochenen Involution 4. h. es sind die reellen Strahlen dieser Involution. In analoger Weise r anch zu den reellen Strahlen der Involution J_3 geführt. Aus von J_2J_3 ergeben sich imaginäre Strahlenpaare von J_3 .

Wir erkennen also, dass die Involutionen J_1 , J_2 , J_3 sowohl reelle wie imaginäre Strahlen enthalten. Weiter erkennen wir, dass $C^{4*'}$ aus K^2 und J_2 oder J_3 auf dieselbe Weise erzeugt werden kann, wie aus K^2 und J_1 .

Uebertragen wir J_1 , J_2 , J_3 auf einen Kegelschnitt H^2 , der durch $M_1M_2M_3$ geht, so liegen die Pole dieser Involutionen in einer Geraden. (3.) Ferner liegen sie resp. in $m_1m_2m_3$. Nun schneidet eine Gerade die Seiten eines Dreiecks, das H^2 eingeschrieben ist, entweder in drei Punkten, welche in Bezug auf H^2 hyperbolisch sind, oder in einem hyperbolischen und in zwei elliptischen Punkten. Wenn C^4 imaginär sein soll, ist nur der zuletzt angedeutete Fall möglich. Dementsprechend muss eine der Involutionen J — und nur eine — hyperbolisch sein. Unter c) haben wir vorausgesetzt, dass J_1 hyperbolisch sei.

e) Die quadratische Transformation, welche durch C^{4*} geleitet wird, führt zur Construction der Doppeltangenten dieser Curve. Wir bestimmen zu diesem Zwecke die vier Kegelschnitte K_{μ}^2 , welche K^2 doppelt berühren. Verfahren wir dabei nach der in 5 erwähnten Methode, so haben wir die gemeinsamen Paare der Involutionen $J_{1k}J_{1m}$, $J_{2k}J_{2m}$, $J_{3k}J_{3m}$ zu suchen. Diese Paare müssen in unserem Falle reell sein, weil J_{1k} , J_{2k} , J_{3k} elliptisch sind. Folglich sind die Schnittpuukte — P_1 , P_2 , P_3 , P_4 — dieser Paare reell (Taf. IV Fig. 21). In den Polaren von P_1 , P_2 , P_3 , P_4 in Bezug auf K^2 liegen die Berührungspunkte der Kegelschnitte K_g^2 mit K^2 . Von diesen Polaren ist in Fig. 21 die zu P_1 gehörende — p_1 — eingezeichnet. Auf ihr ist die elliptische Involution bestimmt, welche die Schnittpunkte von p_1 mit K^2 definirt. In letzteren berührt K^2 einen Kegelschnitt K_q^2 . Dieser hat überdies m_1 , m_2 , m_3 zu Tangenten, ist also durch mehr Elemente als nöthig bestimmt. Seine Darstellung wird durch die Bemerkung erleichtert, dass er m_1 , m_2 , m_3 resp. in den Punkten berührt, in welchen diese Geraden resp. von $P_1 M_1$, $P_1 M_2$, $P_1 M_3$ geschnitten werden. (5.) Aus K_g^2 und J_1 können wir nun eine Doppeltangente — d_1 — zeichnen. Wir wissen, dass K_g^2 durch zwei projectivische Reihen auf m_1 und d_1 hervorgebracht wird. In diesen Reihen entspricht dem Schnittpunkte von d_1 mit m_1 der Berührungspunkt von K_g^2 mit m_1 . Da aber letzterer der Schnittpunkt von $P_1 M_1$ mit m_1 ist, so haben wir zu $P_1 M_1$ den correspondirenden in J_{1k} zu suchen. Zu ihm construiren wir den zugeordneten Strahl in der Involution J_1 . Dieser schneidet m_1 in einem Punkte T_1 , der der Schnittpunkt von m_1 mit d_1 sein muss. In analoger Weise bestimmen wir zu $P_1 M_2$ den entsprechenden in J_{2k} und zu letzterem den zugeordneten in J_2 . Dieser trifft m_2 in T_2 , einem zweiten Punkte von d_1 . Damit ist letztere Linie bestimmt. Wir bemerken bei dieser Construction, dass die entaprechende Gerade zu $P_1 M_1$ in der Involution J_{1k} ein Strahl des gemeinsamen Paares der Involutionen J_{lm} , J_{lk} ist. Ferner ist der Strahl, welcher $P_1 M_2$ in 122 correspondirt, einer der gemeinsamen Strahlen zwischen den Involutionen /24 und /2m. Indem wir unter Berticksichtigung dar analogen Bemerkungen für die Doppeltangenten d_2 , d_3 , d_4 letztere construiren, können wir das Gesagte dahin zusammenfassen:

Die correspondirenden Strahlen zu den gemeinsamen Paaren der Involutionen J_k und J_m in den resp. Involutionen J schneiden die resp. Linien m in sechs Punkten T. Diese liegen viermal zu dreien in den vier reellen Doppeltangenten von C^{4*} .

Wir unterlassen es, hier Alles, was oben für die reellen C^4 bewiesen wurde, nach dem Princip der Continuität für die imaginären C^4 zu interpretiren, und heben nur noch Folgendes hervor.

- f) Je vier Punkte von C^{4*} , welche auf einem reellen Strahlenpaar gh einer Involution J_m liegen, bilden ein imaginäres Quadrupel von Punkten. In ihnen wird C^4 von einem imaginären Kegelschnitt K^2 berührt. g, h lassen sich als die Doppelstrahlen einer Involution J betrachten. Aus K^2 und J kann C^{4*} nach der oben entwickelten Methode erzeugt werden.
- g) Die in 9 dargestellte Ableitung einer C^4 aus einem durch $M_1 M_2 M_3$ gehenden Kegelschnitt K_m^2 führt zu einer imaginären Curve C^{4*} , wenn T im Innern des Dreiecks $M_1 M_2 M_3$ liegt. Denn in diesem Falle schneidet jede Gerade durch T die Seiten des erwähnten Dreiecks in drei Punkten, von welchen zwei in Bezug auf K^2 elliptisch sind. Die Schnittpunkte von K_m^2 mit C^{4*} liegen auf der reellen Polaren von T in Bezug auf K_m^2 und sind bestimmte imaginäre Punkte.
- h) Die Tangenten in den Punkten von C^{4*} sind natürlich imaginär. Construiren wir aber zu einem Punkte sagen wir P_2 in m_2 die Curve $C_{1'2'}$ (13), so hängt diese nur von den Involutionen J_{1k} und J_1 ab. Mit Hilfe von J_{1k} haben wir K_{1p}^2 erzeugt und es muss dieser Kegelschnitt stets reell sein, wenn M_1 , M_2 , M_3 reell sind. Daraus folgt, dass auch $C_{1'2}$ reell sein muss. Ziehen wir dann durch P_2 eine Gerade und schneide diese $C_{1'2}^3$ in X und m_1 in S'_1 , so müssen nach der Definition von $C_{1'2}^3$ auf M_1X zwei Punkte von C^4 liegen, deren Tangenten sich in S'_1 schneiden. Wird die Curve vierter Ordnung imaginär, so sind auch jene Punkte auf M_1X imaginär und durch eine elliptische Involution bestimmt. Bilden wir über ihr das Strahlenbüschel aus S'_1 , so definirt dasselbe zwei Tangenten von C^{4*} .

In analoger Weise schliessen wir, dass sämmtliche Curven C^3 , die in 14 besprochen wurden, in unserem speciellen Falle reell werden und dazu dienen, die imaginären Tangenten von C^{4*} zu bestimmen.

^{*} Unter 5 haben wir gezeigt, dass die Doppeltangenten einer reellen C^4 , für welche M_1 , M_2 , M_3 reell sind, imaginär werden. In Ergänzung des dort Gesagten bemerken wir, dass in jenem Falle stets eines der gemeinsamen Paare zwischen einer Involution J_k und J_m reell ist. Construiren wir zu ihm die entsprechenden Geraden in der Involution J_1 , so schneiden sie das "reellen Punkten. Durch diese gehen paarweise die erwähnten im schneiden die saderen m in bestimmten imaginären P

Dabei bemerken wir, dass diejenigen Punkte von C^{4*} , welche auf einer reellen Geraden durch ein M liegen, Tangenten besitzen, deren reeller Punkt sich in dem gleichnamigen m befindet.

17. Degenerirte Formen von C^4 .

Am Schlusse von 1 haben wir angedeutet, dass m_2 , m_3 zusammenfallen können, und wir wollen nun untersuchen, wie sich in diesem Falle C^4 gestaltet. Da m_2m_3 das gemeinsame Paar der Involutionen J_1 und J_{1k} ist, so kann ein Zusammenfallen von m_2 , m_3 nur dann eintreten, wenn J_1 und J_{1k} einen Doppelstrahl gemeinsam haben. Derselbe muss Tangente an K^2 sein. In ihm decken sich m_1 , m_2 und wir wollen ihn mit m bezeichnen. Er berührt K^2 in einem Punkte M_1 , M_2 , M_3 , M_3 , M_4 , M_5

Indem wir das über C^4 Gesagte für C^3 specialisiren, ergiebt sich für letztere Curve Folgendes:

 C^3 berührt K^2 in M und in den zwei Punkten, in welchen der zweite Doppelstrahl h_1 der Involution J_1 den Kegelschnitt K^2 trifft. — M_1 ist Inflexionspunkt für C^3 . Seine Tangente — i_1 — wird erhalten als die correspondirende zum zweiten Doppelstrahle von J_{1k} in der Involution J_1 . — C^3 ist zu sich selbst centrisch involutorisch mit M_1 als Centrum und m_1 als Axe.

Die quadratische Transformation, welche durch C^3 geleitet wird, ist dadurch specialisirt. dass die Kegelschnitte K_g^2 , welche den Geraden der Ebene correspondiren, die Linie m in M_1 berühren. Die Kegelschnitte K_g^2 aber, welche den Geraden X' durch M in dieser Transformation entsprechen. degeneriren in zwei Punkte. nämlich in M und einen Punkt S auf m (Taf. IV Fig. 20). Durch S geht an K^2 — ausser m— eine weitere Taugente, welche K^2 in A_1 berühre. Sie muss x' in einem Punkte A'_1 von C^3 schneiden. Sei dann der Strahl MA_1 mit x bezeichnet und drehen wir x' um M_1 , so entspricht jeder Lage von x' eine Lage von x. Lassen wir aber an Stelle von x' die Geraden m_1 oder m treten. so correspondiren ihnen resp. die Geraden m, m_1 . Also bilden die Paare x. x' eine Strahleninvolution und C^3 wird aus K^2 und J auf dieselbe Weise erzeugt wie aus K^3 Die Doppelstrahlen von J sind die Geraden aus M nach den Sc von h_1 mit K^2 . M_1 ist also der Pol von J in Bezug auf den K

Indem wir die letzterwähnte Erzeugungsweise der C^3 unabhängig von C^4 betrachten. können wir sagen:

 K^2 sei ein beliebiger Kegelschnitt und einer seiner Punkte -M – sei Scheitel einer Involution J. Construiren wir in den zweiten Schnittpunkten der Strahlen von J die Tangenten an K^2 und schneiden wir mit ihnen die correspondirenden Strahlen von J, so ist der Ort der Schnittpunkte eine C^3 .

Auf jeder Geraden durch M liegt somit ein Punkt von C^3 . Also ist M für diese Curve ein Doppelpunkt. Bemerken wir weiter, dass der reelle Theil von C^3 aus dem in Bezug auf K^2 hyperbolischen Felde der Ebene nicht in das elliptische übergehen kann, so folgt, dass C^3 in M eine Spitze hat. m_1 ist ihre Tangente.

Seien A'_1 , B'_1 zwei Punkte von C^3 auf einer Geraden h durch M_1 und seien a'_1 , b'_1 ihre Tangenten, so wird durch $A'_1a'_1$, $B'_1b'_1$, Mm als Punkte und Tangenten ein Kegelschnitt K^2 bestimmt. Solcher Kegelschnitte giebt es unendlich viele. Aus jedem derselben kann C^3 mit Hilfe einer Involution erzeugt werden, deren einer Doppelstrahl m und deren anderer die Verbindungslinie der Schnittpunkte von K^2 und C^3 ist.

Die Kegelschnitte K_q^2 berühren m in M und enthalten zwei Punktepeare von C^3 , welche auf Geraden durch M_1 liegen. Die Kegelschnitte K_n^2 , K_m^2 gehen durch M_1 und berühren m_1 in M. Mit Hilfe eines Kegelschnittes K_m^2 können wir C^3 erzeugen, wenn wir den Pol — T — der Verbindungslinie der Schnittpunkte von C^3 und K_m^2 kennen. Wir ziehen durch T beliebige Gerade. Eine solche schneide m_1 in S_1 und m in S. Durch S_1 geht — ausser m_1 — eine zweite Tangente an K_m^2 . Sie berühre diesen Kegelschnitt in A_1 . Aus S können wir zwei Tangenten an K_m^2 ziehen. Ihre Berührungspunkte verbinden wir mit M. Bringen wir dann diese Verbindungslinien mit M_1A_1 zum Schnitte, so erhalten wir zwei Punkte von C^3 . Specialisiren wir diese Construction für die Gerade TM_1 , so erhalten wir die Inflexionstangente in M_1 an C^3 .

Wenden wir uns zu den Tangenten von C^3 , so zeichnen wir dieselben mit Hilfe der Kegelschnitte K_g^2 . Sind $A_1A'_1$ ein Paar zugeordneter Punkte eines Kegelschnittes K^2 und der Curve C^3 , so construiren wir den Kegelschnitte K_g^2 , der m in M_1 , $A_1A'_1$ in A_1 berührt und der m_1 zur Tangente bat. Seine Tangente durch A'_1 berührt C^3 in A'_1 . Führen wir diese Construction mit Hilfe des Satzes von Brianchon durch, und seien S, S_1 die Schnittpunkte von $\overline{A_1A'_1}$ mit m resp. m_1 , so ziehen wir die Geraden M_1A_1 . $M_1A'_1$ (Taf. IV Fig. 22). Ihren Schnittpunkt — T_1 — verbinden wir mit S_1 . Dann trifft S_1T_1 die Gerade m in S', einem Punkte der gesuchten S_1 and verbinden S_2 . Dann schneidet

$$-S'_1-\operatorname{von} a'_1.$$

Sei P ein beliebiger Punkt der Ebene, so verbinden wir ihn mit S_1' und schneiden diese Verbindungslinie mit M_1A_1' . Wir können nun zeigen, dass der Ort der so erhaltenen Schnittpunkte ein Kegelschnitt K_{1p}^2 ist. Denn sei x eine Gerade durch P und schneide sie m_1 in S_1' , so gehen — weil C^3 von der dritten Classe ist — durch S_1' ausser m_1 noch zwei weitere Tangenten an C^3 . Die Berührungspunkte derselben liegen auf einer Geraden x_1 aus M_1 , welche x in einem Punkte unseres Ortes schneidet. Es ist also jeder Geraden x durch P eine Gerade x_1 durch M_1 zugeordnet. Umgekehrt erkennen wir, dass jeder Geraden x_1 eine Gerade x entspricht. Mithin steht das Büschel der x zu dem der x_1 in einer eindeutigen Beziehung und beide Büschel erzeugen den oben erwähnten Kegelschnitt K_{1p}^2 . Derselbe geht durch P. M_1 , M.

Befindet sich P auf m, so liegen also auf dieser Geraden drei Punkte von K_{1p}^2 , d. h. m ist ein Theil dieses Kegelschnittes und der Rest desselben besteht aus einer zweiten Geraden p. Wir schliessen daher:

Verbinden wir die Schnittpunkte der Tangenten von C^3 und m_1 mit einem Punkte auf m und bringen wir diese Verbindungslinien mit den resp. Geraden aus M_1 nach den Punkten von C^3 zum Schnitte, so ist der Ort dieser Schnittpunkte eine Gerade.

p geht durch den Schnittpunkt der Inflexionstangente in M_1 mit m_1 .

In Taf. IV Fig. 23 und 24 sind zwei Formen der jetzt besprochenen
Curve C^3 dargestellt.

Fig. 23 ist so disponirt, dass M_1 unendlich fern liegt und m_1 zu m_1 senkrecht steht. C^3 ist also zu m_1 orthogonal symmetrisch. i_1 ist eine Asymptote von C^3 . Die anderen werden gefunden, indem wir die Linie m_1 bestimmen, welche in der Involution J_1 der unendlich fernen Geraden entspricht. m_1 liegt in der Mitte von m_1 und schneidet m_2 in zwei Punkten m_1 , m_2 , deren Tangenten die Richtungen der gesuchten Asymptoten haben. Diese selbst werden also nach der oben gegebenen Tangentenconstruction für Punkte von m_1 0 bestimmt.

Die C^3 von Fig. 24 ist aus einem Kreise K_m^2 hervorgebracht und dadurch specialisirt, dass sie durch die imaginären Punkte dieses Kreises geht, welche auf der unendlich fernen Geraden liegen. T ist also Mittelpunkt von K_m^2 . Die reelle Asymptote von C^3 ist mit Hilfe einer Geraden u bestimmt, welche zu m_1 parallel ist und den Abstand zwischen M_1 und m_1 halbirt. u trifft C^3 in U. Dann ist M_1U die Richtung der gesuchten Asymptote. Wir erhalten letztere, indem wir einen Kegelschnitt K_m^{*2} zeichnen, der m_1 in M berührt, durch M_1U und einen Punkt A_1 von C^3 geht. In Bezug auf diesen Kegelschnitt construiren wir den Pol — T^* — der Geraden UA_1' . Durch UT^*M_1 geht ein Kegelschnitt K_a^2 , der m_1 in M rec C^3 in U berührt. Also ist seine Tangente in U auch Tangente ar trifft m_1 in S_1' . Durch S_1' geht die in Rede stehende Asymi

Schliesslich bemerken wir, dass die in 13 und 14 behandelten Curven dritter Ordnung von der Art der zuletzt besprochenen sind und dass die allgemeine Form einer solchen Curve in Taf. I Fig. 8 gezeichnet ist. — Fällt J_1 mit J_{1k} zusammen, so degenerirt C^4 in die Polare von M_1 in Bezug auf K^2 .

18. Beziehung von C^4 zu einem Büschel von Flächen zweiten Grädes.

Es bleibt uns noch übrig, auf den Zusammenhang hinzuweisen, der zwischen den discutirten Curven vierter Ordnung und einem Büschel von Flächen zweiten Grades besteht. Bekanntlich enthält jedes solche Büschel vier Kegel — K_1^2 , K_2^2 , K_3^2 , K_4^2 . Seien die Spitzen derselben M_1 , M_2 , M_3 , M_4 , so schneiden die Ebenen, welche durch je drei der Spitzen bestimmt werden, die Developpable der Grundcurve des Büschels in Curven der betrachteten Art.* Denn wir können beweisen, dass die Construction dieser Spurcurven mit der in 1 für die Erzeugung von C^4 gegebenen Methode übereinstimmt.

Zu diesem Zwecke gehen wir von der Ebene P_4 aus. welche M_1 , M_2 , M_3 enthält. Der Kegel mit der Spitze M4 schneide diese Ebene im Kegelschnitt K2. Wir construiren die Durchdringung von zweien der vier Kegel, sagen wir von K_1^2 , K_4^2 , indem wir ein Ebenenbüschel durch $M_1 M_4$ legen. Sei E_1 eine Ebene dieses Büschels, so trifft sie K_1^2 in zwei Erzeugenden e_1, f_1 und k_4^2 in zwei Erzeugenden e_4 , f_4 . Diese vier Geraden schneiden sich in vier Punkten der Durchdringungscurve und wir haben nun in denselben die Tangenten zu bestimmen, resp. die Spuren derselben in der Ebene P_4 . Letztere Ebene werde von E_1 in x_1 und von $e_4 f_4$ in $A_1 B_1$ geschnitten. Dann geht x_1 durch M_1 , und A_1 , B_1 sind die Schnittpunkte von x_1 mit K^2 . Construiren wir die Tangentialebenen längs $e_4 f_4$ an K_4^2 , so haben diese zu Spuren in P_4 die Tangenten a_1 , b_1 in A_1B_1 an K^2 . Die Tangentialebenen längs e_1f_1 an K_1^2 müssen sich in einer Geraden x_1' durch M_1 treffen, welche in P_4 liegt, weil die Punkte von $e_1 f_1$ sich auf Geraden durch M_4 befinden. Die gesuchten Spuren der Tangenten sind also die Schnittpunkte A'_1, B'_1 a_1b_1 mit x'_1 . In ihnen treffen sich je zwei Tangenten an Punkte der Grandcurve, die auf einer Geraden durch M_4 liegen.

Drehen wir nun E_1 um M_1M_4 , so erhalten wir dementsprechend in P_4 ein Büschel von Geraden x_1 und zu jeder Lage von x_1 gehört eine solche von x_1' . Speciell die Ebene $M_1M_4M_3$ trifft P_4 in M_1M_3 und dieser Geraden correspondirt als x_1' die Gerade M_1M_3 . Die Ebene $M_1M_4M_2$ schneidet P_4 in M_1M_2 und dieser Geraden ist M_1M_3 zugeordnet. Also entsprechen sich in der Projectivität der Geraden x_1x_1' die Strahlen M_1M_3 , M_1M_2 vertauschber, d. h. die Geraden x_1 , x_1' bilden eine Involution M_1 . Die Construction der Spur der Developpablen von der Grundcurve des Büschels wird also in der M_1M_3 und M_1M_3 nach der in 1 entwickelten Methode durchgeführt.

Perstellende Geometrie, II. Aufl., S. 309 flgg.

Die analoge Darstellung von C^4 erhalten wir, indem wir von $M_2 M_4$ oder von $M_3 M_4$ ausgehen. Die Doppelstrahlen der Involutionen J_1 , J_2 , J_3 sind die Erzeugenden der Kegel K_1^2 , K_2^2 , K_3^2 , welche in P_4 liegen.

Kennen wir zwei dieser Curven vierter Ordnung, etwa C_4^4 in der Ebene P_4 und C_1^4 in der Ebene $M_2 M_3 M_4$ oder P_1 , so ist dadurch die Developpable der Grundcurve bestimmt. Denn sei A'_1 der Punkt von C_4^4 , welcher in dem Schnitte von x'_1 mit a_1 liegt, so müssen die Tangenten an die Grundcurve, welche in A'_1 die Ebene P_4 treffen, sich in der Ebene $M_4 a_1$ befinden. Diese Ebene schneidet P_1 in einer durch M_4 gehenden Geraden. welche den Schnittpunkt S_1 von a_1 mit $M_2 M_3$ enthält. In $S_1 M_4$ nun sind zwei Punkte von C_1^4 gelegen. Verbinden wir diese mit A'_1 , so erhalten wir zwei Gerade der Developpablen.

Zu jedem der unendlich vielen Kegelschnitte K^2 , aus denen C_4^4 erzeugt werden kann. gehört — wenn wir M_1 , M_2 , M_3 , M_4 festhalten — ein anderes Büschel von Flächen zweiter Ordnung. Die Developpablen der Grundcurven aller dieser Büschel schneiden die Ebenen des Quadrupels $M_1 M_2 M_3 M_4$ in denselben Curven.

Zum Schlusse erwähnen wir, dass durch imaginäre Curven vierter Ordnung in den Quadrupelebenen imaginäre developpable Flächen bestimmt werden, auf denen die Grundcurven von Büscheln liegen, die aus imaginären Flächen zweiten Grades bestehen.

Zürich, August 1884.

Ueber die Integration linearer, nicht homogener Differentialgleichungen.

Von Wold. Heymann in Plauen i. V.

(Schluss.)

\$ 7.

Supplementintegral von

1)
$$a_2y'' + (a_1 + b_1x)y' + (a_0 + b_0x + c_0x^2)y = X_{\mu},^{\bullet}$$
$$X_{\mu} = A_0 + A_1\frac{x}{1!} + A_2\frac{x^2}{2!} + \dots$$

Sobald die Coefficienten der Gleichung 1) resp. 1a) in § 6 den zweiten Grad nicht übersteigen, so gilt dies auch von den Coefficienten der Differentialgleichung für W, welche lautete

$$U_2 W'' + U_1 W' + U_0 W = 0$$
,

und es bieten sich daher sogleich zwei Fälle dar. für welche die Integration vollständig durchführbar sein wird, nämlich erstens wenn $c_1 = b_2 = c_2 = 0$ und zweitens wenn $a_1 = a_2 = b_2 = 0$. Wir betrachten hier den ersten Fall.

Es sei also n=2 und

1.
$$c_1 = 0$$
. $b_2 = 0$, $c_2 = 0$,

dann liegt die Gleichung 1) vor, und es handelt sich nur darum, ein partikuläres Integral der vereinfachten Gleichung

1 a)
$$a_2z'' + (a_1 + b_1x)z' + (a_0 + b_0x + c_0x^2)z = B_0 + B_1x$$

aufzustellen. Die Gleichung für W lautet jetzt

$$c_0 W' + (b_0 + b_1 u) W' + (a_0 + a_1 u + a_2 u^2) W = 0,$$

und es ist seit Liouville bekannt, dass selbige durch die beiden Substitutionen $W = e^{\alpha u^2 + \beta u} w$ und $\gamma u + \delta = \xi$

auf die einfachere Form

$$\frac{d^2w}{d\xi^2} = \xi \frac{dw}{d\xi} + \lambda w$$

^{*} Es ist leicht einzusehen, dass die rechte Seite der Gleichu Factor es + hx2 behaftet sein dürfte, da dieser durch die Subati beseitigt werden kann, ohne dass hierbei die Gleicht

80

gebracht werden kann, unter α , β , γ , δ . λ gewisse constante Zahlen verstanden. Der letzten Gleichung genügt

$$w = \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{v^{2}}{2}} v^{\lambda-1} \left\{ \gamma_{1} e^{v\xi} + \gamma_{2} e^{-v\xi} \right\} dv, \quad \lambda > 0,$$

sonach ist

$$W = e^{\alpha u^2 + \beta u} \int_0^{\infty} e^{-\frac{v^2}{2}} v^{2-1} \{ \gamma_1 e^{v (\gamma u + \delta)} + \gamma_2 e^{-v (\gamma u + \delta)} \} dv.$$

Führt man dieses in

$$z = \int_{u_{\bullet}}^{u_{\bullet}} \frac{1}{U_{\bullet}} e^{ux + \int_{\overline{U}_{\bullet}}^{U_{\bullet}} du} W du$$

ein und beachtet, dass

$$U_2 = c_0, \quad U_1 = b_0 + b_1 u,$$

so erhält man das Ergänzungsintegral der Gleichung 1a) in der Gestalt

$$z = \frac{1}{c_0} \int_{u_1}^{u_2} e^{ux + \alpha'u^2 + \beta'u} \left[\int_{0}^{\infty} e^{-\frac{v^2}{2}} v^{\lambda - 1} \left\{ \gamma_1 e^{v(\gamma u + \delta)} + \gamma_2 e^{-v(\gamma u + \delta)} \right\} dv \right] du.$$

Als Grenzen für das erste Integral hat man $u_1 = 0$; u_2 ist die Lösung der Gleichung

 $\alpha' u^2 = -\infty, \quad \left(\alpha' = \alpha + \frac{b_1}{2c_0}\right),$

und es ist α' zufolge der Bedeutung von α , wie man sich leicht überzeugt, immer eine von Null verschiedene endliche Grösse.

Es bleibt noch übrig, die Grössen γ_1 und γ_2 zu bestimmen. Sie sind definirt, wie früher gezeigt worden ist. durch

$$\gamma_1 = \kappa \{B_0 f_2(0) + B_1 f_2(0), \quad \gamma_2 = -\kappa \{B_0 f_1(0) + B_1 f_1(0)\}\}.$$

und im vorliegenden Falle ist

$$f_{1}(u) = e^{\alpha u^{2} + \beta u} \int_{0}^{\infty} v^{\lambda - 1} e^{-\frac{v^{2}}{2} + r(\gamma u + \delta)} dv$$

$$f_{2}(u) = e^{\alpha u^{2} + \beta u} \int_{0}^{\infty} v^{\lambda - 1} e^{-\frac{r^{2}}{2} - r(\gamma u + \delta)} dv$$

woraus unmittelbar folgt

$$f_{1}(0) = \int_{0}^{\infty} v^{\lambda - 1} e^{-\frac{v^{2}}{2} + \delta v} dv, \quad f'(0) = \int_{0}^{\infty} v^{\lambda} e^{-\frac{v^{2}}{2} + \delta v} dv + \beta f_{1}(0)$$

$$f_{2}(0) = \int_{0}^{\infty} v^{\lambda - 1} e^{-\frac{v^{2}}{2} - \delta v} dv, \quad f'_{2}(0) = -\gamma \int_{0}^{\infty} v^{\lambda} e^{-\frac{v^{2}}{2} - \delta v} dv + \beta f_{2}(0)$$

so dass also für γ_1 and γ_2 folgende Ausdrücke gewonnen werden:

Die Constante z ist zu entnehmen aus

$$f'_1(u) f_2(u) - f'_2(u) f_1(u) = \frac{1}{u} e^{-\int \frac{U_1}{U_2} du},$$

worin für u irgendwelcher specieller Werth gesetzt werden darf. Für u=0 ergiebt sich

 $\frac{1}{x} = f'_{1}(0) f_{2}(0) - f'_{2}(0) f_{1}(0),$

oder nach Einführung der betreffenden Integralwerthe

$$\frac{1}{x} = \gamma \left\{ \begin{array}{l} \int_{v^{\lambda}}^{\infty} e^{-\frac{v^{2}}{2} + \delta v} dv \int_{v^{\lambda-1}}^{\infty} e^{-\frac{v^{2}}{2} - \delta v} dv \\ 0 & 0 \\ + \int_{v^{\lambda}}^{\infty} e^{-\frac{v^{2}}{2} - \delta v} dv \int_{v^{\lambda-1}}^{\infty} e^{-\frac{v^{2}}{2} + \delta v} dv \end{array} \right\},$$

d. b.

$$\frac{1}{n} = \gamma \cdot 2^{\lambda - \frac{1}{2}} \Gamma\left(\frac{\lambda + 1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\lambda}{2}\right) \cdot e^{\frac{1}{2}} e^{\frac{\lambda}{2}},$$

oder auch, weil nach Gauss das Product der Gammafunctionen durch $(2\pi)^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{2}-1}\Gamma(\lambda)$ ersetzt werden kann,

$$\frac{1}{\pi} = \gamma \sqrt{2\pi} \Gamma(\lambda) e^{\frac{\lambda_{\lambda}}{2} \delta^{2}}.$$

Sollte $\lambda < 0$ sein, so hat das für w aufgestellte Integral keinen Sinn; alsdann ist aber folgender Ausdruck brauchbar:

$$w = \int_{0}^{\infty} d\xi^{\nu} \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{v^{2}}{2}} v^{\lambda + \nu - 1} \left\{ \gamma_{1} e^{v \cdot \xi} + (-1)^{\nu} \gamma_{2} e^{-v \cdot \xi} \right\} dv,$$

wobei ν diejenige positive ganze Zahl bedeutet, welche dem absoluten Werthe von λ folgt.

* Dies Resultat folgt, wenn in der von Abel aufgestellten Formel

$$\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\alpha}{2}\right)e^{\frac{\alpha^2}{4}} = \begin{cases} \int_0^{\infty} e^{\alpha x - x^2} dx, x^{\alpha-1} \cdot \int_0^{\infty} e^{-\alpha x - x^2} dx, x^{\alpha} \\ \int_0^{\infty} e^{\alpha x - x^2} dx, x^{\alpha} & \int_0^{\infty} e^{-\alpha x - x^2} dx, x^{\alpha-1} \end{cases}$$

folgende Buchstabenveränderung vorgenommen wird:

$$x = \frac{v}{\sqrt{2}}$$
, $\alpha = \lambda$, $\alpha = -\delta \sqrt{2}$.

Man vergl. Abel, Sur quelques intégrales d Zeheshrift f. Mathematik n. Physik XXX, 2. 82

Wir haben bisher stillschweigend vorausgesetzt, dass $\gamma \gtrsim 0$, denn andernfalls konnte die Substitution

$$\gamma u + \delta = \xi$$

nicht gemacht werden. Nun besitzt aber γ in den ursprünglichen Coefficienten ausgedrückt folgenden Werth:

$$\gamma = \frac{\sqrt[4]{b_1^2 - 4a_2c_0}}{\sqrt{-c_0}},$$

und dieses verschwindet, wenn

$$b_1^2 - 4a_2c_0 = 0.$$

In diesem Falle kann man aber die Grössen α , β , γ und δ so bestimmen, dass sich die Gleichung

$$c_0 W'' + (b_0 + b_1 u) W' + (a_0 + a_1 u + a_2 u^2) W = 0$$

vermittelst der Substitutionen

$$W = e^{\alpha u^2 + \beta u}$$
 und $\gamma u + \delta = \xi$

vereinfacht in

$$\frac{d^2w}{d\xi^2} + \lambda \xi w = 0,$$

und dieser genügt

$$w = \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{v^{2}}{3}} \{ \gamma_{1} \varepsilon_{1} e^{s_{1}v\xi} + \gamma_{2} \varepsilon_{2} e^{s_{2}v\xi} + \gamma_{3} \varepsilon_{3} e^{s_{2}v\xi} \} dv,$$

wenn

$$\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 = 0$$

und ε_1 , ε_2 , ε_3 die Wurzeln der Gleichung

$$\epsilon^3 + \lambda = 0$$

sind. Nunmehr ergiebt sich für z ähnlich wie vorhin

$$z = \frac{1}{c_0} \int_{u_1}^{u_2} e^{u \cdot x + \alpha' u^2 + \beta' u} \left[\int_{0}^{\infty} e^{-\frac{v^2}{3}} S \, dv \right] du,$$

wobei

$$S = \sum_{i=1}^{i=3} (\gamma_i \, \varepsilon_i \, e^{\varepsilon_i \, v \, (\gamma \, u + \delta)}),$$

 $u_1 = 0$, and u_2 aus der Gleichung

$$\alpha'u^2 = -\infty, \quad \left(\alpha' = \frac{b_1}{4c_0}\right)$$

folgt. Zur Bestimmung der Grössen γ_1 , γ_2 und γ_3 dienen die Gleichungen

$$\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 = 0$$

und

$$\left[e^{ux+\int \frac{U_1}{\overline{U}_2}du} W'\right]_{u_1}^{u_2} = -B_0, \quad \left[e^{ux+\int \frac{\overline{U}_1}{\overline{U}_2}du} W\right]_{u_1}^{u} = B_1.$$

Nach Einführung der Grenzen und des Ausdruckes

lauten die letzten beiden Gleichungen

$$f'(0) + \beta f(0) = B_0 \atop f(0) = -B_1 \rbrace \quad \text{oder} \quad f'(0) = B_0 + \beta B_1 \atop f(0) = -B_1 \rbrace,$$

wenn f(u) das Integral w für $\xi = \gamma u + \delta$ vorstellt, so dass

$$f(0) = \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{v^{3}}{3}} \{ \gamma_{1} \, \varepsilon_{1} e^{a_{1}v \, \delta} + \gamma_{2} \, \varepsilon_{2} e^{a_{2}v \, \delta} + \gamma_{3} \, \varepsilon_{3} e^{a_{2}v \, \delta} \} \, dv \,,$$

$$f'(0) = \gamma \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{v^{3}}{3}} \{ \gamma_{1} \, \varepsilon_{1}^{2} e^{a_{1}v \, \delta} + \gamma_{2} \, \varepsilon_{2}^{2} e^{a_{2}v \, \delta} + \gamma_{3} \, \varepsilon_{3}^{2} e^{a_{1}v \, \delta} \} \, dv \,.$$

Setzt man zur Abkürzung

$$\varepsilon_k \int_0^\infty e^{-\frac{v^2}{3} + \varepsilon_k \, v \, \delta} \, dv = s_k, \quad k = 1, 2, 3,$$

dann ist

$$f(0) = s_1 \gamma_1 + s_2 \gamma_2 + s_3 \gamma_3, \quad f'(0) = \gamma \{s'_1 \gamma_1 + s'_2 \gamma_2 + s'_3 \gamma_3 \},$$

wobei die Ableitungen der s nach δ zu nehmen sind, und nunmehr lauten die Gleichungen zur Bestimmung von γ_1 , γ_2 und γ_3 folgendermassen:

$$\begin{array}{lll} \gamma_1 & + & \gamma_2 & + & \gamma_3 & = & 0, \\ s_1 \gamma_1 + s_2 \gamma_2 + s_3 \gamma_3 & = & -B_1, \\ s'_1 \gamma_1 + s'_2 \gamma_2 + s'_3 \gamma_3 & = & (B_0 + \beta B_1) : \gamma. \end{array}$$

Es ist bemerkenswerth, dass sich die Hauptdeterminante dieses Gleichungssystems auf eine Determinante reducirt, welche nur noch Potenzen der Wurzeln ε_1 , ε_2 und ε_3 enthält und von dem Integralparameter δ ganz unabhängig ist. Man kann nämlich zeigen, dass

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ s_1 & s_2 & s_3 \\ s_1' & s_2' & s_3' \end{vmatrix} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3 \\ \epsilon_1^2 & \epsilon_2^2 & \epsilon_3^2 \end{vmatrix}.$$

Da diese merkwürdige Integralbeziehung sich allgemein für eine Determinante n^{ten} Grades aussprechen lässt, so wollen wir die Transformation an einer solchen zeigen.

Wir behaupten, dass

$$\Delta = \begin{vmatrix}
1 & 1 & \dots & 1 \\
s_1 & s_2 & \dots & s_n \\
s'_1 & s'_2 & \dots & s'_n \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
s_1^{(n-2)} & s_2^{(n-2)} & \dots & s_n^{(n-2)}
\end{vmatrix} = \vartheta \cdot \begin{vmatrix}
1 & 1 & \dots & 1 \\
\varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \dots & \varepsilon_n \\
\varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 & \dots & \varepsilon_n^2 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
\varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \dots & \varepsilon_n^{n-1}
\end{vmatrix},$$

wenn sk durch das bestimmte Integral

 $s_k = \varepsilon_k \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{v^n}{n} + \varepsilon_k v x} dv, \quad \left(s_k^{(m)} = \frac{d^m s_k}{dx^m} \right), \quad n > 2$

definirt ist, ε_1 bis ε_m die Wurzeln der Gleichung

$$e^n + \lambda = 0$$

bedeuten und & ein gewisser numerischer Factor ist.

Bekanntlich genügt der Differentialgleichung

$$\frac{d^{n-1}s}{dx^{n-1}} + \lambda xs = 0$$

das Integral

$$s = \sum_{k=1}^{k=n} C_k s_k$$
, wenn $\sum_{k=1}^{k=n} C_k = 0$.

Lässt man die letzte Bedingung fort, so stellt der Ausdruck für s das Integral der Gleichung

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{d^{n-1}s}{dx^{n-1}} + \lambda xs\right] = \frac{d^ns}{dx^n} + \lambda x \frac{ds}{dx} + \lambda s = 0$$

dar. Nach Abel besteht nun für eine Differentialgleichung

$$X_n s^{(n)} + X_{n-1} s^{(n-1)} + \ldots + X_1 s' + X_0 s = 0,$$

deren partikuläre Integrale $s_1 \dots s_n$ sind, folgender Determinantensatz:

$$\begin{vmatrix} s_1 & s_2 & \dots & s_n \\ s'_1 & s'_2 & \dots & s'_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ s_1^{(n-1)} & s_2^{(n-1)} & \dots & s_n^{(n-1)} \end{vmatrix} = \pi e^{-\int \frac{X_{n-1}}{X_n} dx},$$

wobei x eine von x unabhängige Integrationsconstante bedeutet.

Für die vorhergehende Differentialgleichung ist $X_{n-1} = 0$, daher reducirt sich die rechte Seite der letzten Gleichung auf x.

Weiterhin ist

$$s_k^{(n-1)} = \varepsilon_k^n \int_0^{\infty} e^{-\frac{v}{n} + \varepsilon_k v \cdot x} v^{n-1} \, dv = \lambda \int_0^{\infty} e^{\varepsilon_k v \cdot x} \, de^{-\frac{v^n}{n}},$$

d. h.

$$s_k^{(n-1)} = -\lambda (1 + x s_k).$$

Führt man dies in die letzte Determinante ein, so zerfällt dieselbe in die Summe zweier, von denen die eine identisch verschwindet, während die andere den Factor — λ ausscheiden lässt, welcher in κ eingehen möge; man erhält also

$$\begin{vmatrix} s_1 & s_2 & \dots & s_n \\ s'_1 & s'_2 & \dots & s'_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ s_1^{(n-2)} & s_2^{(n-2)} & \dots & s_n^{(n-2)} \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{vmatrix} = \varkappa,$$

Die letzte Determinante ist aber nichts Anderes, als die zu bestimmende Δ , und daher ist $\Delta = x$ eine vom Integrationsparameter x unabhängige Grösse. Um diese genauer zu fixiren, sei x = 0, dann ist

$$[s_k^{(m)}]_{x=0} = \varepsilon_k^{m+1} \int_0^{\infty} e^{-\frac{v^m}{n}} v^m dv = \varepsilon_k^{m+1} n^{\frac{m+1}{n}-1} \Gamma\left(\frac{m+1}{n}\right),$$

und man bemerkt, dass in der Determinante A

die erste Horizontalreihe den Factor
$$n^{\frac{1}{n}-1}$$
 $\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)$ ausscheiden ... zweite ,, ,, $n^{\frac{2}{n}-1}$ $\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)$,, , die $(n-1)^{1e}$ Horizontalreihe den Factor $n^{\frac{n-1}{n}-1}$ $\Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right)$ ausscheiden

lässt. In der Determinante verweilen daher nur die entsprechenden Potenzen von ε_1 bis ε_n , und vor dieselbe tritt der Factor

$$n^{-\frac{n-1}{2}}\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)\cdots\Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right).$$

Das Product der Gammafunctionen kann nach dem Theorem von Gauss noch durch

$$(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}n^{-\frac{1}{2}}$$

ersetzt werden, und hiernach hat man als Schlussresultat folgendes:

$$\Delta = \vartheta \cdot \begin{vmatrix}
1 & 1 & \dots & 1 \\
\varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \dots & \varepsilon_n \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
\varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \dots & \varepsilon_n^{n-1}
\end{vmatrix},$$

wobei

$$\vartheta = n^{-\frac{n}{2}} (2\pi)^{\frac{n-1}{2}}.$$

Der Fall n=3, welcher uns anfänglich beschäftigte, liefert demnach

$$\theta = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}},$$

wie bereits angegeben worden ist.*

Geht man etwa von der Differentialgleichung

$$\frac{d^n s}{dx^n} + a_1 x \frac{ds}{dx} + a_0 s = 0,$$

deren partikuläre Integrale in der Form

^{*} Diese Untersuchung bildet ein Supplement zu dem früher citirten Aufstze Abel's. — Es lassen sich nach dem Vorgange Abel's noch manche andere interesante Integralbeziehungen aufdecken.

П.

Supplementintegrale linearer Differentialgleichungen, deren zweiter Theil eine beliebige Function ist.

Euler hat im zweiten Bande seiner Integralrechnung (2. Abschnitt Capitel III $-\nabla$) die Gleichungen

$$X = Ay + B\frac{dy}{dx} + C\frac{d^2y}{dx^2} + \dots, \quad X = Ay + Bx\frac{dy}{dx} + Cx^2\frac{d^2y}{dx^2} + \dots$$

mittels Factoren integrirt. Wir wenden uns daher sofort an andere Gruppen von Differentialgleichungen, insbesondere an diejenigen, denen die Integrale

$$\int_{u_1}^{u_2} (u-x)^m U du \text{ und } \int_{u_1}^{u_2} e^{ux} V du$$

genügen; das ist aber die Differentialgleichung der hypergeometrischen Functionen, resp. die Laplace'sche Gleichung. — Man darf wohl behaupten, dass auf diese Gleichungen die meisten der linearen Differentialgleichungen, welche bisher integrirt wurden, zurückkommen.

§ 8.

Supplementintegral der Differentialgleichung der hypergeometrischen Functionen n^{ter} Ordnung.

Die Gleichung* lautet

1)
$$\varphi(x) \frac{d^n y}{dx^n} + \sum_{k=n-1}^{k=0} (-1)^{n-k} \left[\binom{\lambda-k-1}{n-k} \varphi_{(x)}^{(n-k)} + \binom{\lambda-k-1}{n-k-1} \psi_{(x)}^{(n-k-1)} \right] \frac{d^k y}{dx^k} = X,$$

und hierin haben die Functionen φ und ψ nachstehende Bedeutung:

$$s_{k} = \int_{0}^{\infty} v^{\lambda} - 1 e^{-\frac{v^{n}}{n} + s_{k} v \cdot x} dv, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

enthalten sind, aus, wobei 1 und s aus den Gleichungen

$$a_1 \lambda - a_0 = 0$$
, $\epsilon^n + a_1 = 0$

zu berechnen sind, so erhält man nach einiger Reduction

$$\begin{vmatrix} s_1 & s_2 & \dots & s_n \\ s'_1 & s'_2 & \dots & s'_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ s_1^{(n-1)} & s_2^{(n-1)} & \dots & s_n^{(n-1)} \end{vmatrix} = \vartheta \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \dots & \varepsilon_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \dots & \varepsilon_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

$$\vartheta = n^{-\frac{n}{2}} \left(2\pi \right)^{\frac{n-1}{2}} \Gamma(\lambda).$$

Auch hier ist die Determinante der Integrale unabhängig vom Parameter x, ausgenommen den Fall n=2, in welchem neben Φ der Factor $e^{-\frac{1}{2}a_1x^2}$ tritt. Die letzte Entwickelung begreift die frühere als speciellen Fall in sich.

* Ueber die reducirte Gleichung vergl. die Arbeit von L. Pochhammer, "Ueber hypergeometrische Functionen höherer Ordnung", im 71. Bd. des Journals f. d. reine u. angew. Mathematik.

$$\frac{\varphi(x) = (x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_n)}{\varphi(x)} = \frac{b_1}{x - a_1} + \frac{b_2}{x - a_2} + \dots + \frac{b_n}{x - a_n} \left\{ \cdot \right.$$

Um ein Supplementintegral der vorgelegten Differentialgleichung herzuleiten, kann man zwei Wege einschlagen.

1. Man verhält sich anfänglich so, als ob die reducirte Gleichung zu integriren sei. und sucht der Gleichung durch ein Integral

$$y = \int_{u_1}^{u_2} U(u-x)^{\lambda-1} du$$

zu genügen. Nach Einführung dieses Ausdruckes entsteht

$$q\left\{U\varphi(u)(u-x)^{\lambda-n}\right\}_{u_1}^{u_2}-q\int\limits_{u_1}^{u_2}(u-x)^{\lambda-n}\left\{\frac{d}{du}\left[U\varphi(u)\right]-U\psi(u)\right\}du=X,$$

wo

$$q = (-1)^n (\lambda - 1)(\lambda - 2) \dots (\lambda - n + 1).$$

Man setzt jetzt

$$\frac{d}{du}[U\,\psi(u)]-U\,\psi(u)=F(u),$$

unter F(u) eine noch zu bestimmende Function verstanden, und wählt, wenn möglich, die Grenzen so, dass

$$q\left\{U\,\varphi(u)\,(u-x)^{\lambda-n}\right\}_{u}^{u_{2}}=0,$$

hingegen F so, dass

$$-q \int_{u_1}^{u_2} (u-x)^{1-n} F(u) du = X.$$

Weil

$$U\varphi(u) = e^{\int \frac{\psi(u)}{\varphi(u)} du} \int_{u_0}^{u} e^{-\int \frac{\psi(u)}{\varphi(u)} du} F(u) du,$$

wobei unter u_0 eine solche Grenze zu verstehen ist, für welche das Integral verschwindet, so lautet das gesuchte Supplementintegral

$$y = \int_{u_1}^{u_2} \left\langle (u-x)^{\lambda-1} \chi(u) \int_{u_0}^{u} \vartheta(u) \cdot F(u) \, du \right\rangle du,$$

vorausgesetzt, dass dieses Integral für die ermittelten Grenzen einen Sinn hat. Hier dient zur Abkürzung

$$\chi(u) = (u - a_1)^{b_1 - 1} (u - a_2)^{b_2 - 1} \dots (u - a_n)^{b_n - 1}$$

$$\vartheta(u) = (u - a_1)^{-b_1} (u - a_2)^{-b_2} \dots (u - a_n)^{-b_n}$$

2. Man setzt y in Form eines Doppelintegrals voraus:

$$y = \int_{u_1}^{u_2} \left[S(u) \int_{u_0}^{u} U(u-x)^{\lambda-1} du \right] du,$$

und dann entsteht durch eine analoge Rechnung wie vorhin

$$\int\limits_{u_1}^{u_2} S(u) \left[q \left\{ U \varphi(u) (u-x)^{\lambda-n} \right\}_{u_0}^{u} - q \int\limits_{u_0}^{u} (u-x)^{\lambda-n} \left\{ \frac{d}{du} \left[U \varphi(u) \right] - U \psi(u) \right\} du \right] du = X.$$

Jetzt wähle man U so, dass

$$\frac{d}{du} [U \varphi(u) - U \psi(u) = 0$$

und u, so, dass

$$q \mid U \varphi(u) \cdot (u-x)^{1-n} \mid_{u_0} = 0$$

dann bleibt zurück

$$q\int_{u_1}^{u_2} S(u) \ U \varphi(u) (u-x)^{\lambda-n} \ du = X.$$

Verfügt man endlich über S(u) so, dass

$$S(u) U \varphi(u) = F(u),$$

wo nun F(u), abgesehen vom Vorzeichen, wieder genau die frühere Bedeutung hat, so ergiebt sich als Supplementintegral der Gleichung 1)

$$y = \int_{u_{\bullet}}^{u_{\bullet}} \left[\frac{F(u)}{U \varphi(u)} \int_{u_{\bullet}}^{u} U(u-x)^{\lambda-1} du \right] du.$$

welches wegen

$$U\varphi(u) = e^{\int \frac{\psi(u)}{\varphi(u)} du}$$

und unter Benutzung der früher gebrauchten Abkürzungen auch folgendermassen geschrieben werden kann:

$$y = \int_{u_1}^{u_2} \left[\vartheta(u) \cdot F(u) \int_{u_0}^{u} \chi(u) (u-x)^{\lambda-1} du \right] du.$$

In beiden Fällen 1) und 2) ist also, abgesehen von einem constanten Factor, eine Function F(u) von der Beschaffenheit zu ermitteln, dass*

$$\int_{u_n}^{u_n} (u-x)^{1-n} F(u) du = X.$$

^{*} Ueber diese Functionalgleichung vergl. Abel, Crelle's

Als ein Beispiel sei der Fall

$$\int_{u_1}^{u_2} (u-x)^{k-n} F(u) du = \frac{g}{(x-h)^p}$$

angeführt, welcher auftritt, wenn der zweite Theil der Differentialgleichung eine gebrochene Function ist. Man bemerkt leicht, dass man durch die Annahme

$$F(u) = \kappa (u - h)^{\varrho}$$

zum Ziele gelangt; denn transformirt man

$$u_{2}$$

$$u_{2}$$

$$(u-x)^{\lambda-n} (u-h)^{\varrho} du$$

mittels

$$u-h=(x-h)v$$
, d. h. $u-x=(x-h)(v-1)$,

so entsteht

$$x(x-h)^{\lambda-n}+e+1\int_{v_1}^{v_2}v^{\ell}(v-1)^{\lambda-n}dv,$$

und soll dasselbe identisch sein mit

$$\frac{g}{(x-h)^*}$$

so müssen die Zahlen ϱ und \varkappa so gewählt werden, dass

$$e = n - \lambda - \nu - 1$$
, $x = g : \int_{v_0}^{v_2} v^2 (v - 1)^{\lambda - n} dv$.

Was die Wahl der Grenzen anbelangt, so hat man darauf zu achten, dass das zuletzt aufgeschriebene Integral einen bestimmten, von x unabhängigen Werth erlangt und dass für dieselben Grenzen auch das Supplementintegral einen Sinn hat.

Soll aber der Integralausdruck für u von x unabhängig sein, so bieten sich für u, bez. v, welche Variabelen durch

$$u-h=(x-h)v$$

an einander gebunden waren, folgende drei Werthesysteme dar:

1.
$$\begin{cases} u_{1} = x, & v_{1} = 1, \\ u_{2} = +\infty, & v_{2} = +\infty; \\ u_{2} = -\infty, & v_{3} = +\infty; \\ u_{1} = h, & v_{1} = 0, \\ u_{2} = +\infty, & v_{3} = -\infty; \\ u_{3} = +\infty, & v_{4} = 0, \\ u_{5} = -\infty, & v_{5} = 0, \\ u_{7} = 0, & v_{8} = 1. \end{cases}$$

90

In diesen drei Fällen lässt sich z durch vollständige Gammafunctionen ausdrücken; man findet in der entsprechenden Reihenfolge

1.
$$n = g : \int_{0}^{\infty} v^{\varrho} (v - 1)^{\lambda - n} dv = g \cdot \frac{\Gamma(\nu + \lambda - n + 1)}{\Gamma(\nu) \Gamma(\lambda - n + 1)}$$
, $\nu > 0$, $\lambda - n + 1 > 0$;
2. $n = g : \int_{0}^{\infty} v^{\varrho} (v - 1)^{\lambda - n} dv = g (-1)^{\nu} \int_{0}^{\infty} w^{\varrho} (1 + w)^{\lambda - n} dw$ $\pi = (-1)^{\nu} g \cdot \frac{\Gamma(n - \lambda)}{\Gamma(\nu) \Gamma(n - \lambda - \nu)}$. $\nu > 0$, $n - \lambda - \nu > 0$;
3. $n = g : \int_{0}^{\lambda} v^{\varrho} (v - 1)^{\lambda - n} dv = g (-1)^{\lambda - n} \int_{0}^{1} v^{\varrho} (1 - v)^{\lambda - n} dv$

oder

$$n = (-1)^{\lambda - n} g \cdot \frac{\Gamma(1 - \nu)}{\Gamma(n - \lambda - \nu) \Gamma(\lambda - n + 1)} \cdot \frac{n - \lambda - \nu > 0}{\lambda - n + 1 > 0}.$$

Die erhaltenen u-Grenzen sind unter den aufgestellten Beschränkungen auch zulässige Grenzen für das Supplementintegral. Ist v eine positive ganze Zahl (Exponent des Nenners von einem Partialbruch), so ist die dritte Gruppe der Grenzen. für welche 1-v>0, auszuschliessen. Die durch die Argumente der Gammafunctionen nothwendig gewordenen Beschränkungen lassen sich durch vielfache Differentiationsprocesse und Integrationsprocesse beseitigen. Doch erfordern diese Discussionen zuviel Raum, als dass sie hier angeführt werden könnten.

\$ 9.

Supplementintegral der Laplace'schen Gleichung

1)
$$(a_n + b_n x) y^{(n)} + (a_{n-1} + b_{n-1} x) y^{(n-1)} + ... + (a_1 + b_1 x) y' + (a_0 + b_0 x) y = X.$$

Zu dem Supplementintegral gelangt man wiederum auf zweifschem Wege.

1. Man führt, wie bei der Integration der reducirten Gleichung, das Integral

$$y = \int_{u_1}^{u_2} e^{ux} \nabla du$$

ein. wodurch die Gleichung 1) in

$$\left\{ e^{ux} U_{1} V \right\}_{u_{1}}^{u_{0}} + \int_{u_{1}}^{u_{2}} \left\{ U_{0} V - \frac{d}{du} (U_{1} V) \right\} du = X$$

tibergeht, und hierbei ist (vergl. § 5)

$$U_0 = a_n u^n + a_{n-1} u^{n-1} + \ldots + a_1 u + a_0,$$

$$U_1 = b_n u^n + b_{n-1} u^{n-1} + \ldots + b_1 u + b_0.$$

Nun setze man

$$U_0 V - \frac{d}{du}(U_1 V) = F(u),$$

unter F(u) eine noch zu bestimmende Function verstanden, und suche die Grenzen so auszumitteln, dass

$$\left\{e^{ux} U_1 V\right\}_{u_1}^{u_2} = 0;$$

F(u) hingegen ist so zu wählen, dass

$$\int_{u_{1}}^{u_{2}} e^{ux} F(u) du = X.$$

Beachtet man, dass

$$U_1 V = -e^{\int \frac{U_0}{\overline{U}_1} du} \int_{u_0}^{u} e^{-\int \frac{\overline{U}_0}{\overline{U}_1} du} F(u) du,$$

wobei u_o ein solcher Werth ist, für welchen das Integral verschwindet, so ergiebt sich als Supplementintegral der Laplace'schen Gleichung

$$y = -\int_{u_1}^{u_2} \left\langle e^{u(m+x)} \chi(u) \int_{u_0}^{u} \vartheta(u) \cdot F(u) du \right\rangle du,$$

vorausgesetzt, dass die Grenzen u_1 und u_2 auch für das letzte Integral zulässig sind. Hier dient, wie früher, zur Abkürzung

$$\chi(u) = (u - \alpha_1)^{\beta_1 - 1} (u - \alpha_2)^{\beta_2 - 1} \dots (u - \alpha_n)^{\beta_n - 1},$$

$$\vartheta(u) = (u - \alpha_1)^{-\beta_1} (u - \alpha_2)^{-\beta_2} \dots (u - \alpha_n)^{-\beta_n}.$$

Die Grössen α , β und m sind durch die Identität

$$\frac{\overline{U_0}}{\overline{U_1}} = m + \frac{\beta_1}{u - \alpha_1} + \frac{\beta_2}{u - \alpha_2} + \ldots + \frac{\beta_n}{u - \alpha_n}$$

bestimmt.

2. Man kann y auch in Form eines Doppelintegrales

$$y = \int_{u_1}^{u_2} \left[S(u) \int_{u_0}^{u} e^{ux} V du \right] du$$

voraussetzen, und dann entsteht durch eine analoge Rechnung

$$\int\limits_{u_{1}}^{u_{2}}S(u)\Big[\left.\left\{e^{ux}\;U_{1}\;V\right\}\right\}_{u_{0}}^{u}+\int\limits_{u_{0}}^{u}e^{ux}\left\langle U_{0}\;V-\frac{d}{du}\left(U_{1}\;V\right)\right\rangle du\Big]du=X.$$

Jetzt wähle man V so, dass

$$U_0 V - \frac{d}{du}(U_1 V) = 0$$

und un so, dass

$$\{e^{ux}\,U_1\,V\}_{u_0}=0,$$

dann bleibt zurück

$$\int_{u_1}^{u_2} S(u) e^{ux} U_1 V du = X.$$

Verfügt man endlich über S(u) so, dass

$$S(u) U_1 V = F(u),$$

wo nun F(u) genau die vorige Bedeutung hat, so ergiebt sich als Supplementintegral der Gleichung 1)

$$y = \int_{u_1}^{u_2} \left[\frac{F(u)}{U_1} \int_{u_0}^{u} e^{ux} V du \right] du,$$

welches wegen

$$U_1 V = e^{\int \frac{U_0}{\overline{U}_1} du}$$

und unter Benutzung der früher gebrauchten Abkürzungen auch folgendermassen geschrieben werden kann:

$$y = \int_{u_1}^{u_2} \left\{ \vartheta(u) F(u) \int_{u_0}^{u} e^{u(m+x)} \chi(u) du \right\} du.$$

Die Wahl der Grenzen u_0 , u_1 , u_2 kann auf verschiedene Weise erfolgen, und ist dabei stets der speciell vorgelegte Fall massgebend.

In beiden Fällen 1 und 2 ist also eine Function F(u) von der Beschaffenheit zu ermitteln, dass*

$$\int_{u}^{u_2} e^{ux} F(u) du = X.$$

Man benutzt hierbei vortheilhaft die aus der Theorie der Fourier'schen Integrale bekannte Formel

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{v_1}^{v_2} e^{u(x-v)\sqrt{r-1}} f(v) du dv = 2\pi f(x), \quad v_1 < x < v_2.$$

Behandeln wir auch hier als Beispiel den Fall

$$X = \frac{g}{(x-h)^{\bullet}}.$$

Soll

$$\int_{u_1}^{u_2} e^{ux} F(u) du = \frac{g}{(x-h)^{\tau}}$$

sein, so findet sich leicht, dass

^{*} Ueber diese Functionalgleichung siehe auch: Oeuvres complètes de Niels Henrik Abel, Tome second, XI, "Sur les fonctions génératrices et leurs déterminantes". Abel nennt X die fonction génératrice von F, und F die déterminante von X.

denn das Integral

$$F(u) = x e^{-hu} u^{\nu-1},$$

$$x \int_{u_1}^{u_2} e^{u(x-h)} u^{\nu-1} du$$

geht für

$$u(x-h) = -v$$

über in

$$\frac{(-1)^{\mathbf{v}}\mathbf{x}}{(x-h)^{\mathbf{v}}}\int_{v_{1}}^{v_{2}}e^{-v}\,v^{\mathbf{v}-1}\,dv,$$

und soll das identisch sein mit $\frac{g}{(x-h)^r}$, so muss

$$(-1)^{\nu} * \int_{v_1}^{v_2} e^{-v} v^{\nu-1} dv = g$$

sein. Man ist offenbar veranlasst, die Grenzen folgendermassen zu wählen:

$$\begin{array}{ll} u_1=0\,, & v_1=0\,;\\ u_2=+\infty\\ u_2=-\infty\\ \end{array}, \quad \text{wenn} \quad \begin{cases} x-h<0\\ x-h>0\\ \end{cases}, \qquad v_2=+\infty.$$

Nun hat man

$$\mathbf{x} = (-1)^{\mathbf{v}}g : \Gamma(\mathbf{v}), \quad \mathbf{v} > 0,$$

und man überzeugt sich, dass die Werthe von u_1 und u_2 auch zulässige Grenzen für das Supplementintegral der Gleichung 1) sind, wenn $\nu > 0$.

Ist ν ausserdem eine ganze Zahl (Exponent des Nenners eines Partialbruches), so hat man

 $\varkappa = \frac{(-1)^{\nu}g}{(\nu-1)!}.$

Der Fall negativer v erfordert eine umständlichere Discussion.

Anmerkung.

Wenn der zweite Theil einer linearen, nicht homogenen Differentialgleichung $X_n y^{(n)} + X_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + X_1 y' + X_0 y = X$

in eine Summe von μ-Functionen zerlegt werden kann:

$$X = f_1(x) + f_2(x) + \ldots + f_{\mu}(x),$$

so ist auch das Supplementintegral additiv aus μ-Functionen zusammengesetzt:

$$\zeta = \zeta_1 + \zeta_2 + \ldots + \zeta_{\mu},$$

und zwar muss ζ_k so beschaffen sein, dass es, an Stelle von y in die linke Seite der Differentialgleichung eingeführt, diese umwandelt in $f_k(x)$. Wir nennen kurz ζ_k das zu f_k gehörige Supplement (oder Ergänzung).

Ist also z. B. X eine unecht gebrochene Function

$$X = \frac{G_0 + G_1 x + G_2 x^2 + \dots + G_{\mu} x^{\mu}}{H_0 + H_1 x + H_2 x^2 + \dots + H_2 x^2}, \quad \mu > 0$$

so serlege man dieselbe in

$$X = A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + ... + A_{\mu} - x^{\mu} + \sum_{i=1}^{g_i} \frac{g_i}{(x - h_i)^{\sigma_i}}$$

und bestimme das zu der ganzen Function gehörige Supplement, sowie auch alle Supplemente, welche zu den einzelnen Partialbrüchen gehören. Die Summe dieser Supplemente ist dann das der Function X entsprechende Supplementintegral.

Mit Benutzung früher gewonnener Resultate (§§ 1, 5, 8 und 9) kann man hiernach das Supplementintegral der Pochhammer und Laplace'schen Gleichung angeben, wenn deren zweite Theile gebrochene Functionen sind.

Ш.

Supplementintegrale linearer simultaner Differentialgleichungen.

§ 10.

A. Gleichungen mit constanten Coefficienten.

Es sei das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dx} + a_1y_1 + a_2y_2 + \dots + a_ny_n &= X_1, \\ \frac{dy_2}{dx} + b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_ny_n &= X_2, \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{dy_n}{dx} + n_1y_1 + n_2y_1 + \dots + n_ny_n &= X_n \end{aligned}$$

vorgelegt, die X als ganze Functionen vorausgesetzt, und von diesen Functionen möge X_{μ} den höchsten (μ^{ten}) Grad besitzen. Sind $z_1, z_2, \ldots z_n$ die Integrale des reducirten Systems, so genügt dem vollständigen

$$y_1 = \varepsilon_1 + \zeta_1, \quad y_2 = \varepsilon_2 + \zeta_2, \quad \dots \quad y_n = \varepsilon_n + \zeta_n.$$

wobei $\xi_1, \xi_2, \ldots \xi_n$ ganze Functionen bedeuten, von denen im Allgemeinen jede bis zum μ^{ten} Grade aufsteigt. Denn führt man die letzten Ausdrücke in die Differentialgleichungen ein, so wird es erforderlich, n ganze Functionen vom μ^{ten} Grade mit den Functionen X_1 bis X_n zu identificiren, und hierzu reichen die $(\mu + 1)n$ Coefficienten der ξ im Allgemeinen aus. Die Bestimmungsgleichungen für diese Coefficienten sind linear. — Es ist leicht einzusehen, dass das Verfahren auch bei Gleichungen höherer Ordnung mit constanten Coefficienten angewendet werden kann.

B. Gleichungen mit veränderlichen Coefficienten.

٠.

Sind die Coefficienten der vorgelegten simultanen Gleichungen, sowie deren zweite Theile ganze Functionen, so ist die Annahme der Ergänzungs-

integrale in Form ganzer Functionen immer angezeigt, und sollte man auch nicht im Stande sein, die Ergänzungsintegrale vollständig anzugeben, so lässt sich doch auf diesem Wege aus dem gegebenen Gleichungssystem ein anderes ableiten, in welchem der Grad der rechten Seiten herabgedrückt ist.

Lineare simultane Gleichungen mit veränderlichen Coefficienten sind bis jetzt in so geringer Anzahl integrirt worden, dass es schwer hält, ein passendes Beispiel zu geben. Ein Fall, bei welchem die Integration bekanntlich vollständig durchgeführt werden kann, ist folgender:*

1)
$$\frac{dy_1}{X_1 - N_1} = \frac{dy_2}{X_2 - N_2} = \dots = \frac{dy_n}{X_n - N_n} = \frac{dx}{X},$$

wobei die Functionen X, X_1 , ... X_n nur von x abhängen und die N lineare homogene Ausdrücke der abhängigen Variabelen sind

$$N_h = h_1 y_1 + h_2 y_2 + \ldots + h_n y_n.$$

Sind X_1 bis X_n ganze Functionen und übersteigt X den ersten Grad nicht, so sind sämmtliche Ergänzungsintegrale des Systems ganze Functionen.

Ein zweites Beispiel ist folgendes:

2)
$$(A+Bx)\frac{dy}{dx} + (C+Dx)\frac{dz}{dx} + Ey + Fz = X$$
$$(A'+B'x)\frac{dy}{dx} + (C'+D'x)\frac{dz}{dx} + E'y + F'z = X'$$

Sind hier X und X' ganze Functionen, so sind es auch die beiden Ergänzungsintegrale. Ist etwa

$$X = A_0 + A_1 \frac{x}{1!} + A_2 \frac{x^2}{2!}, \quad X' = A'_0 + A'_1 \frac{x}{1!} + A'_2 \frac{x^2}{2!},$$

so lauten die Integrale

$$y = y_1 + m + n \frac{x}{1!} + p \frac{x^2}{2!}, \quad z = z_1 + m' + n' \frac{x}{1!} + p' \frac{x^2}{2!},$$

wo y_1 und z_1 die Integrale des reducirten Systems vorstellen und die Coefficienten m, m' etc. aus folgenden Gleichungen zu berechnen sind:

$$(2B+E) p + (2D+F) p' = A_{2}$$

$$(2B'+E') p + (2D'+F') p' = A'_{2}$$

$$(B+E) n + (D+F) n' + A p + C p' = A_{1}$$

$$(B'+E') n + (D'+F') n' + A' p + C' p' = A'_{1}$$

$$E m + F m' + A n + C n' = A_{0}$$

$$E'm + F'm' + A'n + C'n' = A'_{0}$$

Das Integralsystem der reducirten Gleichungen konnte, soviel ich weiss, bisher nicht aufgestellt werden, weil für die Differentialgleichung zwischen zwei Veränderlichen, welche auf verschiedene Art aus obigen simultanen Differentialgleichungen abgeleitet werden kann, die Integration nicht bekannt

A Treatise on Differential equations by Geo. **-ondon 1877, Ch. XIII Art. 10.

war. Ich will nun zeigen, dass sich das gegebene System durch hyper-

geometrische Functionen integriren lässt.

Löst man die Gleichungen 2) nach
$$\frac{dy}{dx}$$
 und $\frac{ds}{dx}$ auf, so folgt

3)
$$(a+bx+cx^2)\frac{dy}{dx} + (a_1+b_1x)y + (\alpha_1+\beta_1x)s + X_1 = 0$$

$$(a+bx+cx^2)\frac{ds}{dx} + (a_2+b_2x)y + (\alpha_2+\beta_2x)s + X_2 = 0$$

und hierin sind X_1 und X_2 beliebige Functionen von x, wenn wir von jetzt ab auch über X und X' keine bestimmten Voraussetzungen mehr machen.

Um auf eine Gleichung mit nur zwei Veränderlichen zu kommen, multipliciren wir die zweite Gleichung mit einem unbestimmten Factor 9 und addiren sie zur ersten. (d'Alembert's Methode.) Es entsteht

$$\varphi\left(\frac{dy}{dx} + \Theta\frac{dz}{dx}\right) + (p_1 + p_2\Theta)y + (q_1 + \Theta q_2)z + (X_1 + \Theta X_2) = 0,$$

wobei zur Abkürzung

96

$$a+bx+cx^2=\varphi,$$

$$a_1 + b_1 x = p_1,$$
 $a_1 + \beta_1 x = q_1,$ $a_2 + b_2 x = p_2,$ $a_2 + \beta_3 x = q_3$

$$a_2 + b_2 x = p_2$$
, $\alpha_2 + \beta_2 x = q_3$

geschrieben wurde. Setzt man, um y zu eliminiren,

$$y + \Theta z = t$$

so geht die letzte Differentialgleichung über in

$$\varphi\left(\frac{dt}{dx}-z\frac{d\Theta}{dx}\right)+(p_1+\Theta p_2)(t-\Theta z)+(q_1+\Theta q_2)z+(X_1+\Theta X_2)=0,$$

und dies kann zerfällt werden in

a)
$$\varphi \frac{dt}{dx} + (p_1 + \Theta p_2)t + X_1 + \Theta X_2 = 0$$
b)
$$\varphi \frac{d\Theta}{dx} + (p_1 + \Theta p_2)\Theta - (q_1 + \Theta q_2) = 0$$

b)
$$\varphi \frac{d\Theta}{dx} + (p_1 + \Theta p_2)\Theta - (q_1 + \Theta q_2) = 0$$

Für die letzte Gleichung suche man zwei partikuläre Integrale 🚱 und 🚱 auf; aus der vorletzten Gleichung findet man nach Substitution dieser Functionen zwei entsprechende Werthe für t, von denen jeder eine willkürliche Constante mit sich führt. Die Integrale der simultanen Gleichungen sind sonach gegeben durch

$$y + \Theta_1 z = t_1$$
 und $y + \Theta_2 z = t_2$.

Die Gleichung b) hat die Gestalt

$$(a + bx + cx^2)\frac{d\Theta}{dx} + (a_2 + b_2x)\Theta^2 + \{(a_1 + b_1x) - (a_2 + \beta_2x)\}\Theta - (a_1 + \beta_1x) = 0$$

und lässt sich auf folgende Weise integriren.*

ند

[•] Vergl. meine Arbeit: "Ueber Differentialgleichungen, welche durch hypergeometrische Functionen integrirt werden können", diese Zeitschrift XXIX. Jahrg.

Man setze

$$\Theta = -\frac{1+\lambda v}{v}, \quad \Theta' = \frac{v'}{v^2},$$

wodurch entsteht

$$(a+bx+cx^2)v'+(a_2+b_2x)(1+\lambda v)^2-\{(a_1+b_1x)-(\alpha_2+\beta_2x)\}(1+\lambda v)v'-(\alpha_1+\beta_1x)v^2=0.$$

Bestimmt man λ so, dass der Factor von xv^2 verschwindet, d. h., dass

$$b_2\lambda^2+(\beta_2-b_1)\lambda-\beta_1=0,$$

dann bleibt eine Gleichung zurück, welche Specialfall der von mir integrirten Gleichung*

c)
$$(a+bx+cx^2)\frac{dy}{dx}+Ax^2+By^2+2Cxy+2Dx+2Ey+F=0$$

ist. Ich habe früher mehrere Wege angegeben, wie diese Differentialgleichung in die Differentialgleichung der hypergeometrischen Reihe transformirt werden kann. Es sei hier ein sehr kurzer angedeutet.

Ertheilt man der Gleichung c) die Form

$$(a + bx + cx^2)\frac{dy}{dx} + y^2 + (a_1 + b_1x)y + a_0 + b_0x + c_0x^2 = 0$$

und substituirt

$$y = (a + bx + cx^2)z + (g + hx),$$

so entsteht

$$(a+bx+cx^2)^2\left(\frac{dz}{dx}+z^2\right)$$

$$+(a+bx+cx^2)\{(b+2cx)+(a_1+b_1x)+2(g+hx)\}\{x + (a+bx+cx^2)h + (g+hx)^2 + (a_1+b_1x)(g+hx) + a_0+b_0x+c_0x^2 = 0.$$

Es lassen sich die Zahlen g und h so bestimmen, dass die linke Seite der Gleichung den Factor

$$a+bx+cx^2=c(x-\epsilon_1)(x-\epsilon_2)$$

ausscheiden lässt. Die Bedingungen hierfür sind nämlich

$$\begin{array}{l} (g+h\,\epsilon_1)^2 + (a_1+b_1\,\epsilon_1)(g+h\,\epsilon_1) + a_1 + b_0\,\epsilon_1 + c_0\,\epsilon^2 = 0 \\ (g+h\,\epsilon_2)^2 + (a_1+b_1\,\epsilon_2)(g+h\,\epsilon_2) + a_0 + b_0\,\epsilon_2 + c_0\,\epsilon_2^2 = 0 \end{array} \right\},$$

und man findet aus diesen Gleichungen

$$g+h\,\varepsilon_1=\Delta_1,\quad g+h\,\varepsilon_2=\Delta_2,$$

wo d_1 und d_2 bekannte Grössen sind. Schliesslich hat man

$$g = \frac{\varepsilon_1 \Delta_2 - \varepsilon_2 \Delta_1}{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}, \quad h = \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}, \quad \varepsilon_1 \gtrsim \varepsilon_2,$$

and die Differentialgleichung geht für

$$z = \frac{\frac{dw}{dx}}{w}$$

ther in

^{*} Vergl. meine Aufsätze in die Seitsehrift f. Mathematik u. Physi

$$(a+bx+cx^2)\frac{d^2w}{dx^2}+(\alpha+\beta x)\frac{dw}{dx}+\gamma w=0.$$

Wegen der Ausnahmefälle und weiterer Transformationen vergl. a. a. O.

Wenn nun auch das Integrationsproblem für die simultanen Gleichungen 2) und 3) als gelöst zu betrachten ist, so lässt doch die Form der Integrale zu wünschen übrig. Insbesondere gilt dies von dem Integral der Gleichung a), welches lautet

$$t = e^{-\int \frac{p_1 + \theta p_2}{\Psi} dx} \left\{ const. - \int \frac{X_1 + \Theta X_2}{\Psi} e^{\int \frac{p_1 + \theta p_2}{\Psi} dx} dx \right\},$$

und in welches die höchst complicirte Function 6, ein Quotient aus hypergeometrischen Integralen, eingegangen ist.

Wir sehen uns daher veranlasst, für die Integration einen directen Weg aufzusvehen. In der That kann man den Calcul so anstellen, dass man sogleich zu einer linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung mit zweitem Gliede gelangt; die Gleichung erster Ordnung a) fällt dann ganz weg. Ueber die Functionen φ , p_1 , q_1 etc. brauchen hierbei keine speciellen Voraussetzungen gemacht zu werden. Sind diese Functionen so einfach wie im vorliegenden Beispiele, so gelangt man auf diesem Wege zur Differentialgleichung der hypergeometrischen Reihe — mit zweitem Theile —, und dann tritt das Integrationsverfahren ein, welches in § 8 angedeutet wurde.

§ 11.

Directe Integrationsmethode für ein System von zwei simultanen linearen Differentialgleichungen erster Ordnung

4)
$$\phi \frac{dy}{dx} + p_1 y + q_1 z + X_1 = 0$$

$$\beta) \quad \phi \frac{dz}{dx} + p_2 y + q_2 z + X_2 = 0$$

A. Die Coefficienten seien beliebige Functionen von x.

Wir substituiren

$$y = \varphi \frac{d\eta}{dx} + \psi_1 \eta + \zeta$$

$$\varepsilon = \varphi \frac{d\eta}{dx} + \psi_2 \eta + \zeta$$

und bestimmen die Functionen ψ_1 , ψ_2 und ζ so, dass die Gleichungen α) und β) identisch werden. Diese Gleichungen verwandeln sich in

Man setze

$$\Theta = -\frac{1+\lambda v}{v}, \quad \Theta' = \frac{v'}{v^2},$$

wodurch entsteht

$$\begin{array}{l} (a+bx+cx^2)\,v^{'}+\,(a_2+b_2x)\,(1+\lambda\,v)^2\,-\,\{(a_1+b_1x)-(\alpha_2+\beta_2x)\}\,(1+\lambda\,v)\,v\\ -\,(\alpha_1+\beta_1x)\,v^2\,=\,0. \end{array}$$

Bestimmt man λ so, dass der Factor von xv^2 verschwindet, d. h., dass

$$b_2\lambda^2+(\beta_2-b_1)\lambda-\beta_1=0,$$

dann bleibt eine Gleichung zurück, welche Specialfall der von mir integrirten Gleichung*

c)
$$(a+bx+cx^2)\frac{dy}{dx} + Ax^2 + By^2 + 2Cxy + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

ist. Ich habe früher mehrere Wege angegeben, wie diese Differentialgleichung in die Differentialgleichung der hypergeometrischen Reihe transformirt werden kann. Es sei hier ein sehr kurzer angedeutet.

Ertheilt man der Gleichung c) die Form

$$(a+bx+cx^2)\frac{dy}{dx}+y^2+(a_1+b_1x)y+a_0+b_0x+c_0x^2=0$$

and substituirt

$$y = (a + bx + cx^2)z + (g + hx),$$

so entsteht

$$(a+bx+cx^2)^2\left(\frac{dz}{dx}+z^2\right)$$

+
$$(a + bx + cx^2)$$
 { $(b + 2cx) + (a_1 + b_1x) + 2(g + hx)$ } $z + (a + bx + cx^2)h + (g + hx)^2 + (a_1 + b_1x)(g + hx) + a_0 + b_0x + c_0x^2 = 0$

Es lassen sich die Zahlen g und h so bestimmen, dass die linke Seite der Gleichung den Factor

$$a+bx+cx^2=c(x-\epsilon_1)(x-\epsilon_2)$$

ausscheiden lässt. Die Bedingungen hierfür sind nämlich

$$(g + h \varepsilon_1)^2 + (a_1 + b_1 \varepsilon_1)(g + h \varepsilon_1) + a_0 + b_0 \varepsilon_1 + c_0 \varepsilon_1^2 = 0 (g + h \varepsilon_2)^2 + (a_1 + b_1 \varepsilon_2)(g + h \varepsilon_2) + a_0 + b_0 \varepsilon_2 + c_0 \varepsilon_2^2 = 0$$

und man findet aus diesen Gleichungen

$$g+h\,\epsilon_1=\Delta_1,\quad g+h\,\epsilon_2=\Delta_2,$$

wo d, und de bekannte Grössen sind. Schliesslich hat man

$$g = \frac{\varepsilon_1 \Delta_2 - \varepsilon_2 \Delta_1}{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}, \quad h = \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}, \quad \varepsilon_1 \gtrsim \varepsilon_2,$$

und die Differentialgleichung geht für

$$z = \frac{\frac{dw}{dx}}{w}$$

über in

$$f_0 G^2 + (f_1 - \varphi' f_0) G + f_2 = 0$$

sein für jeden der n Werthe

$$x=\epsilon_i$$
, $i=1, 2, 3, \ldots n$

Löst man die quadratische Gleichung für G auf und bezeichnet eine der beiden Wurzeln mit G(x), so hat man zur Bestimmung der n Coefficienten g_0 bis g_{n-1} ebensoviel lineare Gleichungen der Form

$$g_0 + \varepsilon_i g_1 + \varepsilon_i^2 g_2 + \ldots + \varepsilon_i^{n-1} g_{n-1} = G(\varepsilon_i).$$

Nach dieser Transformation vereinfacht sich die letzte Differentialgleichung zu

$$f_0 \varphi \frac{d^2 w}{dx^2} + \{2f_0 G + f_1\} \frac{dw}{dx} + Fw + \frac{X_0}{\omega} e^{-\int \frac{G}{\varphi} dx} = 0.$$

Die Function F ergiebt sich durch die Division von selbst; sie ist mindestens vom $(n-2)^{ten}$ Grade.*

C. Die Function & reducire sich auf eine Constante.

Die Substitutionscoefficienten

$$\psi_1 = \varphi \frac{\vartheta'}{\vartheta} + (q_2 - q_1), \quad \psi_2 = \varphi \frac{\vartheta'}{\vartheta} - (p_2 - p_1),$$

welche in die Differentialgleichung δ) eingehen, erhöhen diese bezüglich des Grades der Coefficienten hauptsächlich infolge Auftretens der Grösse

$$\varphi \frac{\vartheta'}{A}$$
.

Es verdient daher der Fall $\vartheta = const.$, in welchem diese Grösse verschwindet, besondere Beachtung.

& wird zu einer Constanten, wenn sich in

$${\pmb\vartheta} = (p_2 - p_1) + (q_2 - q_1)$$

die Coefficienten gleicher Potenzen von x gegenseitig auf heben.** Man kann aber auch in anderer Weise die gewünschte Constanz herbeiführen.

Setzt man in dem ursprünglichen Gleichungssystem

$$q_1 - q_2 = -(p_1 - p_2)$$

eine Gleichung, die folgendermassen geschrieben werden kann:

$$\varphi \frac{d}{dx}(y-z)+(p_1-p_2)(y-z)+X_1-X_2=0$$

und nun kann die Integration in einfachster Weise vollzoge

^{*} Ich habe diese Transformation bereits bei anderer Gelegenheit mitgetheilt. Hier musste sie des Zusammenhangs wegen kurz wiederholt werden. Man vergl. diese Zeitschrift XXVII. Jahrg. Heft 6. — An dieser Stelle ist auch des Falles Erwähnung gethan, in welchem gewisse der Wurzeln si einander gleich sind.

^{**} Der Fall $\vartheta = 0$ bildet eine leicht zu erledigende Ausnahme. Subtrahirt man nämlich dann Gleichung β) von α), so erhält man wegen

 μy_1 an Stelle von y, unter μ eine unbestimmte Constante verstanden, so entsteht

$$\varphi \frac{dy_1}{dx} + p_1 y_1 + (q_1: \mu)z + X_1: \mu = 0$$

$$\varphi \frac{dz_1}{dx} + p_2 \mu y_1 + q_2 z + X_2 = 0$$

Es stehen daher jetzt an Stelle der Buchstaben

die anderen:

Mithin ist für das jetzige System

$$\vartheta = \lceil p_2 \mu^2 + (q_2 - p_1) \mu - q_1 \rceil : \mu,$$

und damit dies constant sei, müssen die Functionen p_1 , p_2 , q_1 und q_2 specieller, nämlich folgendermassen beschaffen sein:

$$p_1 = a_1 + b_1 p(x) + q(x), \quad p_2 = a_2 + b_2 p(x),$$

$$q_1 = \alpha_1 + \beta_1 p(x), \qquad q_2 = \alpha_2 + \beta_2 p(x) + q(x)$$

wo p(x) und q(x) beliebige Functionen sind.

Die Grösse μ muss sodann an die Bedingung

$$b_2 \mu^2 + (\beta_2 - b_1) \mu - \beta_1 = 0$$

geknüpft werden. Man bemerkt, dass diese Gleichung für μ genau dieselbe als diejenige ist, welche wir früher für die Bestimmung des Factors λ erhielten. Es besteht thatsächlich zwischen diesen Grössen der innigste Zusammenhang.

Die Constante 3 hat nun den Werth

$$\vartheta = \left[a_2 \, \mu^2 + (\alpha_2 - a_1) \, \mu - \alpha_1 \right] : \mu \,,$$

und weiter hat man

$$\psi_1 = (\mu \, q_2 - q_1) : \mu \,, \quad \psi_2 = - \, (\mu \, p_2 - p_1) \,, \quad \zeta = (X_1 - \mu \, X_2) : \mu \, \vartheta .$$

Folglich lauten die Substitutionen y unter Beachtung, dass $y = \mu y_1$,

$$y = \mu \varphi \frac{d\eta}{dx} + (\mu q_2 - q_1) \eta + \mu \zeta$$

$$z = \varphi \frac{d\eta}{dx} - (\mu p_2 - p_1) \eta + \zeta$$

und η endlich ist das vollständige Integral der Gleichung

$$\delta') f_0 \varphi^2 \eta'' + f_1 \varphi \eta' + f_2 \eta + X_0 = 0,$$

in welcher

k

$$f_0 = 1$$
, $f_1 = \varphi' + p_1 + q_2$, $f_2 = \varphi(p'_1 - \mu p'^2) + (p_1 q_2 - p_2 q_1)$,
 $X_0 = \varphi \zeta' + (\mu p_2 + q_2) \zeta + X_2$.

Die Differentialgleichung 6') ist im Falle ganzer Functionen wieder zu trans-

$$\eta = w e^{\int \frac{G}{\varphi} dx}$$

ungsgleichung für G ist

$$(-+q_2)G + (p_1q_2 - p_2q_1) = 0.$$

h. Vollständiges Integral von

3)
$$(a+bx+cx^2)\frac{dy}{dx} + (a_1+b_1x)y + (a_1+\beta_1x)z + X_1 = 0$$

$$(a+bx+cx^2)\frac{dz}{dx} + (a_2+b_2x)y + (a_2+\beta_2x)z + X_2 = 0$$

Main setze in der vorigen Untersuchung (C)

$$p(x) = x, \quad q(x) = 0,$$

so lass man hat

$$p_1 = a_1 + b_1 x, \quad p_2 = a_2 + b_2 x,$$

 $q_1 = a_1 + \beta_1 x, \quad q_2 = a_2 + \beta_2 x.$

Hierauf berechne man µ aus

$$b_1 \mu^2 + (\beta_2 - b_1) \mu - \beta_1 = 0$$

und & mittels

$$\vartheta = [a_2 \mu^2 + (\alpha_2 - a_1) \mu - \alpha_1] : \mu$$

Man wende sich nun an die Differentialgleichung

$$(a+bx+cx^{2})^{2}\eta'' + (a+bx+cx^{2}) \begin{cases} b+2cx \\ +a_{1}+b_{1}x \\ +a_{2}+\beta_{2}x \end{cases} \eta' + \begin{cases} (a+bx+cx^{2})(b_{1}-\mu b_{2}) \\ +(a_{1}+b_{1}x)(a_{2}+\beta_{2}x) \\ -(a_{2}+b_{2}x)(a_{1}+\beta_{1}x) \end{cases} \eta + X_{0} = 0$$

und transformire dieselbe mittels

$$\eta = w e^{\int \frac{g + hx}{a + bx + cx^2} dx},$$

so dass entsteht

$$(a+bx+cx^{2})w''+(\alpha+\beta x)w'+\gamma w+X_{0}\frac{e^{-\int \frac{g+\lambda x}{a+bx+cx^{2}}dx}}{a+bx+cx^{2}}=0.$$

Die letzte Gleichung integrire man in der Weise, als in § 8 die Differentialgleichung der hypergeometrischen Functionen mit zweitem Theile integrirt worden ist (ohne Variation der Constanten).

Das Integral des vorgelegten Gleichungssystems wird vermittelt durch

$$\begin{split} y &= \mu \left(a + b \, x + c \, x^2 \right) \frac{d \, \eta}{d \, x} + \{ \mu \left(a_2 + \beta_2 \, x \right) - \left(a_1 + \beta_1 \, x \right) \} \, \eta + \left(X_1 - \mu \, X_2 \right) \colon \vartheta \\ z &= \quad \left(a + b \, x + c \, x^2 \right) \frac{d \, \eta}{d \, x} - \{ \mu \left(a_2 + b_2 \, x \right) - \left(a_1 + b_1 \, x \right) \} \, \eta + \left(X_1 - \mu \, X_2 \right) \colon \mu \vartheta \end{split} \right\}. \end{split}$$

Mit den Gleichungen 3) sind nun auch die Gleichungen

2)
$$(A + Bx) \frac{dy}{dx} + (C + Dx) \frac{dz}{dx} + Ey + Fz = X$$

$$(A' + B'x) \frac{dy}{dx} + (C' + D'x) \frac{dz}{dx} + E'y + F'z = X'$$

integrirt. X und X' können beliebige Functionen sein.
ganz, so ist es für die Einfachheit der Rechnung wesent!

zungsintegrale, welche ganze Functionen sind, zu bestimmen, bevor man die Gleichungen 2) nach $\frac{dy}{dx}$ und $\frac{dz}{dx}$ auflöst.

Diese Auflösung kommt nicht in Frage, wenn

$$(A + Bx)\frac{dy}{dx} + Ey + Fz + X = 0$$

$$(C' + D'x)\frac{dz}{dx} + E'y + F'z + X' = 0$$

Um diese Gleichungen auf dem vorigen Wege zu integriren, multiplicire man die erste mit C'+D'x, die zweite mit A+Bx, dann erhält man Gleichungen der Form

$$\varphi \frac{dy}{dx} + p_1 y + q_1 z + X_1 = 0, \quad \varphi \frac{dz}{dx} + p_2 y + q_2 z + X_2 = 0,$$

und es ist speciell

$$\varphi = (A + Bx)(C' + D'x),$$

 $p_1 = E(C' + D'x),$ $q_1 = F(C' + D'x),$
 $p_2 = E'(A + Bx),$ $q_2 = F'(A + Bx).$

Da jetzt

$$p_1 q_2 - p_2 q_1 = (EF' - E'F) \varphi$$
,

wird die Gleichung für η besonders einfach, nämlich

$$\varphi \eta'' + (\varphi' + p_1 + q_2) \eta' + \{(p'_1 - \mu p'_2) + (EF' - E'F)\} \eta + \frac{X_0}{\varphi} = 0,$$

und die Reduction mit Hilfe der Exponentialgrösse fällt hier weg.

Endlich sei noch erwähnt, dass auch das System

Endich set noch erwähnt, dass auch das System
$$(a+bx+cx^2+dx^3)\frac{dy}{dx}+(a_1+b_1x)y+(\alpha_1+\beta_1x)z+X_1=0$$
5)
$$(a+bx+cx^2+dx^3)\frac{dz}{dx}+(a_2+b_2x)y+(\alpha_2+\beta_2x)z+X_2=0$$

durch hypergeometrische Integrale befriedigt werden kann. Denn substituirt man in die Gleichungen 5)

$$x = \frac{1 + \kappa u}{u}, \quad dx = -\frac{du}{u^2},$$

$$-\{au^3 + bu^2(1 + xu) + cu(1 + xu)^2 + d(1 + xu)^3\}\frac{dy}{du} = 0$$

$$+\{a_1u + b_1(1 + xu)\}y + \{a_1u + \beta_1(1 + xu)\}z + U_1$$

$$-\{au^3 + bu^2(1 + xu) + cu(1 + xu)^2 + d(1 + xu)^3\}\frac{dz}{du} = 0$$

$$+\{a_3u + b_3(1 + xu)\}y + \{a_2u + \beta_2(1 + xu)\}z + U_2$$

Whit men st

n der cubischen Gleichung

3
 $x^{3} = 0$,

18. und dann liegt wieder

Schlussbemerkung.

Durch die vorigen Untersuchungen ist gezeigt, dass sich die Supplementintegrale der linearen Differentialgleichungen in bedeutend einfacherer Weise aufschreiben lassen, als dies nach der Lagrange'schen Methode der Variation der Constanten zu erwarten stand. — Da nun das complete Integral einer nicht reducirten Differentialgleichung als das Integral einer reducirten Gleichung von höherer Ordnung angesehen werden kann, so ist nunmehr auch für die Integration gewisser linearer reducirter Gleichungen ein Vortheil gewonnen.

Nehmen wir an, es sei vorgelegt

1)
$$\varphi_n(x) y^{(n)} + \varphi_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \ldots + \varphi_1(x) y' + \varphi_0(x) y = z,$$

und es bedeute z das vollständige Integral der Gleichung

2)
$$\psi_m(x) z^{(m)} + \psi_{m-1}(x) z^{(m-1)} + \ldots + \psi_1(x) z' + \psi_0(x) z = 0.$$

Substituiren wir den Ausdruck für z aus 1) in 2), so entsteht

3)
$$f_{(m+n)}(x) y^{(m+n)} + f_{(m+n-1)}(x) y^{(m+n-1)} + \dots + f_1(x) y' + f_0(x) y = 0.$$

Ist nun

$$y = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \ldots + \alpha_n y_n$$

das vollständige Integral der reducirten Gleichung 1),

$$z = \beta_1 z_1 + \beta_2 z_2 + \ldots + \beta_m z_m$$

das vollständige Integral der Gleichung 2), und sind $\zeta_1, \zeta_2, \ldots, \zeta_m$ die zu z_1, z_2, \ldots, z_m gehörigen Supplemente der Gleichung 1), so ist, wie ohne Weiteres einleuchtet,

$$y = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_n y_n + \beta_1 \zeta_1 + \beta_2 \zeta_2 + \dots + \beta_m z_m$$

das vollständige Integral der Gleichung 3). Diese Gleichung ist eine reducible und hat mit der reducirten Gleichung 1) n partikuläre Integrale gemein.* — Kennt man sonach die vollständigen Integrale von 1) und 2), so kann man auch das Integral von 3) angeben. — Sollte 3) einen zweiten Theil = X besitzen, so würde auch 2) ebendenselben zweiten Theil haben; man hätte dann von 2) ein Supplementintegral aufzustellen und dieses bei der Integration von 1) zu berücksichtigen.

Analoge Bemerkungen gelten für lineare simultane Differentialgleichungen. Man kann auch hier die Integration gewisser Differentialgleichungen höherer Ordnung abhängig machen von nicht reducirten Gleichungen niederer Ordnung.

^{*} Vergl. Königsberger, Allgemeine Untersuchungen aus der Theorie der Differentialgleichungen, 1882, § 4.

Sei vorgelegt

a)
$$\frac{dy}{dx} + p_1 y + q_1 z = \eta$$
b)
$$\frac{dz}{dx} + p_2 y + q_2 z = \zeta$$

und seien η und ζ Functionen von x, definirt durch die Gleichungen

$$\frac{d\eta}{dx} + m_1 \eta + n_1 \zeta = 0$$

$$\frac{d\zeta}{dx} + m_2 \eta + n_2 \zeta = 0$$

Substituirt man die Ausdrücke für η und ζ aus a) und b) in α) und β), so entsteht

entstent
$$\frac{d^2y}{dx^2} + M_1 \frac{dy}{dx} + N_1 \frac{dz}{dx} + P_1 y + Q_1 z = 0$$
B)
$$\frac{d^2z}{dx^2} + M_2 \frac{dy}{dx} + N_2 \frac{dz}{dx} + P_2 y + Q_2 z = 0$$

Ist nun

$$y = a_1 f_1 + a_2 f_2$$
, $z = a_1 F_1 + a_2 F_2$

das vollständige Integralsystem der reducirten Gleichungen a), b),

$$\eta = \alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2, \quad \zeta = \alpha_1 \psi_1 + \alpha_2 \psi_2$$

das vollständige Integralsystem der Gleichungen α), β), so besitzen die nicht reducirten Gleichungen a), b) ein Integralsystem von folgender Gestalt:

$$y = a_1 f_1 + a_2 f_2 + \alpha_1 \chi_1 + \alpha_2 \chi_2, \quad z = a_1 F_1 + a_2 F_2 + \alpha_1 \vartheta_1 + \alpha_2 \vartheta_2,$$

und dieses ist zugleich das vollständige Integralsystem der Gleichungen (A, B). Das System (A, B) hat mit dem reducirten System (a, b) ein Integralsystem erster Ordnung gemein; es ist also ein reducibles. — Sollten die Gleichungen A) und B) zweite Theile besitzen, so kommen dieselben zweiten Theile den Gleichungen α) und β) zu. Man hätte in diesem Falle noch die beiden Supplementintegrale der Gleichungen α) und β) zu bilden und diese bei der Integration des Systems (a, b) zu berücksichtigen. — Liegen Systeme mit beliebig viel linearen Gleichungen von beliebig hoher Ordnung vor, so indert sich in der Art und Weise der Schlüsse nichts Wesentliches.

Zur Resultantenbildung.

Von

Prof. Dr. C. REUSCHLE

Neben der Weiterentwickelung der mathematischen Theorien steht als Factor von kaum geringerer Bedeutung die Nothwendigkeit, bereits bekannte Probleme in einfacherer und rationellerer Weise zu gestalten, und um so wichtiger wird das sein, je fundamentaler das betreffende Problem ist.

Eine derartige Aufgabe ist die Aufstellung der Simultanitätsbedingung oder Bedingung einer gemeinschaftlichen Wurzel (Eliminante, Resultante) für zwei beliebige Gleichungen mit einer Veränderlichen.

Die Euler'sche* und die dialytische Methode von Sylvester* liefern beide die Resultante in Form derselben Determinante, die man etwa als "Rückungsdeterminante" [vergl. Determinante 4)] bezeichnen könnte. Während aber die Herleitung dieser Determinante nach Euler's Methode ziemlich umständlich ist, lässt die dialytische Methode an Klarheit und Durchsichtigkeit Nichts zu wünschen übrig, sie trägt den Stempel absoluter Einfachheit.

Dagegen ist es wiederum ein Vorzug der Euler'schen Methode, dass sie sich unmittelbar darauf anwenden lässt, die Bedingungen zweier und mehrerer gemeinschaftlicher Wurzeln beider Gleichungen zu finden, welche Bedingungen durch eine verschwindende "Rückungsmatrix" sich ausdrücken lassen.

Die zweite wichtige Form der Resultante ist die Bézout'sche; um diese für zwei gleichgradige Gleichungen, z. B. für

1)
$$\begin{cases} a_0 x^4 + a_1 x^3 + a_2 x^2 + a_3 x + a_4 = 0, \\ b_0 x^4 + b_1 x^3 + b_2 x^2 + b_3 x + b_4 = 0, \end{cases}$$

zu erhalten, multiplicirt man der Reihe nach **

^{*} Vergl. etwa Salmon, Introductory lessons to the modern higher Algebra, Dublin 1876, S. 73 and 74.

^{**} Vergl. Salmon, ibid. S. 75.

die erste Gleichung mit:

die zweite Gleichung mit:

1. b.

2. $b_0 x + b_1$

3. $b_0 x^2 + b_1 x + b_2$,

4. $b_0x^3 + b_1x^2 + b_2x + b_3$

1. a_0 ,

2. $a_0x + a_1$,

3. $a_0 x^2 + a_1 x + a_2$

4. $a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$

und subtrahirt die jedesmal erhaltenen zwei Gleichungen, wodurch man vier enbische Gleichungen [s. die Gleichungen 2)] erhält, aus denen man unmittelbar die Resultante der zwei gegebenen Gleichungen 1) in der Bézoutschen Form 3) anschreiben kann.

Diese Herleitung macht aber den Eindruck einer künstlichen, man sieht nicht a priori ein, warum man so verfährt; der Methode fehlt die genetische Natur. Es lassen sich aber durch eine leichte Modification diese vier cubischen Gleichungen [allgemein für zwei Gleichungen n^{ten} Grades die n Gleichungen $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades] in folgender einfacher, rationeller und auch zugleich principiell neuer Weise gewinnen.

Schreibt man nämlich die Gleichungen 1) in den vier Formen

$$\begin{cases} a_0 x^4 + (a_1 x^3 + a_2 x^2 + a_3 x + a_4) = 0, \\ b_0 x^4 + (b_1 x^3 + b_2 x^2 + b_3 x + b_4) = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a_0x + a_1)x^3 + (a_2x^2 + a_3x + a_4) = 0, \\ (b_0x + b_1)x^3 + (b_2x^2 + b_3x + b_4) = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a_0x^2 + a_1x + a_2)x^2 + (a_3x + a_4) = 0, \\ (b_0x^2 + b_1x + b_2)x^2 + (b_3x + b_4) = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a_0 x^3 + a_1 x^2 + a_2 x + a_3) x + a_4 = 0, \\ (b_0 x^3 + b_1 x^2 + b_2 x + b_3) x + b_4 = 0, \end{cases}$$

so erhält man durch Elimination des expliciten x^1 aus 1_1), des expliciten x^3 aus 1_2), des expliciten x^2 aus 1_3) und des expliciten x aus 1_4) die vier cubischen Gleichungen

welche simultan sein müssen, wenn die gegebenen Gleichungen 1) simultan sind. Hieraus ergiebt sich sofort die Resultante in Form der Bézout'schen Determinante:

3)
$$\begin{vmatrix} (a_0b_1) & (a_0b_2) & (a_0b_3) & (a_0b_4) \\ (a_0b_2) & (a_0b_3) + (a_1b_2) & (a_0b_4) + (a_1b_3) & (a_1b_4) \\ (a_0b_3) & (a_0b_4) + (a_1b_3) & (a_1b_4) + (a_2b_3) & (a_2b_4) \\ (a_0b_4) & (a_1b_4) & (a_2b_4) & (a_3b_4) \end{vmatrix} = 0.$$

Man beachte, dass im Vorstehenden Alles geschrieben steht, was zw. vollständigen genetischen Entwicklung der Resultante nöthig ist. Aus d

Gleichungssystemen 1_1) bis 1_4) lassen sich die vier cubischen Gleichungerunmittelbar "mit dem Auge ablesen"; denn aus 1_2) z. B. liefert die Elimination des expliciten x^3 zunächst

$$\begin{vmatrix} a_0x + a_1 & a_2x^2 + a_3x + a_4 \\ b_0x + b_1 & b_2x^2 + b_3x + b_4 \end{vmatrix} = 0;$$

es ist aber gar nicht nothwendig, diese Determinante anzuschreiben, da siunmittelbar in den Gleichungen 1₂) steht und nur mit dem Auge festgehalten zu werden braucht. Die Zerlegung dieser Determinante in

$$(a_0 b_2) x^2 + (a_0 b_3) x^2 + (a_0 b_4) x + (a_1 b_2) x^2 + (a_1 b_3) x + (a_1 b_4)$$

lässt sich nach dem Zerlegungssatz der Determinanten ebenfalls lediglich mit dem Auge vornehmen. Hat man die Berechnung der Resultante nach dieser Methode einmal vorgenommen, so kann man, die Anschreibung der Gleichungen 2) umgehend, die Bézout'sche Determinante 3) direct aus dem System 1_1) bis 1_4) ablesen; ja es ist nicht einmal nöthig, dieses System vollständig anzuschreiben, man braucht sich nur die Klammern in den Gleichungen 1) angebracht zu denken. was für 1_1) und 1_4) gar keine Schwierigkeit hat, so dass man allenfalls nur die Systeme 1_2) und 1_3) zu schreiben hätte.

Die vorstehende Methode schliesst sich auf's Engste der bekannten elementaren Methode* an, gemäss der man, um x aus zwei Gleichungen n^{ten} Grades zu eliminiren, erst das x^n -Glied, dann das Absolutglied eliminirt, wodurch man zwei Gleichungen $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades erhält, mit denen man in derselben Weise verfährt u. s. w. Man könnte letztere Methode die Methode der successiven Elimination nennen. Für zwei quadratische Gleichungen ist dieselbe mit der obigen identisch. Aber schon für zwei cubische, und noch mehr für zwei höhere Gleichungen liefert die Methode der successiven Elimination — abgesehen von der viel grösseren Weitläufigkeit der Rechnung — bekanntlich überschüssige Factoren, während die $B \dot{e} zout$ sche Methode und die oben gegebene Modification derselben (Methode der Elimination expliciter Potenzen) die Resultante frei von überschüssigen Factoren giebt.

Um sodann die Resultante für zwei ungleichgradige Gleichungen zu finden, combinirt man die Methode der Elimination expliciter Potensen mit der dialytischen Methode von Sylvester, indem man für zwei Gleichungen m^{ten} und n^{ten} Grades (m > n) die n ersten Reihen der Resultante nach der ersteren Methode mit Berücksichtigung der Null seienden Ceefficienten anschreibt; die (m-n) übrigen Horizontalreihen sind die nach der dialytischen Methode angeschriebenen Coefficienten der Gleichung n^{ten} Grades [vergl. die Rückungsdeterminante 4]].

^{*} Vergl. Salmon, ibid, S. 71 und 72.

die erste Gleichung mit: die zweite Gleichung mit:

1. b_0 , 2. $b_0x + b_1$, 3. $b_0x^2 + b_1x + b_2$, 4. $b_0x^3 + b_1x^2 + b_2x + b_3$, 1. a_0 , 2. $a_0x + a_1$, 3. $a_0x^2 + a_1x + a_2$, 4. $a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$,

urd subtrahirt die jedesmal erhaltenen zwei Gleichungen, wodurch man vier cubische Gleichungen [s. die Gleichungen 2)] erhält, aus denen man unmittelbar die Resultante der zwei gegebenen Gleichungen 1) in der Bézoutschen Form 3) anschreiben kann.

Diese Herleitung macht aber den Eindruck einer künstlichen, man sieht nicht a priori ein, warum man so verfährt; der Methode fehlt die genetische Natur. Es lassen sich aber durch eine leichte Modification diese vier cubischen Gleichungen [allgemein für zwei Gleichungen n^{ten} Grades die n Gleichungen $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades] in folgender einfacher, rationeller und auch zugleich principiell neuer Weise gewinnen.

Schreibt man nämlich die Gleichungen 1) in den vier Formen

$$\begin{array}{lll} \mathbf{1_{1}}) & \begin{array}{l} & a_{0}x^{4} + (a_{1}x^{3} + a_{2}x^{2} + a_{3}x + a_{4}) = 0, \\ & b_{0}x^{4} + (b_{1}x^{3} + b_{2}x^{2} + b_{3}x + b_{4}) = 0; \\ \\ \mathbf{1_{2}}) & \end{array} \\ & \begin{array}{l} (a_{0}x + a_{1})x^{3} + (a_{2}x^{2} + a_{3}x + a_{4}) = 0, \\ (b_{0}x + b_{1})x^{3} + (b_{2}x^{2} + b_{3}x + b_{4}) = 0; \\ \\ \mathbf{1_{3}}) & \end{array} \\ & \begin{array}{l} (a_{0}x^{2} + a_{1}x + a_{2})x^{2} + (a_{3}x + a_{4}) = 0, \\ (b_{0}x^{2} + b_{1}x + b_{2})x^{2} + (b_{3}x + b_{4}) = 0; \\ \\ \mathbf{1_{4}}) & \end{array} \\ & \begin{array}{l} (a_{0}x^{3} + a_{1}x^{2} + a_{2}x + a_{3})x + a_{4} = 0, \\ (b_{0}x^{3} + b_{1}x^{2} + b_{2}x + b_{3})x + b_{4} = 0, \end{array}$$

so erhält man durch Elimination des expliciten x^4 aus 1_1), des expliciten x^3 aus 1_3), des expliciten x^3 aus 1_3) und des expliciten x aus 1_4) die vier cubischen Gleichungen

$$2) \left\{ \begin{aligned} &(a_0\,b_1)\,x^3 & + (a_0\,b_2)\,\,x^2 & + (a_0\,b_3)\,\,x + (a_0\,b_4) = 0\,,\\ &(a_0\,b_2)\,x^3 + \left[(a_0\,b_3) + (a_1\,b_2) \right] x^2 + \left[(a_0\,b_4) + (a_1\,b_3) \right] x + (a_1\,b_4) = 0\,,\\ &(a_0\,b_3)\,x^3 + \left[(a_0\,b_4) + (a_1\,b_3) \right] x^2 + \left[(a_1\,b_4) + (a_2\,b_3) \right] x + (a_2\,b_4) = 0\,,\\ &(a_0\,b_4)\,x^3 & + (a_1\,b_4)\,\,x^2 & + (a_3\,b_4)\,\,x + (a_3\,b_4) = 0\,, \end{aligned} \right.$$

welche simultan sein müssen, wenn die gegebenen Gleichungen 1) simultan sind. Hieraus ergiebt sich sofort die Resultante in Form der Bézout'schen Determinante:

3)
$$\begin{vmatrix} (a_0b_1) & (a_0b_2) & (a_0b_3) & (a_0b_4) \\ (a_0b_2) & (a_0b_3) + (a_1b_2) & (a_0b_4) + (a_1b_3) & (a_1b_4) \\ (a_0b_3) & (a_0b_4) + (a_1b_3) & (a_1b_4) + (a_2b_3) & (a_2b_4) \\ (a_0b_4) & (a_1b_4) & (a_2b_4) & (a_3b_4) \end{vmatrix} = 0.$$

Man beachte, dass im Vorstehenden Alles geschrieben '
⁷⁰lettndigen genetischen Entwicklung der Resultan

ein ganz schönes Beispiel für Graderniedrigung von Determinanten) log geboten ist, wie überhaupt angeführt werden darf, dass eine vollstärationelle Umformung einer Determinante stets den Stempel der logis Nothwendigkeit an sich tragen muss, was in einer Vorlesung über D minantentheorie den Studirenden nicht oft genug eingeschärft werden k Soll z. B. ein Buchstabenausdruck umgeformt werden, der ursprüninicht in Form einer Determinante vorliegt, sich aber leicht als solche stellen lässt, so wird die Transformation in den meisten Fällen natürlidurchsichtiger und logisch bindender sich ergeben, wenn man dieselbe au Determinante, statt an dem ursprünglichen Ausdruck vornimmt.

Stuttgart, im September 1884.

Kleinere Mittheilungen.

IV. Geometrische Beweise des Satzes von der Minimalablenkung im Prisma.

(Hierzu Taf. lV Fig. 25 u. 26.)

Beweis 1.

Geometrisches. Es sei M (Fig. 25) der Mittelpunkt eines Kreises, B ein Punkt ausserhalb desselben; die Verbindungslinie MB schneide den zwischen M und B liegenden Theil der Peripherie in A; E_2 , E, E_1 seien von A aus aufeinander folgende Punkte der Peripherie zwischen den Berührungspunkten der von B aus möglichen Tangenten, und es sei $LE_1BE=EBE_2$; dann ist in den Dreiecken ME_1B , MEB, ME_2B $BE_1>BE$ $>BE_2$. Ist X ein Punkt der Verlängerung von E_2E über E hinaus, so ist $LXEB>EE_2B$, mithin, da E_1 auf der von B abgewandten Seite der Geraden EX liegt, um so mehr $LE_1EB>EE_2B$, und beide Winkel sind stumpf. Legt man nun $AEBE_2$ mit dem gleichen Winkel, ohne es umzuklappen, auf AE_1BE , etwa in die Lage EE_2 , und zieht durh EE_2 und EE_1 die Parallele EE_2 , so ist $EE_1E>DE_2$, weil $EE_1E:DE_2=EB:E_2B$, und $EE_1E:DE_2=EB:E_2B$. Sehne $EE_1E:EE_2$ ist, so folgt, dass Centriwinkel $EE_1EE:EE_2$ ist.

Physikalisches. Ist 2b der brechende Winkel eines Prismas, e_1 und e_2 Eintritts- und Austrittswinkel, b_1 und b_2 die im Innern gegen die Ebenenlothe gebildeten Winkel eines Lichtstrahles, der in der zur brechenden Kante normalen Ebene hindurchgeht, so ist $b_1 + b_2 = 2b$, also $b_1 - b = b - b_2$. Die Ablenkung des Strahles ist $\alpha = e_1 - b_1 + e_2 - b_2$. b ist auch der Winkel, welchen der gleichschenklig durchfallende Strahl im Innern gegen die Lothe bildet.

 kung jedes Strahles ist grösser als die des gleichschenkligdurchfallenden.

Beweis 2.

Seien, wie oben, e_1 , b_1 , b_2 , e_2 (Fig. 26) die Winkelwerthe für einen beliebig durchfallenden Strahl, e, b, b, e für den gleichschenkligen. Ist $e_1 > e_2$ so ist $b_1 > b$, $b_2 < b$, $e_2 < e$, wegen des Sinusgesetzes und wegen $b_1 + b_2 = 2b_2$ d. h.: tritt ein Strahl EBFG mit grösserem Winkel* ein, als der gleichschenklige ABCD, so tritt er mit kleinerem aus. Nun kann aber eira Lichtstrahl auch den umgekehrten Weg GFRE machen, also mit e_2 einund mit e_1 austreten. Denke ich mir einen solchen Strahl, Eintrittswinkel e_2 , Austrittswinkel e_1 , an den Punkt B verlegt, HBJK, so hat dieser Strahl dieselbe Ablenkung wie der Strahl EBFG, da die Ablenkung $\alpha = e_1 - b_1 + e_2 - b_2 = e_1 + e_2 - 2b$ ausser von dem brechenden Winkel nur von der Summe $e_1 + e_2$ abhängt. Da also auf beiden Seiten des gleichschenkligen Strahles die Ablenkungswerthe paarweise gleich auftreten, so muss die Ablenkung des gleichschenklig durchfallenden Strahles selbst ein Maximum oder Minimum sein.

Eine Entscheidung zwischen den beiden Möglichkeiten liefert dieser Beweis nicht; indessen dürfte er bei seiner Einfachheit vielleicht auch so nicht ohne Nutzen sein, da ja auch die praktischen Benutzungen des gleichschenklig durchfallenden Strahles meist eine solche Entscheidung nicht erfordern, sondern sich nur auf die hier bewiesene Thatsache des ausgezeichneten Werthes stützen.

Breslau.

HEINRICH VOGT.

V. Ueber collineare räumliche Systeme.

Verschiedene Lehrbücher der darstellenden Geometrie enthalten den Satz:** Wenn von drei räumlichen Systemen je zwei mit einander centrisch collinear sind, so liegen die drei Collineationscentra in einer geraden Linie.

Dieser Satz bedarf einer Ergänzung, da die Lage der Systeme obiger Eigenschaft eine viel speciellere sein muss, wie in Folgendem gezeigt werden soll.

Des Weiteren werden wir uns beschäftigen mit der Herstellung eines Systems, welches zu zwei beliebigen anderen collinearen Systemen in centrisch collinearer Lage ist. Damit ist dann, mit Rücksicht auf die Arbeiten des Herrn Hauck,*** der geometrische Beweis erbracht, dass in zwei

^{*} Nach derselben Seite des Lothes positiv gerechnet, nach der andern negativ.

^{**} Zuerst wohl bei Baltzer, Elemente d. M. Bd. II, 5. Aufl., S. 194, § 18 Anm. Der nicht richtige Satz 13, aus dem der obige gefolgert wird, geht auf Magnus, Analyt.-geometr. Aufg. I, S. 51 zurück.

^{*** &}quot;Grundzüge einer allgem, axonom. Theorie der darst. Persp.", diese Ztschr. XXI, S. 402 flgg., insbes. 407; "Ueber Gleichstimmigkeit und Ungleichstimmigkeit der räumlichen Collineation", ibid. Bd. XXIV S. 381.

räumlichen Systemen die entsprechenden Gebilde entweder sämmtlich gleichstimmig oder sämmtlich ungleichstimmig sind, mit anderen Worten, dass die Eintheilung der räumlichen Collineationen in gleichstimmige und ungleichstimmige einen Sinn hat. Schliesslich geben wir ein einfaches Kriterium für die Gleichstimmigkeit von zwei Systemen, welche durch fünf Paare entsprechender Elemente definirt sind.

Drei räumliche Systeme P_1 , P_2 , P_3 mögen paarweise in centrisch collinearer Lage für die Collineationsebenen Σ_{12} , Σ_{23} , Σ_{31} und die Collineationseentra C_{12} , C_{23} , C_{31} sein, d. h. P_1 und P_2 collinear in Bezug auf Σ_{12} und C_{12} etc. Denken wir uns einen Punkt A der Schnittlinie von Σ_{12} und Σ_{23} . Dann entspricht dieser Punkt in P_1 und P_2 sich selbst, weil er auf Σ_{13} , und in P_2 , P_3 sich selbst, weil er auf Σ_{13} liegt, d. h. er entspricht auch in P_1 und P_3 sich selbst und gehört folglich auch Σ_{13} an. Daraus ergiebt sich, dass die Collineationsebenen mindestens eine Gerade p_1 gemein baben müssen. Ebenso findet man, dass eine beliebige Ebene p_1 des Büschels p_2 auch den Punkt p_3 enthält, also die Collineationscentra auf einer Geraden p_1 liegen.

Seien nun m_1 , m_2 , m_3 drei sich entsprechende Gerade. Dann trifft jede von ihnen die beiden anderen und sie liegen daher alle drei entweder in einer Ebene durch g^* oder gehen durch einen Punkt auf g. Mithin lassen sich überhaupt nur zu solchen Geraden entsprechende construiren, welche wenigstens eine der beiden, g oder g^* , schneiden. Folglich:

Drei räumliche Systeme können nicht paarweise centrisch collinear sein bei getrennten Collineationsebenen und getrennten Collineationscentren.

Man erkennt vielmehr die Richtigkeit des folgenden Satzes: Sind drei räumliche Systeme P₁, P₂, P₃ paarweise centrisch collinear, so sind entweder die Collineationsebenen vereinigt und dann liegen die Centra auf einer Geraden g*, oder die Centra sind vereinigt und dann gehen die Collineationsebenen durch eine Gerade g. In beiden Fällen sind auch die Umkehrungen richtig. Beide Möglichkeiten sind in der speciellsten Zuordnung enthalten, bei der Collineationsebene und Collineationscentrum allen Systemen gemeinsam ist.

Im Falle gemeinsamer Collineationsebene schneiden sich je drei entsprechende Gerade in einem Punkte von Σ_{123} und die Ebene von je zweien enthält das zugehörige Centrum; im andern Falle liegen drei solche Gerade in einer Ebene des Bündels C_{123} und je zwei von ihnen schneiden sich auf der zugehörigen Collineationsebene. Die Beziehung ist eine in sich widerspruchsfreie geworden.

Durch Betrachtung der Collineationen Bestehen Σ_1 , Σ_2 , Σ_3 der vorlineatie L Mathematik u. Physik X_i

enden ebe-

ersten Falle in einer Geraden von Σ_{123} , im letzten in einem Punkte von g treffen, ergiebt sich noch:

Wenn drei ebene Systeme paarweise centrisch collinear sind und ihre Collineationsaxen gemein haben, so liegen ihre Collineationscentra auf einer Geraden und umgekehrt. Wenn drei ebene Systeme paarweise centrisch collinear sind und ihre Collineationscentra gemein haben, so gehen die Collineationsaxen durch einen Punkt. Allgemeinere Lagen giebt es nicht.

Der oben angeführten speciellsten Zuordnung der Räume entspricht hier die Vereinigung der Axen und Centren, die Systeme sind Schnitte eines Bündels mit drei Ebenen eines Büschels.

Die dualen Sätze über Strahlenbündel sind minder wichtig und übrigens leicht auszusprechen.

Die abgeleiteten Sätze über räumliche Systeme lassen noch eine etwas andere, wenn man will, allgemeinere Ausdrucksweise zu.

Gegeben seien P_1 und P_2 , welche beide centrisch collinear P_3 für die nämliche Ebene Σ und die Centra C_{13} und C_{23} sind. Dann entspricht sich jeder Punkt von Σ selbst in allen drei Systemen, insbesondere im ersten und zweiten, d. h. auch diese sind centrisch collinear, und man hat mit Rücksicht auf das Frühere die erste Hälfte des folgenden Doppelsatzes, dessen andere Hälfte aus dem Dualitätsprincip folgt:

Sind zwei räumliche Systeme centrisch collinear einem dritten für dieselbe Collineationsebene, aber verschiedene Collineationscentrum, aber verschiedene Collineationsebenen,

so sind sie paarweise centrisch collinear und

die Collineationscentra liegen auf die Collineationsebenen schneiden sich in

einer Geraden. Diese Lagen sind die allgemeinsten.

Es seien jetzt zwei Systeme P_1 und P_2 gegeben, welche centrisch collinear einem dritten P_3 sind, und zwar mögen weder die Centra, noch die Ebenen der Collineation vereinigt sein. Dann sind die Räume unter sich collinear, aber P_1 und P_2 werden im Allgemeinen nicht in centrisch collineare Lage gebracht werden können.

Die Centra seien C_{13} und C_{23} , ihre Verbindungslinie heisse g^* , die Ebenen Σ_{13} und Σ_{23} , ihre Schnittlinie heisse g. Dann entspricht jeder Punkt von g und jede Ebene von g^* sich selbst in allen drei Systemen. Folglich: Sind zwei räumliche Systeme centrisch collinear einem dritten, so haben sie ein gerades Gebilde und einen Ebenenbüschel entsprechend gemein. Wir beweisen nun: Haben zwei collineare räumliche Systeme ein gerades Gebilde entsprechend gemein, so haben sie auch einen Ebenenbüschel entsprechend gemein. Mankann

auf ∞^3 verschiedene Weisen diese Lage erzielen und es lässt sich dann noch auf ∞^2 verschiedene Arten ein System construiren, welches zu beiden centrisch collinear ist.

Folglich lässt die Aufgabe, zu zwei räumlichen Systemen ein drittes zu construiren, welches zu beiden centrisch collinear ist, ∞^5 Lösungen zu.*

Man wähle zum Beweise in den gegebenen räumlichen Systemen zweischentsprechende ebene Systeme, welche nicht affin sind, aus und bringe eines der beiden Paare ihrer sich entsprechenden congruenten geraden Gebide zur Deckung; ihr gemeinschaftlicher Träger heisse g. Das ist auf ∞^3 verschiedene Arten möglich. Die beiden projectivischen Ebenenbüschel der Are g haben zwei Doppelelemente (reell oder imaginär) und jedes derselben ist Träger von centrisch collinearen ebenen Systemen, deren Collineationsare natürlich g ist. Die Verbindungslinie der Collineationscentra heisse g^* ; sie entspricht sich selbst als Verbindungslinie zweier sich selbst entsprechender Punkte. Aber auch jede Ebene des Büschels g^* entspricht sich selbst, da sie einen Punkt von g enthält. Damit ist der erste Theil unseres Satzes bewiesen.

Die Elemente: g^* mit den beiden auf ihr liegenden Doppelpunkten $A_1 A_2$ and $B_1 B_2$, and g mit den durch sie (and $A_1 A_2$ bez. $B_1 B_3$) gehenden Doppelebenen $\alpha_1 \alpha_2$ und $\beta_1 \beta_2$ repräsentiren vier Bestimmungsstücke**, man muss also noch ein Elementenpaar zur vollständigen Bestimmung geben, entweder zwei Punkte P_1 , P_2 in einer Ebene von g^* , oder zwei Ebenen Π_1 , Π_2 durch einen Punkt von g. Wir nehmen etwa das Erstere an und betrachten zunächst die Collineation in der sich selbst entsprechenden Ebene $P_1P_2g^*$. Von dieser kennen wir ausser P_1 und P_2 die Doppelelemente $A_1 A_2$, $B_1 B_2$ und $B_1 B_2$ auf g. Zur Construction von P_3 lege man durch $S_1 S_2$ zwei willkürliche gerade Gebilde u_1 and u_2 , u_1 perspectivisch dem Büschel P_1 , u_2 perspectivisch P_2 . Dann ist auch u_1 perspectivisch u_2 für ein Centrum P_3 . Nimmt man nun diesen Punkt als den zu P_1 und P_2 bez. entsprechenden in P_3 , ferner u_1 und u_2 bez, als Collineationsaxen s_{13} und s_{23} , so bestimmen die Geraden P_1P_3 und $\overline{P_1P_2}$ auf g^* zwei Punkte C_{13} und C_{23} , die gesuchten Collineationscentra. Sofort hat man dann in den Verbindungsebenen von g mit s_{13} und s_{23} die Collineationsebenen Σ_{13} und Σ_{23} . Da nach der Wahl der Geraden s_{13} und alles bestimmt ist, so hat man ∞^2 Möglichkeiten.

Am einfachsten wird die Construction, wenn man, was ersichtlich missig, als Collineationsebenen $\alpha_1 \alpha_2$ und $\beta_1 \beta_2$, als Centra $A_1 A_2$ und $B_1 B_2$ witht

Wir geben schliesslich noch an, wie man auf einfache Weise erkennen ban, ob zwei durch fünf Paare zugeordneter Elemente definirte Räume

^{*} Vergl. H

Setzt man nun fest, dass der von zwei Ebenen ξ , η eingeschlossene = Flächenwinkel durch den Linienwinkel gemessen wird, welcher entsteht, wenn man durch die Polare der Schnittlinie $\xi\eta$ in Bezug auf F eine beliebige Ebene legt, so folgt, dass die von zwei Ebenenpaaren ξ und η , ξ und η' aus deren Schnittlinien an F bezw. die Tangentialebenenpaare und τ , ζ' und τ' gelegt werden können — gebildeten Flächenwinkel "gleich zu nennen sind, sobald

$$(\xi \eta \zeta \tau) \overline{\Lambda} (\xi' \eta' \zeta' \tau')$$

ist.

Nach Massgabe dieser Begriffsbestimmung kann man, unter Verwendung solcher Bezeichnungen, welche in der Euklidischen Geometrie Masss-verhältnissen zukommen, jede Fläche zweiten Grades, welche Flängs eines Kegelschnittes berührt, eine "Kugel" und den Pol der den Berührungskegelschnitt enthaltenden Ebene ihren "Mittelpunkt" nennen.

Es mögen nun ξ , η , ζ , τ ; ξ' , η' , ζ' , τ' bezw. die Polarebenen der Punkte X, Y, Z, T; X', Y', Z', T', und ihre Schnittcurven mit F bezw. K_{ξ} , K_{η} , K_{ζ} , K_{ε} ; K_{ξ} , $K_{\eta'}$, $K_{\zeta'}$, $K_{\tau'}$ sein; ferner mag je eine aus den Geraden XY und X'Y' an F gelegte Tangentialebene das entsprechende Polarebenenquadrupel in dem Tangentenquadrupel t_{ξ} , t_{η} , t_{ζ} , t_{τ} resp. $t_{\xi'}$, $t_{\eta'}$, $t_{\xi'}$, $t_{\tau'}$ treffen. Unter solchen Voraussetzungen hat man

$$(XYZT) \overline{\bigwedge} (\xi \eta \xi \tau) \overline{\bigwedge} (t_{\xi} t_{\eta} t_{\xi} t_{\tau}) \text{ und } (X'Y'Z'T') \overline{\bigwedge} (\xi' \eta' \xi' \tau') \overline{\bigwedge} (t_{\xi'} t_{\eta'} t_{\xi'} t_{\tau'}).$$

Wenn nun (XYZT) $\overline{\bigwedge}$ (X'Y'Z'T') ist, d. h. wenn die beiden Strecken XY und X'Y' "gleich" sind, so folgt $(t_{\xi}t_{\eta}t_{\zeta}t_{\varepsilon})$ $\overline{\bigwedge}$ $(t_{\xi'}t_{\eta'}t_{\zeta'}t_{\varepsilon'})$, d. h.: die Winkel $(t_{\xi}t_{\eta})$ und $(t_{\xi'}t_{\eta'})$ oder, was dasselbe ist, die Winkel, unter denen sich K_{ξ} und K_{η} , $K_{\xi'}$ und $K_{\eta'}$ schneiden, sind "gleich".

Ist jetzt F eine Kugel, so werden für je zwei Tangentialebenen die Tangenten t_{ζ} , t_{τ} resp. t_{ζ} , t_{ε} durch die vom Berührungspunkte nach den imaginären Kreispunkten laufenden Strahlen gebildet, mithin die Winkel, unter denen sich K_{ξ} und K_{η} , $K_{\xi'}$ und $K_{\eta'}$ schneiden, auch im gewöhnlichen Sinne gleich, folglich auch die Schnittwinkel ihrer stereographischen Projectionen wegen der Conformität der Abbildung. Hierdurch ist die unumschränkte Möglichkeit erwiesen, gleiche Schnittwinkel in der Kreisebene durch "gleiche" Strecken im Raume zu ersetzen.

Nun liegt es uns ob, durch vier willkürlich gegebene, nicht in einer Ebene liegende Punkte 1, 2, 3, 4 bei projectivischer Maassbestimmung "Kugeln" zu legen und ihre "Mittelpunkte" zu finden. Das will aber nichts Anderes heissen, als: durch 1, 2, 3, 4 Flächen zweiten Grades legen, welche F, die Fundamentalfläche der Maassbestimmung, längs Kegelschnitten berühren.

Wir wollen unter ik die Combinationen 12, 13, 14, 23, 24, 34 verstehen; die Verbindungslinie ik möge F in den beiden Punkten A_{ik} und A'_{ik} treffen, und die beiden Punkte auf ik, welche sowohl i und k, als auch A_{ik} und A'_{ik} harmonisch trennen, mögen B_{ik} und B'_{ik} heissen. Greifen

wir dann drei durch einen Punkt gehende Verbindungslinien ik heraus, z. B. 12, 13, 14, so schneiden die acht Ebenen

and nur diese acht, die Fläche F in den Berührungskegelschnitten der gesuchten Flächen zweiten Grades oder "Kugeln", und ihre Pole in Bezug auf F sind die gesuchten "Mittelpunkte". Die Richtigkeit dieser Construction leuchtet sofort ein, wenn man sich folgenden Satz vergegenwärtigt: Berühren sich zwei Flächen zweiten Grades F und F_1 längs eines Kegelschnittes, der in der Ebene & gelegen ist, und trifft eine gerade Linie die Fläche F_i in den beiden Punkten i und k, die Fläche F in A_{ik} und A'_{ik} , die Ebene ϵ endlich in B_{ik} , so trennen B_{ik} und B'_{ik} die Punkte A_{ik} und A_{ik} harmonisch, sobald B_{ik} so construirt ist, dass er nebst B_{ik} die Punkte i und k harmonisch trennt. Zugleich lehrt uns diese Construction, dass die oben aufgezählten acht Ebenen, in Verbindung mit den vier Flächen des Tetraeders 1234, eine Configuration $(12_6, 16_8)$ bilden*; und ist F die Kugel, welche die Abbildung des Punktraumes auf die Kreisebene vermittelt, so ist wieder der Beweis geliefert, dass die Lösungen der Steinerschen Aufgabe eine Kreisconfiguration $(12_{\rm c}, 16_{\rm s})$ bilden. (Vergl. des Verf. Note, XIX im 5. Hefte des XXIX. Jahrgangs dieser Zeitschrift.)

Jena, den 30. December 1884.

Dr. CARL HOSSFELD.

VII. Zur Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus.

Im XXV. Jahrgange dieser Zeitschrift S. 271—279 behandelt Herr Pfannstiel die von Poisson vorgeschlagene Methode für Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus, bei welcher im Gegensatz zur Gauss'schen beine Ablenkungs- sondern Schwingungsbeobachtungen zu machen sind, und geht dabei sogar so weit, auch den Torsionscoefficienten durch Schwingungen zu bestimmen, wodurch er allerdings genöthigt ist, drei Magnete zu verwenden, während Gauss und Poisson deren nur zwei bedürfen. Ich habe früher einmal, veranlasst durch Herrn Geh. Rath Hankel in Leipzig, die beiden Methoden theoretisch miteinander verglichen; Beobachtungen habe ich nicht gemacht. Nachdem nun Herr Pfannstiel nach der Schwingungenethode Beobachtungen angestellt hat, welche gute Resultate ergaben, habe ich meine Arbeit nochmals vorgenommen. Man kann nämlich gegen die Anwendung der Schwingungen ein Bedenken haben. Der die Schwing-

^{*} Reye, Die Hexaeder- und die Octaederconfigurationen (126, 163). Actumathematics, Bd. I S. 97.

ungen beeinflussende Magnetstab liegt stets so. dass sich seine magnetische Axe im magnetischen Meridian befindet; der Nordpol ist theils nach Norden. theils nach Süden gerichtet. In diesen Lagen wird der Magnetismus des Stabes durch die inducirende Wirkung des Erdmagnetismus und des zweiten Magnets nicht zu vernachlässigende Aenderungen erfahren. und es fragt sich, ob dieser Umstand auf die Resultate von merklichem Einfluss ist.

Man kann nun nachweisen — und dies ist der Zweck des Folgenden —, dass dieses Bedenken der Anwendung der Schwingungsmethode nicht entgegensteht, dass vielmehr der durch Induction entstehende Fehler weniger in Betracht kommt, als bei der Gauss'schen Methode, bei welcher man einen solchen Fehler nicht vermuthen sollte, weil der ablenkende Magnetstab senkrecht zum magnetischen Meridian liegt. Diesen Fehler in den Ablenkungsbeobachtungen sucht man nach W. Weber durch Bestimmung des Inductionscoefficienten zu beseitigen; es wird sich zeigen, dass bei der Methode der Schwingungen das Resultat einer solchen Correctur nicht bedarf.

Lässt man einen Magnetstab (I), für welchen man das Trägheitsmoment und den Torsionscoefficienten des Aufhängefadens bestimmt hat, unter Einwirkung des Erdmagnetismus schwingen, so findet man aus der Schwingungsdauer das Product MT, worin M das magnetische Hauptmoment des Stabes und T die horizontale Componente der Intensität des Erdmagnetismus bedeutet. Dabei sei vorausgesetzt, der Torsionscoefficient werde in der gewöhnlichen Weise durch Ablenkungen bestimmt, so dass zwei Magnete ausreichen werden.

Während nun Gauss durch den Magnet I einen zweiten (II) ablenken lässt, versetzt Poisson letzteren in Schwingungen und benutzt die aus dem Einflusse des Erdmagnetismus und des ersten Stabes resultirende Schwingungsdauer, um zur Kenntniss des Quotienten M:T zu gelangen.

Ist m das magnetische Moment des Stabes II, t sein Trägheitsmoment, ϑ der Torsionscoefficient des Aufhängefadens und t die auf unendlich kleine Ausschläge reducirte Schwingungsdauer, so gilt, falls der Stab lediglich unter Einwirkung des Erdmagnetismus schwingt, die Pendelgleichung

$$mT + \vartheta = \frac{\pi^2 t}{t^3}.$$

Wir lassen jetzt ausser den schon vorhandenen Kräften den Magnetstab I die Nadel beeinflussen. Die Verbindungslinie der Mittelpunkte der beiden Magnete habe die Länge R und bilde mit dem magnetischen Meridian, welcher durch die Mitte von II geht, den Winkel ψ . Die magnetische Axe des Stabes I sei um den Winkel U, die von II um u aus dem magnetischen Meridian herausgedreht. Alle Winkel sollen vom nördlichen Theilestes des Meridians nach Osten gerechnet werden.

Das von dem festen Magneten auf den schwingenden ausgetibte I ungsmoment, welches den Winkel u zu verkleinern strebt, berech in der Abhandlung "Intensitas vis magneticae etc."; es ist

2)
$$S = \frac{S_s}{R^3} + \frac{S_4}{R^4} + \frac{S_5}{R^5} + \dots$$

Die Angabe des Werthes der Coefficienten S_3 , S_4 , ... mag hier unterbleiben. Bei vollkommen symmetrischer Beschaffenheit der Magnete verschwinden S_4 , S_6 , ... Vermehrt man ψ um 180° , so bleiben S_3 , S_5 , ... ungeändert, S_4 , S_6 , ... aber wechseln das Vorzeichen. Da man R sehr gross gegen die Dimensionen der Magnete wählt, so braucht man die Glieder, welche durch höhere Potenzen als R^5 dividirt sind, nicht zu beachten.

Um die Pendelgleichung verwenden zu können, muss das Drehungsmoment proportional sinu sein. Dies ist bei dem ersten Gliede S_3R^{-3} nur der Fall, wenn $\psi = 0$, 90° , 180° oder 270° und U = 0 oder 180° . Während sich also bei Gauss der Magnet I immer senkrecht zum Meridian befindet, muss er hier parallel dazu liegen. Eine genauere Untersuchung zeigt, dass erstens auch S_4 und S_5 für die angegebenen Lagen nahezu proportional sinu sind und dass zweitens kleine mit cosu proportionale Glieder die Schwingungsdauer von II nicht verändern. Wir setzen daher

3)
$$S = s. \sin u = \left(\frac{s_3}{R^3} + \frac{s_4}{R^4} + \frac{s_5}{R^5}\right) \sin u.$$

Das Moment s ist zu den übrigen auf den Magnet II einwirkenden Kräften — Erdmagnetismus und Torsion — zu addiren, so dass die Gleichung entsteht

$$m T + \vartheta + s = \frac{\pi^2 t}{s^2},$$

wenn : die entsprechende Schwingungsdauer bedeutet. Aus den Gleichungen 1) und 4) folgt durch Elimination von t

5)
$$s = mT \left(1 + \frac{\vartheta}{mT}\right) \left(\frac{t^2}{\tau^2} - 1\right).$$

Da die Wirkung am grössten ist, wenn der feste Magnet nördlich oder städlich vom schwingenden liegt (d. h wenn $\psi=0$ oder 180° ist), so werden nur diese Lagen bei Versuchen und also auch im folgenden zu berücksichtigen sein. Der Coefficient s_3 , dessen Bedeutung aus Gleichung 3) ersichtlich ist, hat für diese Fälle die Grösse $\pm 2\,M\,m$ und es entstehen daher folgende Gleichungen 6):

$$\begin{split} &\text{for } \psi = 0, \quad U = 0: \quad + \frac{2\,M\,m}{R^3} + \frac{s_4}{R^4} + \frac{s_5}{R^5} = m\,T \left(1 + \frac{\vartheta}{m\,T} \right) \left(\frac{t^2}{\tau_1^2} - 1 \right), \\ &\text{for } \psi = 0, \quad U = 180^\circ: \quad - \frac{2\,M\,m}{R^3} + \frac{s_4'}{R^4} + \frac{s_5'}{R^5} = m\,T \left(1 + \frac{\vartheta}{m\,T} \right) \left(\frac{t^2}{\tau_2^2} - 1 \right), \\ &\text{for } \psi = 180^\circ, \quad U = 0: \quad + \frac{2\,M\,m}{R^3} - \frac{s_4'}{R^4} + \frac{s_5}{R^5} = m\,T \left(1 + \frac{\vartheta}{m\,T} \right) \left(\frac{t^2}{\tau_3^2} - 1 \right). \end{split}$$

Aie erste und dritte Gleichung, ziehen die Summe der zweiten 1b, dividiren durch 4 und setzen

7)
$$\frac{1}{4} \left(\frac{1}{\tau_1^2} - \frac{1}{\tau_2^2} + \frac{1}{\tau_3^2} - \frac{1}{\tau_4^2} \right) = D,$$
 so erhalten wir 8)
$$\frac{2 Mm}{R^3} + \frac{s_5 - s_5'}{2 R^5} = m T \left(1 + \frac{\vartheta}{m} T \right) t^2. D.$$

Wiederholen wir die Versuche bei einer Entfernung P statt R und bezeichnen den dem D entsprechenden Ausdruck mit Δ , so wird

9)
$$\frac{2Mm}{P^3} + \frac{s_5 - s_5'}{2P^5} = mT\left(1 + \frac{\vartheta}{mT}\right)t^2. \Delta.$$

Durch Elimination des zweiten Gliedes aus 8) und 9) erhält man

10)
$$\frac{M}{T} = \left(1 + \frac{\vartheta}{mT}\right)t^2 \cdot \frac{DR^5 - \Delta P^5}{2(R^2 - P^2)}$$

Mittels dieser Formel kann man das gewünschte M: T berechnen.

Es ist nun die anfangs aufgeworfene Frage zu erörtern, ob nicht die Poisson'sche Methode zu verwerfen ist, weil bei ihr ein Magnet verschiedene Lagen einnehmen muss, in denen er verschiedenen die Stärke seines Magnetismus beeinflussenden Kräften ausgesetzt ist. Wenn zwei Magnete sich in derselben Geraden befinden, so wird ihr Magnetismus durch die gegenseitige Einwirkung geändert; so gross wird auch im bestgehärteten Stahl die Koercitivkraft nicht sein, dass dies ganz verhindert würde. Der Magnetismus wird vergrössert, wenn ungleichnamige Pole einander zugekehrt sind, er wird vermindert im entgegengesetzten Falle; gar keine Aenderung erleidet er, wenn die Axe des einen Magneten senkrecht gegen die des andern liegt, wenigstens brauchen wir die Aenderung in diesem Falle nicht zu berücksichtigen. Das Gesagte hat natürlich seine volle Giltigkeit, wenn ein Magnet durch die Erde vertreten ist. Ueberlegen wir uns, welchen Einfluss diese Thatsachen auf die Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus haben.

Die Methode von Gauss sowohl, wie die von Poisson beginnt damit, dass ein Magnet unter dem Einflusse des Erdmagnetismus schwingt, wobei er immer nur einen kleinen Winkel mit dem magnetischen Meridian bildet. Er besitzt daher nicht nur das Moment M, das er haben würde, wenn er senkrecht zum Meridian läge, sondern der Erdmagnetismus vermehrt dieses Moment um eine gewisse Grösse M, so dass wir schliesslich nicht MT, sondern (M+M)T erhalten. Gauss bringt nun diesen Magnetstab in verschiedene Lagen, aber so, dass er immer senkrecht zum magnetischen Meridian gerichtet ist, und lenkt damit eine zweite Nadel ab, auf deren Moment es nicht ankommt. Das Moment der ersten Nadel ist jetzt M und das Resultat M:T. Durch Division in den früher erhaltenen Werth bekommt man daher nicht das gewünschte T^2 , sondern $T^2\left(1+\frac{M}{M}\right)$ und findet den Erdmagnetismus etwas zu gross.

^{*} S. Kohlrausch, Leitfaden der praktischen Physik, 5. Aufl., S. 188.

Bei Poisson befinden sich beide Magnete stets wenigstens nahezu im magnetischen Meridian. Wir wollen uns wiederum auf die bei praktischen Versuchen stets zu wählenden Fälle beschränken, in denen der feste Magnet nördlich oder stidlich vom schwingenden liegt. Es sei zunächst $\psi=0$, U=0. Das Moment des festen Magnets wird vergrössert, und zwar durch den Erdmagnetismus um M, durch den schwingenden Magneten um M_1 , es steigt also auf $M+M+M_1$. Die entsprechenden Vergrösserungen des Momentes m der beweglichen Nadel seien μ (durch die Erde) und μ_1 (durch den festen Magneten), so dass das Gesammtmoment $m+\mu+\mu_1$ ist.

Hat dagegen der feste Magnet die Lage $\psi=0$, $U=180^\circ$, während die Entfernung der Mittelpunkte dieselbe wie vorhin ist, so wird das Moment des festen Magneten $M-M-M_1$, des schwingenden $m+\mu-\mu_1$. Für $\psi=180^\circ$ sind die Momente dieselben. Stellen wir jetzt die vier Gleichungen 6) mit Berücksichtigung des Vorhergehenden nochmals auf, so müssen wir bedenken, dass die Schwingungsdauer t durch Schwingen des Magneten H lediglich unter Einfluss des Erdmagnetismus bestimmt worden ist. Das Moment der Nadel ist hierbei $m+\mu$ und Gleichung 1) heisst daher

(11)
$$(m+\mu)T + \vartheta = \frac{\pi^2 t}{t^2},$$

Gleichung 4) aber lautet für $\psi = 0$, U = 0, wenn wir für s den Werth $\frac{2 M_{20}}{R^5} + \frac{s_4}{R^4} + \frac{s_6}{R^5}$ einsetzen:

12)
$$(m+\mu+\mu_1)T+\vartheta+\frac{2(M+M+M_1)(m+\mu+\mu_1)}{R^3}+\frac{s_4}{R^4}+\frac{s_5}{R^5}=\frac{\pi^2\mathfrak{t}}{\mathfrak{r}_1}^2$$

wobei wir natürlich die Aenderung der Magnetismen in s_4 und s_5 vernachlässigen. Setzen wir aus 11) den Werth von n^2 t in 12) ein und stellen die Gleichung auch für die drei anderen Lagen auf, in denen beobachtet wird, so erhalten wir folgende Gleichungen 13):

for
$$\psi = 0$$
, $U = 0$: $(m + \mu + \mu_1)T + \vartheta + \frac{2(M + M + M_1)(m + \mu + \mu_1)}{R^3}$

$$+\frac{s_4}{R^4} + \frac{s_5}{R^5} = \frac{t^2}{\tau_1^2} [(m+\mu)T + \vartheta],$$

for
$$\psi = 0$$
, $U = 180^{\circ}$: $(m + \mu - \mu_1)T + \vartheta - \frac{2(M - M - M_1)(m + \mu - \mu_1)}{R^3}$

$$+\frac{s_{4}^{'}}{R^{4}}+\frac{s_{5}^{'}}{R^{5}}=\frac{t^{2}}{\tau_{2}^{2}}[(m+\mu)T+\vartheta],$$

für
$$\psi = 180^{\circ}$$
, $U = 0$: $(m + \mu + \mu_1) T + \vartheta + \frac{2(M + M + M_1)(m + \mu + \mu_1)}{R^3}$

$$-\frac{s_4}{R^4} + \frac{s_5}{R^5} = \frac{t^3}{\tau_2^2} [(m+\mu) T + \vartheta],$$

für
$$\psi = 180^{\circ}$$
, $U = 180^{\circ}$: $(m + \mu - \mu_1) T + \vartheta - \frac{2(M - M - M)}{2(M - M)}$

Durch Addition der ersten und dritten, Subtraction der zweiten und vierten Gleichung, Division durch 4 und Benutzung der durch Gleichung 7) eingeführten Abkürzung wird

14)
$$\mu_{1}T + \frac{2(M+M)(m+\mu)}{R^{3}} - \frac{2Mm}{R^{3}} - \frac{2M\mu}{R^{3}} + \frac{2M\mu_{1}}{R^{3}} + \frac{2M\mu_{1}}{R^{3$$

Das vierte, fünfte und sechste Glied der linken Seite dieser Gleichung brauchen wir nicht zu berücksichtigen, da im Zähler zwei der kleinen Momentenänderungen miteinander multiplicirt sind; gegen das zweite Glied werden diese Brüche ausserordentlich klein. Störend für die weitere Rechnung sind aber das erste und dritte Glied; in der entsprechenden Gleichung 8) sind diese Glieder nicht vorhanden. Wir werden jedoch weiter unten nachweisen, dass sich dieselben gegenseitig aufheben. Nehmen wir dies schon jetzt als bewiesen an, d. h. setzen wir

$$\mu_1 T = \frac{2 Mm}{R^3},$$

so geht Gleichung 14) nach Division durch $(m+\mu)T$ über in

16)
$$\frac{2(M+M)}{TR^3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{s_5 - s_5'}{(m+\mu)TR^5} = \left[1 + \frac{\vartheta}{(m+\mu)T}\right]t^2. D.$$

Wählt man eine andere Entfernung P statt R, so sind die durch die Erde bewirkten Aenderungen M und μ dieselben; man erhält eine zweite Gleichung

17)
$$\frac{2(M+M)}{TP^3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{s_5 - s_5'}{(m+\mu)TP^5} = \left[1 + \frac{\vartheta}{(m+\mu)T}\right]t^2. \Delta,$$

so dass

18)
$$\frac{M+M}{T} = \left[1 + \frac{\vartheta}{(m+\mu)T}\right]t^2 \cdot \frac{DR^5 - \Delta P^5}{2(R^2 - P^2)}$$

Die in dieser Gleichung vorkommende Grösse $\frac{\vartheta}{(m+\mu)T}$ ist das durch die Versuche erhaltene Torsionsverhältniss, da auch bei diesen das Moment der

Nadel nicht m, sondern $m + \mu$ ist.

Da man im ersten Theile des Versuchs (M+M)T gefunden hat, so ergiebt sich durch Division mit dem aus Gleichung 18) resultirenden (M+M):T das gesuchte T selbst ohne einen durch Induction verursachten Fehler. Es fragt sich nur, ob Gleichung 15) richtig ist.

In der Theorie über die drehbaren Molecularmagnete und die Abhängigkeit des Magnetismus im weichen Eisen von der magnetisirenden Kraft stellt W. Weber* die Gleichung auf

19)
$$Y = n m \frac{X}{\sqrt{X^2 + Z^2}} \cdot \frac{X^4 + \frac{7}{6}X^2Z^2 + \frac{2}{3}Z^4}{X^4 + X^2Z^2 + Z^4}.$$

^{*} Elektrodynamische Maassbestimmungen, insbesondere über Diamagnetismus_Abhandlungen der königl. sächs. Ges. d. Wissensch., math.-phys. Cl., Bd. 1 8. 572_

Darin ist m (bei Weber μ) das der Axe eines Molecularmagneten parallel genommene Moment desselben (dieses Moment ist für alle Moleküle gleich vorausgesetzt), n die Anzahl der Moleküle in dem zu magnetisirenden Stück, Z (bei Weber D) die Resultante der auf das Molekül wirkenden Molecularkräfte, X die magnetisirende Kraft (Magnetpol, elektrischer Strom) und Y das in dem Eisen in Richtung der Kraft X durch dieselbe hervorgerufene Moment. Ist X klein gegen Z, so kann man in Gleichung 19) die Facture im X

toren im Nenner nach Potenzen von $\frac{X}{Z}$ entwickeln und die höheren Potenzen vernachlässigen. Man erhält dann

$$Y = n \operatorname{m} \frac{2}{3} \frac{X}{Z} \text{ für } X < Z.$$

Ist dagegen X gross gegen Z, so entwickelt man nach $\frac{Z}{X}$ und erhält

21)
$$Y = n \operatorname{m} \left(1 - \frac{1}{3} \frac{Z^2}{X^2} \right) \text{ für } X > Z.$$

Diese beiden Gleichungen haben auch durch Versuche im Wesentlichen Bestätigung gefunden. Aus der ersten derselben geht hervor, dass, wenn X klein gegen Z, das entstehende magnetische Moment proportional der einwirkenden Kraft ist. Die Gleichung gilt zwar für weiches Eisen, und in unserem Falle handelt es sich um gut gehärtete Stahlmagnete; aber da gerade bei diesen die Directionskraft der Moleküle sehr gross gegenüber der einwirkenden Kraft ist, so wird es gestattet sein, Gleichung 20) als richtig annischen und demnach die Aenderung des Moments im Magneten proportional der einwirkenden Kraft zu setzen. Es sei dies Hypothese I. Darauf, dass dieselbe absolut richtig ist, kommt es nicht an, da die Folgerungen darans nur dazu dienen sollen, die Gleichheit der Grössen μ , T und $2MmR^{-3}$ nachzuweisen, und diese an und für sich nicht sehr gross sind. Die Voraussetzung, dass das entstehende magnetische Moment der einwirkenden Kraft Proportional ist, liegt auch der Poisson'schen Theorie der Induction zu Grande, welche z. B. von F. Neumann (Vater) weiter entwickelt worden ist.*

Die Momentenänderungen μ und μ_1 , welche die schwingende Nadel durch die Erde und den festen Magneten erfährt, werden sich demnach verhalten wie die Kräfte, welche Erde und Magnet auf ein magnetisches Theilchen e der Nadel ausüben. Die erstere Kraft ist Te, die letztere berechnet man leicht, indem man die durch höhere Potenzen als R^3 dividirten

Glieder weglässt, zu $\frac{2M}{R^3}$ e. Es ergiebt sich also die Proportion

$$\mu: \mu_1 = Te: \frac{2M}{R^3}e$$

oder

^{*}Vorlesungen über die Theorie des Magnetismus, namentlich über die Theorie der magnetischen Induction. Herausgegeben von C. Neumann (Sohn). Läpsig 1881. S. 30

$$\mu_1 T = \frac{2 M \mu}{R^3}.$$

Diese Gleichung würde mit 15) übereinstimmen, wenn statt $M\mu$ das Product Mm darin stünde. Wir müssen daher weiter untersuchen, wie dieselbe Kraft X auf verschiedene Eisenmassen wirkt. Wir können voraussetzen, dass die beiden zu Versuchen benützten Magnete aus gleich gutem Stable bestehen (so dass die Kraft Z in beiden dieselbe Grösse hat) und dass sie mit gleicher Sorgfalt magnetisirt worden sind. Dann wird unzweifelhaft der grössere Magnet durch eine gewisse Kraft eine grössere Momentenänderung erfahren, als der kleinere Magnet durch dieselbe Kraft, es werden mit anderen Worten die Momentenänderungen M und μ proportional den Momenten M und m sein (Hypothese II). Diese Behauptung können wir noch in anderer Weise stützen. Wenn auf das Eisen eine unendlich grosse Kraft X einwirkte, so würde nach Gleichung 21) das Moment sein Maximum nm erreichen, in dem einen Magneten also N.m., in dem andern n.m., wenn N und n die Anzahl der Moleküle im festen und schwingenden Magneten bedeuten. Nun sind zwar unsere Magnete nicht bis zum Maximum magnetisirt; aber vorausgesetzt, dass ihre Magnetisirung mit gleicher Sorgfalt vorgenommen ist, wird der Magnetismus der Nadeln um analoge Werthe vom Maximum entfernt sein, die vorhandenen Momente werden gleiche Bruchtheile der Maximalmomente bilden, d. h.

$$M: m = (\mathfrak{N}.\mathfrak{m}): (\mathfrak{n}.\mathfrak{m}).$$

Ferner ist aber das entstehende Moment oder die Momentenänderung nach Gleichung 20) und 21) proportional mit n.m., d. h.

$$M: \mu = (\mathfrak{N}.m): (n.m).$$

Aus beiden Proportionen folgt

 $M: \mu = M: m$

oder

$$23) M\mu = Mm,$$

und dies ist wieder obige Behauptung. Dass die Gleichung ganz genau der Wirklichkeit entspricht, ist für unsern Zweck nicht nöthig.

Nunmehr geht Gleichung 22) über in

$$\mu_1 T = \frac{2 M m}{R^3},$$

und dies ist Gleichung 15), deren Richtigkeit früher vorausgesetzt wurde. Wir erhalten also durch die Methode der Schwingungen direct das wahre T, während es bei Anwendung der Ablenkungsmethode mit dem unbekannten

Factor $\sqrt{1+\frac{M}{M}}$ multiplicirt ist, dessen Grösse, wenn man die möglichste Schärfe des Resultats erreichen will, durch besondere Versuche festgestellt werden muss.

Grimma.

Dr. TR. HÄBLER.

VIII. Notiz zur Differentialgleichung

1)
$$(a_3 + b_3 x + c_3 x^2 + d_3 x^3) \frac{d^3 y}{dx^3} + (a_2 + b_2 x + c_2 x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} + (a_1 + b_1 x) \frac{dy}{dy} + a_0 y = 0$$
.

Bekanntlich ist für diese nicht unwichtige Gleichung die Integration in einigen speciellen Fällen geleistet worden. Man vergl. die Arbeiten von Hossenfelder — Annalen Bd. IV; Pochhammer — Journal f. d. reine u. angew. Mathematik Bd. LXXI; Thomae — Zeitschrift f. Math. u. Phys. Bd. XXI.

Wir machen hier auf folgenden neuen integrablen Fall aufmerksam: Genügt der Gleichung 1) partikulär

$$y=(x-x)^2.$$

unter z eine Wurzel der Gleichung

$$a_3 + b_3 x + c_3 x^2 + d_3 x^3 = 0$$

verstanden, so kann jene Differentialgleichung mittels der Substitution

 $y = (x - x)^{2} \int (x - x)^{-2 - 1} z \, dx$

in die Differentialgleichung der hypergeometrischen Reihe transformirt werden.

Setzt man, was keine Beschränkung ist, $a_3 = 0$ voraus und wählt z = 0, so lautet Gleichung 1) einfacher

la) $x(b_3+c_3x+d_3x^2)y'''+(a_2+b_2x+c_3x^2)y''+(a_1+b_1x)y'+a_0y=0$, und diese letzte Gleichung kann man sich entstanden denken durch Elimination einer Variabelen s aus folgenden beiden Gleichungen:

$$x\,y'-\lambda\,y=s,$$

$$\beta) \qquad (\alpha_2 + \beta_2 x + \gamma_2 x^2) z'' + (\alpha_1 + \beta_1 x) z' + \alpha_0 z = 0.$$

Für die auf diese Weise hergeleitete (reducible) Differentialgleichung ist nun charakteristisch, dass sie mit der reducirten Gleichung α) ein Integral gemein haben muss, d. h. dass ihr $y = x^2$ partikulär genügt. — Gleichzeitig folgt aus α)

 $y = x^{\lambda} \int_{-\lambda - 1}^{\lambda} z \, dx,$

durch welchen Ausdruck die Gleichung dritter Ordnung — ihrer Entstehung gemäss — nothwendig auf die Gleichung β) zurückführbar ist. Hiermit ist unsere anfänglich aufgestellte Behauptung erwiesen.

Um nun die Transformation an der Gleichung 1a) auszuführen, stellen wir zunächst die Bedingungen fest, dass jener Gleichung $y = x^2$ partikulär genügt. Man findet

2)
$$d_{3}\lambda(\lambda-1)(\lambda-2) + c_{2}\lambda(\lambda-1) + b_{1}\lambda + a_{0} = 0 \\ c_{3}(\lambda-1)(\lambda-2) + b_{3}(\lambda-1) + a_{1} = 0 \\ b_{3}(\lambda-2) + a_{2} = 0$$

Aus der letzten dieser Gleichungen folgt ein Werth für λ , die auderen beiden Gleichungen geben zwei Coefficientenbedingungen, unter denen die partikuläre Lösung $y = x^{\lambda}$ überhaupt existirt.

Substituirt man weiter in Gleichung 1a) auch

$$y = x^{\lambda} \int x^{-\lambda - 1} s \, dx$$
, $y^{(n)} = x^{\lambda - n} \int x^{-\lambda + n - 1} s^{(n)} \, dx$, $n = 1, 2, 3$,

so entsteht nach passender Anordnung der Glieder und Berücksichtigung der Partikularlösung

$$x^{2}(b_{3}+c_{3}x+d_{3}x^{2})z''+x[(\lambda-2)(b_{3}+c_{3}x+d_{3}x^{2})+(a_{2}+b_{2}x+c_{2}x^{2})]s'+[(\lambda-1)(\lambda-2)(b_{3}+c_{3}x+d_{3}x^{2})+(\lambda-1)(a_{2}+b_{2}x+c_{2}x^{2})+(a_{1}+b_{1}x)x]s=0.$$

Beachtet man, dass zufolge der Bedingungen 2) die letzte Differentialgleichung durch x^2 theilbar wird, so kommt man zu der Gleichung

3)
$$(b_3 + c_3 x + d_3 x^2) z'' + [(\lambda - 2)(c_3 + d_3 x) + b_2 + c_2 x] z' + [(\lambda - 1)(\lambda - 2)d_3 + (\lambda - 1)c_2 + b_1] z = 0,$$

wie vorausbestimmt war. Sind z_1 und z_2 die partikulären Integrale von 3), so genügt der Gleichung 1a) folgender Ausdruck:

$$y = x^{\lambda} \left\{ C_0 + C_1 \int x^{-\lambda - 1} z_1 \, dx + C_2 \int x^{-\lambda - 1} z_2 \, dx \right\}.$$

In ähnlicher Weise gelangt man auch zu folgendem Satze: Genügt der Differentialgleichung

$$(a_3 + b_3 x) \frac{d^3 y}{dx^3} + (a_2 + b_2 x) \frac{d^2 y}{dx^2} + (a_1 + b_1 x) \frac{dy}{dx} + (a_0 + b_0 x) y = 0$$
partikulär
$$y = e^{\lambda x},$$

so lässt sie sich durch die Substitution

$$y = e^{\lambda x} \int e^{-\lambda x} z \, dx$$
, $y^{(n)} = e^{\lambda x} \int e^{-\lambda x} z^{(n)} \, dx$, $n = 1, 2, 3$,


in eine Gleichung von der Form

$$(\alpha_0 + \beta_0 x)z'' + (\alpha_1 + \beta_1 x)z' + (\alpha_0 + \beta_0 x)z = 0$$

verwandeln.

Es sei schliesslich noch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Vortheil der angegebenen Transformation nicht darin zu suchen ist, dass eine. Gleichung dritter Ordnung mit Hilfe eines ersten Integrals auf eine Gleichung zweiter Ordnung herabgesetzt werden kann — was selbstverständlich ist —, sondern darin, dass man in den erwähnten Fällen auf Gleichungen geführt wird, deren Integration bereits erledigt ist.

WOLDEMAR HEYMANN.



Aus de: beiden ' partikul Sul

..

y =

so entsi der Par $x^2(b_3\cdot$ $+[(\lambda-1)]$ Bea gleichur

3)

wie vor so genti

In Differen

(6

partikul

so lässt

in eine

verwand Es theil de Gleichus ung zw ist —, geführt

VI.

Beziehungen zwischen den Krümmungen reciproker räumlicher Gebilde.

Von

Dr. L. GEISENHEIMER,
Bergschuldirector in Tarnowitz.

Hierzu Taf. V Fig. 1.

In einer früheren, ebenfalls in dieser Zeitschrift veröffentlichten Abhandlung wurde die Beziehung zwischen den Krümmungsradien reciproker, collinearer und inverser ebener Curven untersucht.* Zweck der vorliegenden Arbeit ist, diese Untersuchung auf reciproke räumliche Systeme, also auf die einer beliebigen Raumcurve oder Fläche entsprechenden reciproken Gebilde auszudehnen. Als Specialfälle der erhaltenen Resultate werden sich Beziehungen zwischen den Krümmungen der auf einer Fläche zweiter Ordnung enthaltenen Curve und ihrer Abwickelungsfläche, ferner Eigenschaften der Krümmungslinien und der Centrafläche für die genannten quadratischen Flächen, insbesondere eine Construction für das Centrum der zu einer Krümmungslinie gehörigen Schmiegungskugel ergeben.

§ 1.

Im Folgenden werde immer vorausgesetzt, dass die betrachteten reciproken Gebilde in involutorische Lage gebracht seien, das eine derselben also das Polarsystem des andern in Bezug auf eine als Directrix dienende Fläche zweiter Ordnung darstelle; die Allgemeinheit der Untersuchung wird durch diese Annahme nicht beschränkt.

Um die einer Raumcurve entsprechende reciproke Figur zu erhalten, können wir die Curve sowohl als den Ort ihrer Punkte, wie als die Einhüllende ihrer Schmiegungsebenen betrachten. Im ersten Falle bildet das reciproke Gebilde eine von den entsprechenden Polarebenen umhüllte abwickelbare Fläche, im zweiten Falle die Rückkehrkante (Cuspidal- oder Strictionscurve) derselben. Wenn, was im Weitern geschehen soll, unter den Krümmungen einer abwickelbaren Fläche längs einer Erzeugenden die

[•] Bd. XXV 8. 300.

Krümmungen im berührten Elemente dieser Rückkehrkante verstanden werden, braucht in der vorliegenden Untersuchung diese verschiedenartige Bildung des einer Raumcurve reciproken Systems nicht beachtet zu werden und können wir uns kurz dahin ausdrücken, dass einer Raumcurve als reciprokes System wieder eine solche Curve entspreche. Bezüglich der Krümmungen in einem Elemente der Raumcurve unterscheiden wir: 1 die Krümmung des Elements in seiner Schmiegungsebene gleich dem reciproken Werthe des (ersten) Krümmungsradius; 2. die Krümmung des Elements in seinem Punkte gleich dem reciproken Werthe der Neigung des Schmiegungskegels, so dass, falls dieser Kegel in eine Gerade degenerirt, seine Krümmung unendlich gross, die einer Ebene null wird; 3. das Product dieser beiden Krümmungen gleich dem reciproken Werthe des Windungsradius (Radius der zweiten Krümmung).

Die zu einem Punkte P_1 der Raumcurve k_1 gehörige Schmiegungsebene werde mit π_1 , der in ihr liegende Krümmungsradius mit ϱ_1 , der Windungsradius mit R_1 , die Neigung des Schmiegungskegels mit $tgH_1=\frac{R_1}{\varrho_1}$, die gleichnamigen Grössen der reciproken Curve durch gleiche Buchstaben mit dem Index 2 bezeichnet, so dass also P_1 und π_2 , P_2 und π_1 polare Elemente darstellen.

Wir denken uns die Schmiegungsebene π_1 verlängert und vom osculirenden Elemente des Schmiegungskegels des entsprechenden Elements in der reciproken Curve durchsetzt, so ist bei Vernachlässigung unendlich kleiner Grössen von mindestens dritter Ordnung, also bis auf die Krümmungsradien genau, das in π_1 fallende Element von k_1 dem Element der Schnittfigur reciprok, wobei die Schnittcurve der Schmiegungsebene π_1 mit der Directrix-fläche der räumlichen Involution die Directrix des jetzt bestimmten ebenen Polarsystems bildet. Daher ist nach der vorhin angeführten Abhandlung*:

$$\varrho_1 \cdot \varrho'_2 = \frac{a_1^4 \cdot b_4^4}{n_1^3 \cdot n'_2^3},$$

wo ϱ'_2 den Krümmungsradius für das Schnittelement des Schmiegungskegels, a_1b_1 die halben Hauptaxen der in π_1 liegenden Directrix, n_1 und n'_2 die Entfernungen der Tangenten t_1 und t'_2 der reciproken Curvenelemente vom Mittelpunkte dieses Kegelschnittes bedeuten. Die Tangente t'_2 fällt mit dem Schnitte der beiden Schmiegungsebenen π_1 und π_2 zusammen.

Die von P_2 bis zu ihrer Spur in π_1 mit t_2 bezeichnete Tangente an k_2 bilde mit π_1 den Winkel χ_2 , mit der Geraden $|\pi_1\pi_2|$ den Winkel ψ_2 , so wird der Hauptkrümmungsradius des Schmiegungskegels im Endpunkte von t_2 , also der Krümmungsradius des zu t_2 normalen Schnittes, $t_2.tgH_2$. Die in dieser Normalebene und in π_1 liegenden Schnittelemente des zweiten Schmiegungskegels dürfen bis auf unendlich kleine Grössen einschließlich

zweiter Ordnung als affin betrachtet werden, und zwar ist t_2 der Affinitätsstrahl. Das Verhältniss zwischen den Krümmungsradien entsprechender Punkte in zwei affinen Curven ist gleich dem Cubus aus dem Verhältniss der entsprechenden Tangentenstrecken, dividirt durch das Affinitätsverhältniss*. Hiernach ergiebt sich:

$$\frac{\varrho_2'}{t_2.tgH_2} = \frac{\sin \chi_2}{\sin \psi_2^3},$$

und in Verbindung mit der vorstehend entwickelten Gleichung:

1)
$$\varrho_1 \cdot tg H_2 = \frac{a_1^4 \cdot b_1^4}{n_1^3 \cdot n_2^{'3}} \cdot \frac{\sin \psi_2^3}{t_2 \cdot \sin \chi_2}$$

Eine entsprechende Gleichung kann für $\varrho_2.tg\,H_1$ aufgestellt werden. Die Formel lässt sich in verschiedene Formen überführen, von welchen wir zweinäher betrachten.

Wir legen durch den Mittelpunkt S der Directrixfläche eine zu π_1 parallele Ebene π'_1 ; die halben Hauptaxen des in derselben inducirten Mittelpunktskegelschnittes seien a'_1 und b'_1 , die von ihr und P_2 begrenzte Strecke auf der Tangente an k_2 sei l_2 , ferner die normale Entfernung der Schnittgeraden $|\pi'_1 \pi_2|$ von S gleich n''_2 , so wird nach bekannten Sätzen:

$$\frac{a_1^{4} \cdot b_1^{4}}{n'_2{}^3 \cdot l_2} = \frac{a'_1{}^4 \cdot b'_1{}^4}{n''_2{}^3 \cdot l_2} \cdot$$

Die vom Involutionsmittelpunkte S auf die Schmiegungsebenen π_1 und π_2 gefällten Senkrechten seien mit p_1 und p_2 , der längs SP_2 fallende Halbmesser der Directrixfläche mit c_1 bezeichnet. Es ist:

$$n''_2 = p_2 \cdot \frac{\sin \psi_2}{\sin \tau_2}$$
 und $l_2 \sin \chi_2 = \frac{c_1^2}{p_1} \cdot \sin^2(\pi_1, c_1)$.

Diese Werthe in Formel 1) einsetzend, kommt:

$$\varrho_1 \ tg \ H_2 = \frac{a_1^{'4} \cdot b_1^{'4} \cdot c_1^{'4} \sin^4(\pi_1, c_1)}{p_1^{'2} \cdot p_2^{'3} \cdot l_2^{'2} \cdot n_1^{'3}} \cdot$$

Der Zähler des rechtsstehenden Ausdruckes ist constant, nämlich gleich $a_0^{A_1} \cdot b_0^{A_2} \cdot c_0^{A_3}$, wo a_0 , b_0 , c_0 die halben Hauptaxen der Directrix sind. Demmech wird:

$$\varrho_{1}.tg\,H_{2}=\frac{a_{0}{}^{4}.\,b_{0}{}^{4}.\,c_{0}{}^{4}}{p_{1}{}^{2}.\,p_{2}{}^{3}.\,l_{2}{}^{3}.\,n_{1}{}^{3}},$$

welche (Heichung auf ihrer rechten Seite keine Winkelgrössen enthält. Unter \mathbf{a}_1 kann auch die Länge der Senkrechten verstanden werden, welche vom Involutionsmittelpunkte S auf die Schnittgerade der Ebene π'_1 mit der dem Endpunkte von l_2 entsprechenden Polarebene gefällt wird. —

Eine andere bemerkenswerthe Umformung folgt aus der Betrachtung des der Geraden $|\pi_1\pi_2|$ conjugirten Mittelpunktskegelschnittes in der Ebene $^{8}P_1P_2$ (Fig. 1); die in diese Ebene fallenden Mittelpunkte der in π_1 , π_2

^{*} a. a. O. S. 215.

und $|\pi_1 \pi_2|$ inducirten Involutionen seien bezüglich mit O_1 , O_2 und O_2 , der zu $|\pi_1 \pi_2|$ parallele Halbmesser der Directrixfläche mit d bezeichnet. Da

$$t_2 = l_2 \frac{O_1 P_2}{S P_2},$$

wird nach Formel 1):

$$\varrho_{1} \cdot tg H_{2} \cdot l_{2} \cdot \frac{\sin \gamma_{3}}{\sin \psi_{3}^{3}} = \frac{a_{1}^{4} \cdot b_{1}^{4}}{n_{1}^{3} \cdot n_{3}^{'3}} \cdot \frac{SP_{2}}{O_{1}P_{2}}$$

Weiter ist $a_1^4 \cdot b_1^4 = (O_1 O \cdot O_1 P_1)^2 \cdot \left(d^2 \cdot \frac{O_1 P_2}{SP_2}\right)^2 \cdot sin^4(d, OP_1), \text{ da } O_1 O \cdot O_1 P_1$

die Potenz des nach O_1P_1 fallenden Durchmessers, $d^2 \cdot \frac{O_1P_2}{SP_2}$ die Potenz des hierzu conjugirten Durchmessers in π_1 darstellt. Ferner ist:

$$n_1 = 0_1 P_1 \cdot \sin \varphi_1$$

wo φ_1 den Winkel der Tangente t_1 mit O_1P_1 bedeutet,

$$n'_{2} = O_{1}O$$
. $sin(d, OP_{1})$.

Diese Werthe einsetzend, kommt:

$$\varrho_{1}.tg\,H_{2}.l_{2}\cdot\frac{\sin\chi_{2}}{\sin\psi_{2}^{3}}=\frac{O_{1}P_{2}.d^{4}}{O_{1}O.O_{1}P_{1}.SP_{2}}\cdot\frac{\sin(d,OP_{1})}{\sin^{3}\varphi_{1}}\cdot$$

Der um das Tripel P_1OP_2 gelegte Kreis schneide SP_2 zum zweiten Male in Q, so ist $\frac{O_1O.O_1P_1}{OP_2}=O_1Q$, und $O_1Q.SP_2=SP_2(SQ-SO_1)=SP_2.SQ$ $-SP_2.SO_1$. Nun ist $SP_2.SQ$ die Potenz des Mittelpunktes S in Bezug auf den dem Tripel umschriebenen Kreis und daher nach einem bekannten Satze gleich $c_1^2+c_1^2$, wenn c_1' der im Polarsystem der Ebene SP_1P_2 zu c_1 conjugirte Halbmesser ist; ferner ist $SP_2.SO_1=c_1^2$, und somit wird

$$\frac{O_1 P_2}{O_1 O.O_1 P_1.SP_2} = \frac{1}{c_1'^2}.$$

Weiter ist, wie vorhin schon benutzt wurde, $l_2 \sin \chi_2 = \frac{c_1^2}{p_1} \sin^2(\pi_1, c_1)$, daher

$$\varrho_1. tg\, H_2 = \frac{d^4 \cdot p_1}{c_1^{\ 2} \cdot c_1^{\ 2} \sin^2(\pi_1,\, c_1)} \cdot \frac{\sin(d,\, O\, P_1) \cdot \sin\psi_2^{\ 3}}{\sin^3\phi_1}.$$

Indem der rechtsstehende Ausdruck mit d^2 . $sin^2(P_1O_1P_2)$ erweitert und berücksichtigt wird, dass für die bei O_1 gebildete körperliche Ecke die Gleichung stattfindet:

$$\sin{(d\,,\,P_1\,O_1\,P_2)}.\sin{(P_1\,O_1\,P_2)} = \sin{(c_1\,,\,\pi_1)}.\sin{(d\,,\,O_1\,P_1)}\,,$$

und dass

$$c_1^2 \cdot c_1^2 \cdot \sin^2(P_1 O_1 P_2) \cdot d^2 \cdot \sin^2(d, P_1 O_1 P_2) = a_0^2 \cdot b_0^2 \cdot c_0^2$$

ergiebt sich die umgestaltete Formel:

$$\begin{cases} e_1 \cdot tg \, H_2 = \frac{d^3}{a_0^2 \, b_0^2 \, c_0^2} \cdot \left(\frac{\sin(d, \, O \, P_1) \cdot \sin\psi_2}{\sin\varphi_1}\right)^3 \cdot p_1 \,. \\ \text{In genau entsprechender Weise gilt:} \\ e_2 \cdot tg \, H_1 = \frac{d^3}{a_0^2 \, b_0^2 \, c_0^2} \cdot \left(\frac{\sin(d, \, O \, P_2) \cdot \sin\psi_1}{\sin\varphi_2}\right)^3 \cdot p_2 \,. \end{cases}$$

In diesen Formeln bedeuten also die Bestimmungsstücke φ_1 , φ_2 , ψ_1 , ψ_2 der reciproken Curventangenten die Winkel derselben mit den Halbmessern O_1P_1 bezüglich O_2P_2 der in den Schmiegungsebenen inducirten Involutionen und mit $|\pi_1\pi_2|$, bezüglich den aus O_1 und O_2 hierzu gezogenen Parallelen.

Ein weiteres interessantes Resultat wird durch Multiplication der beiden letzten Formeln gewonnen. Man erhält:

$$R_{1}.R_{2} = \frac{d^{12}}{a_{0}{}^{4}.b_{0}{}^{4}.c_{0}{}^{4}} \cdot \left(\frac{\sin(d,OP_{1}).\sin(d,OP_{2}).\sin\psi_{1}.\sin\psi_{2}}{\sin\varphi_{1}.\sin\varphi_{2}}\right)^{3} \cdot p_{1}\,p_{2}.$$

Bezeichnet man die Potenz der auf $|\pi_1 \pi_2|$ hervorgerufenen Involution mit k^2 , so ergiebt sich

$$\frac{\sin \psi_{1} \cdot \sin \psi_{2}}{\sin \varphi_{1} \cdot \sin \varphi_{2}} = \frac{O P_{1} \cdot O P_{2}}{k^{2}} = \frac{2 \Delta (P_{1} O P_{2})}{k^{2} \sin (P_{1} O P_{2})}.$$

Es ist
$$\frac{k^2}{d^2} = \frac{OO_3}{SO_3} = \frac{\Delta(P_1 O P_2)}{\Delta(P_1 S P_2)}$$
, daher:

4)
$$\frac{\sin\psi_1 \cdot \sin\psi_2}{\sin\varphi_1 \cdot \sin\varphi_2} = \frac{2\Delta(P_1SP_2)}{d^2 \cdot \sin(P_1OP_2)}$$

Wir drücken $\Delta(P_1SP_2)$ in folgender Weise aus: Bedeuten s_1 , s_2 , s_3 die aus S auf die Seiten des Tripels OP_1 , OP_2 , P_1P_2 gefällten Senkrechten, a, b die halben Hauptaxen des zu diesem Tripel gehörigen Kegelschnittes, so ist bekanntlich, wenn r der Radius des dem Tripel umschriebenen Kreises*:

$$2 s_1 s_2 s_3 r = a^2 b^2;$$
 und da $r = \frac{P_1 P_2}{2 \sin(P_1 O P_2)}$, wird
$$\Delta(P_1 S P_2) = \frac{a^2 b^2 \sin(P_1 O P_2)}{2 \cdot s \cdot s}.$$

Die Ebene P_1OP_2 werde im Folgenden mit μ bezeichnet. Es ist

$$\begin{split} s_1 &= \frac{p_1}{\sin{(\mu,\,\pi_1)}}, \quad s_2 = \frac{p_2}{\sin{(\mu,\,\pi_2)}}, \quad \text{daher:} \\ &\frac{\sin{\psi_1}.\sin{\psi_2}}{\sin{\phi_1}.\sin{\phi_2}} = \frac{a^2\,b^2\sin{(\mu,\,\pi_1)}\sin{(\mu,\,\pi_2)}}{d^2\,p_1\,p_2}. \end{split}$$

Wird Zähler und Nenner der rechten Seite mit $d^2 sin^2(d\mu)$ multiplicirt, so folgt:

5)
$$\frac{\sin \psi_1 \cdot \sin \psi_2}{\sin \varphi_1 \cdot \sin \varphi_2} = \frac{a_0^2 \cdot b_0^2 \cdot c_0^2}{d^4 p_1 p_2 \sin(d, OP_1) \sin(d, OP_2)}$$

Die in den Ebenen π_1 und π_2 liegenden, durch P_1 und P_2 laufenden reciproken Tangenten bilden zwei projectivische Strahlbüschel, so dass P_2 o einer Parallelen zu d, die aus P_2 parallel zu d gelegte Gerade mit P_1 o projectivisch ist. Gleichung 5) liefert den constanten Werth des Doppelschnittverhältnisses, welches durch die Strahlen t_1 , t_2 mit den ebenerwähnten Strahlen der Büschel gebildet wird. Falls P_1 und P_2 auf ihren bezüg-

^{*} Vergl. Schröter, Theorie der Kegelschnitte, S. 194.

lichen Durchmessern SP_1 und SP_2 fortrücken, wobei π_1 und π_2 parallel zu sich selbst verschoben werden, bleibt Winkel P_1OP_2 und $\Delta(P_1SP_2)$, daher auch p_1p_2 und nach Formel 5) der Werth dieses Doppelschnittverhältnisses ungeändert. Wird sein Werth in den für R_1 . R_2 erhaltenen Ausdruck eingesetzt, so kommt:

$$R_1 \cdot R_2 = \frac{a_0^2 b_0^2 c_0^2}{p_1^2 p_2^2} \cdot \cdots$$

Das Product aus den Radien der zweiten Krümmung räumlich reciproker involutorischer Curven ist dem Quadrat aus dem Product der ihren Schmiegungsebenen angehörigen Entfernungen vom Involutionsmittelpunkte umgekehrt proportional Rücken beide sich entsprechende Punkte der involutorischen Curven auf ihren bezüglichen Durchmessern fort, so bleibt das Product dieser Krümmungsradien constant.

Der vorstehende Satz bildet ein Analogon zu dem für die Krümmungsradien ebener involutorisch-reciproker Curven hergeleiteten.

Wird der aus Formel 5) für d zu entnehmende Werth in 3) eingesetzt, so nehmen diese Gleichungen die später zu verwendende Form an:

$$\begin{cases} \varrho_{1} \cdot lg H_{2} = \frac{a_{0}b_{0}c_{0}}{p_{1}^{1/2}p_{2}^{3/2}} \left(\frac{\sin(d, OP_{1})\sin\varphi_{2}\sin\psi_{2}}{\sin(d, OP_{2})\sin\varphi_{1}\sin\psi_{1}} \right)^{s_{1}}, \\ \varrho_{2} \cdot lg H_{1} = \frac{a_{0}b_{0}c_{0}}{p_{1}^{3/2}p_{2}^{3/2}} \left(\frac{\sin(d, OP_{2})\sin\varphi_{1}\sin\psi_{1}}{\sin(d, OP_{1})\sin\varphi_{2}\sin\psi_{2}} \right)^{s/2}. \end{cases}$$

Aus den vorstehenden Gleichungen ergiebt sich ferner:

Sind die Schmiegungsebenen und Richtungen zweier reciproken Curvenelemente gegeben, so ist die ebene Krümmung
des einen der räumlichen Krümmung des entsprechenden Elements umgekehrt proportional. Das Product zweier sich derartig entsprechender Krümmungen bleibt ungeändert, wenn
die Curvenelemente parallel zu sich selbst auf den Durchmessern der Directrix verschoben werden.

Die Bezeichnung der beiden bezüglich einer Fläche zweiter Ordnung polaren Systeme als "reciproke Figuren" findet hiernach durch die Betrachtung der Krümmungen ihre Rechtfertigung.

§ 2.

Zur Bestimmung des zwischen den Bogenelementen ds_1 und ds_2 herrschenden Verhältnisses gehen wir wieder von der Betrachtung der in π_1 liegenden involutorischen reciproken Curvenelemente aus. Das Element, welches durch den an k_2 gelegten Schmiegungskegel in π_1 ausgeschnitten

wird, ist gleich $\frac{t_2 \cdot d\vartheta_2}{\sin \psi_2}$, wo $d\vartheta_2$ den ebenen Contingenzwinkel der Curve k_2 bedeutet. Hiernach wird:*

$$\frac{ds_{1}}{t_{2} d\vartheta_{2}} \sin \psi_{2} = \sqrt{\frac{\varrho_{1} n_{1}}{\varrho_{2}' n_{2}'}} = \sqrt{\frac{\varrho_{1} n_{1} \sin \psi_{2}^{3}}{t_{2} t g H_{2} n_{2}' \sin \chi_{2}}}$$

Es ist $d\theta_2 = \frac{ds_2}{\varrho_2}$, $\frac{t_2}{n_2'} = \frac{l_2}{n_2''} = \frac{l_2 \cdot \sin \eta_2}{p_2 \cdot \sin \psi_2}$, $\varrho_1 \cdot tg H_2 = \frac{a_0^4 b_0^4 c_0^4}{p_1^2 p_2^3 l_2^3 n_1^3}$ (Formel 2), daher:

8)
$$\frac{ds_1}{ds_2} = \frac{\varrho_1}{\varrho_2} \frac{p_1 p_2 l_2^2 n_1^2}{a_0^2 b_0^2 c_0^2}.$$

Entsprechend müsste sein $\frac{ds_2}{ds_1} = \frac{\varrho_2}{\varrho_1} \frac{p_1 p_2 l_1^2 n_2^2}{a_0^2 b_0^2 c_0^2}$, so dass sich durch Multiplication der beiden letzten Formeln ergiebt:

$$(l_2 n_1)(l_1 n_2) = \frac{a_0^2 b_0^2 c_0^2}{p_1 p_2},$$

und mit Hilfe dieser Beziehung folgt:

9)
$$\frac{ds_1}{ds_2} = \frac{\varrho_1}{\varrho_2} \frac{l_2 n_1}{l_1 n_2}.$$

Nach Formel 2) ist

$$(l_1 n_1)^3 = \frac{a_0^4 b_0^4 c_0^4}{e_1 t g H_2 p_1^2 p_2^3} \text{ und entsprechend } (l_1 n_2)^3 = \frac{a_0^4 b_0^4 c_0^4}{e_2 t g H_1 p_1^3 p_2^3},$$

10)
$$\frac{ds_1}{ds_2} = \frac{\varrho_1}{\varrho_2} \sqrt[3]{\frac{\overline{p_1} \varrho_2 tg H_1}{p_2 \varrho_1 tg H_2}} = \sqrt[3]{\frac{\overline{p_1} \varrho_1 R_1}{p_2 \varrho_2 R_2}},$$

welche Formel der für ebene Systeme entwickelten analog ist. Dieselbe lässt sich in folgender Weise umformen. Bedeuten $d\eta_1$, $d\eta_2$ die räumlichen Contingenzwinkel (Winkel der unendlich nahen Schmiegungsebenen) in beiden reciproken Curven, so wird

$$\frac{ds_{1}}{ds_{2}} = \sqrt[3]{\frac{p_{1}}{p_{1}} \frac{ds_{1}^{2} \cdot d\vartheta_{2} \cdot d\eta_{2}}{ds_{2}^{2} \cdot d\vartheta_{1} \cdot d\eta_{1}}}$$

oder

$$\frac{ds_1.d\vartheta_1.d\eta_1}{p_1} = \frac{ds_2.d\vartheta_2.d\eta_2}{p_2}.$$

 $\frac{1}{6}ds d\theta d\eta$ bedeutet aber die normale Entfernung des um ds weiter liegenden Punktes einer Raumcurve von der vorhergehenden Schmiegungsebene. Formel 11) liefert hiernach den Satz:

In raumlich-involutorischen Systemen verhalten sich die unendlich kleinen Strecken, um welche zwei reciproke Curven bei entsprechendem Fortschreiten aus den Schmiegungsebenen heraustreten, wie die Entfernungen dieser Schmiegungsebenen vom Mittelpunkte der Involution.

^{*} Diese Zeitschrift Bd. XXV S. 310.

Der entsprechende Satz für ebene Systeme lautet:

In ebenen involutorisch liegenden reciproken Curven verhalten sich die Bogenhöhen unendlich kleiner entsprechender Curvenelemente wie die Entfernungen der ihnen zugehörigen Tangenten vom Mittelpunkte der Involution.

Gleichung 9) giebt noch zu der Entwickelung Anlass:

$$\frac{ds_1}{ds_2} = \frac{\varrho_1 tg H_1}{\varrho_2 tg H_1} \cdot \frac{l_2 n_1}{l_1 n_2} = \frac{R_1}{\varrho_2 tg H_1} \cdot \frac{l_2 n_1}{l_1 n_2},$$

woraus sich unter Benutzung von 2) und 6) ergiebt:

$$\frac{ds_1}{ds_2} = \frac{R_1 p_1}{l_2 n_1}.$$

Sind die Schmiegungsebenen und Richtungen zweier reciproken Curvenelemente gegeben, so ist deren Verhältniss $\frac{ds_i}{ds_2}$ dem Windungsradius R_1 proportional, vom Krümmungsradius e_1 unabhängig.

Bei involutorischen Systemen in der Ebene wird das Verhältniss $\frac{ds_1}{ds_2}$ dem Krümmungsradius ϱ_1 proportional. —

Der vorhin entwickelte Satz über das Verhältniss der Abweichungen von der Schmiegungsebene ist nur der specielle Fall eines sich auf endliche Werthe beziehenden und für beliebige reciproke Systeme giltigen Gesetzes, welches im Folgenden unter Voraussetzung orthogonaler Coordinaten hergeleitet werden soll.

Die Gleichung einer dem ersten System angehörigen Ebene α_1 sei

$$x\cos\lambda_1+y\cos\mu_1+z\cos\nu_1=p_1,$$

die Gleichung einer zum zweiten involutorisch-reciproken System gerechneten Ebene β_2 sei

$$x\cos\lambda_2 + y\cos\mu_2 + z\cos\nu_2 = p_3.$$

Fallen die Coordinatenaxen mit den Hauptaxen der Involution $2a_0$, $2b_0$, $2c_0$ zusammen, so werden die Coordinaten der diesen Ebenen entsprechenden Punkte A_2 und B_1 bezüglich:

$$\frac{a_0^2}{p_1}\cos\lambda_1, \quad \frac{b_0^2}{p_1}\cos\mu_1, \quad \frac{c_0^2}{p_1}\cos\nu_1 \quad \text{und} \quad \frac{a_0^2}{p_2}\cos\lambda_2, \quad \frac{b_0^2}{p_2}\cos\mu_2, \quad \frac{c_0^2}{p_2}\cos\nu_2.$$

Die von B_1 auf die Ebene α_1 gefällte Senkrechte sei $B_1\alpha_1$, so wird:

$$\begin{split} \frac{B_{1} \, a_{1}}{p_{1}} &= \frac{p_{1} - \frac{a_{0}^{2}}{p_{2}} \cos \lambda_{1} \, \cos \lambda_{2} - \frac{b_{0}^{2}}{p_{2}} \cos \mu_{1} \, \cos \mu_{2} - \frac{c_{0}^{2}}{p_{2}} \cos \nu_{1} \, \cos \nu_{2}}{p_{1}} \\ &= 1 - \frac{a_{0}^{2}}{p_{1} \, p_{2}} \cos \lambda_{1} \cos \lambda_{2} - \frac{b_{0}^{2}}{p_{1} \, p_{2}} \cos \mu_{1} \cos \mu_{2} - \frac{c_{0}^{2}}{p_{1} \, p_{2}} \cos \nu_{1} \cos \nu_{2}. \end{split}$$

Aus der symmetrischen Bildung des letzten Ausdrucks folgt:

$$\frac{B_1 \alpha_1}{p_1} = \frac{A_2 \beta_2}{p_2} \cdot$$

Die Entfernung irgend eines Punktes von einer beliebigen Ebene verhält sich zur Entfernung der reciproken Elemente, wie die Abstände der beiden so erhaltenen Ebenen vom Mittelpunkte der Involution.

Dieser Satz ist die Verallgemeinerung des in Formel 11) gefundenen Gesetzes; die für circular-reciproke Systeme benutzte Proportion $\frac{B_1\alpha_1}{SB_1} = \frac{A_2\beta_2}{SB_2}$ ist ein specieller Fall desselben; ebenso benutzt Graves in Crelle's Journal Bd. XLII S. 279 einen speciellen Fall dieses Satzes.

Falls das Curvenelement k_1 die Fläche der Directrix berührt, vereinfachen sich die vorstehend entwickelten Formeln. Die Tangente t_1 fällt alsdann mit der Schnittlinie $|\pi_1 \pi_2|$, t_2 mit OP_2 , Punkt P_1 mit O zusammen und es wird:

Die zu den conjugirten Tangenten t_1 und t_2 parallelen Halbmesser der Directrix seien d_1 und d_2 , so ist

$$d_1 d_2 p_2 \sin \psi_2 = a_0 b_0 c_0$$
.

Nach Formel 3) wird:

$$\varrho_1 \, tg \, H_2 = \frac{d_1^6}{a_0^2 \, b_0^{\; 2} \, c_0^{\; 2}} \, p_1 \, sin^3 \, \psi_2 \, .$$

Ferner wird

$$\begin{split} \frac{ds_1}{ds_2} &= \sqrt[3]{\frac{\overline{p_1}\,\varrho_1\,R_1}{p_2\,\varrho_2\,R_2}} = R_1d_1^{\,2}\sin\psi_2\,\sqrt[3]{\frac{\overline{p_1}^2}{a_0^{\,3}\,b_0^{\,2}\,c_0^{\,3}\,(R_1\,.\,R_2)^2\,.\,p_2}} = \frac{p_1^{\,2}\,p_2\,d_1^{\,2}\,R_1}{a_0^{\,3}\,b_0^{\,3}\,c_0^{\,3}} \\ &= \frac{p_1^{\,2}\,R_1}{p_2\,d_2^{\,2}\sin\psi_2}. \end{split}$$

Anderseits ist nach Formel 12)

$$\frac{ds_1}{ds_2} = \frac{p_1 R_1}{l_2 n_1},$$

und da im vorliegenden Falle die Proportion stattfindet

$$t_2: l_2 = n_1: n'_1,$$

kommt

$$l_2 n_1 = t_2 n'_1 = \frac{t_2 p_2}{\sin(\pi_1 \pi_2)}$$
 und somit $\frac{ds_1}{ds_2} = \frac{p_1 R_1}{p_2 t_2} \sin(\pi_1 \pi_2)$.

Die Vergleichung beider für das Verhältniss der Bogendifferentiale gefundenen Formeln liefert:

$$t_2 = \frac{d_2^2}{p_1} \sin \chi_3,$$

eine sich auch aus der Figur leicht ergebende Gleichung. $\frac{p_1}{\sin \chi_2}$ bedeutet den Abschnitt der π_1 auf d_2 .

Wenn endlich k_1 in die Directrix fällt, geht die reciproke Curve k_2 in die Strictions- oder Rückkehrcurve der abwickelnden Fläche über. deren Krümmungen und Bogendifferential sich also nach den vorstehenden Formeln aus denen der abzuwickelnden Curve k_1 bestimmen. Setzt man in die Formel $tg H_2 = \frac{d_1^6}{a_0^2} \frac{d_1^6}{b_0^2} \frac{p_1}{c_0^2} \frac{p_1}{\varrho_1} \sin^3 \psi_2$ für ϱ_1 seinen Werth $\frac{d_1^2}{p_2} \sin (\pi_1 \pi_2)$, so ergiebt sich:

$$tg\,H_2=\frac{\varrho_1\,sin^3\,\psi_2}{t_2\,sin\,\chi_2},$$

welche für die Abwickelung irgend eines Curvenelements von einer beliebigen Fläche giltige Gleichung wie Formel 1) durch die Betrachtung des abwickelnden Kegels abgeleitet werden kann. Hierbei ergiebt sich weiter die Gleichung:

13)
$$\frac{ds_1}{d\theta_2} = \frac{ds_1}{ds_2} \varrho_2 = \frac{t_2}{\sin \psi_2},$$

welche Beziehung mit den früheren Gleichungen übereinstimmt. falls für ez der sich nach dem Vorstehenden ergebende Werth eingesetzt wird.

In sämmtlichen Formeln dieses Paragraphen treten p_1 , p_2 und die vorkommenden Sinus als positive Grössen ein, so dass mit der Wahl eines Vorzeichens für ds_1 die weiteren Variablen der Grösse und Richtung nach bestimmt sind. Für eine parabolische Directrix, für welche die Durchmesser p_1 und p_2 unendlich werden und daher die Gleichungen in unbestimmter Form auftreten. lassen sich durch sehr einfache Grenzbetrachtungen statt der Durchmesser die Parameter der durch die Hauptaxe gelegten Schnitte $\lim_{a=\infty} \frac{d^2}{a}$, statt der Entfernungen p_1 und p_2 die Winkel der Schmiegungsebenen n_1 und n_2 mit dem Durchmesser der Directrix einführen. Hierbei ergiebt sich in entsprechender Weise wie für ebene Systeme der Satz:

Das Product aus den Windungsradien zweier parabolischreciproken Curvenelemente bildet den reciproken Werth aus dem geometrischen Mittel der Krümmungsmaasse in denjenigen Punkten der Directrix, welche mit den Curvenelementen in einen Durchmesser fallen.

Wird die Directrix eine Kugelfläche mit dem Radius a_0 , so wird $\varphi_1 + \pi_1 = 90^\circ$, $\varphi_2 + \psi_2 = 90^\circ$, daher die in Formel 5) gefundene Beziehung für das Doppelschnittsverhältniss der reciproken Tangenten:

$$tg \, \psi_1 \cdot tg \, \psi_2 = \frac{a_0^2}{p_1 \, p_2} = \frac{1}{\cos(P_1 S \, P_2)}$$

v Formeln nehmen folgende Gestalt an.

1. Für beliebige Lage eines Curvenelements:

$$\begin{aligned} \varrho_1 \, tg \, H_2 &= p_1 \left(\frac{\sin \psi_2}{\cos \psi_1}\right)^3, \quad \varrho_2 \, tg \, H_1 = p_2 \left(\frac{\sin \psi_1}{\cos \psi_2}\right)^3, \\ R_1 \, R_2 &= \frac{a_0^6}{p_1^2 \, p_2^2} = \left(\frac{a_0}{\cos \left(\dot{P}_1 \, S \, P_2\right)}\right)^2. \end{aligned}$$

2. Fails ein Curvenelement die Directrix berührt:

$$\varrho_1 tg H_2 = p_1, \quad \varrho_2 tg H_1 = \frac{a_0^4}{p_1^3}, \quad R_1 \cdot R_2 = \frac{a_0^4}{p_1^2}, \quad \frac{ds_1}{ds_2} = \frac{p_1^3 R_1}{a_0^3} = \frac{a_0}{R_2}$$

3. Liegt die Curve k_1 in der als Directrix benutzten Kugelfläche, so excitet sich aus der Formel $tgH_2 = \frac{p_1}{\varrho_1}$, dass die abwickelnde Regelfläche stels normal zu dem Kegel steht, welcher durch k_1 und den Mittelpunkt S elegt wird, welche Folgerung sich auch unmittelbar aus der Figur hertet. k_2 ist bekanntlich in diesem Falle eine geodätische Linie eines durch und Kugelmittelpunkt als Scheitel gelegten Kegels. —

Die für die Abwickelung einer Curve von einer Fläche zweiter Ordnung ≪onnenen Formeln werden im Nachstehenden für die Betrachtung der Immungslinien solcher Flächen Verwendung finden. In einem Punkte P \blacksquare igen sich die drei confocalen Flächen F', F'', F''', deren primäre halbe A ren bezüglich mit a', a'', a''' bezeichnet seien, durchschneiden; die Durchschnittscurve der Flächen F' und F'' werde mit k_{12} , der Flächen F' und F'''mit k18 angedeutet. Aus der Eigenschaft confocaler Systeme, dass für jeden Punkt die Hauptebenen der durch die Flächen des Systems in ihm inducir-Polarsysteme coincidiren, folgt, dass sich F', F'', F''' in P orthogonal durchschneiden und daher k_{12} normal zu F''' steht. Wird k_{12} von F'' ab-Sewickelt, so bilden die Erzeugenden der Abwickelungsfläche ein System Von Normalen zu F', von welchen sich zwei benachbarte bis auf unendlich Leine Grössen dritter Ordnung schneiden. Der Schnittpunkt zweier derartiger benachbarter Normalen heisse M'12; derselbe bildet den Krümmungs**mittelpunkt** des k_{12} tangirenden Normalschnittes auf F'. Der Krümmungsius dieses Normalschnittes werde mit ρ'12, der Krümmungsradius eines andern durch P gelegten Hauptschnittes auf einer der drei Flächen durch enteprechende Indices bezeichnet. Rücken wir auf k_{12} von P aus um eine endlich kleine Strecke nach derjenigen Richtung fort, welche ausserhalb fallt, und bilden alsdann für den zu P benachbarten Punkt gleichfalls die Normale zu F'. Die zur neuen Normalen bezüglich einer der Flächen, **also** auch bezüglich der F''', conjugirte Gerade fällt in die Tangentialebene den neuen Punktes an F'. Um die conjugirte Gerade zu finden, ziehen wir beliebige Tangente dieser Ebene, welche F''' schneidet. Hierbei bilden sich auf der Tangente im Polarsystem von F''' vier harmonische Punkte, welchen drei unendlich nahe liegen; bis auf Grössen höherer Ordnung wird also die Strecke zwischen dem Berührungspunkte und dem diese

züglich F''' conjugirten Punkte von F''' halbirt, und hieraus folgt, dass die Gerade, welche sich durch diesen conjugirten Punkt und den ursprünglichen Punkt P legen lässt, stets nur einen unendlich kleinen Winkel mit der an F' gelegten Tangente bilden kann. Der geometrische Ort der erwähnten conjugirten Punkte ist die zur Nachbarnormalen conjugirte Gerade, die hierdurch und P gelegte Ebene daher die Polarebene des Schnittpunktes M'_{12} , in welchem sich diese benachbarten Normalen treffen, bezüglich F'''; und da nach dem Vorstehenden diese Polarebene in der Grenze mit der Tangentialebene an F' in P zusammenfällt, ergiebt sich in synthetischer Herleitung der bekannte Satz:

Die Hauptkrümmungscentra sind die Pole der Tangentialebenen in Bezug auf die beiden durch den Berührungspunkt gehenden confocalen Flächen.

 M'_{12} fällt also mit dem Pol der Tangentialebene an F' bezüglich F''', M'_{13} mit dem Pol dieser Ebene bezüglich F'' zusammen.

Wird die Krümmungscurve k_{12} von F'' abgewickelt, so bilden die Erzeugenden der Abwickelungsfläche als Normalen zu F' eine der von Mannheim als "Normalie" bezeichneten Flächen*. Die Strictionscurve dieser Normalie ist also der Ort der Krümmungscentra M'12; derselbe ist bekanntlich eine geodätische Linie auf der zu F' gehörigen Centrafläche. Die Normale zu F' berührt diese Centrafläche ausser in M'_{12} noch in M'_{12} , welchem letztern Punkte die Tangentialebene 7, als Polarebene in Bezug auf F'' entspricht. Und da diese Ebenen z' die Fläche zweiter Ordnung F'umhüllen, so liegen auch diese Krümmungscentra M'18 auf einer Fläche zweiter Ordnung, nämlich der Reciproken von F' bezüglich F'' als Directrix. Hierbei entspricht dem Punkte P, zu F' gerechnet, in der Reciproken die Ebene τ'' , welche die Fläche der zu F' gehörigen Krümmungscentra in M'13 berührt. Demuach bildet die betrachtete Normalie die Abwickelungsfläche einer Schaar Flächen zweiter Ordnung, und hiernach ist der geometrische Ort der Krümmungscentra M'13 eine Raumcurve vierter Ordnung, längs welcher sich die Centrafläche zu F', die Normalie und eine Fläche zweiter Ordnung (nämlich die ebenerwähnte Reciproke zu F' in Bezug auf F'') berühren.

Dem Hauptschnitte längs k_{12} gehört auf F'' Punkt M''_{12} als Krümmungscentrum an. Wickeln wir mit Hilfe der Tangentialebene τ''' an F''' die geodätische Linie der M'_{12} von der eben genannten Centrafläche ab, so erhalten wir in der Geraden $|M'_{12}M''_{12}|$ eine Erzeugende der an die Centrafläche längs der geodätischen Linie geführten Developpabeln, welche auch die zu F'' gehörige Centrafläche in der durch M''_{12} gehenden, ebenfalls der Krümmungslinie k_{12} entsprechenden geodätischen Linie berührt. Für die Centrafläche der F' sind, da $|M'_{12}M''_{12}|$ ein Curvenelement derselben

nuheim, Cours de Géométrie Descriptive, p. 273.

längs der Normalen | PM'_{12} | abwickelt, diese Normale und | $M'_{12}M''_{12}$ | conjugirte Tangenten.

Wird diese beide Centraflächen einhüllende Developpable abgewickelt, so gehen die erwähnten geodätischen Linien der Centraflächen in zwei zu einander senkrechte gerade Linien, die Normalen zu F' und F'', über. Da die abwickelnden Ebenen die Normalebenen der Krümmungslinie k_{12} bilden, fallen die Erzeugenden | M'12 M"12 | mit den Krümmungsaxen, die Strictionscurve der aus ihnen gebildeten Developpabeln mit dem geometrischen Ort für die Centra der Schmiegungskugeln dieser Krümmungslinie zusammen. Durch diese Betrachtung ist ein ₩eg gebahnt, um den Krümmungs- und Windungsradius wie das Centrum der Schmiegungskugel für k_{12} aufzufinden.

Wir bezeichnen im Folgenden:

mit t_{12} , π_{12} , R_{13} , ds_{12} die Tangente, die Schmiegungsebene, den Windungsradius und das Bogenelement der Krümmungslinie k_{12} ;

mit p', p'', p''', p_{12} die stets positiv zu rechnenden Entfernungen der Tangentialebenen τ' , τ'' , τ''' und der Schmiegungsebene π_{12} vom Mittel-

mit d'_{13} , d''_{23} die in den Flächen F', F'' parallel den zu t_{12} senkrechten Tangenten dieser Flächen gezogenen Halbmesser.

Den Krümmungsradius von k_{12} erhalten wir in der vom Punkte P auf die Krümmurgsaxe $|M'_{12}|M''_{12}|$ gefällten Senkrechten. Projicirt man p' und P auf diese Gerade, so folgt:

$$p'q'_{12} - p''q''_{12} = |M'_{12}M''_{12}|p_{12}.$$

Nach den bekannten Formeln ist:

$$e'_{12} = \frac{a'^2 - a'''^2}{p'}, \quad e''_{12} = \frac{a''^2 - a'''^2}{p'''}, \quad d'_{13}{}^2 = a'^2 - a''^2 = -d''_{23}{}^2.$$

daher:

$$p_{12} = \frac{d'_{13}^2}{|M'_{12}|},$$

welche Formel die Entfernung der Schmiegungsebene π_{12} von S bestimmt. Behufs der Bestimmung des Windungsradius R_{12} gehen wir von den

Gleichungen aus:
$$e'_{12} = \frac{a'^2 - a'''^2}{p'} \quad \text{und} \quad p'^2(a'^2 - a'''^2) = Const. \ \text{längs} \ k_{12},$$
 daher länge dieser Krümmungslinie:

daher längs dieser Krümmungslinie:

$$e'_{12} = \frac{Const.}{p'^3}$$
 und $de'_{12} = -3 \frac{Const.}{p'^4} dp'.$

Aus der Figur folgt $dp' = p''' d\sigma$, wo $d\sigma$ die Projection des zur Krüm**mungslinie** k_{ij} gehörigen Contingenzwinkels auf die Ebene τ'' bedeutet, also $ds_{12} = \frac{ds_{12}}{s_{12}}$ ist. Hiernach wird:

Figur folgt $\delta p' = p'' \frac{ds_{13}}{\varrho'_{13}}$, daher $\delta \varrho'_{12} = -\frac{a'^2 - a'''^2}{p_1^2} p'' \frac{ds_{13}}{\varrho'_{12}} = -\frac{p''}{p'} \frac{\varrho'_{12}}{\varrho'_{12}} ds_{13}$. Die Abweichung der Krümmungslinie k_{13} von der Ebene τ''' ist $\frac{ds_{13}^{2}}{2a'''}$, de 1nach die Abweichung der Centrafläche in dem zu M'18 benachbarten Punkte $d\nu = \frac{\varrho'_{13} - \varrho'_{12}}{\varrho'_{13}} \frac{ds_{13}^2}{2\varrho''_{13}}$ oder $d\nu = \frac{p'''}{p'} \frac{ds_{13}^2}{2\varrho'_{13}}$. Der Kreisbogen zwischen den zwei betrachteten unendlich nahen Normalen ist gleich $\frac{e_{13} - e_{12}'}{c} ds_{13} =$ $-\frac{p''}{p'}\frac{\varrho''_{13}}{\varrho'_{13}}ds_{13}$. daher die Entfernung der benachbarten Punkte der Centrafläche als Hypotenuse des aus diesem Bogen und de 12 gebildeten rechtwinkligen Dreiecks gleich $\frac{p''}{p'} \frac{|M'_{12} M''_{12}|}{q'_{13}} ds_{13}$ und somit der Krümmungsradius des durch diese Strecke gelegten Normalschnittes der Centrafiäche gleich $\frac{p''^2}{p'p''} = \frac{q'_{12}^2 + q''_{12}^2}{q'_{13}}$. Für die Neigung dieses Normalschnittes gegen die nach dem Krümmungsmittelpunkte M'_{12} gerichtete Normale der F' ergiebt sich $\frac{\varrho''_{12}}{\varrho''_{12}}$; der Normalschnitt geht also durch $|\pmb{M'}_{12}\pmb{M''}_{12}|$, ist zu dem erstbetrachteten, in der Ebene z" liegenden Schnitte conjugirt und hiermit die Indicatrix der Centrufläche im Punkte M'12 bestimmt. Für das der Scheitelhöhe dv entsprechende Element der Indicatrix längs der Normalen von F'folgt $\sqrt{2P} dv = \frac{p'''}{p'} \sqrt{-3\frac{\varrho'_{12}}{\varrho'_{13}}} ds_{13}$. Falls der in diesem Ausdruck enthaltene Wurzelwerth imaginär wird, besitzen die Scheitelhöhe dv und die Bogenhöhe des letztberechneten Elements entgegengesetzte Richtung; die Indicatrix der Centrafläche wird also eine Hyperbel. Hiermit folgt:

Die sich entsprechenden Punkte auf einer Fläche zweiter Ordnung und ihrer Centrafläche sind stets verschiedener Art, so dass einem elliptischen Punkte ein hyperbolischer und umgekehrt entspricht.

Einem ebenen unendlich kleinen Schnitte oder der Indicatrix der einen kann daher niemals ein gleichfalls ebener Schnitt der andern Fläche entsprechen. Der ferner bei der vorstehenden Entwickelung benutzte Satz, dass | $M'_{12}M''_{12}$ | und die Normale von F' conjugirte Tangenten der Centrafläche sind, findet seine Verallgemeinerung in dem schon an anderer Stelle* hergeleiteten Gesetze, nach welchem die Verbindungslinie des Krümmungsmittelpunktes einer Krümmungslinie mit dem zugehörigen Krümmungscentrum der Fläche, also die von letzterem auf die Schmiegungsebene der Krümmungslinie gefällte Senkrechte, bezüglich der Centrafläche zur Normalen conjugirt ist.

^{*} Zeitschr. f. Math. u. Phys., Bd. XXVIII S. 56.

§ 4.

Die in § 1 gefundenen Formeln, obgleich für die Systeme reciproker Raumcurven entwickelt, haben eine weitergehende Bedeutung. Die Schnittlinie zweier sich folgenden Schmiegungsebenen bildet mit der Tangente den halben Contingenzwinkel; dies berücksichtigend, gelten die dort gebildeten Gleichungen überhaupt für die unendlich kleinen Ortsveränderungen reciproker Elemente.

Wir recapituliren die gebrauchten Bezeichnungen nochmals. Bedeuten P_1 und P_2 zwei conjugirte Punkte, π_2 und π_1 deren Polarebenen, t_1 und t_2 zwei in π_1 bezüglich π_2 liegende, durch P_1 bezüglich P_2 gehende gerade Linien; $d\vartheta_1$, $d\vartheta_2$ die sich entsprechenden unendlich kleinen Drehungen dieser Geraden in der Ebene π_1 , π_2 um P_1 , P_2 ; $d\eta_1$, $d\eta_2$ die Neigung (der Torsionswinkel) zweier durch diese Geraden gelegten, von π_1 und π_2 unendlich wenig abweichenden Ebenen gegen π_1 und π_2 ; ds_1 und ds_2 die unendlich kleinen Entfernungen der den neuen Ebenen zugehörigen Pole von P_1 im ersten, bezüglich von P_2 im zweiten System; ferner d den zur Schnittlinie $|\pi_1\pi_2|$ parallele Halbmesser der Directrix, O die Spur dieser Schnittlinie mit der zu d conjugirten Durchmesserebene $[P_1SP_2]$; φ_1 , ψ_1 die Winkel der Geraden t_1 mit OP_1 und $|\pi_1\pi_2|$; φ_2 , ψ_2 die entsprechenden Grössen für t_2 , so gelten, wenn wir noch der Kürze wegen die Winkel von $|\pi_1\pi_2|$ mit OP_1 und OP_2 durch μ_1 und μ_2 bezeichnen, nach § 1 folgende Formeln:

$$\begin{split} \frac{\sin\psi_{1} \cdot \sin\dot{\psi}_{2}}{\sin\varphi_{1} \cdot \sin\varphi_{2}} &= \frac{a_{0}^{2} b_{0}^{2} c_{0}^{2}}{d^{4} p_{1} p_{2} \sin\mu_{1} \sin\mu_{2}}, \\ \frac{ds_{1}}{d\vartheta_{1}} \cdot \frac{d\vartheta_{2}}{d\eta_{2}} &= \frac{a_{0} b_{0} c_{0}}{p_{1}^{1/2} p_{2}^{3/2}} \left(\frac{\sin\mu_{1} \sin\varphi_{2} \sin\psi_{2}}{\sin\mu_{2} \sin\varphi_{1} \sin\psi_{1}} \right)^{3/2}, \\ \frac{ds_{1}}{d\eta_{1}} \cdot \frac{ds_{2}}{d\eta_{2}} &= \frac{a_{0}^{2} b_{0}^{2} c_{0}^{2}}{p_{1}^{2} p_{2}^{2}}, \\ \frac{ds_{1} \cdot d\vartheta_{1} \cdot d\eta_{1}}{ds_{2} \cdot d\vartheta_{2} \cdot d\eta_{2}} &= \frac{p_{1}}{p_{2}}, \end{split}$$

wo a_0 , b_0 , c_0 die halben Hauptaxen der Directrix, p_1 , p_2 die Entfernungen der Ebenen n_1 , n_2 vom Mittelpunkte S der Involution sind. Aus diesen Gleichungen folgt:

$$\begin{split} \frac{d\,\vartheta_{1}}{d\,\vartheta_{1}} &= \frac{\sin\mu_{1}\,\sin\varphi_{2}\,\sin\psi_{2}}{\sin\mu_{2}\,\sin\varphi_{1}\,\sin\psi_{1}}\,,\\ \frac{d\,s_{1}}{d\,\eta_{2}} &= \frac{a_{0}\,b\,\,c}{p_{1}^{\;\prime}\,'}\,\int_{1}^{l_{1}} \left(\frac{\sin\mu_{1}\,\sin\varphi_{2}\,\sin\psi_{1}}{\sin\mu_{2}\,\sin\psi_{1}}\right)^{l_{2}}\,,\\ \frac{d\,s_{2}}{d\,\eta_{1}} &= \frac{a_{0}\,l\,\,c_{0}}{p_{1}^{\;4}\,\,\frac{1}{2}^{\;l_{2}}}\left(\frac{\sin\mu_{2}\,\sin\varphi_{1}\,\sin\psi_{1}}{\sin\mu_{1}\,\sin\varphi_{2}\,\sin\psi_{2}}\right)^{l_{2}}\,, \end{split}$$

welche Beziehungen sich auch in die fortlaufende Proportion zusammenfassen.

$$18) = \frac{ds_{1}}{p_{1}^{1/2} \left(\frac{\sin \varphi_{1} \sin \psi_{1}}{\sin \mu_{1}}\right)^{3/2}} \cdot \frac{a_{0} b_{0} c_{0}}{p_{1}^{2}} d\eta_{1} : \frac{du}{\left(p_{1} \frac{\sin \varphi_{1} \sin \psi_{1}}{\sin \mu_{1}}\right)^{1/2}} \\ = \frac{a_{0} b_{0} c_{0}}{p_{2}^{2}} d\eta_{2} : \frac{d\vartheta_{2}}{p_{2}^{1/2} \left(\frac{\sin \varphi_{2} \sin \psi_{2}}{\sin \mu_{2}}\right)^{1/2}} : ds_{2} : \frac{du}{\left(p_{2} \frac{\sin \varphi_{2} \sin \psi_{2}}{\sin \mu_{2}}\right)^{1/2}},$$

wo du irgend eine Urvariable bedeutet.

Die zu $d\vartheta_1$ gehörige Richtung von $d\vartheta_2$ bestimmt sich am einfachsten durch die auf $|\pi_1\pi_2|$ durch t_1 und t_2 gebildete Involution, wodurch auch die Vorzeichen von $sin\varphi_1$ und $sin\varphi_2$ bestimmt sind; die Richtung von ds_2 entweder durch die auf t_2 inducirte Involution oder nach dem durch Formel 11) entwickelten Satze über das Verhältniss entsprechender Abstände in reciproken Systemen. $p_1, p_2, sin\mu_1, sin\mu_2, sin\psi_1$ und $sin\psi_2$ werden stets positiv genommen. (Vergl. S. 138.)

Für ebene involutorisch-reciproke Systeme findet man:

$$ds_1: \frac{a_0^2 b_0^2}{p_1^2 p_2} d\vartheta_1: du = \frac{a_0^2 b_0^2}{p_1 p_2^2} d\vartheta_2: ds_2: du,$$

wo p_1 , p_2 wieder die Entfernungen der entsprechenden Tangenten vom Involutionscentrum bedeuten. —

Nach dieser vorgängigen Entwickelung wenden wir uns zur Betrachtung reciproker Flächen. Lassen wir bei der ersten Fläche Φ_1 die Tangentialebene längs einer Curve k_1 gleiten, so bilden die den Tangentialebenen reciproken Punkte auf der entsprechenden Fläche Φ_2 eine zweite Curve k_2 ; in diesem Sinne können wir sagen, dass jedem Punkte auf Φ_1 ein solcher auf Φ_2 , jeder Curve k_1 auf Φ_1 eine solche k_2 auf Φ_2 entspreche. Die Tangente an k_1 als Verbindungslinie unendlich naher Punkte auf Φ_1 entspricht hierbei der Schnittlinie benachbarter Berührungsebenen längs k_2 .

Bei sich entsprechenden Curven zweier reciproken Flächen sind die Tangenten der einen Curve reciprok zu den, den Elementen der entsprechenden Curve conjugirten Richtungen.

Hieraus ergiebt sich sofort:

Die in entsprechenden Punkten zweier reciproken Flächen durch deren Tangenten gebildeten Strahlbüschel sind projectivisch verwandt, und zwar entspricht einer Asymptote der einen eine Asymptote der projectivischen Strahlinvolution.

Da hiernach zu einer reellen Haupttangente an Φ_1 eine gleiche an Φ_2 reciprok ist, folgt:

Bei zwei reciproken Flächen entspricht einem elliptischen oder hyperbolischen Punkte der einen stets ein Punkt gleicher Art auf der zweiten Fläche; hiernach ist die Reciprokalfläche einer Regelfläche wieder eine Regelfläche.

Da die Ordnung und Classe einer Regelfläche stets durch dieselbe Zahl ausgedrückt werden, ist der Grad der Reciprokalfläche gleich dem der erstgegebenen Regelfläche, ein von Cayley aufgefundener Satz.

Im Punkte einer Fläche fallen drei Schnittpunkte für jede Haupttangente dieses Punktes zusammen; nach dem Vorstehenden coincidiren in der Tangentialebene eines Flächenpunktes drei durch eine Haupttangente desselben an die Fläche gelegte Berührungsebenen.

Legen wir durch \mathcal{O}_1 in unendlich kleinem Abstande zweiter Ordnung won der Tangentialebene π_1 eine hierzu parallele Schnittebene, so entspricht dieser im reciproken System ein der Fläche \mathcal{O}_2 unendlich naher Punkt, aus welchem sich ein reeller Tangentialkegel an letztere Fläche legen lässt, dessen halbe Oeffnung unendlich wenig von einem Rechten abweicht und dessen Berührungseurve mit \mathcal{O}_2 bis auf Grössen höherer Ordnung ein zur Indicatrix in π_2 ähnlicher Kegelschnitt ist, dessen Ebene bis auf einen Winkel zweiter Ordnung zur Tangentialebene π_2 parallel ist. Da nun π_2 die Höhe dieses Kegels zwischen seinem Scheitelpunkte und letzterer Ebene halbirt, folgt unter Benutzung des S. 137 hergeleiteten Satzes:

Einem unendlich kleinen ebenen Schnitte der einen entspricht ein gleichartiger ebenfalls ebener Schnitt der Reciprokalfläche; die Scheitelhöhen derartiger sich entsprechenden unendlich kleinen Flächentheile verhalten sich wie die Entfernungen ihrer Tangentialebenen vom Mittelpunkte der Involution.

Der vorstehende Satz wird für diejenigen Flächenpunkte, welche in einer der Haupttangente benachbarten Richtung liegen, hinfällig. Für dertige Punkte gilt überhaupt der Satz nicht mehr, dass sie bis auf Grössen beberer Ordnung in einem der Indicatrix ähnlichen Kegelschnitte liegen.

Um eine Beziehung zwischen den Krümmungen sich entsprechender schendifferentiale zu gewinnen, gehen wir von den Coordinatengleichungen selben aus. Als Z-Axe werde in beiden Systemen die bezügliche Flännormale, als X- und Y-Axe zwei sich entsprechende Paare conjugirter schentangenten gewählt; es mögen sich also die Richtungen von X_1 und X_2 und X_3 auf den reciproken Flächen entsprechen, in welchem Falle und X_3 , X_1 und X_2 reciproke Gerade sind. Hiernach laute die Gleichge von \mathcal{O}_1 :

$$s_1 = \frac{r_1}{2} x_1^2 + \frac{s_1}{2} y_1^2 + \dots$$

diejenige von Φ_2 :

$$z_2 = \frac{r_2}{2} x_2^2 + \frac{s_2}{2} y_2^2 + \dots$$

Nach dem eben gefundenen Satze über die Scheitelhöhen reciproker Elemente

$$\frac{\frac{r_1}{2}x_1^2 + \frac{s_1}{2}y_1^2}{p_1} = \frac{\frac{r_2}{2}x_2^2 + \frac{s_2}{2}y_2^2}{p_2},$$

wo p_1 und p_2 nach früherer Bezeichnung die Ehtfernung der Tangentialebenen n_1 und n_2 vom Involutionsmittelpunkte darstellen. Da für $y_1 = 0$ auch

nach der Wahl der Coordinatensysteme $y_2 = 0$ wird, kommt $\frac{x_1}{x_2} = \sqrt{\frac{r_2 p_1}{r_1 p_2}}$

Anderseits erhält man, wenn der Berührungspunkt der Tangentialebene an Φ_2 längs X_2 um x_3 verschoben wird, als Gleichung der letztern:

$$z-z_2=r_2x_2(x-x_2)$$
,

demnach als Torsionswinkel der um Y_2 gedrehten Tangentialebene gegen π_2 :

$$d\eta_2 = \frac{r_2 x_2}{\sin(X_2 Y_2)}$$

Dieser Drehung um Y_2 entspricht im ersten System die Verschiebung $ds_1 = x_1$ längs X_1 ; daher wird nach Formel 18) in abgekürzter Schreibweise:

$$\frac{ds_1}{d\eta_2} = A_{x_1y_2},$$

wo sich die in $A_{x_1y_1}$ auftretenden Winkelgrössen φ_1 , ψ_1 auf X_1 als Verschiebungs-, φ_2 , ψ_2 auf Y_2 als Drehaxe beziehen; oder:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{r_2}{\sin(X_2 Y_2)} \cdot A_{x_1 y_2}.$$

Der Vergleich mit dem vorhin entwickelten Werthe für $\frac{x_1}{x_2}$ giebt:

$$\sqrt{r_1r_2} = \sqrt{\frac{\overline{p_1}}{p_2}} \cdot \frac{\sin(X_2 Y_2)}{A_{x_1 y_2}}.$$

Die Krümmungsradien der Normalschnitte von Φ_1 und Φ_2 längs der Coordinatenaxen X_1 , Y_1 , X_2 , Y_2 seien ϱ_{x_1} , ϱ_{y_1} , ϱ_{x_2} , ϱ_{y_2} ; nach letzter Gleichung wird:

 $\sqrt{\overline{\varrho_{x_1}} \cdot \varrho_{x_2}} = \sqrt{\frac{\overline{p_2}}{p_1}} \cdot \frac{A_{x_1 y_2}}{\sin(X_2 Y_2)}$

Indem wir in dieser Gleichung einmal die Indices 1 und 2, dann x und y vertauschen, ergeben sich die entsprechend gebildeten Gleichungen:

$$\sqrt{\overline{\varrho_{x_1} \cdot \varrho_{x_2}}} = \sqrt{\frac{\frac{p_1}{p_2}}{p_2}} \cdot \frac{A_{x_1 y_1}}{\sin(X_1 Y_1)},$$

$$\sqrt{\overline{\varrho_{y_1} \cdot \varrho_{y_2}}} = \sqrt{\frac{\frac{p_2}{p_1}}{p_1}} \cdot \frac{A_{y_1 x_2}}{\sin(X_2 Y_2)},$$

$$\sqrt{\overline{\varrho_{y_1} \cdot \varrho_{y_2}}} = \sqrt{\frac{p_1}{p_2}} \cdot \frac{A_{y_2 x_1}}{\sin(X_1 Y_1)}.$$

Nennen wir die sich entsprechenden unendlich kleinen Drehungen der Xund Y-Axen innerhalb der Berührungsebenen $d\vartheta_{x_1}$, $d\vartheta_{y_1}$, $d\vartheta_{x_2}$, $d\vartheta_{y_3}$, so
können diese vier Gleichungen nach 18) auch geschrieben werden:

$$\sqrt{\varrho_{x_{1}} \cdot \varrho_{x_{2}}} = \frac{a_{0} b_{0} c_{0}}{p_{1} p_{2} \sin(X_{2} Y_{2})} \cdot \sqrt{\frac{d \vartheta_{y_{1}}}{d \vartheta_{x_{1}}}},
\sqrt{\varrho_{x_{1}} \cdot \varrho_{x_{2}}} = \frac{a_{0} b_{0} c_{0}}{p_{1} p_{2} \sin(X_{1} Y_{1})} \cdot \sqrt{\frac{d \vartheta_{y_{1}}}{d \vartheta_{x_{2}}}},
\sqrt{\varrho_{y_{1}} \cdot \varrho_{y_{2}}} = \frac{a_{0} b_{0} c_{0}}{p_{1} p_{2} \sin(X_{2} Y_{2})} \cdot \sqrt{\frac{d \vartheta_{x_{2}}}{d \vartheta_{y_{1}}}},
\sqrt{\varrho_{y_{1}} \cdot \varrho_{y_{2}}} = \frac{a_{0} b_{0} c_{0}}{p_{1} p_{2} \sin(X_{1} Y_{1})} \cdot \sqrt{\frac{d \vartheta_{x_{1}}}{d \vartheta_{y_{2}}}}.$$

Die Gleichsetzung der ersten und zweiten oder der dritten und vierten dieser Gleichungen liefert die Proportion:

$$\frac{d\vartheta_{y_1}}{\sin\left(X_2\,Y_2\right)} : \frac{d\vartheta_{x_1}}{\sin\left(X_1\,Y_1\right)} = \frac{\sin\left(X_2\,Y_2\right)}{d\vartheta_{x_1}} : \frac{\sin\left(X_1\,Y_1\right)}{d\vartheta_{y_1}},$$

welche Proportion auch aus der Projectivität der reciproken Strahlbüschel der Tangenten hätte erschlossen werden können.

Die Multiplication aller vier Gleichungen liefert:

20)
$$\varrho_{x_1} \cdot \varrho_{y_1} \cdot \sin^2(X_1 Y_1) \cdot \varrho_{x_2} \cdot \varrho_{y_2} \cdot \sin^2(X_2 Y_2) = \frac{a_0^4 b_0^4 c_0^4}{p_1^4 p_2^4}$$

Das Product aus den totalen Krümmungen zweier reciproken Flächenelemente ist der vierten Potenz des Productes ihrer Entfernungen vom Involutionsmittelpunkte proportional

Bezeichnen wir die Absolutwerthe (Moduln) des geometrischen Mittels au_3 den Hauptkrümmungsradien für die beiden reciproken Flächen mit R_1 , R_2 . 80 folgt:

$$R_1.R_2 = \frac{a_0^2 b_0^2 c_0^2}{p_1^2 p_2^2}.$$

Für einen elliptischen Punkt bedeuten R_1 , R_2 die Radien zweier die Proken Elemente berührenden Kugeln, auf welche sich die erwähnten thenelemente abwickeln lassen; für einen hyperbolischen Punkt erhalten in R_1 und R_2 die Windungsradien der auf \mathcal{O}_1 und \mathcal{O}_2 verlaufenden zu einander reciproken asymptotischen Curven, deren Tangenten Schmiegungsebenen also mit den Haupttangenten und Berührungsebenen reciproken Flächen zusammenfallen. In der letztentwickelten Gleichung durch die Wahl des Vorzeichens in beiden Fällen die Richtung von R_1 and R_2 berücksichtigt. Für reelle asymptotische Linien folgen die vorstehenden Sätze ohne Weiteres aus Formel 6). Der vorstehend geführte Beweis ist von dieser Reellität unabhängig. Der Satz selbst liefert wieder eine Bestätigung für die Berechtigung des für die untersuchte Art der Abhängigkeit gewählten Namens der "Reciprocität"; bei gegebenen Tensentialebenen bleibt das Product aus den Krümmplächenelemente constant.

Sowohl aus den allgemeinen Beziehungen zwischen den Verschiebungen sich beliebig entsprechender Punkte, wie aus den bisherigen Entwickelungen folgt, dass sich die Schnittlinien beider reciproken Flächen mit einer ihrer Tangentialebene parallelen und unendlich nahen Ebene als affine Curven entsprechen. Für das Verhältniss entsprechender Flächentheile der beiden ebenen Systeme und hiermit für ihren Affinitätscoefficienten folgt $\frac{p_1 R_1}{p_2 R_2}$; das Verhältniss entsprechender Bogendifferentiale ergiebt sich nach Seite 148:

$$\frac{x_1}{x_2} = \sqrt{\frac{\overline{p_1 \varrho_{x_1}}}{\overline{p_2 \varrho_{x_2}}}} -$$

Für Bogenelemente, welche die asymptotische Curve berühren, gelten diese Entwickelungen nicht mehr. In diesem Falle erhält man die entsprechenden Beziehungen, wenn man die Haupttangenten der Flächenelemente als Coordinatenaxen annimmt und, unter Berücksichtigung der Glieder dritter Ordnung, wieder von dem Satze über das Verhältniss zwischen den Entfernungen reciproker Elemente Gebrauch macht. Diese Rechnung liefert folgendes Resultat:

Das Verhältniss zweier entsprechenden, die Asymptoten berührenden Curvenelemente ist constant, also gleich dem nach Formel 10) oder 12) ausdrückbaren Verhältnisse zwischen den Bogendifferentialen der reciproken asymptotischen Curven.

Bezeichnen ferner $R^{(\mathbf{I})} \varrho^{(\mathbf{I})}$, $R^{(\mathbf{II})} \varrho^{(\mathbf{II})}$ die Windungs- und Krümmungsradien der berührenden, $R_1 \varrho_1$, $R_2 \varrho_2$ die entsprechenden Grössen für die einander reciproken asymptotischen Curven, so gilt noch folgende Gleichung:

$$\frac{\varrho_1}{\varrho^{(1)}} + \frac{\varrho_2}{\varrho^{(11)}} = 2.$$

Falls zwischen der betrachteten Curve und der Haupttangente an \mathcal{O}_1 bezüglich \mathcal{O}_2 eine zweipunktige Berührung stattfindet, fällt die Schmiegungsebene der ersteren ebenfalls in die Berührungsebene der Fläche und es finden die weiteren Gleichungen statt:

22)
$$R^{(1)} = \frac{R_1 \rho_1}{3\rho_1 - 2\rho^{(1)}}, \text{ bezüglich } R^{(11)} = \frac{R_2 \rho_2}{3\rho_2 - 2\rho^{(11)}}.$$

Wir entnehmen diesen Beziehungen einige Folgerungen.

Eine beliebige durch die Haupttangente gelegte Ebene schneidet $\boldsymbol{\theta}_1$ in einer diese Tangente osculirenden Curve, für welche also $\boldsymbol{\varrho}^{(1)} = \infty$ ist. Das reciproke Gebilde ist der aus einem Punkte der reciproken Asymptote an $\boldsymbol{\theta}_2$ gelegte Tangentialkegel, für dessen Berührungscurve sich nach dem Vorstehenden $\boldsymbol{\varrho}^{(11)} = \frac{\varrho_2}{2}$, $\boldsymbol{R}^{(11)} = \frac{R_2}{2}$, also beide Grössen als constant ergeben.

Falls die Spitze dieses Kegels in die Fläche Φ_2 selbst fällt, wird diese Betrachtung hinfällig. In diesem Falle ist die Sehne der Kegelberührungs-

curve zu deren Tangente conjugirt; und da die conjugirten Halbmesser einer Hyperbel bei der Annäherung an eine Asymptote in der Grenze mit dieser gleiche Winkel bilden, folgt, dass der Contingenzwinkel der asymptotischen Curve das arithmetische Mittel zu den unendlich kleinen Drehungen der einander conjugirten Sehne und Tangente, also $\frac{3}{4}$ des Contingenzwinkels der Kegelberührungscurve bildet. Für letztere ist daher $e^{(11)} = \frac{3}{4}e_2$ und somit $R^{(11)} = \frac{3}{4}R_2$. Für das reciproke Gebilde, nämlich für den entsprechenden Zweig des Schnittes von Φ_1 mit der Berührungsebene, folgt $e^{(1)} = \frac{3}{4}e_1$, $e^{(1)} = \frac{3}{4}e_2$. Die Krümmungen der beiden durch einen hyperbolischen Flächenpunkt laufenden asymptotischen Curven bestimmen also in sehr einfacher Weise die Krümmungen in den sie berührenden Zweigen der erwähnten ebenen Schnitt- und der Kegelberührungscurve.

§ 5.

Die bisherigen Entwickelungen sind für den Fall, dass der betrachtete Flächenpunkt auf Φ_1 ein parabolischer (ein Wendepunkt) sei, zu ergänzen, wobei zunächst einige Eigenschaften der Fläche in der Nähe dieses Punktes entwickelt werden.

Die Gleichung einer Fläche in der Nähe eines parabolischen Punktes hann stets in der Form gegeben werden:

$$s = \frac{r}{2}x^2 + \left(\frac{t}{6}x^3 + \frac{u}{2}x^2y + \frac{w}{6}y^3\right) + \dots,$$

die Doppelasymptote des Wendepunktes zur Y-Axe und, was immer möglich ist, die X-Axe derart gewählt wurde, dass der Coefficient $\frac{v}{2}$ des Gliedes xy^2 verschwindet.

Sämmtliche Wendepunkte der Fläche bilden deren Wendecurve, welche die weitere Gleichung $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)^2 = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ erfüllt. Als zweite Gleichung dieser Curve erhalten wir hiernach:

$$r.wy = u^2x^2 + \dots$$

Die gewählte X-Axe ist also die Tangente der Wendecurve.

Wird aus einem beliebigen Punkte $\xi\eta$ der Berührungsebene ein Tangentialkegel an die Fläche gelegt, so ergiebt sich als zweite Gleichung winer Berührungscurve:

$$z = \frac{\partial z}{\partial x}(x - \xi) + \frac{\partial z}{\partial y}(y - \eta).$$

Die Ausführung der Rechnung liefert, indem wir uns auf die niedrigsten Potenzen beschränken:

$$r\xi x = -\frac{w}{2}\eta y^2 + \dots$$

Die Berührungscurve tangirt hiernach die Doppelasymptote: "" "" "nnkte

radius gleich $-\frac{r}{w \cdot m \sin(xy)}$, der Parameter längs der X-Axe $\left(\lim \frac{y^2}{2x}\right)$ gleich $-\frac{r}{wm}$. Das Strahlbüschel der Tangenten durch den Wendepunkt ist der Punktreihe der Krümmungsmittelpunkte projectivisch zugeordnet; jede Tangente schneidet auf der zur X-Axe parallelen Geraden $y=-\frac{r}{w}$ den Parameter ab, welcher den Berührungscurven der aus ihren Punkten an die Fläche gelegten Tangentialkegel angehört. Die der Tangente der Wendecurve angehörigen Berührungscurven osculiren die Doppelasymptote.

Die vorstehende Entwickelung wird für $m = \infty$, also für die Punkte der Doppelasymptote, ungiltig. In diesem Falle ergiebt sich für die Berührungscurve die Gleichung:

$$\left(\frac{r}{2} - \frac{u}{2}\eta\right) - \frac{w}{2}\eta\left(\frac{y}{x}\right)^{2} + \dots = 0, \quad \left(\frac{y}{x}\right)^{2} = \frac{r - u\eta}{w\eta}.$$

Die Berührungscurve besitzt diesmal im parabolischen Punkte der Fläche einen isolirten oder Doppelpunkt, dessen Tangenten eine Involution mit der X- und Y-Axe als Asymptoten bilden. Die Doppelasymptote ist ein isolirter oder Doppelstrahl des Berührungskegels, dessen beide Mäntel einander osculiren, da ihre z-Ordinaten sich längs der X-Axe nur um Grössen dritter Ordnung von denjenigen der Wendecurve unterscheiden. Die Schmiegungsebene dieser Berührungscurve fällt im Allgemeinen nicht in die XY-Ebene, so dass auch der Tangentialkegel diese Ebene nicht osculirt. Falls die Zweige der Berührungscurve sich den Asymptoten der Involution nähern, geht die Schmiegungsebene in die Berührungsebene der Fläche über.

Die diesen Asymptoten entsprechenden Punkte der Doppelasymptote Y, nämlich $\eta=0$ und $\eta=\frac{r}{u}$, verlangen eine besondere Betrachtung. Für den ersten, also für den parabolischen Flächenpunkt selbst, ergeben sich die Gleichungen der Berührungscurve:

$$\frac{r}{2}x^2 + \frac{w}{3}y^3 + \dots = 0, \quad z = -\frac{w}{6}y^3 + \dots$$

Die Curve bildet längs des positiven oder negativen Theils der Y-Axe eine Schnabelspitze (Cuspidalpunkt), für welche die Schmiegungsebene mit der XY-Ebene zusammenfällt. Die Singularität stimmt mit derjenigen überein, welche der Schnitt der Fläche mit ihrer Berührungsebene im Wendepunkte zeigt.

Für den zweiten Ausnahmefall, $\eta = \frac{r}{u}$, wird für die Berührungscurve des Tangentialkegels gefunden:

$$\frac{wr}{2u}y^2 = \left(\frac{t}{3} - \frac{b_4}{6} \cdot \frac{r}{u}\right)x^3 + \dots,$$

wo $\frac{o_4}{6}$ den Coefficienten von x^3y in der Flächengleichung bedeutet. Die Curve bildet diesmal längs der X-Axe eine Spitze, deren Schmiegungsebene wieder in die Berührungsebene der Fläche fällt. Im Punkte $\eta = \frac{\tau}{\mu}$ selbst schneiden sich drei aufeinander folgende, längs der Wendecurve gelegte Berthrungsebenen der Fläche; derselbe gehört also der Cuspidallinie der sus den Doppelasymptoten gebildeten abwickelbaren Fläche an.

Die Discussion der Gleichung $\left(\frac{y}{x}\right)^3 = \frac{r - u\eta}{w\eta}$ zeigt, dass, wenn u und w gleiches Vorzeichen haben, $\frac{y}{\pi}$ für alle Punkte zwischen $\eta = 0$ und $\eta = \frac{r}{u}$ reell, für alle ausserhalb liegenden imaginär wird; besitzen aber uund w ungleiches Vorzeichen, so wird umgekehrt $\frac{y}{x}$ und hiermit der ngebörige Berührungskegel für die Punkte der Y-Axe zwischen 0 und imaginär, für alle Punkte ausserhalb dieser Strecke reell.

Für eine Regelfläche fallen die parabolischen Punkte in die unendlich serne Ebene. Die Fläche der Doppelasymptoten wird in diesem Falle durch den Ort der zur Regelfläche gehörigen Asymptoten, die Cuspidalcurve des letztern durch den geometrischen Ort der Centra der die Regelfläche osculirenden Hyperboloide ersetzt. —

Um das einem im Endlichen gelegenen Flächenwendepunkte entsprechende räumliche Gebilde zu erhalten, suchen wir zunächst im ebenen System das Curvenelement, welches dem eine Gerade osculirenden ebenen Curvenelement reciprok ist. Lautet die Gleichung des letztern für orthogomale Axen $y_1^3 = 3a_1x_1$, so ergiebt sich für den normalen Abstand der zur Wendetangente benachbarten Tangente vom Coordinatenanfangspunkte n_1 Bezieht man das reciproke Element gleichfalls auf orthogonale Axen, so dass seine Y-Axe dem Wendepunkte entspricht, so folgt:

$$x_2 = n_1 \frac{p_2}{p_1} = \frac{2}{3} \frac{y_1^3}{a_1} \cdot \frac{p_2}{p_1},$$

ferner für den Contingenzwinkel ϑ_2 des zweiten Elements: $\vartheta_2 = \frac{p_1 \, p_2^2}{a_0^2 \, b_0^2} \, y_1 \, ,$

$$\vartheta_2 = \frac{p_1 p_2^2}{a_0^2 b_0^2} y_1$$

und somit als Bedingung des zweiten Elements:

$$x_2 = \frac{2}{8} \frac{a_0^6 b_0^6}{a_1 p_1^4 p_2^5} \cdot \vartheta_2^3,$$

worsus sich dessen Gleichung in Coordinaten ergiebt:

$$y_2''_2 = \frac{1}{2}a_2x_2$$
, wo $a_2^2 = \frac{a_0^6 b_0^6}{a_1 p_0^4 p_0^6}$

Einem ebenen Curvenelement mit Wendepunkt $y_1^3 = 3a_1x_1$ entspricht als reciprokes Gebilde ein ebenes Element mit einem Cuspidalpunkte $y_2^{3_2} = \frac{3}{2}a_2x_2$.

Für eine räumliche Involution folgt, dass einem Kegel mit Wendeberührungsebene das Element einer ebenen Curve mit Cuspidalpunkt entspricht.

Hiernach lässt sich das dem parabolischen Punkte entsprechende Gebilde bestimmen. Rückt die Spitze des Berührungskegels auf einer beliebigen Tangente dieses Punktes (mit Ausnahme der Doppelasymptote) fort, so osculirt der Tangentialkegel die Berührungsebene der Fläche. Das reciproke Gebilde entsteht also durch die Bewegung eines Curvenelements mit Cuspidalpunkt; die Curve, welche zu der aus den Doppelasymptoten von Φ_1 gebildeten Developpabeln reciprok ist, bestimmt in der reciproken Fläche Φ_2 eine Cuspidalcurve, welche in dem früher erläuterten Sinne der Wendecurve auf Φ_1 entspricht.

Um die Gleichung der Fläche Φ_2 in der Nähe eines derartigen Cuspidalpunktes zu bestimmen, wählen wir die Tangente der Cuspidalcurve zur X-, die zur Tangente der Wendecurve auf Φ_1 reciproke Gerade zur Y-Axe und nehmen die Z-Axe in der Schmiegungsebene der Cuspidalcurve (letztere reciprok zum Punkte $\eta = \frac{r}{u}$) beliebig an. Je drei sich folgende Berührungsebenen an Φ_2 schneiden sich in einem Punkte y_0 der Y-Axe. Das Element der Cuspidalcurve habe die Gleichung $x^2 = 2pz$, so lautet die Gleichung des aus y_0 durch dieses Element gelegten Kegels:

$$2pz = y_0 \frac{x^2}{y_0 - y}.$$

Indem den Strahlen dieses Kegels eine Cuspidalspitze aufgesetzt wird, ergiebt sich als Gleichung der Fläche Φ_3 in der Nähe eines Punktes ihrer Cuspidalcurve:

 $2pz = y_0 \frac{x^2}{y_0 - y} - \sqrt{c}(y + ax^3 + \dots)^{1/2},$

wo a und c Constanten; oder nur die Glieder niedrigster Ordnung nehmend:

$$x^2 - 2pz = \sqrt{c}(y + ax^3)^{3/2}$$

Das Krümmungsmaass dieser Fläche und jedes durch den betrachteten Punkt gelegten Schnittes ist unendlich gross; eine Ausnahme bilden die Schnitte durch die Cuspidaltangente, deren Krümmungen endlich sind. Für den Coordinatenanfangspunkt wird:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)^2 = -\frac{3 \sqrt{c}}{8 p^2} \lim(y + ax^3)^{-\frac{1}{2}},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{3 \sqrt{c}}{8 p} \lim(y + ax^3)^{-\frac{1}{2}}.$$

Hieraus folgt durch · Transformation auf ein beliebiges Coordinaten-

Für jeden Punkt in der Cuspidalcurve einer Fläche werden Lie zweiten Ableitungen $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ und das Krümmungssess unendlich gross in der $\frac{1}{2}$ ten Ordnung eines Ausdrucks, elcher für die Cuspidalcurve verschwindet und in der Grenze Lie zur Cuspidalcurve conjugirte Entfernung des Punktes von lieser Curve darstellt. Das Verhältniss zwischen einer beliesigen linearen Verbindung der zweiten Ableitungen und dem Krümmungsmasse bleibt im Allgemeinen endlich.

Im Folgenden sind die sich auf die Singularitäten der Wende- und der Ihr entsprechenden (nicht reciproken) Cuspidalcurve beziehenden Sätze gegentabergestellt, wobei unter Osculation eine Berührung zweiter Ordnung, unter einer Cuspidalspitze die mittels der Gleichung $\lim \frac{y^3}{x^2} = Const.$ definirte Singularität verstanden wird. Unter der ganzen oder gebrochenen Ordnung einer Berührung ist die Ordnung des unendlich kleinen Winkels gemeint, welchen zwei aus dem Berührungspunkte der Curven gezogene, gegen Null convergirende gleiche Sehnen bilden.

Die Schnittcurve jeder die Doppelsymptote enthaltenden Ebene osculirt die Doppelssymptote im Wendepunkte der Fläche Φ_1 .

Der Bertihrungskegel aus jedem Punkte einer im Wendepunkte an die Fläche Φ_1 gelegten Tangente osculirt die Bertihrungsebene von Φ_1 im Wendepunkte.

Die Krümmung der Kegelberührungscurve ist für alle
Punkte einer solchen Tangente
im Wendepunkte constant, so
dass die Punktreihe der Krümmungsmittelpunkte dem Strahlbüschel der Tangenten des Wendepunktes projectivisch ist.

Der aus einem beliebigen Punkte der Cuspidaltangente an Φ_2 gelegte Berührungskegel besitzt in der genannten Tangente einen Cuspidalstrahl.

Jede durch einen Cuspidalpunkt gelegte Ebene schneidet Φ_2 in einer Curve mit Cuspidalpunkt. Die den letztern enthaltenden Schnittcurvenelemente des durch eine Tangente gelegten Ebenenbüschels werden alle durch dasselbe Element einer Kegelfläche, welcher der Cuspidalpunkt als Spitze, die Cuspidaltangente als Strahl angehört, von Φ_o abgewickelt, so dass die Krümmung dieser Kegelelemente (bezüglich die Punktreihe der Krümmungsmittelpunkte, welche den Schnitten der Kegelelemente mit einer Jeder Tangente im Wendepunkte einer Fläche (ausser der Doppelasymptote) ist also ein die Doppelasymptote im Allgemeinen zweipunktig berührendes Curvenelement conjugirt. beliebigen Ebene entsprechen) zum Strahlbüschel der Tangenten im Cuspidalpunkte projectivisch ist.

Jeder Tangente einer Fläche im Cuspidalpunkte (ausser der Cuspidaltangente) ist also ein die Cuspidaltangente im Allgemeinen als einfachen Strahl enthaltendes Kegelelement mit dem Cuspidalpunkt als Spitze conjugirt.

Ferner folgt aus dem letzten Satze:

Jedem die Doppelasymptote zweipunktig berührenden Curvenelement erster Ordnung in Φ_1 entspricht ein gegen die Cuspidaltangente geneigtes Curvenelement unendlich klein zweiter Ordnung in Φ_2 .

Als specieller Fall ergiebt sich:

Das zur Tangente der Wendecurve conjugirte Curvenelement osculirt die Doppelasymptote. Für die Erzeugende der die Cuspidalcurve von Φ_2 abwickelnden Fläche bildet das conjugirte Kegelelement längs der Cuspidaltangente einen Cuspidalstrahl.

Für die Punkte der Doppelasymptote bezüglich der Cuspidaltangente folgt:

Der aus einem beliebigen Punkte der Doppelasymptote an O, gelegte Berührungskegel zerfällt in zwei reelle oder imaginäre sich osculirende Zweige, welche bis auf Grössen dritter Ordnung das Element der Wendecurve enthalten und deren Berührungsrichtungen auf Φ_i eine hyperbolische Involution bilden, welcher die Doppelasymptote und die Tangente der Wendecurve als Asymptoten angehören. Die Doppelasymptote wird durch den Wendepunkt und ihren Schnitt-Punkt mit der benachbarten

Eine beliebige durch die Cuspidaltangente gelegte Ebene schneidet Φ_2 in der Nähe des Cuspidalpunktes in zwei reellen oder imaginären, sich osculirenden Curvenelementen, welche auf einem Cylinder liegen, dessen Strahlen mit der Erzeugenden der die Cuspidalcurve abwickelnden Fläche parallel laufen. Die zu den Elementen der Schnittcurven conjugirten Richtungen (in den Erzeugenden ihrer Abwickelungsflächen erhalten) bilden eine hyperbolische Involution, deren Asymptoten die Cuspioppelasymptote in zwei Abchnitte getrennt, so dass sich us den Punkten des einen nur eelle, aus denen des andern Abschnittes nur imaginäre Kegelzweige durch den Wendepunkt legen lassen.

daltangente und die dem Element der Cuspidalcurve conjugirte Richtung sind. Die
Berührungsebene der Fläche

\$\Phi_2\$ und die Schmiegungsebene
der Cuspidalcurve trennen die
Ebenen, welche die Fläche in
reellen Curvenelementen treffen, von den in imaginären
Zweigen schneidenden.

Demnach entspricht einem gegen die Doppelasymptote geneigten Curvenelement in Φ_1 ein die Cuspidaltangente im Allgemeinen zweipunktig berührendes Curvenelement gleicher Ordnung in Φ_2 .

Für die Grenzpunkte bezüglich Grenzebenen findet man:

Der Tangentialkegel aus einem parabolischen Punkte der Fläche hat mit deren Berührungsebene längs der Doppelasymptote eine Berührung dritter Ordnung. Seine Berührungscurve mit der Fläche Φ_1 bildet längs der Doppelasymptote einen Cuspidalpunkt in einem nicht ebenen Elemente.

Die Gleichung dieses Kegelelements $ext{tet}$ unter Anwendung der für $ext{dot}$ her gebrauchten Bezeichnungen:

$$x^4 = \frac{8w}{3r^2}y^3s.$$

Die Berührungscurve des aus dem inittpunkte zweier sich folgenden ppelasymptoten an die Fläche Φ_1 legten Tangentialkegels bildet längs wendecurve eine nicht in der bene liegende Cuspidalspitze. Die iden Zweige des Berührungskegels, seen Krümmung sich wieder durch in bis auf Grössen höherer als zweiter rinung von x in ihn fallende Element der Wendecurve ergiebt, beteint der Wendecurve ergiebt, beteint der Wendecurve ergiebt, beteint der kängs der als singulärer Stahl enthaltenen Doppelasymptote med böherer (gebrochener) Ordnung.

Die Tangentialebene der Fläche Φ_2 im Cuspidalpunkte schneidet die Fläche in einer Curve, welche den Cuspidalpunkt und die Cuspidaltangente als singuläre Elemente enthält. Die Abwickelungsfläche dieses Schnittes berührt längs der Cuspidaltangente die Berührungsebene der Fläche in einem Cuspidalstrahl.

Die Gleichung dieser Curve in der Nähe des Cuspidalpunktes lautet nach den auf S. 154 angewendeten Bezeichnungen;

$$x'' = c'' \cdot y$$
.

Die Schmiegungsebene der Cuspidalcurve schneidet die Fläche \mathcal{O}_2 in einer Curve, welche in der Nähe des Cuspidalpunktes in zwei die Cuspidalcurve osculirende Zweige zerfällt, die sich in dem der Schnittcurve als singulärer Punkt angehörigen Cuspidalpunkte nach höherer (gebrochener) Ordnung berühren. Ihre Abwickelungsfläche osculirt die der Cuspidalcurve längs der Erzeugenden (der Y-Axe).

Die Schnittcurve dieses Kegelelements mit der XZ-Ebene besitzt die Gleichung:

$$z = \frac{r}{2}x^2 + \frac{Const.r}{2\eta} \cdot x^{1/2},$$
wo
$$\eta = \frac{r}{u}, \quad Const. = \left(\frac{2ut - b_4r}{3wr}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

Endlich ergeben sich noch die Sätze:

Die Tangentialebene des parabolischen Punktes schneidet die Fläche Φ_1 in einer die Doppelasymptote berührenden Cuspidalspitze.

Die Gleichung dieser Schnittcurve heisst:

$$x^2-2ps=\sqrt{ca^3}.x^{1/2}$$
.

Sowohl aus dieser Gleichung wie aus der Betrachtung der Figur folgt, dass beide Zweige der Schnittcurve, entsprechend den beiden Zweigen des nebenstehend erwähnten reciproken Kegels, im Cuspidalpunkte abbrechen.

Der von einem Cuspidalpunkte an die Fläche Φ_2 gelegte Tangentialkegel osculirt die Berührungsebene dieses Punktes längs der Cuspidaltangente.

VII.

Ueber einige Flächen, welche Schaaren von Kegelschnitten enthalten.

Von

Dr. A. WEILER in Hottingen-Zürich.

1. Bringt man die Flächen zweiten Grades eines einstufigen Systems in Zuordnung mit den Ebenen einer Torse und schneidet man die entsprechenden Flächen und Ebenen, so entsteht eine Schaar von Kegelschnitten und als deren Gesammtheit eine Fläche. Sind die Ebenen der Torse n^{ter} Classe und die Flächen des Systems, von denen je μ durch einen Punkt gehen, je ν eine Ebene berühren, [1,1]-deutig aufeinander bezogen, so ist die Fläche der Kegelschnittschaar von der Ordnung $2n + \mu$.

Die Anzahl der Geradenpaare der Kegelschnittschaar ist gleich derjenigen der Ebenen der Torse, welche ihre entsprechenden Flächen berühren. Eine Ebene E der Torse berührt v Flächen F des Systems, denen v Ebenen E' der Torse entsprechen. Umgekehrt entspricht der Ebene E' eine Fläche F, an welche 2n Ebenen E der Torse gelegt werden können. Die "berührenden" Ebenen E und die "entsprechenden" Ebenen E' sind somit in $[2n, \nu]$ deutiger Beziehung; es sind $2n+\nu$ Ebenen, welche die ihnen entsprechen den Flächen berühren, und die Kegelschnittschaar enthält somit 2≈+v Paare von Geraden. — Ist im Falle der Berührung F eine Kegelfläche, so vereinigen sich die Geraden des Paares und man erhält auf der erzeugten Fläche eine Gerade mit stationärer Tangentialebene. Das Nämliche wird eintreten, wenn F in ein Ebenenpaar ausartet und die entsprechende Ebene E durch die Schnittlinie geht, oder wenn F zu einer Doppelebene wird. — Wenn eine Fläche F in zwei Ebenen E₁, E₂ zerfällt and ihr in der Torse die eine dieser Ebenen, E1, entspricht, so erniedrigt sich die Ordnung der entstehenden Fläche um 1 und die Zahl der Geraden-Pere in der Kegelschnittschaar um 2; E, berührt die entsprechende Fläche doppelt und giebt bei der Bestimmung der Geradenpaare eine doppelte (wegfallende) Coincidenz.

Wenn eine Curve c allen Flächen des Systems gemeinsam ist, so muss sie eine n-fache Curve der entstehenden Fläche $F^{2n+\mu}$ sein. Denn durch einen Punkt P auf c gehen n Ebenen E_1, \ldots, E_n der Torse, denen n Vehen F_1, \ldots, F_n des Systems entsprechen; durch P geh

P.

schnitte E_1F_1 , ..., E_nF_n , und keine anderen. Legt man in P an c und an E_iF_i die Tangenten, so bestimmen beide zusammen eine Tangentialebene an $F^{2n+\mu}$ in P. Diese stimmt überein mit der Tangentialebene in P an F_i , d. h.: die n Mäntel der Fläche $F^{2n+\mu}$ in einem Punkte P der n-fachen Curve c berühren die n Flächen zweiter Ordnung, welche den durch P gehenden Ebenen der Torse entsprechen. — So oft dieser Punkt P von c auf der durch die Torse gebildeten developpabeln Fläche liegt, fallen zwei dieser Tangentialebenen zusammen und P wird zu einem Pinchpunkt (hierbei abgesehen von den n-2 übrigen, durch P gehenden Mänteln). Ist c jener developpabeln Fläche aufgeschrieben, so ist sie eine Rückkehreurve der erzeugten Fläche.

2. Zu den hier erzeugten Flächen gehören immer die F^{2n+1} , welche eine n-fache Curve vierter Ordnung erster Species, c^4 , haben. Jede Fläche zweiter Ordnung F durch c^4 schneidet aus F^{2n+1} ausser c^4 einen Kegelschnitt heraus; hierdurch wird jeder Fläche F eine Ebene E zugeordnet, die auch jenen Kegelschnitt enthält. Die Torse jener Ebenen muss von der n^{ten} Classe sein, ihr Geschlecht ist gleich 0.

Für diese Fläche ergeben sich unmittelbar folgende Eigenschaften. Weil durch einen Punkt-im Raume nur eine Fläche des Büschels geht, so geht durch jeden Punkt auf F^{2n+1} nur ein Kegelschnitt der Schaar, durch einen Punkt auf c^4 deren n. Weil die von der Torse eingehüllte Developpable von der Ordnung 2(n-1) ist, so liegen auf c^4 im Ganzen 8(n-1) Pinchpunkte. Die Kegelschnittschaar enthält 2n+3 Geradenpaare, von denen höchstens vier aus coincidirenden Geraden bestehen können. Jeder Kegelschnitt der Schaar trifft c^4 in vier Punkten, jede Gerade in zweien. Eine beliebige Ebene der Torse schneidet F^{2n+1} in einem Kegelschnitt c^4 und in einer Curve c^{2n-1} . Beide schneiden sich in vier Punkten auf c^4 , welche n-1-fache von c^{2n-1} sind. Von sämmtlichen Schnittpunkten beider Curven sind ausser jenen vier nur noch zwei einfache, welche Berührungspunkte jener Ebene mit F^{2n+1} sind. Die Ebenen der Torse sind also doppelte, die der 2n+3 zerfallenden Kegelschnitte dreifache Tangentialebenen von F^{2n+1} .

Längs c^4 hat F^{2n+1} eine umschriebene Developpable, deren Classe bestimmt werden soll; wir untersuchen, wieviele ihrer Ebenen durch einen Punkt O des Raumes gehen. Sei P ein Punkt auf c^4 ; die Gerade OP wird in P von einer Fläche F des Büschels berührt, dieser entspricht eine Ebene E der Torse, welche c^4 in vier Punkten P' schneidet. Fällt einer dieser Punkte P' nach P, so erhält man jedesmal eine Ebene der gesuchten Developpabeln. Zu P' gehören nun n Ebenen E der Torse, denen n Flächen E entsprechen, an welche aus E im Ganzen E in E (in Punkten E) berührende Linien gehen. Die Beziehung der Punkte E, E ist also E umschriebene E developpable von der E classe ist.

Jede Gerade, welche c^4 zweimal schneidet, trifft F^{2n+1} noch einmal. Daher sind die Punkte der Fläche eindeutig auf die Strahlen der Congruenz der Secanten von c^4 bezogen, also im Allgemeinen auf eine Congruenz zweiter Ordnung sechster Classe.

Für n=1 entsteht eine Fläche dritter Ordnung F^3 ; die Torse ist jetzt ein Ebenenbüschel. Wenn seine Axe a die Grundcurve c^4 des Flächenbüschels schneidet, so ist der Schnittpunkt beider ein Doppelpunkt von F^3 , die Seiten des zugehörigen Berührungskegels ergeben sich sehr einfach als Schnittlinien projectiver Ebenenbüschel. Sind diese Ebenenbüschel in perspectiver Zuordnung, so wird der Knoten biplanar u. s. f. Umgekehrt führt jeder Büschel von Flächen zweiter Ordnung, dessen Grundcurve eine c^4 auf F^3 ist, auf eine Schaar von Kegelschnitten, deren Ebenen einen Büschel bilden.

Für n=2 entsteht eine Fläche F⁵, auf welcher nach Clebsch 64 nicht zu der Schaar gehörende Kegelschnitte liegen. Diese Fläche entsteht dadurch, dass man die Flächen zweiter Ordnung eines Büschels in projectivische Zuordnung bringt mit den Ebenen eines Kegels zweiter Classe. Unter den sehr zahlreichen Specialfällen soll hier nur einer näher betrachtet werden: Wir setzen voraus, der Kegel zweiter Classe K² sei ein doppelt projicirender Kegel der Grundcurve c⁴ des Flächenbüschels. Aus Nr. 1 folgt, dass jetzt c⁴ eine Rückkehrcurve von F⁵ ist. In bekannter Weise findet man: Die Torse der Tangentialebenen an F⁵ längs c⁴ ist von der sechsten Classe, sie besitzt eine Doppelcurve dritter Classe mit Doppeltangente (weil sie vom Geschlecht O sein muss). Die Ebene S der Doppelcurve ist diejenige, welche der Spitze S des Kegels K² mit Bezug auf c⁴ und mit Bezug auf alle Flächen des Büschels conjugirt ist.

Es sei E die Tangentialebene von K^2 längs der Seite e. e schneide c^4 in zwei Punkten E_1 , E_2 , in denen t_1 , t_2 die Tangenten an c^4 sein mögen. Die der Ebene E entsprechende Fläche F schneidet E in einem Kegelschnitte e^2 der Schaar, welcher t_1 , t_2 in E_1 . E_2 berührt Daraus folgt, dass zwei Punkte auf e^2 , welche auf einem Strahl aus S liegen, durch S und S harmonisch getrennt sind. Und weil durch jeden Punkt auf F^5 ein Kegelschnitt e^2 geht, welcher stets einen vierten harmonischen mit Bezug auf S, S liefert, welcher mit jenem auf einem Strahl aus S liegt, so folgt: Die Fläche F^5 entspricht sich selbst in einer involutorischen centrischen Collineation, deren Centrum die Kegelspitze S und deren Ebene S die gemeinsame Polarebene von S für alle Flächen des Büschels ist.

Die Ebene E hat ausser e^2 mit F^5 noch eine Curve e^3 gemein Dieselbe ergiebt sich wie folgt. Die Flächen des Büschels schneiden E in

^{*} Göttinger Nachrichten 1869; Abhandlungen der königl. Ges. zu Göttingen, XV, 1870. — Nöther, Ueber Flächen, welche Schaaren rationaler Curven besitzen; Math. Annalen III, S. 98.

Kegelschnitten c^2 , welche in E_1 , E_2 die Linien t_1 , t_2 berühren. Die entsprechenden Ebenen von K^2 schneiden E in Geraden g aus S, die Kegelschnitte c^2 und diese Geraden g bilden zwei projective Büschel, wobei ersichtlich dem früher genannten Kegelschnitte e^2 die Linie $e = E_1 E_2 S$ entspricht. Die Schnittpunkte $g c^2$ bilden nun in ihrer Gesammtheit eine Curve dritter Ordnung e^3 , welche in S einen Wendepunkt hat. Sie geht durch die Grundpunkte des Kegelschnittbüschels, berührt also t_1 , t_2 in E_1 , E_2 . Mit e^2 hat sie E_1 und E_2 doppelt zählend und die beiden Punkte $g c^2$ gemein. Für den Kegelschnitt e^2 des Büschels fällt g in e, die Punkte $g c^2$ fallen hier nach E_1 , E_2 . Hieraus folgt, dass e^3 mit e^2 in den beiden Punkten E_1 , E_2 je drei gemeinsame Punkte hat, dass also e^2 und e^3 sich in E_1 , E_2 berühren und schneiden.* Wenn somit in einer Ebene E der Kegelschnitt e^2 der Schaar zu einem Geradenpaare wird, so sind diese Geraden in E_1 , E_2 Wendetangenten an e^3 .

Unter allen Ebenen E des Kegels ist diejenige ausgezeichnet, welche dem Kegel K², als Fläche des Büschels betrachtet, entspricht. In ihr zerfällt e² in ein coincidirendes Linienpaar, e doppelt gezählt. Hieraus folgt, dass die in dieser Ebene gelegene e^3 in E_1 , E_2 Wendetangenten hat, welche mit $e = E_1 E_2$ zusammenfallen. Also ist jetzt e ein Bestandtheil von e^3 , •• der Rest ist ein Kegelschnitt f2 auf F5, welcher der Schaar nicht angehört. Er geht durch E_1 , E_2 und lässt sich construiren, wie früher e^3 construirt wurde. Auch die Punkte von f^2 (wie früher von e^3) sind durch SS paarweise harmonisch getrennt. Durch Einführung von f ergiebt sich sofort folgende Erzeugungsweise der Kegelschnittschaar auf F5: Eine Curve vierter Ordnung erster Species, c4, hat einen doppelt projicirenden Kegel K² von der Spitze S, deren conjugirte Ebene nach c4 S sein soll. In einer festen Ebene von K2 liegt ein Kegelschnitt f^2 , welcher c^4 in zwei Punkten schneidet und für welchen die Polare von S in S fällt. Nun lege man alle Ebenen an K² und construire in jeder von ihnen den Kegelschnitt, welcher c4 doppelt berührt und f2 (in zwei Punkten) Diese Kegelschnitte sind die auf F5 gelegene schnei**de**t.

^{*} Hat allgemein eine Fläche F eine Rückkehrcurve c und längs derselben eine berührende developpable Fläche D, so schneidet eine Ebene durch eine Tangente t an c aus F daselbst zwei Aeste, die sich berühren und schneiden. Die Berührung beider Aeste folgt aus der Berührung mit t. Beide schneiden sich, denn wenn man auf dem äussern Mantel der Fläche F längs der Tangente t über den Berührungspunkt hinwegschreitet, so gelangt man auf den innern Mantel, weil innerer und äusserer Mantel längs c zusammenhängen.

^{**} Diese ausgezeichneten Elemente E, ε liefern für beliebige Querschnitte von F⁵ je einen Wendepunkt mit seiner Tangente und speciell E für die ω' Curven ε³ je die Wendetangente in S. Die Schaar der Curven ε³ entsteht ähnlich der Schaar der Curven ε⁴ durch einen Büschel von Flächen dritter Ordnung in projectiver Zuordnung mit den Ebenen von K.

Schaar. Der Kegelschnitt der Schaar wird bei seiner Bewegung zweimal f² berühren, viermal mit c⁴ vier consecutive Punkte gemein haben und viermal zu einem Geradenpaar werden, einmal zu einer Doppelgeraden.

3. Es sei wieder ein Büschel von Flächen zweiten Grades mit den Ebenen einer Torse n^{ter} Classe in projectives Entsprechen gebracht. Jedoch oll im Büschel eine in zwei Ebenen P, Q zerfallende Fläche vorkommen, selber die eine ihrer Ebenen, P, entspreche. Abgesehen von P entsteht als Erzeugniss eine Fläche $2n^{\text{ter}}$ Ordnung F^{2n} . In den Ebenen P, Q seien p^2 , q^2 die Grundcurven des Flächenbüschels, sie sind auf F^{2n} bezüglich n-1-fache und n-fache Curve. Die Fläche ist die allgemeinste dieser Art. Längs p^2 , q^2 besitzt sie berührende Developpabeln von der Classe 2n, 2(n+1), auf p^2 , q^2 liegen 4(n-2), 4(n-1) Pinchpunkte. Die Kegelschnitte der Schaar schneiden p^2 , q^2 je in zwei Punkten, unter ihnen sind 2n Geradenpaare, jede Gerade trifft p^2 und q^2 . Die F^{2n} wird von der Schaar einsch überdeckt. — Die Punkte der Fläche sind umkehrbar eindeutig bewogen auf die Strahlen der Congruenz zweiter Ordnung vierter Classe der Treffgeraden von p^2 , q^2 .

Eine solche Fläche ist die Fläche vierter Ordnung mit Doppeltegelschnitt. Jede Doppeltangentialebene schneidet aus ihr zwei Kegelwhaitte k2, l2. Zwei Schnittpunkte k2, l2 liegen auf dem doppelten Kegelchnitte c2, die übrigen sind die Berührungspunkte der Ebene. Aus k2, 12 lusen sich zwei Schaaren von Kegelschnitten herleiten, welche aus F4 durch Michenbuschel herausgeschnitten werden mit c2, k2; c2, l2 als Grundcurven. Alle Flachen durch c2 und k2 schneiden F4 in Kegelschnitten der Schaar, welcher l2 gehört; in der That wird l2 durch die Fläche herausgeschnitten, welche in die beiden Ebenen von c² und k² zerfällt: Je zwei Kegelschuitte (eventuell Geradenpaare) der beiden adjungirten Schaaren lingen mit dem Doppelkegelschnitt auf einer Fläche zweiten Grades. Hierbei kommt es co1-mal vor, dass zwei adjungirte Kegelschnitte m einer Ebene liegen, und die Enveloppe solcher Ebenen ist ein Kummerscher Kegel. Die letzteren Kegelschnittpaare haben allemal zwei Schnittpunkte auf c2, die anderen liegen auf der Berührungslinie ihrer Ebene mit Em Kegel, weshalb dieser Kegel die F4 längs einer Curve vierter Ordnung enter Species berührt. Auf c2 sind vier Pinchpunkte, nämlich die Schnittpunkte mit dem genannten Kegel. - Jede Kegelschnittschaar enthält vier Page von Geraden. Ein Geradenpaar wird von den vier Geradenpaaren andern Schaar geschnitten. Daraus folgt, dass eine der 16 Geraden allemal von 5 anderen geschnitten wird,

Nach Kummer hat die Fläche fünf Kegel doppelt berührender Ebenen.*
Zu jedem gehören (∞¹-mal) zwei Büschel von Flächen zweiter Ordnung,

Vergl. Zeuthen, Math. Annal. X, S. 540. — Folgende Betrachtung führt seiert auf das Vorhandensein der fünf Kegel. Eine Kegelschnittschaar hat eine stimpgirte", weil die Ordnung der Fläche gleich 4 ist; jede Schaar hat vier Ge-

welche mit den Ebenen des Kegels in bekannter Weise die Fläche erzeugen.* Alle diese Kegel gehen durch die Pinchpunkte, weshalb z. B. die 16 Schnittpunkte der Geraden auf der Fläche mit c² auf fünf Arten zu je zwei verbunden acht Tangenten eines durch die Pinchpunkte gehenden Kegelschnittes liefern.

Die Punkte der Fläche lassen sich hier ausnahmsweise eindeutig beziehen auf die Strahlen einer Congruenz erster Ordnung zweiter Classe, deren Brenneurven der doppelte Kegelschnitt und eine Gerade der Fläche sind.

Wenn speciall die Spitze eines Kummer'schen Kegels in die Ebene von c² fällt (was höchstens dreimal eintreten kann), so wird einer der vorhin genannten fünf Kegelschnitte zu einem Doppelbüschel, die 16 Schnittpunkte der Geraden auf F⁴ mit c² und die Pinchpunkte bilden alsdann zehn Paare einer Involution und umgekehrt. (Die beiden adjungirten Kegelschnittschaaren, welche zu diesem ausgezeichneten Kegel gehören, schneiden c² in Paaren der genannten Involution.) Wie in Nr. 2, folgt, dass in diesem Falle F⁴ sich selbst entspricht in einer involutorischen, centrischen Collineation, deren Centrum die Spitze jenes ausgezeichneten Kegels ist.

Zurückkommend auf eine beliebige F⁴ mit Doppelkegelschnitt, mag noch bemerkt werden, dass jede Kegelschnittschaar die Fläche einfach überdeckt, dass aber der doppelte Kegelschnitt keiner Schaar angehört. — Wenn ein Kegelschnitt einer Schaar in zwei coincidirende Gerade ausartet, so berühren alle adjungirten Kegelschnitte die zu der Geraden gehörende stationäre Ebene an der Geraden selbst, die Geradenpaare in der adjungirten Schaar schneiden sich auf dieser Geraden.

4. Wenn im Flächenbüschel zwei in Ebenenpaare zerfallende Flächen vorkommen, so ist seine Grundcurve ein windschiefes Vierseit. Den in die Ebenenpaare A, B; C, D zerfallenden Flächen sollen in der Torse die Ebenen B und D entsprechen, so besteht das eigentliche Erzeugniss aus einer F^{2n-1} , welche die Gerade AC zur n-fachen, die Geraden AD und BC zu n-1-fachen, endlich BD zur n-2-fachen Geraden hat. Deshalb lassen sich die

radenpaare, beide zusammen ergeben die 16 Geraden der Fläche. Da jede Gerade von fünf anderen geschuitten wird, so hat man 40 Schnittpunkte oder 40 sich schneidende Geradenpaare im Ganzen. Je zwei sich schneidende Geraden führen aber auf eine Kegelschnittschaar, mit Hilfe der Flächen durch sie und den doppelten Kegelschnitt. So erhält man 40 Schaaren von Kegelschnitten, jede Schaar aber viermal, weil in jeder Schaar vier sich schneidende Geradenpaare sind. Also giebt es zehn Schaaren resp fünf adjungirte Schaaren und dazu gehörend fünf Kummer'sche Kegel.

^{*} Der Querschnitt der Fläche mit einer Ebene des Kegels wird gefunden wie in Nr. 2; er besteht aus zwei Kegelschnitten, von denen zwei Schnittpunkte in der Berührungsseite der Ebene mit dem Kegel liegen; die übrigen fallen in den Doppelkegelschnitt. (Von den ersteren Schnittpunkten liegen auf jeder Kegelseite zwei, keiner von allen fällt in die Kegelspitze.)

Punkte der Fläche umkehrbar eindeutig beziehen auf die Strahlen der linearen Congruenzen mit den Directricen AC und BD oder AD und BC. Die Kegelschnitte der Schaar treffen im Allgemeinen alle Seiten des Vierseits (für n=1 nur AC, für n=2 alle ausser BD, auf welcher alsdann die Kegelspitze S liegt); unter ihnen sind 2n-3 Geradenpaare. — Die Developpabeln von \mathbb{F}^{2n-1} längs AC, AB und BC, BD sind bezüglich von der Classe n+1, n, n-1; auf diesen Geraden sind bezüglich 2n-2, 2n-4, 2n-6 Pinchpunkte. — Flächen zweiter Ordnung durch drei und Flächen dritter Ordnung durch die vier mehrfachen Geraden ergeben mit \mathbb{F}^{2n-1} bemerkenswerthe Schnittcurven.

5. Der Büschel von Flächen zweiten Grades enthalte eine Doppelebene P, welche der Torse nter Classe angehören und sich selbst entsprechen soll. Das Erzeugniss ist eine F^{2n} , welche die in P gelegene Grundcurve p^2 des Büschels zur n-fachen Curve hat. (Wir betrachten hier im Vergleich zu Nr. 3 den zweiten Fall, dass sich gegenüber Nr. 2 von F^{2n+1} eine Ebene absondert; dieser Fall ist allerdings als ein specieller von Nr. 3 aufzufassen, wenn nämlich dort P und Q zusammenfallen. Die Veränderungen gegenüber Nr. 3 sind aber so intensiv, dass eine besondere Behandlung des vorliegenden Falles berechtigt erscheint.) Durch einen Punkt Q auf p² gehen ≈-1 von P verschiedene Ebenen der Torse; die Tangentialebenen in Q an die n-1 entsprechenden Flächen fallen zusammen: Der Kegel, welcher längs p2 alle Flächen berührt, ist n-1-fach gezählt für F2n eine längs p² umschriebene Developpable. Ausser demselben existirt aber noch ein einfach zählender Kegel zweiter Classe durch p2, welcher ebenfalls zu dieser Developpabeln gehört. Namlich es entspricht der P consecutiven Ebene der Torse ein Kegelschnitt, welcher durch diese Ebene aus einer unendlich schmal gewordenen Fläche des Büschels herausgeschnitten wird. Dieser Kegelschnitt ist p² unendlich benachbart, er trifft p2 in zwei Punkten und bestimmt mit p2 einen Kegel, welcher in der Nähe von p² einen einzelnen Mantel der Fläche F²ⁿ darstellt. (Man erkennt, dass nunmehr p2 der Kegelschnittschaar angehört.) Der n-1-fache und der einfache Mantel an p^2 berühren sich in zwei Punkten, welche auf der zu P gehörenden Berührungsseite der Torse liegen. Es kann der Fall eintreten, dass die beiden betrachteten Kegel zusammenfallen. Alsdann gehen durch $p^2 n-1$ Mäntel der Fläche, welche an p^2 denselben **Kegel berühren**; zudem ist p^2 eine Rückkehreurve von F^{2n} .

In der Kegelschnittschaar sind 2n Geradenpaare. Jede Gerade berührt in ihrem Schnittpunkte mit p^2 den n-1-fach berührenden Kegel der Fläche.

Die analytische Darstellung des allgemeinen Falles ist hier folgende. Der Flächenbüschel sei dargestellt durch

wo $\varphi = 0$ eine beliebige Fläche des Büschels, p = 0 die Ebene P ist. Die Torse n^{ter} Classe soll für $\lambda = 0$ die Ebene p = 0 liefern, ihre Gleichung sei demnach

2)
$$\lambda^n a + \lambda^{n-1} b + \ldots + \lambda^2 k + \lambda l + p = 0,$$

worin a, \ldots, l lineare Ausdrücke sind. Die Gleichung von F^{2n} ist

3)
$$ap^{2n-1} + bp^{2n-3}\varphi + ... + kp^{3}\varphi^{n-2} + lp\varphi^{n-1} + \varphi^{n} = 0.$$

Längs p^2 ($p = \varphi = 0$) wird F^{2n} von $\varphi = 0$ berührt, resp. n-1 Mäntel von F^{2n} berühren dort $\varphi = 0$. Um den letzten Mantel zu finden, setze man in 1) und 2) an Stelle von λ einen unendlich kleinen Werth $d\lambda$, so entsteht der Kegelschnitt der Schaar

$$\varphi d\lambda - p^2 = l d\lambda + p = 0,$$

welcher p^2 unendlich benachbart ist. Durch ihn und durch p^2 geht die Fläche zweiter Ordnung $\varphi + lp = 0$, welche $\varphi = 0$ nicht längs p^2 berührt; dagegen berührt sie F^{2n} längs p^2 einfach. [Lässt man in 3) φ und p zu Null werden, so bleiben als niedrigste Glieder $lp\,\varphi^{n-1} + \varphi^n = \varphi^{n-1}\,(lp+\varphi)$ übrig.] Der n-1-fache Mantel $(\varphi=0)$ und der einfache $(\varphi+lp=0)$ berühren sich in den singulären Punkten $\varphi=p=l=0$ und beide Mäntel sind identisch, wenn l=0 mit p=0 zusammenfällt.

Für n = 2 erhält man wieder eine Fläche vierter Ordnung mit Doppelkegelschnitt, auf welcher zunächst eine Kegelschnittschaar liegt

4)
$$\lambda \varphi - p^2 = 0$$
, $\lambda^2 a + 2\lambda b + p = 0$;

die Gleichung der Fläche ist

5)
$$ap^3 + 2bp\varphi + \varphi^2 = ap^3 + \varphi(\varphi + 2bp) = 0.$$

Zu der Schaar 4) giebt es eine adjungirte, welche man erhält, wenn man 5) mit der Ebene in 4) schneidet und den Schnitt mit $\lambda \varphi - p^2 = 0$ weglässt. Diese adjungirte Schaar ist

6)
$$\lambda(\varphi + 2bp) + p^2 = 0$$
, $\lambda^2 a + 2\lambda b + p = 0$.

Offenbar wird F⁴ längs p^2 von $\varphi = 0$ und von $\varphi + 2bp = 0$ berührt: Die Developpable längs der Doppelcurve zerfällt hier in zwei Kegel zweiter Classe. Beide berühren sich in zwei Punkten ($\varphi = b = p = 0$), in welchen je zwei Pinchpunkte sich vereinigt haben. — Die beiden Kegelschnittschaaren haben p^2 gemeinsam und durchschneiden sich in demselben (für die übrigen Schaaren ist dieses natürlich nicht der Fall).

Die Ebenen $\lambda^2 a + 2\lambda b + p = 0$ umhüllen einen Kummer'schen Kegel, dessen Spitze in der Ebene der Doppelcurve liegt, als Folge davon, dass die Developpable längs p^2 zerfällt. Wenn umgekehrt die Kegelschnitte von zwei adjungirten Schaaren auf F^4 den doppelten Kegelschnitt p^3 in Paaren einer Involution schneiden und die Pinchpunkte sich paarweise so vereinigen, dass ein Paar derselben Involution entsteht, so muss die Developpable längs p^2 in zwei Kegel zerfallen.

Damit endlich die F^4 längs p^2 berührenden Kegel zusammenfallen, hat man b = p zu setzen. Die Gleichung der Fläche wird zu

7)
$$ap^3 + 2p^2\varphi + \varphi^2 = ap^3 + \varphi(\varphi + 2p^2) = 0;$$

sie enthält die Kegelschnittschaaren

8)
$$\lambda \varphi - p^2 = 0$$
, $\lambda^2 a + 2\lambda p + p = 0$, $\lambda(\varphi + 2p^2) + p^2 = 0$.

Die Flächen zweiter Ordnung in 8) gehören demselben Büschel an, indem alle $\varphi=0$ an p=0 berühren. Die Torse der Ebenen $\lambda^2a+2\lambda b+p=0$ wird zu einem Ebenenbüschel. Dieser Büschel erscheint zweimal mit dem Flächenbüschel in solche Zuordnung gebracht, dass je einer Ebene ein Flächenpaar, einer Fläche eine einzelne Ebene entspricht und wobei die Flächenpaare eine Involution bilden. Diese Involution ist beidemal dieselbe, weil in einer Ebene des Büschels nur zwei Kegelschnitte von F^4 liegen. Van kann deshalb die Gleichungen 8) auf eine andere Form bringen, indem man eine Ebene des Büschels mit $\varrho a+p=0$ (an Stelle von $\lambda^2a+2\lambda p+p=0$) bezeichnet. Alsdann gehen 8) übereinstimmend über in

9)
$$ea + p = 0$$
, $\{e + \sqrt{e(1+e)}\} \varphi - p^2 = 0$.

Offenbar handelt es sich jetzt um eine Fläche vierter Ordnung mit Cuspidalkegelschnitt. Gegenüber F4 mit Doppelkegelschnitt ist hier die Erzeugungsweise ausgeartet. An Stelle der Ebenen des ausgezeichneten Kegels treten die Ebenen eines Büschels; die getrennten Flächenbüschel sind die zu Paaren einer Involution geordneten Flächen, welche sich (und F4) Engs des Cuspidalkegelschnittes berühren. In der Ebene des Cuspidalkegelschnittes fällt eine Ebene zusammen mit dem entsprechenden Flächenpaar. In jeder Ebene des Büschels liegen zwei Kegelschnitte von F4, heraus-Seschnitten aus dem der Ebene entsprechenden Flächenpaar. Diese Kegel-Schnitte berühren sich in den Schnittpunkten der Axe des Ebenenbüschels it dem Cuspidalkegelschnitt, welche infolge dessen Clospunkte sind. Die Axe liefert für beide Kegelschnitte denselben Pol und der Ort dieser Pole st die Schnittlinie der Tangentialebenen an F4 in den Clospunkten, nennen wir sie die "Conjugirte der Axe". Wenn somit ein Kegelschnitt der (Involutions-) Schaar zu einem Paar von Geraden wird, so schneiden sich die-Selben auf der Conjugirten der Axe. — Es mag hier im Voraus zusammen-Essend gesagt sein, dass die Involutionsschaar, welche die Stelle von zwei adjungirten Schaaren vertritt, folgende ausgezeichneten Kegelschnitte entbult: 1. p2; 2. ein Kegelschnitt, der mit dem in seiner Ebene liegenden zummenfallt, weil in der Involution von Flächen noch eine selbstentsprechande Flache vorkommt; 3. vier Geradenpaare; 4. drei Kegelschnitte, in deam jedes Mal F4 von einem Kegel zweiter Classe berührt wird, dessen Scheitel auf der Conjugirten der Axe liegt. — Aus dem Vorstehenden geht anch hervor, dass die Fläche mit sich selbst in involutorischer Centralcollineation steht für jeden Punkt der Axe (wobei die Collineationseber die Conjugirte der Axe geht) und für jeden Punkt auf der

VIIL

Ueber Flächen vierter Ordnung mit Doppel- und mit Cuspidalkegelschnitt.

Von

Dr. A. WEILER in Hottingen-Zürich.

Hierzu Taf. V Fig. 2.

In dem vorangegangenen Aufsatze habe ich auf eine methodische Untersuchung der obgenannten Flächen hingewiesen, welche hier näher ausgeführt und ergänzt werden soll. Ich beschränke mich im Wesentlicherz auf drei Hauptfälle, nämlich auf die allgemeine Fläche mit Doppelkegelschnitt, mit Cuspidalkegelschnitt und den Specialfall der letzteren Fläche, in welchem die Clospunkte zusammenfallen. Die Untersuchung fördert einige neue Resultate zu Tage und setzt bereits bekannte Eigenschaften in leicht übersehbaren Zusammenhang. — Specialfälle der drei genannten Typen werden gelegentlich berührt. Allerdings ist die angewandte Methode derart, dass aus ihr alle Specialfälle entspringen würden; aber eine solche Durchführung wäre augenscheinlich mühsam und es würden in den meisten Fällen verschiedene Dispositionen bezüglich der erzeugenden projectiven Gebilde auf nicht von einander verschiedene Flächen führen. Eine systematische Classification dieser Flächen ist übrigens soeben durch Herrn Segre ausgeführt worden,* seine Methode giebt weiterhin das Mittel, die Frage nach der Realität dieser Gebilde zu erledigen.

1. Ueber die Flache vierter Ordnung mit Doppelkegelschnitt habe ich unter Anderem folgende Eigenschaften angegeben. Die Fläche wird von jeder Kegelschnittschaar einfach überdeckt, somit haben im Allgemeinen zwei Kegelschnitte derselben Schaar keinen Punkt gemein. Zwei Kegelschnitte, welche einer Schaar und ihrer adjungirten entnommen sind, schneiden sich stets in zwei Punkten, deren Verbindungslinie durch den Scheitel S des zugehörenden Kummer'schen Kegels K² geht. Liegen sie

^{*} Mathem. Annalen XXIV, S. 313, woselbst eine vollständige Literaturangabe zu finden ist.

zudem in einer Ebene, so schneiden sie sich in vier Punkten. Zwei davon liegen auf dem Doppelkegelschnitte c², die übrigen auf der Berührungsseite s ihrer Ebene E mit dem Kegel K². Also wird ein Kegelschnitt von allen Kegelschnitten der adjungirten Schaar in Punktepaaren einer Involution geschnitten, deren Pol in S fällt. — Durch einen beliebigen Punkt auf unserer Fläche F⁴ gehen zehn Kegelschnitte, nämlich fünfmal je zwei adjungirte, welche sich nochmals in einem Punkte treffen. Andere Kegelschnitte unter diesen zehn gelangen nicht fernerhin zum Schnitt. Zwei Kegelschnitte, welche verschiedenen, aber nicht adjungirten Schaaren zugehoren, haben stets einen Punkt gemein.

Es seien nun a_1 , a_2 in der Ebene A, b_1 , b_2 in B, c_1 , c_2 in C drei Geradenpaare der ersten Kegelschnittschaar I, so schneiden sich A, B, C in S_1 ; alle Kegelschnitte der adjungirten Schaar I^* liegen in Ebenen aus S_1 und schneiden die sechs Geraden a_i , b_i , c_i^* . Hierdurch ist die Schaar I^* völlig bestimmt und es ist F^4 die Fläche derjenigen Kegelschnitte, deren Ebenen durch einen Punkt S_1 gehen und welche die in drei Ebenen aus S_1 liegenden Geradenpaare a_1 , a_2 ; b_1 , b_2 ; c_1 , c_1 schneiden. In den drei Ebenen sind die Geradenpaare in allgemeiner Lage, womit sich die Zahl der Constanten der Fläche auf 21 beläuft.

Eine Ebene E schneide nun a_i , b_i , c_i in sechs Punkten eines Kegelschnittes. Diese Punkte sind drei Paare der Involution vom Pol S1. Constrairt man zu S, mit Bezug auf die drei Paare die vierten harmonischen Punkte, so liegen dieselben auf der Polaren des Punktes S, mit Bezug auf diesen Kegelschnitt. Indem man aber die Paare ai, bi, ci mit allen Ebenen Aus S, schneidet und je den vierten harmonischen Punkt von S, für jedes herausgeschnittene Punktepaar bestimmt, entstehen die drei Geraden a_0, b_0 , 6, die Polaren von S, mit Bezug auf die drei degenerirten Kegelschnitte a, a, b, b, c, c, c, der Schaar I. Bei der Erzeugung der Schaar I* aus S, a, b, c, hat man offenbar Ebenen durch S, zu legen, welche ao, bo, co je m drei Punkten einer Geraden schneiden; eine solche Ebene schneidet alsdann die sechs Geraden ai, ... in sechs Punkten eines Kegelschnittes. Man construire somit die ∞^1 Transversalen zu a_0 , b_0 , c_0 , sie sind die Polaren Ton S, für die Kegelschnitte der Schaar I* und die aus S, nach ihnen gelegten Ebenen bilden den Kummer'schen Kegel K,2: Die Polaren des Scheitels eines Kummer'schen Kegels mit Bezug auf die Kegelschnitte der einen zugehörigen Kegelschnittschaar bilden stets "lue Regelschaar zweiten Grades. (Der Scheitel S, des Kegels liegt nur dann auf dieser Regelschaar, wenn S, auf F4 liegt; ein solcher Punkt al nach Früherem ein Knotenpunkt der Fläche, durch welchen alle Kegel-

^{*} Dass die beiden adjungirten Schaaren I, I* genannt werden, sei der Bequemlichkeit des Ausdrucks wegen gestattet; die hier abzuleitenden Resultate
kommen auf gleichberechtigte Kegelschnittschaaren übertragen werden-

schnitte der Schaar hindurchgehen; die genannte Regelschaar geht über in seinen Berührungskegel.)

Der Kegelscheitel S_i liefert für die zugeordneten Schaaren I, I^* zwei solche Regelschaaren zweiten Grades. Da aber jeder Kegelschnitt von I jeden von I^* in zwei Punkten auf der durch S_1 gehenden Schnittlinie ihrer Ebenen schneidet, so schneiden alle Polaren von S, für die Kegelschnitte der Schaar I alle Polaren der Schaar I*: Die Polaren eines Kegelscheitels für die Kegelschnitte der beiden zugeordneten adjungirten Schaaren bilden die beiden Erzeugungen derselben Fläche zweiten Grades. — Die Anzahl dieser covarianten Flächen ist fünf; nennen wir sie einfach "Polarenhyperboloide". — Aus Vorstehendem erhellt nunmehr folgender Zusammenhang: Der Kummer'sche Kegel K,2 ist der Berührungskegel aus S, an das zugehörige Polarenhyperboloid. Es tritt damit der Kegelschnitt auf, längs welchem K,2 und das Polarenhyperboloid sich berühren; seine Punkte sind die conjugirten von S_1 für beide, in derselben Ebene von K_1^2 liegende adjungirte Kegelschnitte. Dieser Kegelschnitt trifft die Raumcurve vierter Ordnung erster Species c,4, längs welcher K,2 die Fläche F4 derührt, in vier Punkten; die Tangenten an c_1^4 in diesen Punkten gehen durch S_1 und es folgt: Unter den Kegelschnitten von zwei adjungirten Schaaren, welche je in einer Ebene liegen, sind vier Paare, welche sich ausserhalb des Doppelkegelschnittes berühren*; die Berührungspunkte liegen in der der Polarebene des Kegelscheitels für das Polarenhyperboloid.

Irgend eine Gerade g aus S_1 schneide zwei Kegelschnitte der Schaar I (und auch der Schaar I^*) in den beiden Punktepaaren A_1B_1 , A_2B_2 . Die vierten harmonischen Punkte P_1 , P_2 von S_1 für diese zwei Punktepaare sind die Schnittpunkte von g mit dem Polarenhyperboloid. Man erkennt hieraus, dass das Polarenhyperboloid keineswegs die quadratische Polarfläche von S_1 für F^4 sein kann. Construirt man aber endlich den vierten harmonischen Punkt Q von S_1 für das Paar P_1P_2 , so ist Q auf der Polarebene von S_1 für F^4 gelegen: Die Polarebene des Scheitels des Kummer'schen Kegels mit Bezug auf dessen Polarenhyperboloid ist die Polarebene des genannten Punktes für die Fläche vierter Ordnung.

Man kann beweisen, dass F4 von einem Polarenhyperboloid in zwei getrennten Curven geschnitten wird, wovon die eine sehr bemerkenswerth

^{*} Bei dieser Berührung ist die gemeinsame Tangente eine Seite des Kegels K₁². — Es giebt vier weitere Ebenen an K₁², welche c² berühren; die darin liegenden Kegelschnittpaare berühren sich und c² in demselben Punkte. Endlich berühren sich diese Kegelschnittpaare auch in den vier Ebenen von K₁², deren Berührungsseiten durch die Pinchpunkte gehen. Der Berührungspunkt ist der Pinchpunkt und die gemeinsame Tangente ist die Schnittlinie jener Ebene mit der singulären Tangentialebene des Pinchpunktes.

ist. — Es seien E eine Ebene an K₁²; e₁², e₂² die in E liegenden Kegelschnitte; s die Berührungsseite von E mit K_1^2 ; p_1 , p_2 die Polaren von S_1 för e,2, e,2. Der Schnitt von E mit dem Polarenhyperboloid besteht aus p_1 , p_2 . Die Schnittpunkte von p_1 mit e_1^2 und von p_2 mit e_2^2 sind Punkte sof F^4 , in welchen die Tangentialebenen durch S_1 gehen; sie sind die Doppelpunkte der bereits erwähnten Involutionen auf e_1^2 , e_2^2 . Diese vier Punkte liegen auf dem Berührungskegel vierter Ordnung, welchen man aus S_1 an \mathbb{P}^{1} (ausser \mathbb{K}_{1}^{2}) legen kann. (Den Schnittpunkten von p_{1} mit e_{2}^{2} und von p, mit e, kommt diese Eigenschaft nicht zu.) Jene vier Punkte, sagen wir kor ei pi, beschreiben bei der Bewegung von E um K,2 eine Curve vierter Ordnang, welche, auf dem Polarenhyperboloid liegend, jede seiner Erzeugenden zweimal schneidet. Letzteres gilt auch für den Ort der Punkte cip urd es folgt: Die Schnittcurve des Polarenhyperboloids mit P4 zerfällt in zwei Raumcurven vierter Ordnung erster Species. Die eine davon ist die Berührungscurve des aus dem Kegelscheitel an F4 (ausser K12) gelegten Berührungskegels vierter Ordnung; in jedem ihrer Punkte berühren sich zwei Kegelschnitte der zum Kegel gehörenden adjungirten Schaaren.* Wenn eine Ebene A an K_1^2 einen zerfallenden Kegelschnitt $a_1 a_2$ der Schaar I(oder I^*) enthält, so fallen die Doppelpunkte der Involution auf $a_1 a_2$ in dem Schnittpunkte dieser Geraden zusammen: Die letztgenannte Raumcurve vierter Ordnung geht durch die acht Schnittpunkte der in den beiden Kegelschnittschaaren enthaltenen Geradenpaare und berührt in jedem Schnittpunkte den vierten harmonischen Strahl des Kegelscheitels mit Bezug auf das Geradenpaar.**

Schneidet man F^4 und den Kummer'schen Kegel K_1^2 mit der Polarebene des Kegelscheitels S_1 , so erhält man eine Curve vierter Ordnung mit zwei Doppelpunkten und einem Kegelschnitt, welche beide sich in vier Punkten berühren. Diese Punkte liefern mit K_1^2 die Ebenen, in denen sich je zwei Kegelschnitte der Schaaren I, I^* , die in derselben Ebene von K_1^2 liegen, berühren.

Nehmen wir wieder an, man kenne von der Fläche F^4 die drei Geradenpaare $a_1 a_2$. $b_1 b_2$, $c_1 c_2$, deren Ebenen sich im Kegelscheitel S_1 schneiden. Es sei t eine Transversale der vierten harmonischen Strahlen a_0 , b_0 , c_0 von

^{*} Zur Ergünzung des gegebenen Beweises betrachte man irgend einen Querschnitt von F^4 , dessen Ebene P durch S_1 gelegt ist. Der Schnitt besteht aus einer Curve vierter Ordnung p^4 mit zwei Doppelpunkten, S_1 ist der Schnittpunkt zweier Doppeltangenten t_1 , t_2 von p^4 . Aus S_1 gehen an p^4 noch vier Tangenten, welche P, Q, R, S zu Berührungspunkten haben mögen. Durch P, Q, R, S lässt sich ein Kegelschnitt legen, welcher t_1 , t_2 je im vierten harmonischen Punkte von S_1 für die Berührungspunkte dieser Doppeltangenten berührt. Er ist der Schnitt mit dem Polarenhyperboloid. Die Punkte von p^4 sind durch S_1 und die Punkte dieses Kegelschnittes paarweise harmonisch getrennt.

^{*} Vergl. Clebsch, Crelle's Journal Bd. 69 S. 25.

 S_i für die Geradenpaare a_i , b_i , c_i . Die Ebene S_i t schneidet die sechs gegebenen Geraden in Punkten eines Kegelschnittes, welcher augenscheinlich dann und nur dann zerfällt, wenn die sechs Punkte zu je dreien in zwei Geraden liegen. Weil aber die Geraden eines Paares, z. B. b, b2, sich schneiden, diejenigen verschiedener Paare windschief sind, so müssen jedesmal drei Geraden, welche von der Ebene S₁t in Punkten einer Geraden geschnitten werden, allen drei Paaren a_i , b_i , c_i entnommen sein. Die Ebene $S_1 t$ z. B., welche a_1 , b_1 , c_1 in Punkten einer Geraden schneidet, thut dasselbe für a_2 , b_2 , c_2 ; diese Ebene enthält einen zerfallenden Kegelschnitt der Schaar I^* . Man findet diese Ebene eindeutig wie folgt. Die Geraden $a_0b_0c_0$ und a, b, c, bestimmen (durch ihre Transversalen) zwei Regelschaaren, an welche aus S_1 im Ganzen vier gemeinsame Tangentialebenen gelegt werden können. Drei davon, nämlich die Ebenen A (von $a_1 a_2$), B, C sind bereits bekannt und fallen ausser Betracht. Die vierte gemeinsame Ebene E schneidet alsdann a_1 , b_1 , c_1 in drei Punkten der Geraden e_1 ; a_2 , b_2 , c_2 in drei Punkten der Geraden e_2 . — Ebenso findet man drei weitere Ebenen F, G, H, welche bezüglich

$$a_1b_1c_2$$
, $a_2b_2c_1$; $a_1b_2c_1$, $a_2b_1c_2$; $a_1b_2c_2$, $a_2b_1c_1$

je in drei Punkten der Geraden

$$f_1, f_2; g_1, g_2; h_1, h_2$$

schneiden, und es sind damit die in der Schaar I^* enthaltenen Geradenpaare linear construirt.

Umgekehrt könnte man etwa aus e_1 , e_2 ; f_1 , f_2 ; g_1 , g_2 die Geradenpaare der Schaar I finden. Nach der eingeführten Bezeichnung werden $e_1 f_1 g_1$, $e_1 f_1 g_2$, $e_1 f_2 g_1$, $e_2 f_2 g_2$, $e_2 f_2 g_1$, $e_2 f_1 g_2$ bezüglich von a_1 , b_1 , c_1 , a_2 , b_2 , c_2 geschnitten. Es verbleiben die Ternen $e_1 f_2 g_2$, $e_2 f_1 g_1$; erstere sollen von d_1 , letztere von d_2 geschnitten werden. So erhält man folgende Tabelle, in welcher neben jeder einzelnen Geraden diejenigen fünf angegeben sind, welche erstere schneiden.

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 h2 e ₁ e ₂ a ₁ b ₁ c ₁ d ₁ 1 h ₁ f ₁ f ₂ a ₁ b ₁ c ₂ d ₂ 2 h ₁ g ₁ g ₂ a ₁ b ₂ c ₁ d ₂ 1 h ₂ h ₁ h ₂ a ₁ b ₂ c ₂ d ₁	
---	--	--

Die folgende Tabelle enthält die Geradenpaare, welche jedesmal zu derselben Kegelschnittschaar gehören.

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}\hline I & a_1a_2, \ b_1b_2, \ c_1c_2, \ d_1d_2 & I^* & e_1e_2, \ f_1f_2, \ g_1g_2, \ h_1h_2 \\ II & a_1e_1, \ b_2f_2, \ c_2g_2, \ d_2h_2 & II^* & a_2e_2, \ b_1f_1, \ c_1g_1, \ d_1h_1 \\ III & a_1f_1, \ b_2e_2, \ c_1h_2, \ d_1g_2 & III^* & a_2f_2, \ b_1e_1, \ c_2h_1, \ d_2g_1 \\ IV & a_1g_1, \ b_1h_2, \ c_2e_2, \ d_1f_2 & V^* & a_2g_2, \ b_2h_1, \ c_1e_2, \ d_2f_1 \\ V & a_1h_2, \ b_2g_1, \ c_2f_1, \ d_1e_1 \\ \hline \end{array}$$

Die Linienpaare einer ganzen Horizontalreihe bezeichnen zugleich je acht Ebenen des zu den adjungirten Schaaren gehörenden Kummer'schen Kegels $K_1^2 \dots K_5^2$.

Wenn der Scheitel S, eines Kummer'schen Kegels in die Ebene C des Doppelkegelschnittes fällt, so ist S, ein Diagonalpunkt des Vierecks der Pinchpunkte. F¹ ist dann sich selbst entsprechend in einer involutorischen Collineation vom Centrum S_1 , deren Ebene S_1 die Punkte a_1a_2 , b_1b_2 , ... enthält. Das Polarenhyperboloid des Scheitels S, degenerirt in den Kegelschnitt, welchen S, aus K,2 schneidet. Aus der letzten Tabelle folgt, dass die Scheitel S2, ..., S5 der übrigen Kegel in S1 liegen, so dass auch diese kegel und ihre Hyperboloide ihre eigenen Bilder in der Collineation sind. 8, schneidet aus F4 eine Curve vierter Ordnung c4 mit zwei Knoten und mit acht Doppeltangenten. Diese Doppeltangenten gehen zu je zweien durch die vier Kegelscheitel. - Wenn ein zweiter Kegelscheitel, S2, in C fällt, titt eine neue Collineation vom Centrum S2 und der Ebene S2 auf. Die welche durch S, aus F4 geschnitten wird, hat nunmehr folgende Eigenchaften. Zwei ihrer Doppeltangenten schneiden sich in S2, also auf der Verbindungslinie der Knoten; S2 ist ein Homologiecentrum für c4, die Homologicare ist die Schnittlinie S, S, auf ihr schneiden sich die verbleibenden echs Doppeltangenten paarweise in den Scheiteln der übrigen Kummerschen Kegel. - Rückt endlich auch von diesen drei Scheiteln einer in die Ebene C (in den Punkt CS, S,), so fallen die beiden übrigen im Schnittpunkte der nunmehr vorhandenen drei Collineationsebenen zusammen. Dieser Punkt ist alsdann der Scheitel eines singulären Kummer'schen Kegels, bezüglich ein Knotenpunkt der Fläche F4.

Wenn wiederum S_1 in C fällt, K_1^2 aber C berührt, so gehört c^2 den adjungirten Schaaren I, I^* an. Beide Schaaren "durchschneiden sich" in c^2 und die Developpable an F^4 längs c^2 zerfällt in zwei Kegel zweiter Classe. In diesem Falle kann kein weiterer Kegelscheitel in C liegen, es sei denn, dass gleichzeitig c^2 selbst zerfällt.

2. Die Fläche vierter Ordnung F⁴ mit Rückkehrkegelschnitte swird durch c² und einen beliebigen ihrer Kegelschnitte g² erzeugt wie folgt. Die Kegelschnitte c² und g², welche sich hier nothwendig berühren müssen, sind die Grundcurve eines Büschels von Flächen zweiten Grades. Ein Kegel K², durch c² gehend, habe seinen Scheitel S in der Ebene G von g², seine Ebenen E sind den Flächen F² des Büschels c²g² projectiv so zustordnet, dass der Ebene G die in die Ebenen CG zerfallende Fläche entpicht. Die Kegelschnitte, in welchen die Ebenen E ihre entsprechenden plächen F² schneiden, bilden eine Schaar, welche F⁴ einfach überdeckt.

Von F⁴ liegt in E zunächst der Kegelschnitt $e_1^2 = EF^2$. Die übrigen Ebenen von K² und ihre entsprechenden Flächen des Büschels schneiden E in einem Strahlbüschel aus S und einem dazu projectiven Kegelschnittbüchel; der Berührungsseite s von E mit K² entspricht e_1^2 . Der f^{-1}

178

alle Kegelschnitte aus F4 geschnitten, deren Ebenen die Axe a enthalten. Zu jeder Ebene durch a gehören aber zwei Flächen, welche sich innerhalb des Büschels vertauschungsfähig entsprechen müssen. Daraus folgt die schon früher (analytisch) hergeleitete Erzeugung der "Involutionsschaar" von Kegelschnitten auf F4. - Unter den zu einer Involution gepaarten Flächen des Büschels c^2g^2 sind zwei selbstentsprechende (Doppelflächen). Der einen entspricht die Ebene C von c2 und es erweist sich der Cuspidalkegelschnitt c2 als "Rückkehrkegelschnitt der Involutionsschaar"; die diesbezügliche Doppelfläche wird mit F4 längs c2 von demselben Kegel zweiter Classe Ko2 berührt. Ko2 enthält die Ebenen A, B, weshalb sein Scheitel in die Gegenaxe an fallen muss. — Der zweiten Doppelfläche entspricht als Ebene durch a offenbar die Doppeltangentialebene von F4. Diese Ebene schneidet aus A, B die singulären Tangenten in den Clospunkten und ist gleichzeitig für die beiden letzteren die ausgezeichnete durch sie hindurch gelegte Ebene; an Stelle des Contactes zweiter Ordnung der Aeste in dieser Ebene, an den Clospunkten, tritt Identität dieser Aeste ein (Zeuthen, 1. c. S. 480). - Der einfachste Flächenbüschel, welcher bei Erzeugung der Involutionsschaar auftritt, ist augenscheinlich derjenige, welcher an c2 und den c2 unendlich nahen Kegelschnitt dieser Schaar gelegt ist (dessen Flächen Ko2 längs c2 berühren).

Besitzt die Fläche F4 mit Cuspidalkegelschnitt einen conischen Knoten S, so ist er der Scheitel eines Kummer'schen Kegels K2 = Sc2, er liegt auf der Gegenaxe ao. Von den vier Schnittpunkten von ao mit F4 fallen zwei in S und damit werden je zwei von den Geraden a; (b;) mit AS (BS) identisch, z. B. $a_1 = a_2$, $b_1 = b_2$. Die Kegelschnittschaaren, welche (c^2 berühren und) a_1 , a_3 , b_2 , b_4 , und die, welche a_2 , a_3 , b_1 , b_4 schneiden, sind hier identisch, ebenso ihre adjungirten (welche entweder a_2 , a_4 , b_1 , b_3 oder a, a, b, b, schneiden). Es erweist sich S selbst als Scheitel des zu diesen vereinigten Schaaren gehörenden Kummer'schen Kegels. Der Kegel Sc2 = K2 ist hier ein singulärer Kummer'scher Kegel, welcher durch Vereinigung aus zweien entstanden ist. Die zugehörigen adjungirten Kegelschnittschaaren sind durch Vereinigung aus je zwei Schaaren entstanden; ihre Kegelschnitte gehen sämmtlich durch den Kegelscheitel, sie sind singuläre Kegelschnittschaaren.* - Ausser den hier abgeleiteten Kegelschnittschaaren und der Involutionsschaar hat man noch zwei adjungirte Schaaren, welche zu einem Kummer'schen Kegel K12 = S1c2 gehören, dessen Scheitel S, ebenfalls auf a liegt. Diese Kegelschnitte, welche c berühren, schneiden entweder b3. b4 und berühren A an AS, oder sie schneiden a3. a4 und berühren B an BS. - Der singuläre Kegel K3 berührt F4 längs dem in AS, BS zerfallenden Kegelschnitt, währenddem K,2 die Fläche längs einem irreducibeln Kegelschnitt der Involutionsschaar berührt.

^{*} Jeder Kegelschnitt dieser singulären Schaaren berührt in S eine Seite des zu diesem Knoten S gehörenden Berührungskegels zweiter Ordnung St.

An dieser Stelle werde angenommen, es seien von der Fläche F^4 belannt der Cuspidalkegelschnitt, die Axen und ihre Schnittpunkte mit F^4 , mit anderen Worten c^2 und die vier Geradenpaare $a_i\,b_i\,(i=1,\,2,\,3,\,4)$. Dunn lassen sich die sechs Kegelschnittschaaren, die drei Kummer'schen Kegel und die Polarenhyperboloide direct finden. Die Kegelschnitte der usten Schaar (berühren c^2 und) schneiden die vier Geraden $a_1,\,a_2,\,b_3,\,b_4$; die der adjungirten Schaar schneiden $a_3,\,a_4,\,b_1,\,b_2$ u. s. f. Die Bestimmung der ersten Schaar ist folgende.

Es habe c' in einem seiner Punkte E die Tangente c (Fig. 2). Um e dreht man eine Ebene E, welche a_1 , a_2 , b_3 , b_4 in A_1 , A_2 , B_3 , B_4 schneidet. Wenn diese Ebene in einer bestimmten Lage einen Kegelschnitt der Schaar I enthalt, so ergeben die Seiten des Vierecks A, A, B, B, mit e geschnitten drei Punktepaare einer Involution, welche in E einen selbstentsprechenden Punkt haben muss. Die Gegenseiten $A_1 A_2$, $B_3 B_4$ liefern nun ein festliegendes Paar M, N; soll daher E der eine Doppelpunkt der Involution sein, so fällt der andere in O = ae. Wenn daher die Schnittpunkte P, P'von A, B, and A, B, mit E die Strecke OE harmonisch theilen, so befindet sich E in der richtigen Lage. — Bei der Drehung von E um e beschreiben P. P' zwei projective Reihen, für E = C fallen beide in O zusammen, und was kommt also nur einmal vor, dass OEPP' eine harmonische Gruppe ist (abgesehen von E = C, welche Ebene ausser Betracht fällt). Diese eine Ebene E, schneidet alsdann a, in dem Scheitel S, des Kegels K,2. Construirt man in dieser Ebene E, die vierten harmonischen Punkte A,2, B34 ∇ on S_1 für A_1A_2 , B_3B_4 , so ist deren Verbindungslinie die Polare von S_1 Fur den in E, gelegenen Kegelschnitt der Schaar I. - Lässt man nun E den Kegelschnitt c2 durchlaufen, so beschreibt E den Kummer'schen Kegel $S_1 = S_1 c^2$; die Polare $A_{12} B_{34}$ schneidet A. B in zwei projectiven Reihen, deren Träger die Polaren von S, für a, a, b, b, sind. Indem man beide Regelschnittschaaren beachtet, die K,2 zukommen, hat man: Die Polaren won S, für die Geradenpaare a_1a_2 , a_3a_4 , b_1b_2 , b_3b_4 sind ein windschiefes Vierseit des dem Kegel K12 zugeordneten Polarenhyperboloids.

Bei der Bestimmung der Clospunkte hat sich herausgestellt, dass die Ebenen durch die Axe aus F⁴ Kegelschnittpaare ausschneiden, welche A, B in A, B berühren. Daher kann man durch c² und irgend zwei dieser Kegelschnitte jedesmal eine Fläche zweiten Grades legen (welche F⁴ weiterhin hicht mehr schneidet). Umgekehrt schneidet eine Fläche zweiten Grades F², durch c² und einen von diesen Kegelschnitten gelegt, F⁴ in einem weiteren Regelschnitte durch A, B. Denn sei P irgend ein, F² und F⁴ gemeinmer Punkt, so muss der Kegelschnitt durch P, welcher A und B in A and B berührt, auf F² und auf F⁴ liegen. Legt man daher durch c² und einen beliebigen dieser Kegelschnitte, k², dessen Ebene durch die Axe geht, inen Büschel von Flächen zweiten Grades, so werden durch diese Flüchen

Lejtschrift f. Mathematik u. Physik XXX, 3.

Jede F4 mit Cuspidalkegelschnitt c2 wird längs c2 von einem Kegel zweiter Classe Ko2 berührt und die Flächen zweiten Grades F2, welche Ko2 längs c2 berühren, schneiden F4 in den Kegelschnitten der Involutionsschaar. Ordnen wir daher die Ko2 längs c2 berührenden Flächen zu einer Involution, so dass die Ebene C von c2 die eine selbstentsprechende (Doppelfläche) ist. Die Flächenpaare bringt man in bekannter Weise in projective Zuordnung mit den Ebenen E durch die Tangente a an c2. Die in E liegenden Kegelschnittpaare haben bei A stets vier consecutive Punkte gemein. Unter diesen Ebenen entspreche D der zweiten Doppelfläche, so ist D die Doppeltangentialebene von F4. Vor Allem aber ist die Ebene A ausgezeichnet, welche K_0^2 längs S_0A berührt: diese Ebene A schneidet ihr entsprechendes Flächenpaar in vier Geraden a, a, a, a, welche die einzigen der Schaar und der Fläche sind. Da nun alle Flächen F2 des genannten Büschels aus A die Geradenpaare einer Involution schneiden. deren Doppelstrahlen a und die Berührungsseite a_0 von A mit K_0^2 sind, so folgt: Die vier Geraden a; der Fläche sind durch die Axe a und die Gegenaxe a₀ paarweise harmonisch getrennt. Die Gegenaxe a, fällt in die singuläre Tangentialebene des Clospunktes, ihre Schnittpunkte mit F4 sind im Clospunkt vereinigt. — In bekannter Weise findet man: Die Fläche enthält zwei Kummer'sche Kegel K₁², K₂² und dazu gehörend zwei Paare adjungirter Kegelschnittschaaren, endlich die Involutionsschaar.

Kegel aus Punkten auf a_0 nach c^2 gelegt schneiden F^4 in Paaren von Kegelschnitten der Involutionsschaar.* Für K_1^2 , K_2^2 erhält man bekannterweise je nur einen Kegelschnitt doppelt. Für K_0^2 fällt der eine dieser Kegelschnitte in c^2 . — Zur Erzeugung der Kegelschnittschaaren dient übrigens K_0^2 wie folgt: Eine Ebene E des Kegels K_1^2 berühre c^2 in E. Diese Ebene enthält zwei Kegelschnitte der Schaaren I, I^* , welche c^2 in E berühren, K_0^2 (bezüglich dessen Schnitt mit E) bei E osculiren und von denen jeder zwei der Geraden a_i schneidet, welche nicht mit Bezug auf a_i a_0 conjugirt sind (so dass durch beide Kegelschnitte alle vier Geraden a_i getroffen werden).

Im Clospunkt fällt die singuläre Tangente mit der Tangente an den Cuspidalkegelschnitt zusammen. Weil die Axen a, a_0 sich schneiden, sind die Elemente der Fläche nicht mehr in geschaarter Involution, dagegen entsprechen sie sich noch für ∞^1 involutorische Centralcollineationen aus Punkten auf a und mit Ebenen durch a_0 .***

ŀ

^{*} Dasselbe gilt für die Fläche mit getrennten Clospunkten.

^{**} Ebenso wenn bei einer Fläche mit Doppelkegelschnitt zwei Pinchpunkte sich vereinigen.

^{***} Hieraus folgt u. A., dass die Geraden a_i paarweise durch a und a_b harmonisch getrennt sind.

Indem man die Geraden a_i in A mit a_0 oder unter sich zusammenfallen lässt, erhält man folgende Specialfälle:

- a) Wenn eine Gerade a_1 in a_0 fällt, so geschieht das gleichzeitig für eine zweite Gerade a_2 und es bleiben a_3 , a_4 , welche durch a, a_0 harmonisch getrennt sind. Die früheren Kegel K_1^2 , K_2^2 fallen hier zusammen und bilden den einzig vorhandenen singulären Kummer'schen Kegel K^2 , dessen Scheitel S ein conischer Knoten der Fläche ist. Der Berührungskegel an F^4 im Knoten, S^2 , und der singuläre Kegel K^2 haben an $a_0 = AS$ vier consecutive Erzeugende gemein. Bei der Erzeugung der Involutionsschaar entspricht hier der Ebene A (an K_0^2) ein Flächenpaar, dessen eine Fläche der Kegel K_0^2 selbst ist.
- b) Die Geraden a_i vereinigen sich paarweise, so dass $a_1 = a_2$, $a_3 = a_4$; \mathbf{F}^4 besitzt also noch zwei Geraden, welche durch a, a_0 harmonisch getrennt sind. Daraus folgt, dass zwei adjungirte Kegelschnittschaaren mit der Involutionsschaar zusammenfallen und es verbleibt noch ein Kegel mit seinen adjungirten Schaaren. (Der hier wegfallende Kegel wird zu einem doppelten Ebenenbüschel; sein Scheitel ist zu einem unbestimmten Punkte der Axe geworden.) Bezüglich der Erzeugung der Flächen aus ihrer Involutionsschaar ist hier massgebend, dass der Ebene A die eine, hier irreducible Doppelfläche des involutorischen Büschels entspricht; die Doppeltangentialebene fällt mit der singulären Tangentialebene im Clospunkt zusammen.
- c) Alle Geraden in A fallen mit a_0 zusammen, $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = a_0$. Die Büschel von Flächen zweiten Grades durch c^2 und irgend zwei der Geraden a_i sind identisch und es folgt: Alle Kegelschnittschaaren fallen mit der Involutionsschaar zusammen. Das Flächenpaar, welches bei der Erzeugung der Involutionsschaar der Ebene A entspricht, besteht aus dem Kegel K_0^2 doppelt gezählt.

In allen diesen Specialfällen behält A seinen Charakter als Clospunkt bei

Kleinere Mittheilungen.

IX. Conjugirte Reciprocitaten.

Der Begriff "conjugirte Reciprocitäten" ist durch die von Herrn Prof. Rosanes in Breslau veröffentlichte Abhandlung "Zur Theorie der reciproken Verwandtschaft", Crelle's Journal Bd. 90, erweitert worden. Herr Prof. Reye in Strassburg spricht in seiner "Geometrie der Lage", I. Abtheilung, 2. Auflage, S. 194 figg., von sich stützenden Kegelschnitten. Die vorliegende Arbeit hat den Zweck, analog den Reye'schen Ausführungen, den Begriff sich stützender Reciprocitäten aufzustellen und deren Identität mit den von Herrn Rosanes betrachteten conjugirten Reciprocitäten nachzuweisen.

Es mögen $a_1 a_2 \ldots$, $b_1 b_2 \ldots$ die Geraden zweier Ebenen A und B, $\alpha_1 \alpha_2 \ldots$, $\beta_1 \beta_2 \ldots$ deren Punkte bedeuten. Vermöge der Reciprocität R_1 entspricht der Geraden a_i ein Pol P_{a_i} und dem Punkte α_i eine Polare p_{a_i} ; vermöge der Reciprocität R_2 ist der Geraden a_i ein Pol \mathfrak{P}_{a_i} und dem Punkte α_i eine Polare \mathfrak{p}_{a_i} zugeordnet.

Wie gewöhnlich, werden zwei Punkte conjugirt genannt, wenn der eine in der Polaren des andern liegt; ebenso heissen zwei Gerade conjugirt, wenn die eine durch den Pol der andern geht. Statt conjugirter Punkte oder Geraden einer Reciprocität wird auch oft der Ausdruck "Nullpaare" dieser Reciprocität Anwendung finden. Alle übrigen vorkommenden Bezeichnungen sind in der erwähnten Rosanes'schen Abhandlung erklärt.

8 1.

Sind (a_1b_1) und (a_2b_2) zwei Nullpaare der R_2 , derart, dass a_2 den Pol $P_{b_1} = a_1$ und b_2 den Pol $P_{a_1} = \beta_1$ enthält, und construiren wir zu $a_1 \mid a_2 = a_3$ die Polare $p_{a_1} = b_3$ und zu $b_1 \mid b_2 = \beta_3$ die Polare $p_{\beta_1} = a_3$, so ist $a_1 a_2 a_3$ ein Paar polarer Dreiseite der R_1 , deren entsprechende Seitenpaare $b_1 b_2 b_3$ (a_1b_1) und (a_2b_3) conjugirt in R_3 sind.

Lassen wir a_2 das Büschel erster Ordnung a_1 durchlaufen, so beschreibt b_3 das Strahlenbüschel erster Ordnung β_1 , a_3 das Büschel a_1 und β_{a_1} die gerade Punktreihe p_{a_1} . Die beiden concentrischen Büschel β_1 \mathfrak{P}_{a_2} und β_1 \mathfrak{P}_{a_2} sind projectivisch, sie haben daher zwei Strahlen b_3 und b_3 entsprechend gemein.

Für $b_3^i=b_3^1$ und b_3^2 ist $\mathfrak{P}_{a,i}$ in b_3^i gelegen, es sind daher $a_1a_2^1a_3^1$ und $a_1a_2^2a_3^2$ zwei Paare polarer Dreiseite der Reciprocität R_1 , deren entsprechende Seitenpaare (a_1b_1) , $(a_2^1b_2^1)$, $(a_3^1b_3^1)$, $(a_2^2b_2^2)$, $(a_3^2b_3^2)$ conjugirt sind in R_2 .

Die beiden Dreiseitenpaare $a_1 a_2^{-1} a_3^{-1}$ und $a_1 a_2^{-2} a_3^{-2}$ müssen nicht vollständig real sein, denn die Seiten b_3^{-1} und $b_1 b_2^{-2} b_3^{-2}$ müssen nicht vollständig real sein, denn die Seiten b_3^{-1} und b_3^{-2} z. B. können als Doppelstrahlen zweier projectivischen Büschel, die concentrisch liegen, imaginär werden.

"Sind daher R_1 und R_2 zwei beliebige Reciprocitäten, so giebt es eine Doppelserie von Paaren polarer Dreiseite $\begin{array}{c} a_1\,a_2\,a_3 \\ b_1\,b_2\,b_3 \end{array}$ der R_1 , deren entsprechende Seiten $(a_i\,b_i)$, $i=1,\,2,\,3$, conjugirt sind in R_2 ."

§ 2.

"Enthält die Reciprocität R_1 ausser dieser Doppelserie von Paaren polarer Dreiseite, deren entsprechende Seitenpaare conjugirt in R_2 sind, noch ein einziges Paar $a_1a_2a_3$ solcher polarer Dreiseite, so sind die entsprechenden Seiten $(a_i^m b_i^m)$, i=1,2,3, aller polaren Systeme $a_1^m a_2^m a_3^m \atop b_1^m b_2^m b_3^m$ der R_1 , welche auf die in § 1 angegebene Art construirt werden, Nullpaare der R_2 ." Be weis.

I. Theil. Hier zeigen wir, dass bei festgehaltenen $(a_1 b_1)$ a_2^i einen beliebigen Strahl des Punktes a_1 bedeuten kann, und stets wird $a_1 a_2^i a_3^i$ ein Paar polarer Dreiseite der R_1 vorstellen, welche die in unserem Satze gewünschten Eigenschaften haben.

Wenn (a_1b_1) festgehalten wird, so beschreibt, wie wir in § 1 gesehen, a_i^i das Büschel a_1 , b_3^i das Büschel β_1 und $\mathfrak{P}_{a_3^i}$ eine gerade Punktreihe, wenn a_2^i sich um a_1 dreht. Für $a_3^i=a_3$ ist $\mathfrak{P}_{a_3^i}=\mathfrak{P}_{a_3}$ nach Voraussetzung in $b_i^i=b_3$ gelegen; die beiden concentrischen Strahlenbüschel β_1^i $\mathfrak{P}_{a_3^i}$ und b_i^i haben daher, ausser ihren zwei Doppelstrahlen, noch den Strahl b_3 ent-prechend gemein, sie sind also identisch, d. h. $\mathfrak{P}_{a_3^i}$ liegt stets in b_3^i , und alle polaren Dreiseitenpaare $a_1 a_2^i a_3^i$ von a_1^i genügen unserem Satze.

II. Theil. Wir weisen jetzt nach, dass unser Satz für die ganzen Ebeen A und B besteht.

a' konnte ein beliebiger Strahl des Büschels α_1 sein, und stets ge
algie a, α_1 a' α_2 unserem Satze. In ganz analoger Weise lässt einh zeigen,

dass a_1^i ein beliebiger Strahl des Punktes a_2 sein kann, und immer wird das polare System $a_1^i a_3^i a_3^i$ von $a_2^i a_3^i a_3^i$ von $a_2^i a_3^i a_3^i$ von $a_3^i a_3^i a_3^i a_3^i$ von $a_3^i a_3^i a_3^i a_3^i$ von $a_3^i a_3^i a_3^i a_3^i a_3^i$ von $a_3^i a_3^i a_3^i a_3^i a_3^i$ von $a_3^i a_3^i a_3^i a_3^i a_3^i a_3^i a_3^i a_3^i$ von $a_3^i a_3^i a_3$

Sind $(a_1^m b_1^m)$ irgend zwei in R_2 conjugirte Strahlen der Büschel a_2 resp. β_2 , so kann $P_{a_1^m} = \beta_1^m$ und $P_{b_1^m} = \alpha_1^m$ jeden Punkt der Geraden p_{a_1} resp. p_{β_2} vorstellen. Construiren wir jetzt, gemäss den Vorschriften des § 1, alle Paare polarer Dreiseite der R_1 , deren Seiten a_2^m durch α_1^m gehen, so kommt unter diesen ein Paar vor (dessen Seite $a_2^m = \alpha_1^m \alpha_1$ ist), dessen drei entsprechende Seitenpaare $(a_i^m b_i^m)$, i = 1, 2, 3, conjugirt sind in R_2 ; es haben daher auch, nach dem im I. Theil Bewiesenen, alle diese Dreiseitenpaare $a_1^m a_2^m a_3^m$ dieselbe Eigenschaft.

Weil a_1^m irgend ein Punkt der Geraden p_{β_1} und a_2^m ein beliebiger Strahl des Punktes a_1^m sein kann, so stellt a_2^m jeden Strahl der Ebene vor. In gleicher Weise lässt sich zeigen, dass auch a_1^m einen beliebigen Strahl der Ebene bedeuten kann, und stets wird das polare System $a_1^m a_2^m a_3^m$ der $a_1^m a_3^$

"Von zwei Reciprocitäten R_1 und R_2 , welche dem soeben bewiesenen Satze Genüge leisten, sagt man, sie seien einander conjugirt."

"Sind daher zwei Reciprocitäten R_1 und R_2 einander conjugirt und man construirt ein Paar polarer Dreiseite der R_1 , deren zwei Paare entsprechender Seiten conjugirt sind in R_2 , so hat auch das dritte Paar entsprechender Seiten diese Eigenschaft."

§ 3.

Suchen wir zu a_1 die Pole $P_{a_1} = \beta_1$ und \mathfrak{P}_{a_1} und construiren zu $\beta_1 = \mathfrak{P}_{a_0}$ die Polare a_2 und schliesslich zu a_3 den Pol $P_{a_1} = \beta_3$, so ist $a_1 a_2 a_3$ ein polares System der a_1 , dessen entsprechende Seiten $a_1 a_2 a_3$ ein polares System der $a_1 a_2 a_3$ ein polares System der $a_1 a_2 a_3$ ein polares System der $a_1 a_2 a_3$ Seiten $a_1 a_2 a_3$ ein polares System der $a_1 a_2 a_3$ entsprechende Seiten $a_1 a_2 a_3$ ein polares System der $a_1 a_2 a_3$ entsprechende Seiten $a_1 a_2 a_3$ ein polares System der $a_1 a_2 a_3$ entsprechende Seiten $a_1 a_2 a_3$ ein polares System der $a_1 a_2 a_3$ entsprechende Seiten $a_1 a_2 a_3$ ein Polares System der $a_2 a_3$ entsprechende Seiten $a_1 a_2 a_3$ ein Polares System der $a_2 a_3$ entsprechende Seiten $a_1 a_2 a_3$ ein Polares System der $a_2 a_3$ entsprechende Seiten $a_1 a_2 a_3$ ein Polares System der $a_2 a_3$ entsprechende Seiten $a_1 a_2 a_3$ ein Polares System der $a_2 a_3$ entsprechende Seiten $a_2 a_3$ ein Polares System der $a_2 a_3$ entsprechende Seiten $a_2 a_3$ ein Polares System der $a_2 a_3$ ein Polares System der $a_3 a_4$ entsprechende Seiten $a_1 a_2 a_3$ ein Polares System der $a_2 a_3$ ein Polares System der $a_3 a_4$ entsprechende Siener $a_4 a_4$ entsprechende System der $a_4 a$

Beweis.

Durchläuft a_1 das Büschel a_3 , so bewegt sich $P_{a_1^i} = \beta_1^i$ in b_3 , $\mathfrak{P}_{a_1^i}$ in b_1 . Da $\beta_1^i = \mathfrak{P}_{a_2^i}$ und $\mathfrak{P}_{a_1} = \beta_2^i$ ist, so beschreiben a_3^i und a_2^i die Büschel erster Ordnung a_2 und a_1 , also $P_{a_1^i} = \beta_2^i$ und $\mathfrak{P}_{a_2^i}$ zwei gerade Punktreihen, die projectivisch sind und in demselben Träger b_2 liegen.

Diese Punktreihen β_3^i und $\mathfrak{P}_{a_2^i}$ sind identisch. Denn alle auf die angegebene Weise construirten polaren Dreiseitenpaare $\begin{array}{c} a_1^{\ i} a_2^{\ i} a_3^{\ i} \\ b_1^{\ i} b_2^{\ i} b_3^{\ i} \end{array}$ der R_1 haben die Eigenschaft, dass ihre entsprechenden Seiten Nullpaare der R_2 sind; es muss daher $\mathfrak{P}_{a_2^i}$ stets ein Punkt der Geraden b_2^i sein. Da aber alle \mathfrak{P}_{a_2} in der Geraden b_3 liegen, so ist $\mathfrak{P}_{a_2^i} = b_3 | b_2^i = \beta_3^i$.

Bedeutet daher a_1^i irgend einen Strahl des Büschels a_3 , so lässt sich stets ein Paar polarer Dreiseite $a_1^i a_2^i a_3^i \atop b_1^i b_3^i b_3^i$ der R_1 construiren, welche unserem Satze genügen.

Ist a_1^m ein beliebiger Strahl der Ebene und wir construiren in der obigen Weise alle Paare polarer Dreiseite $a_1^m a_2^m a_3^m$ der R_1 , deren Seiten a_1^m durch den Punkt a_3^m gehen, so ist für $a_1^m = a_1^0 = a_3^m \cdot a_3^n$, $a_1^0 a_2^0 a_3^0$ ein Paar polarer Dreiseite der R_1 , die unserem Satze genügen.

Nach dem zuerst Bewiesenen haben daher alle polaren Dreiseitenpaare $a_1^m a_2^m a_3^m$ die in unserem Satze geforderten Eigenschaften.

\$ 4.

Ist $a_1 a_2 a_3 a_4$ ein Vierseit der A-Ebene, $b_1 b_2 b_3 b_4$ ein solches der B-Ebene, und ist

nennt man $a_1 a_2 a_3 a_4$ ein polares System von zwei Vierseiten der Reciprocität R_1 , wenn die sechs Punktepaare $(a_i | a_k, b_\ell | b_m)$, wo iklm eine Anordnung der vier Zahlen 1234 vorstellt A h wenn

$$(\alpha_1 \beta_4), (\alpha_2 \beta_5), ($$

Vallpaare dieser Reciproci

Ein solches System von zwei polaren Vierseiten $a_1 a_2 a_3 a_4$ der R_1 ist vollkommen bestimmt, sobald zwei zugeordnete Seitenpaare $(a_1 b_1)$, $(a_2 b_2)$, eine dritte Seite a_3 und von der zugeordneten Geraden b_3 ein Punkt π gegeben ist. Man hat dann

$$\alpha_1 = a_1 | a_2, \quad \alpha_2 = a_1 | a_3, \quad \alpha_6 = a_2 | a_3, \quad \beta_1 = b_1 | b_3.$$

 β_3 wird in der Geraden b_1 , β_5 in b_2 , β_4 in β_3 $\beta_5 = b_4$ und α_4 in α_5 so construirt, dass $(\alpha_6 \beta_5)$, $(\alpha_2 \beta_5)$, $(\alpha_1 \beta_4)$ und $(\alpha_4 \beta_1)$

conjugirte Punktpaare der Reciprocität R, bilden, d. h. es wird

$$eta_3 = b_1 | p_{a_1}, \quad eta_5 = b_2 | p_{a_2}, \quad eta_4 = eta_3 \cdot eta_5 | p_{a_1}, \quad a_4 = a_3 | p_{eta_1}.$$

Weiter ist

 $b_3 = \beta_1 \cdot \pi$, $\beta_2 = b_1 | b_3$, $\beta_6 = b_2 | b_3$, $\alpha_3 = a_1 | p_{\beta_4}$, $a_4 = a_3 \cdot \alpha_4$ und $\alpha_5 = a_4 | a_2$. a_5 ist dann zu β_2 conjugirt, denn es besteht der Satz:

"Sind fünf Eckenpaare zweier Vierseite Nullpaare einer Reciprocität, so ist auch das sechste Eckenpaar conjugirt in Bezug auf diese Reciprocität." Um diesen Satz zu beweisen, sprechen wir ihn in der Form aus:

"Hat man zwei Dreiseite $a_1 a_2 a_3$ und $b_1 b_2 b_3$ und sind die in b_1 , b_2 und b_3 liegenden resp. zu α_6 , α_2 und α_1 conjugirten Punkte β_3 , β_5 und β_4 Punkte einer Geraden b_4 , so liegen auch die in a_1 , a_2 und a_3 befindlichen resp. zu β_6 , β_2 und β_1 conjugirten Punkte α_3 , α_5 und α_4 in einer Geraden a_4 ."

Beweis.

Die beiden Dreiseite $b_1b_2b_3$ und $p_{\alpha_i}p_{\alpha_i}p_{\alpha_i}$ liegen perspectivisch, weil $b_1|p_{\alpha_i}=\beta_3$, $b_2|p_{\alpha_i}=\beta_5$ und $b_3|p_{\alpha_i}=\beta_4$ Punkte einer Geraden b_4 sind; die drei Verbindungslinien der entsprechenden Eckpunkte beider Dreiseite schneiden sich folglich in einem Punkte. Bezeichnen wir daher $p_{\alpha_i}|p_{\alpha_i}=\beta'_1$, $p_{\alpha_i}=\beta'_2$ und $p_{\alpha_i}|p_{\alpha_i}=\beta'_5$, so gehen die drei Geraden $\beta_1\beta'_1$, $\beta_2\beta'_2$ und $\beta_6\beta'_6$ durch einen Punkt S.

Der Pol der Geraden $\beta_1 \beta_1'$ ist α_4 , der von $\beta_2 \beta_2'$ ist α_5 und der von $\beta_6 \beta_6'$ ist α_3 ; die drei Punkte α_3 , α_4 und α_5 liegen daher in einer Geraden α_4 , q. e. d.

Aus der angegebenen Construction der polaren Vierseite der Reciprocität R_1 ergiebt sich, dass b_1 , b_2 und π so gewählt werden können, dass (a_1b_1) , (a_3b_3) , (a_3b_3) Nullpaare der Reciprocität R_2 werden. Wir haben zu diesem Zwecke nur festzusetzen, dass b_1 den Pol \mathfrak{P}_{a_1} , b_3 den Pol \mathfrak{P}_{a_2} enthält und das der Punkt π mit dem Pol \mathfrak{P}_{a_3} identisch wird.

§ 5.

Beweis.

Wie im vorigen Paragraphen gezeigt wurde, lassen sich unendlich viele Paare polarer Vierseite der R_1 construiren, die (a_1b_1) und (a_2b_3) zu Seiten haben und bei denen drei Paare entsprechender Seiten (a_ib_i) , i=1,2,3, conjugirt in R_2 sind. Ist $a_1a_2a_3a_4$ ein solches Paar, und a_3 durchläuft das Büschel a_4 , so beschreiben β_3^i und β_5^i zwei projectivische Punktreihen in b_1 resp. b_2 , die zu einander perspectivisch liegen, weil für $a_3^i = p_{\beta_1}$ $\beta_3^i = \beta_5^i = \beta_1 = b_1 | b_2$ wird.

Für $a_3^i = \alpha_4^i \alpha_1^i$ ist $\alpha_6^i = \alpha_2^i = \alpha_1^i$, daher $\beta_3^i = b_1 | p_{\alpha_1}^i$, $\beta_5^i = b_2 | p_{\alpha_1}^i$ und $\beta_3^i \cdot \beta_5^i = p_{\alpha_1}^i$.

Wenn also a_3^i das Büschel a_4 beschreibt, bewegt sich $\beta_3^{i} \cdot \beta_5^{i} = b_4^{i}$ in einem Strahlenbüschel erster Ordnung, dessen Scheitel der Schnittpunkt der Geraden b_4 und p_{a_1} , d. h. der Punkt β_4 ist.

Da $b_3^i = \beta_4^{i}$ $\mathfrak{B}_{\alpha_i}^i$ ist, so beschreibt unter diesen Umständen $\beta_2^i = b_1 | b_3^i$ die gerade Punktreihe b_1 , $\alpha_5^i = a_2 | p_{\beta_2^i}$ die projectivische Punktreihe a_2 , $a_4^i = a_4^i a_5^i$ das Büschel erster Ordnung a_4 , welches dem Büschel b_4^i projectivisch ist. Die Punktreihe $\mathfrak{B}_{\alpha_1^i}$ ist demnach projectivisch dem Büschel b_4^i , die beiden concentrischen Strahlenbüschel $\beta_4^i \mathfrak{B}_{\alpha_1^i}$ und b_4^i haben daher zwei Strahlen b_4^1 und b_4^2 entsprechend gemein; $a_1 a_2 a_3^1 a_4^1$ und $a_1 a_2 a_3^3 a_4^2$ stellen daher zwei Paare polarer Vierseite der a_1^i vor, deren entsprechende Seitenpaare conjugirt in a_1^i sind, a_2^i e. d.

§ 6.

"Enthält die Reciprocität R_1 , ausser den im vorigen Paragraphen erwähnten Paaren polarer Vierseite, deren vier entsprechende Seitenpaare conjugirt in R_2 sind, noch ein einziges Paar $\begin{array}{c} a_1\,a_2\,a_3\,a_4 \\ b_1\,b_2\,b_3\,b_4 \end{array}$ derselben Beschaffenheit, und wir construiren nach den Regeln des § 5 irgend ein Paar polarer Vierseite $\begin{array}{c} a_1^m\,a_2^m\,a_3^m\,a_4^m \\ b_1^m\,b_2^m\,b_3^m\,b_4^m \end{array}$ der R_1 , so sind die entsprechenden Seiten $(a_1^m\,b_1^m)$, i=1,2,3,4, dieser Vierseite conjugirt in R_2 ."

Beweis.

:=

:=

I. Theil. Wir zeigen zunächst, dass bei festgehaltenen a_1 , a_2 , b_1 und b_2 irgend ein Strahl a_3^i des Punktes a_4 sein kann, und stets wird das Polare System $a_1 a_2 a_3^i a_4^i \\ b_1 b_2 b_3^i b_4^i$ der R_1 unserem Satze genügen.

Wie wir gesehen, bewegen sich β_4 $\beta_{a,i}$ und b_4 in swei concentrischen und projectivischen Strahlenbüscheln erster α_i duchlenft. Die Büschel β_4 $\beta_{a,i}$ und α_i m Doppelschen, noch den Strahl b_4 er

nach Voraussetzung \mathfrak{P}_{a_i} ein Punkt von b_i . Die beiden Büschel β_i \mathfrak{P}_{a_i} und b_i sind daher identisch, d. h. der erste Theil unseres Satzes ist bewiesen.

II. Theil. Wir weisen hier nach, dass unser Satz für alle Geraden der Ebenen A und B besteht.

 a_3 konnte ein beliebiger Strahl des Büschels a_4 sein, und stets genügte $a_1 a_2 a_3^i a_4^i$ unserem Satze. In analoger Weise lässt sich zeigen, dass a_3 einen beliebigen Strahl a_3^i des Büschels a_6 und a_1^i irgend einen Strahl des Punktes a_1 bedeuten kann, und immer wird sich ein Paar polarer Vierseite $a_1^i a_2^i a_3^i a_4^i$ der a_1^i construiren lassen, deren entsprechende Seiten Nullpaare der a_2^i sind.

Ist α_1^m ein beliebiger Punkt der Ebene A, so schneiden sich in demselben zwei Strahlen o_1^m und a_2^m der beiden Büschel α_1 und α_6 . Bezeichnet α_2^m einen beliebigen Punkt der Geraden a_1^m , so geht durch ihn der Strahl a_3^m des Büschels α_4 . Es lässt sich dann ein polares System $a_1^m a_3^m a_3^m a_4^m a_5^m b_4^m der R_1 \text{ construiren, dessen entsprechende Seitenpaare } (a_i^m b_i^m), \ i = 1, 2, 3, 4, \text{ conjugirt in Bezug auf die Reciprocität } R_3 \text{ sind.}$

Ist daher a_1^m irgend ein Strahl des Punktes a_1^m , a_2^m ein beliebiger Strahl von a_6^m , a_3^m ein beliebiger Strahl von a_4^m und bedeuten b_1^m resp. b_2^m zwei beliebige Geraden der Punkte $\mathfrak{P}_{a_1^m}$ resp. $\mathfrak{P}_{a_3^m}$, so lässt sich ein Paar polarer Vierseite $a_1^m a_2^m a_3^m a_4^m$ der R_1 finden, welche unserem Satze genügen, q. e. d. $b_1^m b_2^m b_3^m b_4^m$

Auf Grund unseres Satzes stellen wir die Definition auf:

"Die Reciprocität R_1 stützt oder trägt die Reciprocität R_2 , und umgekehrt R_2 stützt sich oder ruht auf R_1 , wenn R_1 , ausser den im § 5 erwähnten Paaren polarer Vierseite, deren entsprechende Seiten conjugirt in R_2 sind, noch ein einziges Paar polarer Vierseite derselben Beschaffenheit enthält."

"Stützen sich die beiden Reciprocitäten R_1 und R_2 , und wir construiren nach den Vorschriften des § 5 irgend ein System polarer Vierseite $a_1 a_2 a_3 a_4$ der R_1 , so sind dessen vier entsprechende Seitenpaare $(a_i b_i)$, i = 1, 2, 3, 4, congruent in R_2 ."

§ 7.

"Stützen sich die Reciprocitäten R_1 und R_2 , so sind sie auch einander conjugirt."

Beweis.

Von dem System polarer Vierseite $a_1 a_2 a_3 a_4$ der R_1 , dessen entsprechende Seitenpaare (a,b_i) , i=1,2,3,4, conjugirt in R_2 sind, wählen wir a_2 and a_3 beliebig and definiren:

$$b_1 = \mathfrak{P}_{a_1} P_{a_2}, \quad b_2 = \mathfrak{P}_{a_2} P_{a_1}.$$

 a_3 bestimmen wir so, dass $P_{a_3} = b_1 \mid b_2 = \beta_1$ wird. In diesem Falle ist $\beta_5 = b_2 \mid p_{a_3} = b_2 \mid P_{a_1} \cdot P_{a_2} = P_{a_1}$, $\beta_3 = b_1 \mid p_{a_4} = b_1 \mid P_{a_2} \cdot P_{a_3} = P_{a_3}$, $b_4 = b_3 \cdot \beta_5 = P_{a_1} \cdot P_{a_2}$, $\beta_4 = b_4 \mid P_{a_1} \cdot P_{a_2}$ (d. h. unbestimmt in b_4). Wir wählen β_4 in b_4 so, dass $b_3 = P_{a_3} \cdot \mathfrak{P}_{a_3}$ wird. Es ist dann $\beta_2 = \beta_3 = \beta_1$,

also

 $a_4 = a_3 | p_{\beta_1} = a_3 | a_3$, $a_5 = a_2 | p_{\beta_2} = a_3 | a_3 = a_6$, $a_3 = a_1 | p_{\beta_6} = a_1 | a_5 = a_2$; a_4 ist daher identisch mit a_3 .

Weil wir bei unserer Construction die Regeln des § 5 befolgt haben, müssen (a_1b_1) , (a_2b_3) , (a_3b_3) , (a_4b_4) Nullpaare der R_2 sein. Da $a_4=a_3$ ist, so muss \mathfrak{P}_{a_1} ein Punkt der Geraden b_4 sein, d. h. $\mathfrak{P}_{a_1}=b_3|b_4=\beta_4$. Die beiden Dreiseite $a_1a_2a_4$, von denen zwei Seiten a_1 und a_2 beliebig sind, bilden daher ein polares System der Reciprocität R_1 , dessen entsprechende Seitenpaare (a_1b_1) , (a_2b_2) und (a_4b_4) conjugirt in R_2 sind, q. e. d.

"Zwei conjugirte Reciprocitäten R_1 und R_2 stützen sich."

Beweis.

Um die Richtigkeit dieses Satzes nachzuweisen, zeigen wir zunächst: "Ein Paar polarer Dreiseite $a_1 a_2 a_3 \\ b_1 b_3 b_3$ der Reciprocität R_1 wird durch jedes beliebige Geradenpaar $(a_4 b_4)$ zu einem System polarer Vierseite $a_1 a_2 a_3 a_4 \\ b_1 b_2 b_3 b_4$ dieser Reciprocität ergänzt."

Denn ist $a_1 a_2 a_3$ ein System polarer Dreiseite der R_1 , so muss $\beta_1 b_2 b_3$ $\beta_1 = P_{a_1}$, $\beta_2 = P_{a_2}$, $\beta_6 = P_{a_1}$

sein. Es sind daher

$$(\alpha_1 \beta_4)$$
, $(\alpha_2 \beta_5)$, $(\alpha_3 \beta_6)$, $(\alpha_4 \beta_1)$, $(\alpha_5 \beta_2)$ und $(\alpha_6 \beta_2)$

conjugirte Punktpaare der R_1 , $a_1 a_2 a_3 a_4$ folglich ein System polarer Vierseite der R_1 .

Ist die Reciprocität R_1 conjugirt der Reciprocität R_2 , so sind die entsprechenden Seitenpaare (a_ib_i) , i=1,2,3, des polaren Systems $\begin{array}{c} a_1a_2a_3\\b_1b_2b_3\end{array}$ von R_1 conjugirt in R_2 . $\begin{array}{c} a_1a_2a_3\\b_1b_2b_3\end{array}$ wird durch jedes beliebige Seitenpaar (a_4b_4) in einem System polarer Vierseite $\begin{array}{c} a_1a_2a_3a_4\\b_1b_2b_3b_4\end{array}$ der R_1 ergänzt. Bestimmen wir daher (a_4b_4) so, dass es ein Nullpaar der R_2 vorstellt, so bilden $a_1a_2a_3a_4$ ein Paar polarer Vierseite von R_1 , derem

Die Gleichung 2) giebt zunächst wegen Nr. 1) und durch Coefficientenvergleichung

4)
$$\begin{cases} f_1(\mu + \nu) = f_1(\mu) + f_1(\nu), \\ f_2(\mu + \nu) = f_2(\mu) + f_1(\mu) f_1(\nu) + f_2(\nu), \\ f_3(\mu + \nu) = f_3(\mu) + f_2(\mu) f_1(\nu) + f_1(\mu) f_2(\nu) + f_3(\nu), \end{cases}$$

Für $\mu = \nu = 0$ findet sich $f_1(0) = f_2(0) = f_3(0) \dots = 0$; ertheilt man ferner den Gleichungen 4) die Formen

$$\begin{split} & \frac{f_1(\mu + \nu) - f_1(\mu)}{\nu} := \frac{f_1(\nu)}{\nu}, \\ & \frac{f_2(\mu + \nu) - f_2(\mu)}{\nu} = \frac{f_1(\nu)}{\nu} f_1(\mu) + \frac{f_2(\nu)}{\nu}, \\ & \frac{f_3(\mu + \nu) - f_3(\mu)}{\nu} = \frac{f_1(\nu)}{\nu} f_2(\mu) + \frac{f_2(\nu)}{\nu} f_1(\mu) + \frac{f_3(\nu)}{\nu} \end{split}$$

lässt v in Null übergehen und setzt zur Abkürzung

$$Lim\frac{f_k(v)}{v} = f'_k(0) = c_k,$$

so gelangt man zu den Differentialgleichungen

$$f'_1(\mu) = c_1,$$

 $f'_2(\mu) = c_1 f_1(\mu) + c_2,$
 $f'_3(\mu) = c_1 f_2(\mu) + c_3 f_1(\mu) + c_3,$

Unter Rücksicht auf $f_k(0) = 0$ erhält man hieraus

$$f_{1}(\mu) = c_{1} \mu,$$

$$f_{2}(\mu) = \frac{1}{2} c_{1}^{2} \mu^{2} + c_{3} \mu,$$

$$f_{3}(\mu) = \frac{1}{6} c_{1}^{3} \mu^{3} + c_{1} c_{2} \mu^{2} + c_{3} \mu,$$

$$f_{4}(\mu) = \frac{1}{24} c_{1}^{4} \mu^{4} + \frac{1}{2} c_{1}^{2} c_{2} \mu^{3} + (c_{1} c_{3} + \frac{1}{2} c_{2}^{2}) \mu^{2} + c_{4} \mu,$$

$$f_{5}(\mu) = \frac{1}{20} c_{1}^{5} \mu^{5} + \frac{1}{6} c_{1}^{3} c_{2} \mu^{4} + \frac{1}{2} (c_{1}^{3} c_{3} + c_{1} c_{2}^{2}) \mu^{3} + (c_{1} c_{4} + c_{2} c_{3}) \mu^{2} + c_{5} \mu,$$

worin c_1 , c_2 , c_3 etc. willkürliche Constanten bedeuten. Das allgemeine Bildungsgesetz dieser Gleichungen würde noch zu erörtern sein.

Für $c_1=1$, $c_2=-\frac{1}{2}$, $c_3=+\frac{1}{3}$, $c_4=-\frac{1}{4}$ u. s. w. kommt man auf den binomischen Satz zurück; für $c_1=1$, $c_2=\frac{3}{2}$, $c_3=\frac{10}{3}$, $c_4=\frac{35}{4}$, $c_5=\frac{126}{5}$ u. s. w. entsteht die gleichfalls bekannte Entwickelung

$$1 + \frac{\mu}{1}x + \frac{\mu(\mu+3)}{1 \cdot 2}x^3 + \frac{\mu(\mu+4)(\mu+5)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^3 + \frac{\mu(\mu+5)(\mu+6)(\mu+7)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}x^4 + \frac{\mu(\mu+6)\dots(\mu+9)}{1 \cdot 2 \dots 5}x^5 + \dots$$

$$= (1+x+2x^2+5x^3+14x^4+42x^5+\dots)^{\mu} = \left(\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}\right)^{\mu}$$

Eine weitere Untersuchung dieser Frage behalte ich mir vor.

SCHLONITOR.

Ueber die Bewegung ähnlich-veränderlicher ebener Systeme.

Von

PAUL SOMOFF,
Docent am K. Foretinstitut in St. Petersburg.

Durch die Untersuchungen von Grouard*, Burmester** und Geisenheimer*** sind die meisten Eigenschaften der Bewegung ähnlich-veränderlicher Systeme bekannt geworden. Diese Untersuchungen, wie auch die allgemeinen Untersuchungen von Burmester über die Bewegung collinear-veränderlicher Systeme, wurden auf geometrischem Wege durchgeführt, wobei die bekannten Eigenschaften collinearer Figuren als Grundlage dienten. Obgleich die geometrische Methode sehr oft schneller zum Ziele führt, als die Untersuchung auf analytischem Wege, beabsichtige ich in diesem Artikel gerade den zweiten Weg zu wählen, weil dadurch ein etwas anderer Gesichtspunkt gewonnen und vielleicht auch eine grössere Einheit der Untersuchung erzielt wird.

Es sei mir daher erlaubt, bevor ich zum eigentlichen Gegenstande dieser Mittheilung, der Zusammensetzung der Bewegungen und der relativen Bewegung ähnlich-veränderlicher ebener Systeme übergehe, einige Grundformeln, sowie auch einige analytische Beweise schon bekannter Sätze an zusühren und dabei auf gewisse Einzelheiten einzugehen.

- 1. Die Bewegung eines ähnlich-veränderlichen ebenen Systems kann durch folgende Grössen vollständig bestimmt werden:
 - a) durch die Coordinaten (x_1, y_1) eines Systempunktes M_1 ,
 - b) durch die momentane Winkelgeschwindigkeit r und
- c) durch den Ausdehnungscoefficienten e,
 alle vier Grössen als Functionen der Zeit t betrachtet.

^{*} L'Institut 1865, S. 159 und 179.

Diese Zeitschrift Bd. XIX 8. 154,

on Daselbst Bd. XXIV S. 845.

Schooleife & Mathematik u. Physik XXX, 4.

194

Indem wir entsprechend durch (x^0, y^0) und (x_1^0, y_1^0) die Anfangscoordinaten eines Systempunktes (x, y) und des Grundpunktes M_1 bezeichnen, erhalten wir folgende Grundgleichungen:

$$\begin{cases} x = x_1 + e^{\int_0^t dt} \left[(x^0 - x_1^0) \cos \left(\int_0^t dt \right) - (y^0 - y_1^0) \sin \left(\int_0^t dt \right) \right], \\ y = y_1 + e^{\int_0^t dt} \left[(x^0 - x_1^0) \sin \left(\int_0^t dt \right) - (y^0 - y_1^0) \cos \left(\int_0^t r dt \right) \right]. \end{cases}$$

Diese Ausdrücke können auch als Lösungen folgender simultaner Differentialgleichungen betrachtet werden:

2)
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{dx_1}{dt} + \varepsilon(x - x_1) - r \ y - y_1), \\ \frac{dy}{dt} = \frac{dy_1}{dt} + \varepsilon(y - y_1) + r(x - x_1), \end{cases}$$

welche auch als Grundgleichungen für die Bewegung des betrachteten Systems angenommen werden können.

Die Bewegung eines ähnlich-veränderlichen ebenen Systems kann bekanntlich auch durch die Bewegung zweier beliebigen Systempunkte M_1 und M_2 bestimmt werden. Wenn wir durch (x_1, y_1) und (x_2, y_2) die Coordinaten dieser Punkte und durch (a_1, b_1) und (a_2, b_2) die Geschwindigkeitscomponenten derselben bezeichnen, können wir folgendermassen die Functionen ε und r darstellen:

Zur Bestimmung der Coordinaten eines Systempunktes M erhalten wir aber, indem wir die permanente Aehnlichkeit des Dreiecks $M_1 M_2 M$ ausdrücken und mit k_1 und k_2 die Tangenten der Winkel $(M_2 M_1 M)$ und $(M_1 M_2 M)$ bezeichnen:

4)
$$\begin{cases} x = \frac{k_1 k_2 (y_2 - y_1) + k_1 x_1 + k_2 x_2}{k_1 + k_2}, \\ y = \frac{-k_1 k_2 (x_2 - x_1) + k_1 y_1 + k_2 y_2}{k_1 + k_2}. \end{cases}$$

Diese Formeln beweisen unmittelbar den folgenden Satz von Burmester:

Beschreiben zwei Punkte eines ähnlich-veränderlichen ebenen Systems affine Punktreihen auf zwei affinen Curven, so gilt dasselbe von allen Systempunkten.

Man ersieht sofort die Richtigkeit dieses Satzes, indem man beachtet, dass, wenn zwei Punkte M_1 und M_2 affine Punktreihen auf zwei aftinen Curven beschreiben, zwischen den Coordinaten dieser Punkte die Beziehungen

5) $x_2 = A_1 x_1 + B_1 y_1 + C_1$, $y_2 = A_2 x_1 + B_2 y_1 + C_2$ bestehen müssen.

Der analoge Satz von Burmester, die einförmige Bewegung des Systems betreffend, kann hieraus als specieller Fall abgeleitet werden.

2. Betrachten wir in der Ebene einen Punkt, dessen Coordinaten durch die Grössen ε und r bestimmt sind. Der geometrische Ort solcher Punkte, welche verschiedenen Werthen der Functionen ε und r entsprechen, stellt eine Curve dar, welche bei der Untersuchung der Bewegung eines ähnlichverunderlichen ebenen Systems von Bedeutung ist Diese Curve soll im Folgenden die Charakteristik genannt und mit ψ bezeichnet werden.

Wir bemerken vorläufig Folgendes über diese Curve.

- a) Der aus dem Coordinatenanfangspunkte gezogene Radius vector spielt überall in der Kinematik ähnlich-veränderlicher ebener Systeme dieselbe Rolle, wie die momentane Winkelgeschwindigkeit in der Bewegung eines ebenen unveränderlichen Systems. In der Folge wird dies näher gezeigt werden.
- b) Der Winkel, den dieser Radius vector mit der Abscissenaxe bildet, stellt den von Burmester als Geschwindigkeitswinkel bezeichneten Winkel dar.
- c) Die Schnittpunkte der Charakteristik mit der Abscissenaxe entsprechen denjenigen Systemphasen, bei welchen die Drehung des Systems ihre Richtung wechselt.
- d) Die Schnittpunkte dieser Curve mit der Ordinatenaxe entsprechen denjenigen Systemphasen, bei welchen die Ausdehnung des Systems ihr Maximum oder Minimum erlangt hat.

Um einige Beispiele anzufthren, bemerken wir folgendes.

Bei der gleichförmigen geradlinigen Bewegung des Systems ist die Charakteristik ein die Abscissenaxe im Anfangspunkte der Coordinaten berührender Kreis.

Bei der gleichförmigen kreislinigen Bewegung des Systems ist die Charakteristik auch ein Kreis, dessen Centrum auf der Coordinatenaxe liegt und welcher entweder die Abscissenaxe schneidet oder nicht, je nachdem das System eine beständige Drehung um den Geschwindigkeitspol besitzt oder ihre Bewegung eine oscillirende ist.

3. Die Formeln 2) erlauben sehr einfach die Vertheilung der Geschwindigkeiten im System zu bestimmen. Wir wollen nur Einiges kurz darüber wegen. Setzen wir

$$y_{2} = \frac{[b_{1} + s(y - y_{1}) + r(x - x_{1})]}{(a_{1} + s(x - x_{1}) - r(y_{1})} = \frac{r(y - y_{1}) |\sin \lambda|}{x - x_{1}|\sin \lambda}$$

und bezeichnen wir mit u den Geschwindigkeitswinkel und mit s den Radius vector der Charakteristik, so ersehen wir leicht, dass die Punkte eines ühnlich-veränderlichen ebenen Systems, deren Geschwindigkeiten in dem gegebenen Augenblicke den Winkel z mit einer gegebenen Geraden, deren Richtung durch den Winkel 2 mit der Abscissenaxe bestimmt ist, bilden, auf der Geraden

6) $s.sin(\lambda+\tau-u).(x-x_1)-s.cos(\lambda+\tau-u).(y-y_1)+v_1.sin(\lambda+\tau-\delta)=0$ liegen, welche mit der Richtung (λ) einen Winkel bildet, der durch den Winkel zwischen der Geschwindigkeitsrichtung der betrachteten Punkte und dem Radius vector der Charakteristik gemessen wird.

 δ bedeutet hier den Winkel, welchen die Geschwindigkeit v_1 des Punktes M_1 mit der Abscissenaxe bildet.

Alle Geraden 6) schneiden sich in einem Punkte, dem Geschwindigkeitspole. Die Coordinaten (ξ, η) dieses Punktes können auch unmittelbar aus den Bedingungen

7)
$$\begin{cases} a_1 + \varepsilon(\xi - x_1) - r(\eta - y_1) = 0, \\ b_1 + \varepsilon(\eta - y_1) + r(\xi - x_1) = 0 \end{cases}$$

gefunden werden und ergeben folgende Werthe:

8)
$$\xi = x_1 - \frac{a_1 \varepsilon + b_1 r}{\varepsilon^2 + r^2}, \quad \eta = y_1 - \frac{b_1 \varepsilon - a_1 r}{\varepsilon^2 + r^2}.$$

Indem wir die Gleichungen 7) von den Gleichungen 2) abziehen, erhalten wir für die Geschwindigkeit eines Systempunktes

9)
$$v_x = \varepsilon(x-\xi) - r(y-\eta), \quad v_y = \varepsilon(y-\eta) + r(x-\xi),$$

woraus $v = s \sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2},$

d. h.: die Geschwindigkeit eines Systempunktes ist gleich dem Producte aus der Entfernung dieses Punktes von dem Geschwindigkeitspol in den Radius vector der Charakteristik.

Wenn die Bewegung des Systems durch die Bewegung zweier Grundpunkte M_1 und M_2 bestimmt ist, so können wir die Coordinaten ξ , η dadurch bestimmen, dass wir die Ausdrücke 3) für ε und r in die Gleichungen 8) einsetzen. Es seien

$$\frac{v_2}{v_1} = q$$

das Verhältniss der Geschwindigkeiten der Punkte M_1 und M_2 , und μ der Winkel zwischen diesen Geschwindigkeiten. Es ergiebt sich dann

$$\begin{cases} \xi = \frac{(q^2 - q \cos \mu) x_1 + (1 - q \cos \mu) x_2 + q \sin \mu (y_1 - y_2)}{1 - 2 q \cos \mu + q^2}, \\ \eta = \frac{(q^2 - q \cos \mu) y_1 + (1 - q \cos \mu) y_2 - q \sin \mu (x_1 - x_2)}{1 - 2 q \cos \mu + q^2}. \end{cases}$$

Verschiedene andere Sätze, welche sich auf die Vertheilung der Geschwindigkeiten im System beziehen, können mittels derselben Formeln sehr leicht abgeleitet werden. Wir wollen aber darauf weiter nicht eingehen.

4. Polbahn und Polcurve. Um die Gleichung der Polbahn zu erhalten, müssen wir offenbar die Zeit t aus den Gleichungen 8) oder 10) eliminiren.

Um die Gleichung der Polcurve zu finden, wollen wir zuerst die Coordinaten des Geschwindigkeitspols auf ein bewegliches Coordinatensystem, welches mit dem ähnlich-veränderlichen System verbunden ist, beziehen.

Rechtwinklige, aus den Punkten des ähnlich-veränderlichen Systems gebildete Axen werden immer rechtwinklig bleiben. Wenn wir den Anfangspunkt dieses Coordinatensystems im Punkte M_1 wählen, mit Ξ , H die neuen Coordinaten des Geschwindigkeitspoles und mit A_1 , B_1 die Componenten der Geschwindigkeit des Punktes M_1 in Bezug auf diese Axen bezeichnen, so finden wir

11)
$$\Xi = -\frac{A_1 \varepsilon + B_1 r}{\varepsilon^2 + r^2}, \quad \mathbf{H} = -\frac{B_1 \varepsilon - A_1 r}{\varepsilon^2 + r^2}.$$

Wir werden nicht die Gleichung der Polcurve erhalten, wenn wir direct die Zeit t aus diesen Gleichungen eliminiren; denn jeder Punkt der Polcurve wechselt mit der Zeit seine Lage in Bezug auf das bewegliche Coordinatensystem infolge der Ausdehnung des ähnlich-veränderlichen Systems, während wir, um die Gleichung der Polcurve zu bekommen, die Lage aller ihrer Punkte auf ein und dieselbe Ausdehnungsphase des Systems beziehen müssen. Um zu zeigen, wie das zu thun ist, bilden wir zuerst die Ausdrücke für \equiv und H für den Fall, dass die Bewegung des Systems durch die Bewegung der Grundpunkte M_1 und M_2 bestimmt ist. Ziehen wir die bewegliche Absteissenaxe durch den Punkt M_2 , so dass jetzt

$$X_1 = 0$$
, $Y_1 = 0$, $X_2 = M_1 M_2$, $Y_2 = 0$

ist and folglich.

$$A_2 = A_1 + \varepsilon X_2, \quad B_2 = B_1 + r X_2$$

wird. Es ergiebt sich dann

12)
$$\Xi = X_2 \frac{1 - q \cos \mu}{1 - 2q \cos \mu + q^2}$$
, $H = X_2 \frac{q \sin \mu}{1 - 2q \cos \mu + q^2}$

Es sei C ein Punkt der Polcurve in ihrer Lage zur Zeit t. Das Dreieck M_1CM_2 bleibt während der Bewegung sich selbst ähnlich. Wollen wir die Lage des Punktes C in einem andern Momente t_0 erhalten, so müssen wir die Coordinaten dieses Punktes in demselben Verhältnisse verkleinern. in welchem diese Coordinaten im Zeitraume $t-t_0$ infolge der Ausdehnung des Systems sich vergrössert haben. Hieraus folgt, dass man, um die Gleichung der Polcurve, auf das Moment t_0 bezogen, zu bestimmen, der Coordinate X_1 den Werth X_0^2 , welcher diesem Moment entry lann aus des Gleichungen 12), welche jetzt

13)
$$\Xi_0 = X_2^0 \frac{1 - q \cos \mu}{1 - 2q \cos \mu + q^2}$$
, $H_0 = X_2^0 \frac{q \sin \mu}{1 - 2q \cos \mu + q^2}$

sein werden, die Variable t eliminiren muss.

Dieselbe Ueberlegung zeigt. dass, wenn die Coordinaten E, H durch die Gleichungen 11) gegeben sind, wir anstatt dieser Gleichungen folgende nehmen müssen:

$$\Xi_0 e^{\int_0^t e^{it}} = -\frac{A_1 \varepsilon + B_1 r}{\varepsilon^2 + r^2}, \quad H_0 e^{\int_0^t e^{it}} = -\frac{B_1 \varepsilon - A_1 r}{\varepsilon^2 + r^2},$$

um dann die Zeit t aus ihnen zu eliminiren.

- 5. Untersuchen wir einige specielle Fälle.
- a) Aus den Gleichungen 13) folgt

$$\Xi_0^2 + H_0^2 = \frac{X_2^{02}}{1 - 2q \cos \mu + q^2},$$

und wir sehen, dass die Polcurve ein Kreis wird, welcher den Punkt M, zum Centrum hat, wenn das Verhältniss der geometrischen Differenz der Geschwindigkeiten zweier Systempunkte zur Geschwindigkeit eines dieser Punkte constant ist. Das wird z. B. in einer solchen Bewegung des ähnlichveränderlichen Systems vorkommen, in welcher der Punkt **M**, sich geradlinig bewegt, während der Punkt M, eine Cycloide (welche auch eine verkürzte oder verlängerte sein kann) beschreibt. Diese Cycloide muss durch das Rollen eines Kreises auf der Bahn des Punktes M, mit einer der Geschwindigkeit dieses Punktes gleichen Geschwindigkeit erzeugt werden.

b) Die Gleichungen 13) ergeben weiter

$$\frac{\mathsf{H}_0}{\Xi_0} = \frac{q \sin \mu}{1 - q \cos \mu},$$

woraus man ersieht, dass die Polcurve eine Gerade ist, wenn die geometrische Differenz der Geschwindigkeit zweier Systempunkte einen constanten Winkel mit der Geschwindigkeit eines dieser Punkte bildet. Man erhält z. B. eine solche Bewegung, wenn der eine Punkt sich geradlinig und gleichförmig bewegt, wührend der andere Punkt eine Parabel beschreibt, deren Axe zur geometrischen Differenz beider Punkte parallel ist. Die übrigen Punkte werden dabei auch Parabeln beschreiben.

c) Indem wir μ aus den Formeln 13) eliminiren, erhalten wir die Gleichung

 $\Xi_0^2 + H_0^2 - \frac{2X_2^0}{1-a^2} \Xi_0 + \frac{X_2^{02}}{1-a^2} = 0$

woraus wir ersehen, dass die Polcurve ein Kreis ist, wenn das Verhältniss der Geschwindigkeiten zweier Punkte des Systems constant ist. Das werden wir z. B. in jeder solchen Bewegung des Systems finden, in welcher zwei Punkte ganz beliebige Bahnen gleichmässig beschreiben. Man findet dabei leicht, dass der Kreisbogen, welchen der Geschwindigkeitspol auf der Polcurve in einer gewissen Zeit beschreibt, durch den Winkel gemessen wird, um welchen sich in dieser Zeit der Winkel zwischen den Geschwindigkeiten der beiden Punkte geändert hat.

d) Durch Elimination von q aus den Gleichungen 13) erhalten wir

$$\Xi_0^2 + H_0^2 - X_0^2 \Xi - \cot \mu \cdot X_0^2 H = 0,$$

so dass die Polcurve ein durch die Punkte M_1 und M_2 gehender Kreis wird, wenn die Geschwindigkeiten der Punkte M_1 und M_2 miteinander einen constanten Winkel bilden, d. h. wenn die Geschwindigkeiten dieser Punkte den Krümmungsradien ihrer Trajectorien proportional sind. Das wird auch eintreffen, wenn zwei Systempunkte auf irgend eine Weise sich geradlinig bewegen.

- e) Die Formeln 13) können auch dazu dienen, den von Geisenheimer ausgesprochenen Satz, dass die Polcurve bei einer affinen Bewegung eines ähnlich-veränderlichen Systems ein Kreis ist, zu beweisen. Das kann jedoch bei Betrachtung der Beschleunigung auf einem kürzeren Wege nachgewiesen werden.
- 6. Herr Burmester hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Bewegung eines ähnlich-veränderlichen Systems durch das Rollen der veränderlichen Polcurve auf der unbeweglichen Polbahn erzeugt werden kann. Der Beweis, dass dabei wirklich ein Rollen ohne Gleitung bestehen wird, scheint uns nicht vollkommen unnöthig zu sein; wir wollen ihn daher hier ausstehen.

Wenn wir durch φ den Winkel, welchen die bewegliche Abscissenaxe mit der unbeweglichen bildet, bezeichnen und die Werthe von $\xi - x_1$ und $\eta - y_1$ aus den Formeln 8) in die Gleichungen

$$\Xi = (\xi - x_1) \cos \varphi + (\eta - y_1) \sin \varphi,$$

$$H = -(\xi - x_1) \sin \varphi + (\eta - y_1) \cos \varphi$$

einsetzen, erhalten wir

$$\begin{split} \Xi &= -\frac{a_1 \, \varepsilon + b_1 \, r}{\varepsilon^2 + r^2} \cos \varphi - \frac{b_1 \, \varepsilon - a_1 \, r}{\varepsilon^2 + r^2} \sin \varphi \,, \\ \mathsf{H} &= -\frac{a_1 \, \varepsilon + b_1 \, r}{\varepsilon^2 + r^2} \sin \varphi - \frac{b_1 \, \varepsilon - a_1 \, r}{\varepsilon^2 + r^2} \cos \varphi \,. \end{split}$$

ladem wir

$$\frac{d\left(\frac{a_1\varepsilon+b_1r}{\varepsilon^2+r^2}\right)}{dt}=P, \quad \frac{d\left(\frac{b_1\varepsilon-a_1r}{\varepsilon^2+r^2}\right)}{dt}=Q$$

setzen, finden wir

14)
$$d\xi = (a_1 - P) dt, d\eta = (b_1 - Q) dt.$$

Es ist offenbar

مطعة

$$\frac{d\,\sigma}{dt}=r,$$

$$\begin{split} d \, \Xi &= \left[\left(\frac{a_1 \, \varepsilon + b_1 r}{\varepsilon^2 + r^2} \, r - Q \right) \sin \varphi - \left(\frac{b_1 \, \varepsilon - a_1 r}{\varepsilon^2 + r^2} \, r + P \right) \cos \varphi \right] dt \,, \\ d \, \mathsf{H} &= \left[\left(\frac{a_1 \, \varepsilon + b_1 r}{\varepsilon^2 + r^2} \, r - Q \right) \cos \varphi + \left(\frac{b_1 \, \varepsilon - a_1 r}{\varepsilon^2 + r^2} \, r + P \right) \sin \varphi \right] dt \,. \end{split}$$

Wenn man bemerkt, dass infolge der Gleichungen 8) und 14)

$$\begin{split} -\left(\frac{b_1\varepsilon-a_1r}{\varepsilon^2+r^2}r+P\right) &= \frac{d\xi}{dt} + \varepsilon(\xi-x_1),\\ \left(\frac{a_1\varepsilon+b_1r}{\varepsilon^2+r^2}r-Q\right) &= \frac{d\eta}{dt} + \varepsilon(\eta-y_1) \end{split}$$

ist, erhält man

$$d\Xi = d\xi \cos \varphi + d\eta \sin \varphi + \varepsilon dt. [(\xi - x_1) \cos \varphi + (\eta - y_1) \sin \psi].$$

$$dH = -d\xi \sin \varphi + d\eta \cos \varphi + \varepsilon dt. [-(\xi - x_1) \sin \varphi + (\eta - y_1) \cos \varphi];$$

oder, durch $d\sigma$ und $d\Sigma$ entsprechend die Bogendifferentiale der Polbahn und der Polcurve bezeichnend,

$$d\Sigma \cos(X_1 d\Sigma) = d\sigma \cos(X_1 d\sigma) + \Xi \varepsilon dt,$$

$$d\Sigma \sin(X_1 d\Sigma) = d\sigma \sin(X_1 d\sigma) + H \varepsilon dt.$$

Hieraus ersehen wir, dass $d\Sigma$ eine geometrische Summe des Bogens $d\sigma$ und der unendlich kleinen, von der Ausdehnung des Systems abhängigen Translation des Geschwindigkeitspoles ist. Es ergiebt sich also die Gleichheit der Bogen $d\Sigma$ und $d\sigma$, wenn wir annehmen, dass im Zeitraum dt keine Ausdehnung stattfindet. Es geschieht also wirklich ein Rollen der Polcurve auf der Polbahn; die Polcurve aber erleidet dabei eine Ausdehnung, welche dem durch die Function ϵ bestimmten Gesetze folgt.

7. Die Beschleunigung eines Systempunktes kann durch folgende Formeln bestimmt werden:

$$15) \begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} = \left[\frac{da_1}{dt} - r^2(x - x_1) - \frac{dr}{dt}(y - y_1)\right] + \left(\varepsilon^2 + \frac{d\varepsilon}{dt}\right)(x - x_1) - 2r\varepsilon(y - y_1), \\ \frac{d^2y}{dt^2} = \left[\frac{db_1}{dt} - r^2(y - y_1) + \frac{dr}{dt}(x - x_1)\right] + \left(\varepsilon^2 + \frac{d\varepsilon}{dt}\right)(y - y_1) + 2r\varepsilon(x - x_1). \end{cases}$$

Daraus ersehen wir, dass die Beschleunigung sich folgendermassen zusammensetzt:*

- a) aus der Beschleunigung, welche der Systempunkt besitzen würde, wenn das System unveränderlich wäre;
- b) aus der Beschleunigung, welche nur von der Ausdehnung des Systems abhängt und der Function $\epsilon^2 + \frac{d}{dt} \epsilon$ proportional ist;
- c) aus einer Beschleunigung, welche zugleich von der Ausdehnung und von der Drehung des Systems abhängt und daher gemischte Beschleunigung (accélération mixte**) genannt werden kann; sie is zu der vorhergehenden Beschleunigung senkrecht gerichtet.

^{*} Vergl. Durrande, Comptes rendus, LXXV, 1177. ** ibid.

Die Beschleunigung kann noch auf eine andere Weise zerlegt werden, wobei die Analogie zwischen der Bewegung eines ebenen ähnlich-veränderlichen und eines unveränderlichen Systems sichtbar wird, nämlich:

a) in die Beschleunigung, welche das System haben würde, wenn der Geschwindigkeitspol unbeweglich wäre und welche die Grössen

wobei
$$\lambda(x-\xi)-\mu(y-\eta) \text{ und } \lambda(y-\eta)+\mu(x-\xi),$$
$$\lambda=\varepsilon^2+\frac{d\,\varepsilon}{d\,t}-r^2, \quad \mu=2\,r\,\varepsilon+\frac{d\,r}{d\,t}$$

gesetzt ist, zu ihren Projectionen auf den Coordinatenaxen hat, und b) in die Beschleunigung, welche davon abhängt, dass der Geschwindigkeitspol seine Lage wechselt.

Diese letztere Beschleunigung setzt sich zusammen aus einer Beschleunigung $r\frac{d\sigma}{dt}$, welche der Richtung der Normale zur Polbahn im Punkte, welcher im betrachteten Augenblicke als Geschwindigkeitspol dient, parallel ist, und aus einer zu dieser Beschleunigung senkrechten Beschleunigung t Diese beiden Beschleunigungen bilden die Beschleunigung t t t welche mit der Tangente zur Polbahn im Punkte, der im betrachteten Augenblicke als Geschwindigkeitspol dient, einen dem Geschwindigkeitswinkel gleichen Winkel bildet. Dasselbe finden wir für ein unveränderliches System, wenn wir nur den Radius vector der Charakteristik durch die momentane Winkelgeschwindigkeit und den Geschwindigkeitswinkel durch einen rechten ersetzen.

- 8. Mittels der Formeln 13) kann sehr einfach die Vertheilung der Beschleunigungen im System untersucht und die Gleichungen der Bresseschen Kreise gefunden werden, wie auch der Pascal'schen Schnecken, für deren Punkte die Tangential- oder die Normalbeschleunigung einen constanten Werth hat, u. dergl. Wir wollen darauf weiter nicht eingehen, sondern nur einiges den Beschleunigungspol Betreffendes bemerken.
- a) Der Beschleunigungspol fällt im Allgemeinen nicht mit dem Geschwindigkeitspol zusammen; wir können aber leicht die Bedingung aufstellen, unter welcher ein solches Zusammenfallen stattfindet. Diese Bedingung besteht darin, dass die Bewegung des Systems eine einförmige sein muss.
- b) Damit der Beschleunigungspol beständig mit einem und demselben Punkte A der Ebene zusammenfalle, ist es nothwendig, dass die Beschleunigungen zweier Punkte M_1 und M_2 den Entfernungen dieser Punkte vom Punkte A proportional sind und dass diese Beschleunigungen mit den Ge-AM, und AM, entsprechend gleiche Winkel bilden.

wird z. B. eine solche Bewegung des Systems ge-M₁ eine Curve zweiten Grades, von der ein Brennpunkt mit dem Punkte A zusammenfällt, beschreibt, während der Punkt M_2 sich so auf einer Geraden bewegt, dass das Verhältniss seiner Beschleunigung zu seiner Entfernung vom Punkte A umgekehrt proportional dem Cubus der Entfernung des Punktes M_1 vom Beschleunigungspol A ist.

Soll der Beschleunigungspol beständig mit einem und demselben Punkte B des Systems zusammenfallen, so müssen die Beschleunigungen der Punkte M_1 und M_2 denselben Bedingungen genügen, welchen die Geschwindigkeiten dieser Punkte im Falle der einförmigen Bewegung des Systems genügen; d. h. das Verhältniss der Beschleunigungen dieser Punkte und der Winkel $M_1 B M_2$ müssen constant bleiben.

Als ein Beispiel dazu können wir eine solche Bewegung anführen, bei welcher der Punkt M_1 gleichmässig einen Kreis beschreibt, der Punkt M_2 aber eine Cycloide, welche durch das Rollen eines Kreises, der sich mit derselben Winkelgeschwindigkeit wie der Punkt M_1 dreht, beschrieben wird.

9. Zusammensetzung der Bewegungen ähnlich-veränderlicher ebener Systeme. Wir stellen uns zwei Bewegungen eines ähnlich-veränderlichen ebenen Systems vor und bezeichnen mit $(x_1, y_1, \varepsilon_1, r_1)$ und $(x_2, y_2, \varepsilon_2, r_2)$ die Elemente, welche diese Bewegung bestimmen, wobei die beiden Bewegungen auf ein und dasselbe Coordinatensystem bezogen werden. Jeder Punkt der Ebene wird infolge der gegebenen Bewegungen zwei verschiedene Geschwindigkeiten besitzen; wenn wir für jeden Punkt diese Geschwindigkeiten geometrisch addiren, erhalten wir eine neue Bewegung des veränderlichen Systems, welche den Aehnlichkeitsbedingungen offenbar wieder genügen wird.

Die Elemente einer so zusammengesetzten Bewegung können aus folgenden Gleichungen bestimmt werden:

$$\begin{split} A_1 + E(x - X_1) - R(y - Y_1) &= a_1 + \epsilon_1(x - x_1) - r_1(y - y_1) \\ &+ a_2 + \epsilon_2(x - x_2) - r_2(y - y_2). \\ B_1 + E(y - Y_1) + R(x - X_1) &= b_1 + \epsilon_1(y - y_1) + r_1(x - x_1) \\ &+ b_2 + \epsilon_2(y - y_2) + r_2(x - x_2). \end{split}$$

Da diese Gleichungen für alle möglichen Werthe von x und y erfüllt sein müssen, so zerfallen sie in folgende vier:

$$E = \epsilon_1 + \epsilon_2,$$

$$R = r_1 + r_2,$$

$$A_1 - (\epsilon_1 + \epsilon_2) X_1 + (r_1 + r_2) Y_1 = a_1 + a_2 - (\epsilon_1 x_1 + \epsilon_2 x_2) + (r_1 y_1 + r_2 y_2),$$

$$B_1 - (\epsilon_1 + \epsilon_2) Y_1 - (r_1 + r_2) X_1 = b_1 + b_2 - (\epsilon_1 y_1 + \epsilon_2 y_2) - (r_1 x_1 + r_2 x_2).$$

Die ersten zwei von diesen Gleichungen können auf folgende Weise ausgesprochen werden:

Der Radius vector der Charakteristik der zusammengesetzten Bewegung eines ähnlich-veränderlichen ebenen Systems ist der geometrischen Summe der Radii vectores der Charakteristiken bei den Componenten gleich.

Wollen wir die Lage des Geschwindigkeitspols in der zusammengesetzten Bewegung aus den Lagen der Geschwindigkeitspole der Componenten ableiten, so müssen wir die Coordinaten eines solchen Punktes aufsuchen, dessen Geschwindigkeit, aus den beiden Componenten zusammengesetzt. gleich Null ist. Wenn wir entsprechend durch (Ξ, H) , (ξ_1, η_1) und (ξ_2, η_2) die Coordinaten der drei Geschwindigkeitspole bezeichnen, müssen wir daher = und H aus folgenden Gleichungen bestimmen:

$$\begin{array}{l} a_1 + a_2 + \epsilon_1 (\Xi - x_1) + \epsilon_2 (\Xi - x_2) - r_1 (H - y_1) - r_2 (H - y_2) = 0, \\ b_1 + b_2 + \epsilon_1 (H - y_1) + \epsilon_2 (H - y_2) + r_1 (\Xi - x_1) + r_2 (\Xi - x_2) = 0. \end{array}$$
 Indem wir die Gleichungen

$$a_1 + \epsilon_1(\xi_1 - x_1) - r_1(\eta_1 - y_1) = 0, \quad b_1 + \epsilon_1(\eta_1 - y_1) + r_1(\xi_1 - x_1) = 0, a_2 + \epsilon_2(\xi_2 - x_2) - r_2(\eta_2 - y_2) = 0, \quad b_2 + \epsilon_2(\eta_2 - y_2) + r_2(\xi_2 - x_2) = 0,$$

welche den Gleichungen 7) nachgebildet sind, beachten, finden wir

$$= \frac{(\epsilon_1^2 + r_1^2)\xi_1 + (\epsilon_2^2 + r_2^2)\xi_2 + (\epsilon_1\epsilon_2 + r_1r_2)(\xi_1 + \xi_2) + (\epsilon_1r_2 - \epsilon_2r_1)(\eta_1 - \eta_2)}{(\epsilon_1 + \epsilon_2)^2 + (r_1 + r_2)^2},$$

$$\sqrt{\epsilon_1^2 + r_1^2} = s_1$$
, $\sqrt{\epsilon_2^2 + r_2^2} = s_2$, $\frac{s_1}{s_2} = p$

setzen und durch φ den Winkel zwischen den Radii vectores s_1 und s_2 bezeichnen, erhalten wir

$$\begin{cases}
\Xi = \frac{(1 + p\cos\varphi)\xi_1 + (p^2 + p\cos\varphi)\xi_2 + p\sin\varphi.(\eta_1 - \eta_2)}{1 + 2p\cos\varphi + p^2}, \\
H = \frac{(1 + p\cos\varphi)\eta_1 + (p^2 + p\cos\varphi)\eta_2 - p\sin\varphi.(\xi_1 - \xi_2)}{1 + 2p\cos\varphi + p^2}.
\end{cases}$$

Diese Formeln geben uns folgende Beziehungen:

17)
$$\frac{(\Xi - \xi_1)^2 + (H - \eta_1)^2}{(\Xi - \xi_2)^2 + (H - \eta_2)^2} = p^2$$

17)
$$\frac{(\Xi - \xi_{1})^{2} + (H - \eta_{1})^{2}}{(\Xi - \xi_{2})^{2} + (H - \eta_{3})^{2}} = p^{2},$$
18)
$$\frac{(H - \eta_{1})(\Xi - \xi_{2}) - (H - \eta_{3})(\Xi - \xi_{1})}{(\Xi - \xi_{1})(\Xi - \xi_{3}) + (H - \eta_{1})(H - \eta_{3})} = tg \varphi.$$

Die erste von ihnen beweist, dass die Entfernungen des Geschwindigkeitspoles der zusammengesetzten Bewegung von den Geschwindigkeitspolen der Componenten den Grössen s_i und s_i umgekehrt proportional sind. Wir erblicken darin eine Analogie mit der zusammengesetzten Bewegung eines unveränderlichen ebenen Systems. Die Gleichung 18) spricht aus, dass der Winkel, welcher durch die Verbindungslinien des Geschwindigkeitspoles der zusammengesetzten Bewegung mit den Geschwindigkeitspolen der Componenten gebildet wird, dem Winkel zwischen den Linien s, und s, gleich ist

Man bekommt also den Geschwindigkeitspol der zusammengesetzten Rewegung als einen der Durchschnittspunkte zweier Kreise, von denen der eine die Verbindungslinie der Geschwindigkeitspole der Componenten harmonisch im umgekehrten Verhältnisse der Grössen s_1 und s_2 theilt und der andere durch diese Punkte geht.

- Wir wollen einige Resultate angeben, welche sich auf specielle Fälle beziehen.
- a) Wenn die Componenten der zusammengesetzten Bewegung einförmig sind und ihre Geschwindigkeitspole zusammenfallen, so ist die zusammengesetzte Bewegung auch einförmig und ihr Geschwindigkeitspol fällt mit den Geschwindigkeitspolen der Componenten zusammen.
- b) Wenn die Componenten einförmig sind, aber die Geschwindigkeitspole derselben nicht zusammenfallen, so wird im Allgemeinen die zusammengesetzte Bewegung nicht einförmig sein. Damit aber dieselbe einförmig wird, ist es nothwendig und hinreichend, dass die Charakteristiken der Componenten ähnliche Curven seien mit dem Aehnlichkeitspol im Anfangspunkte der Coordinaten und dass die Punkte derselben in verschiedenen Zeitmomenten entsprechend ähnliche Punktreihen bilden.
- c) Die zusammengesetzte Bewegung kann auch dann einförmig sein, wenn die Componenten nicht einförmig sind. Die Coordinaten Ξ und H hängen von sechs Grössen ξ_1 . ξ_2 . η_1 , η_2 , p und φ ab; von denselben können vier willkürlich gegeben und die übrigen zwei der Bedingung gemäss, dass Ξ und H constant bleiben, bestimmt werden. Auf diese Weise finden wir z. B.: wenn die Charakteristiken der Componenten ähnliche Curven sind und in entsprechenden Momenten ähnliche Punktreihen bilden, so ist es, damit die zusammengesetzte Bewegung einförmig sei, nothwendig und hinreichend, dass die Geschwindigkeitspole der Componenten so ihre Lage ändern, wie zwei Punkte eines ähnlich-veränderlichen ebenen Systems, welches sich einförmig bewegt und zum Geschwindigkeitspol den Geschwindigkeitspol der zusammengesetzten Bewegung hat.

11. Die relative Bewegung des ähnlich-veränderlichen ebenen Systems.

Es sei S_1 ein ähnlich-veränderliches ebenes System, dessen Bewegung durch die Elemente x_1 , y_1 , ε_1 , r_1 bestimmt ist, und es mögen x, y und x^0 , y^0 entsprechend die Coordinaten eines Systempunktes und ihre Anfangswerthe bedeuten. Wir haben dann, den Formeln 1) gemäss:

$$\begin{cases} x = x_{1} + e^{\int_{0}^{t} \mathbf{e}_{1} dt} \left[(x^{0} - x_{1}^{0}) \cos \left(\int_{0}^{t} \mathbf{r}_{1} dt \right) - (y^{0} - y_{1}^{0}) \sin \left(\int_{0}^{t} \mathbf{r}_{1} dt \right) \right], \\ y = y_{1} + e^{\int_{0}^{t} \mathbf{e}_{1} dt} \left[(x^{0} - x_{1}^{0}) \sin \left(\int_{0}^{t} \mathbf{r}_{1} dt \right) + (y_{0} - y_{1}^{0}) \cos \left(\int_{0}^{t} \mathbf{r}_{1} dt \right) \right]. \end{cases}$$

Ŀ

Stellen wir uns ein anderes ähnlich-veränderliches System S vor, dessen Bewegung in derselben Ebene vorgeht und durch die Elemente X_1 , Y_1 , E, R bestimmt ist. Dann können wir, durch X, Y und X^0 , Y^0 entsprechend die Coordinaten eines Systempunktes und ihre Anfangswerthe bezeichnend, ebenso wie oben schreiben:

$$\begin{cases} X = X_{1} + e^{\int_{0}^{t} E \, dt} \left[(X^{0} - X_{1}^{0}) \cos \left(\int_{0}^{t} R \, dt \right) - (Y^{0} - Y_{1}^{0}) \sin \left(\int_{0}^{t} R \, dt \right) \right], \\ Y = Y_{1} + e^{\int_{0}^{t} E \, dt} \left[(X^{0} - X_{1}^{0}) \sin \left(\int_{0}^{t} R \, dt \right) + (Y^{0} - Y_{1}^{0}) \cos \left(\int_{0}^{t} R \, dt \right) \right]. \end{cases}$$

Wenn wir diese Bewegung auf ein Coordinatensystem beziehen. welches aus den Punkten des Systems S_1 gebildet ist, so können wir diese Bewegung als die relative Bewegung eines ähnlich-veränderlichen ebenen Systems betrachten. Indem wir mit ξ_1 , η_1 , ε_2 , r_2 die Elemente dieser relativen Bewegung und mit ξ , η und ξ^0 , η^0 entsprechend die Coordinaten eines Systempunktes und ihre Anfangswerthe in Bezug auf das bewegliche Coordinatensystem bezeichnen, können wir setzen:

$$\begin{cases} \xi = \xi_1 + e^{\int_0^t e_{s} dt} \left[(\xi_0 - \xi_1^0) \cos \left(\int_0^t r_2 dt \right) - (\eta^0 - \eta_1^0) \sin \left(\int_0^t r_2 dt \right) \right], \\ \eta = \eta_1 + e^{\int_0^t e_{s} dt} \left[(\xi^0 - \xi_1^0) \sin \left(\int_0^t r_2 dt \right) + (\eta^0 - \eta_1^0) \cos \left(\int_0^t r_2 dt \right) \right]. \end{cases}$$

Bei Betrachtung dieser Formeln müssen wir uns vorstellen, dass das System S_1 sich in einer bestimmten Ausdehnungsphase befindet; denn sonst werden alle darin stehende Coordinaten, abgesehen von allen übrigen Umständen, ihre Grösse noch infolge der Deformation des Systems S_1 ändern. Wir werden daher voraussetzen, dass die Formeln 21) sich auf diejenige Phase des Systems S_1 beziehen, welche dem Moment t=0 entspricht.

Wählen wir die beweglichen Coordinatenaxen so, dass der Anfangspunkt (x_1, y_1) fällt und dass zur Zeit t = 0 diese Axen den unbeweglichen parallel sind, so werden zwischen den Coordinaten ξ , η und X, Y folgende Beziehungen bestehen:

$$Z(2) \begin{cases} X = x_1 + e^{\int_0^t e_1 dt} \left[\xi \cos \left(\int_0^t r_1 dt \right) - \eta \sin \left(\int_0^t r_1 dt \right) \right], \\ Y = y_1 + e^{\int_0^t e_1 dt} \left[\xi \sin \left(\int_0^t r_1 dt \right) + \eta \cos \left(\int_0^t r_1 dt \right) \right]. \end{cases}$$

$$27) \begin{cases} \frac{dY}{dt} = b_{1} + \epsilon_{1}(Y - y_{1}) + r_{1}(X - x_{1}) \\ + e^{\int_{0}^{t} \epsilon_{1} dt} \begin{cases} [\alpha_{1} + \epsilon_{2}(\xi - \xi_{1}) - r_{2}(\eta - \eta_{1})] \sin\left(\int_{0}^{t} r_{1} dt\right) \\ + [\beta_{1} + \epsilon_{2}(\eta - \eta_{1}) + r_{2}(\xi - \xi_{1})] \cos\left(\int_{0}^{t} r_{1} dt\right) \end{cases}.$$

13. Wir wollen zuletzt die Beschleunigungen der relativen und der absoluten Bewegung untersuchen. Wenn wir

28)
$$\begin{cases} \varepsilon_1^2 - \frac{d\varepsilon_1}{dt} - r_1^2 = \lambda_1, & 2\varepsilon_1 r_1 + \frac{dr_1}{dt} = \mu_1. \\ \varepsilon_2^2 - \frac{d\varepsilon_2}{dt} - r_2^2 = \lambda_2, & 2\varepsilon_2 r_2 + \frac{dr_2}{dt} = \mu_2 \end{cases}$$

setzen und durch w_1 und w_2 entsprechend die Führungs- und die relative Beschleunigung bezeichnen, werden wir haben:

$$w_{1x} = \frac{da_{1}}{dt} + \lambda_{1}(X - x_{1}) - \mu_{1}(Y - y_{1}),$$

$$w_{1y} = \frac{db_{1}}{dt} + \lambda_{1}(Y - y_{1}) + \mu_{1}(X - x_{1});$$

$$w_{2\xi} = \left[\frac{da_{1}}{dt} + \lambda_{2}(\xi - \xi_{1}) - \mu_{2}(\eta - \eta_{1})\right] e^{\int_{0_{1}}^{\xi} dt},$$

$$w_{2\eta} = \left[\frac{d\beta_{1}}{dt} + \lambda_{2}(\eta - \eta_{1}) + \mu_{2}(\xi - \xi_{1})\right] e^{\int_{0_{1}}^{\xi} dt},$$

wobei wieder der Factor e^{i} aus demselben Grunde wie oben eingeführt ist.

Wenn wir die Gleichung 27) nach t differenziren und die Formeln 25), 26), 27), 28) und 29), sowie die Beziehungen

$$w_{2x} = w_{1\xi} \cos\left(\int_{0}^{t} r_{1} dt\right) - w_{2\eta} \sin\left(\int_{0}^{t} r_{1} dt\right),$$

$$w_{2y} = w_{2\xi} \sin\left(\int_{0}^{t} r_{1} dt\right) + w_{2\eta} \cos\left(\int_{0}^{t} r_{1} dt\right)$$

beachten, finden wir:

31)
$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dt^2} = w_{1x} + w_{2x} + 2(\varepsilon_1 v_{2x} - r_1 v_{2y}), \\ \frac{d^2 Y}{dt^2} = w_{1y} + w_{2y} + 2(\varepsilon_1 v_{2y} + r_1 v_{2x}). \end{cases}$$

Somit setzt sich die absolute Beschleunigung aus drei Beschleunigungen zusammen: aus der Führungsbeschleunigung, der relativen Beschleunigung und einer Beschleunigung, welche der zusammengesetzten Centripetalbeschleunigung in der absoluten Bewegung eines unveränderlichen ebenen Systems ganz analog ist. Ihre Grösse

$$2\sqrt{(\varepsilon_1 v_{2x} - r_1 v_{2y})^2 + (\varepsilon_1 v_{2y} + r_1 v_{2x})^2} = 2\sqrt{\varepsilon_1^2 + r_1^2} \cdot v_2$$

ist dem doppelten Product der relativen Geschwindigkeit in den Radius vector der Charakteristik der Führungsbewegung gleich. Ihre Richtung bildet mit der relativen Geschwindigkeit des betrachteten Punktes einen Winkelwelcher dem Geschwindigkeitswinkel der Führungsbewegung gleich ist.

Somit sehen wir, dass der Satz von Coriolis auch für ein ähnlich, veränderliches System giltig ist; es muss nur dabei die Winkelgeschwindigkeit durch den Radius vector der Charakteristik und der rechte Winkel, welchen die zusammengesetzte Centrifugalbeschleunigung mit der relativen Geschwindigkeit bildet, durch den Geschwindigkeitswinkel der Führungsbewegung ersetzt werden.

Ueber die Bedingungen, unter denen zwei lineare homogene Differentialgleichungen mehrere partikuläre Integrale gemeinsam haben.

Von

Dr. E. GRÜNFELD,

Assistent an der techn. Hoshschule in Wien.

Sind
$$P(y) = \frac{d^m y}{dx^m} + p_1 \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \dots + p_m y = 0$$

$$Q(y) = \frac{d^n y}{dx^n} + q_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + q_n y = 0$$

lineare homogene Differentialgleichungen der m^{ten} , beziehungsweise n^{ten} Ordnung, und man bildet das System von m+n Gleichungen

2)
$$\begin{cases} \frac{d^{m-1}Q(y)}{dx^{m-1}} = 0, & \frac{d^{m-2}Q(y)}{dx^{m-2}} = 0, \dots, & \frac{dQ(y)}{dx} = 0, Q(y) = 0; \\ \frac{d^{n-1}P(y)}{dx^{n-1}} = 0, & \frac{d^{n-2}P(y)}{dx^{n-2}} = 0, \dots, & \frac{dP(y)}{dx} = 0, P(y) = 0, \end{cases}$$

so wird bekanntlich durch das identische Verschwinden ihrer Determinante

$$d = \begin{bmatrix} 1 & q_1 & q_{m-1,1} & q_{m-1,2} & \cdots & q_{m-1,m+n-3} & q_{m-1,m+n-2} \\ 0 & 1 & q_1 & q_{m-2,1} & \cdots & q_{m-2,m+n-4} & q_{m-2,m+n-3} \\ 0 & 0 & 1 & q_1 & \cdots & q_{m-3,m+n-5} & q_{m-3,m+n-4} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & q_{n-1} & q_n \\ 1 & p_1 & p_{n-1,1} & p_{n-1,2} & \cdots & p_{n-1,m+n-3} & p_{n-1,m+n-2} \\ 0 & 1 & p_1 & p_{n-2,1} & \cdots & p_{n-2,m+n-4} & p_{n-2,m+n-3} \\ 0 & 0 & 1 & p_1 & \cdots & p_{n-3,m+n-5} & p_{n-3,m+n-4} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & p_{m-1} & p_m \end{bmatrix}$$

in welcher, wenn zur Abkürzung

$$e_a = \frac{e(e-1)\dots(e-a+1)}{1\cdot 2 \dots a},$$

$$p_i^{(a)} = \frac{d^a p_i}{d x^a}, \quad q_i^{(a)} = \frac{d^a q_i}{d x^a}$$

gesetzt wird,

$$p_{\varrho\sigma} = \varrho_{\sigma} p_1^{(\sigma)} + \varrho_{\sigma-1} p_2^{(\sigma-1)} + \dots + \varrho_1 p_{\sigma}^{(1)} + p_{\sigma+1},$$

$$q_{\varrho\sigma} = \varrho_{\sigma} q_1^{(\sigma)} + \varrho_{\sigma-1} q_2^{(\sigma-1)} + \dots + \varrho_1 q_{\sigma}^{(1)} + q_{\sigma+1}$$

ist, die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür ausgedrückt, dass die beiden Differentialgleichungen 1) ein partikuläres Integral gemeinsam haben.

Die Bedingungen, unter denen diesen Gleichungen zwei oder mehrere Integrale gemeinsam sind, lassen sich, wie Herr v. Escherich gezeigt hat,* durch die Betrachtung der Unterdeterminanten in der Determinante d herleiten; man kann dieselben jedoch auch aus dem Gleichungssystem 2) selbst erhalten,** zu welchem Zwecke mir das nachstehende Verfahren sehr angezeigt scheint, welches ähnlich demjenigen ist, mit dessen Hilfe Herr Hioux *** die analogen Bedingungen für zwei algebraische Gleichungen gewonnen hat.

Das System der Gleichungen 2) besteht aus zwei Gruppen, deren erste und deren zweite n Gleichungen enthält.

Man unterdrücke in jeder Gruppe die n-i ersten Gleichungen: dann bleiben k+i in der ersten und i in der zweiten übrig. In diesen zurückbleibenden Gleichungen bilden die k+2i ersten Colonnen zur Linken eine Determinante $(k+2i)^{\text{tor}}$ Ordnung, in welcher die Elemente der ersten Codm+i-1

lonne aus den Coefficienten von $\frac{d^{m+i-1}y}{dx^{m+i-1}}$ und die der letzten Colonne aus

den Coefficienten von $\frac{d^{n-i}y}{dx^{n-i}}$ in den übrig bleibenden Gleichungen bestehen.

Für i=n kommt das ursprüngliche System 2) wieder zum Vorschein. Diese Determinanten $(k+2i)^{\text{ter}}$ Ordnung mögen mit $\mathfrak{D}_{i,0}$ bezeichnet werden.

Es bezeichnen ferner

$$\mathfrak{D}_{i,1}, \, \mathfrak{D}_{i,2}, \, \ldots \, \mathfrak{D}_{i,\,n-i}$$

Determinanten, welche aus $\mathfrak{D}_{i,0}$ hervorgehen, wenn darin die letzte Colonne von Coefficienten nach und nach durch jede der n-i folgenden Coefficientencolonnen ersetzt wird.

Es werde die Determinante $\mathfrak{D}_{t,0}$ nach den Elementen ihrer letzten Colonne geordnet, und seien die denselben zugehörigen Unterdeterminanten die Grössen

$$q_{i,0}, q_{i,1}, q_{i,2}, \dots q_{i,k+i-1}$$

und

$$p_{i,0}, p_{i,1}, p_{i,2}, \dots p_{i,i-1}.$$

Von den zurückgebliebenen Gleichungen multiplicire man die erste mit $q_{i,0}$, die zweite mit $q_{i,1}, \ldots$, die letzte mit $p_{i,i-1}$ und addire: die so erhaltene Samme ist offenbar nichts Anderes als der Ausdruck

en der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien,

raier in den Comptes Rendus, t. XCV p. 476. le Supérieure, t. X p. 888-390.

3)
$$F_i = \mathfrak{D}_{i,0} \frac{d^{n-i}y}{dx^{n-i}} + \mathfrak{D}_{i,1} \frac{d^{n-i-1}y}{dx^{n-i-1}} + \ldots + \mathfrak{D}_{i,n-i-1} \frac{dy}{dx} + \mathfrak{D}_{i,n-i}y$$

indem in derselben die Coefficienten der höheren Ableitungen von y als der $(n-i)^{\text{ten}}$ identisch verschwinden.

 F_i kann andererseits, wie leicht zu ersehen ist, auch in der Form geschrieben werden:

4)
$$\begin{cases} F_{i} = \left(q_{i,0} \frac{d^{k+i-1}}{dx^{k+i-1}} + q_{i,1} \frac{d^{k+i-2}}{dx^{k+i-2}} + \dots + q_{i,k+i-2} \frac{d}{dx} + q_{i,k+i-1}\right) Q(\mathbf{y}) \\ + \left(p_{i,0} \frac{d^{i-1}}{dx^{i-1}} + p_{i,1} \frac{d^{i-2}}{dx^{i-2}} + \dots + p_{i,i-2} \frac{d}{dx} + p_{i,i-1}\right) P(\mathbf{y}) \end{cases}$$

oder, wen

$$(q_{i,0} \frac{d^{k+i-1}}{dx^{k+i-1}} + q_{i,1} \frac{d^{k+i-2}}{dx^{k+i-2}} + \dots + q_{i,k+i-1}) y = P_i(y)$$

und

$$\left(\mathfrak{p}_{i,0} - \frac{d^{i-1}}{dx^{i-1}} + \mathfrak{p}_{i,1} - \frac{d^{i-2}}{dx^{i-2}} + \dots + \mathfrak{p}_{i,i-1}\right) y = Q_i(y)$$

gesetzt wird,

$$F_i = P_i(Q(y)) + Q_i(P(y))$$

oder kürzer

$$F_i = P_i Q + Q_i P.$$

Aus der Gleichung 5) ergiebt sich der Satz:

- I. "Die nothwendigen und hinreichenden Bedingungen, dass die beiden Differentialgleichungen P(y) = 0 und Q(y) = 0 * und nur * Integrale gemeinsam haben, sind
- 6) $\mathfrak{D}_{n-x+1,0} = 0$, $\mathfrak{D}_{n-x+1,1} = 0$, ..., $\mathfrak{D}_{n-x+1,x-1} = 0$ und $\mathfrak{D}_{n-x,0} \neq 0$."

In der That, aus der Gleichung

4)
$$F_i(y) = P_i Q(y) + Q_i P(y)$$

folgt allgemein, dass für jedes Integral, welches P(y) = 0 und Q(y) = 0 gleichzeitig zukommt, auch $F_i = 0$ wird. Nun ist

$$F_{n-x+1} = P_{n-x+1} Q + Q_{n-x+1} P,$$

wo nach 3)

$$F_{n-x+1} = \mathfrak{D}_{n-x+1,0} y^{(x-1)} + \mathfrak{D}_{n-x+1,1} y^{(x-2)} + \ldots + \mathfrak{D}_{n-x+1,x-1} y;$$

für jedes der \varkappa den Gleichungen P(y) = 0 und Q(y) = 0 gemeinsamen Integrale müsste $F_{n-x+1} = 0$ sein, d. h. es liesse diese Differentialgleichung $(\varkappa - 1)^{\text{ter}}$ Ordnung \varkappa von einander linear unabhängige Integrale zu, was nicht möglich ist; es muss daher F_{n-x+1} identisch verschwinden, somit sein:

$$\mathfrak{D}_{n-k+1,0}=0$$
, $\mathfrak{D}_{n-x+1,1}=0$, ..., $\mathfrak{D}_{n-x+1,x-1}=0$.

Haben also P(y) = 0 und Q(y) = 0 x Fundamentalintegrale gemeinsam, so finden nothwendig die letzteren Gleichungen statt. Soll die Anzahl der gemeinsamen Integrale x nicht übersteigen, so muss ausserdem die Bedingung $\mathfrak{D}_{n-x,0} \neq 0$ erfüllt sein. Denn es ist

$$F_{n-x} = \mathfrak{D}_{n-x,0} y^{(n)} + \mathfrak{D}_{n-x,1} y^{(n-1)} + \ldots + \mathfrak{D}_{n-x,x} y$$

ein homogener linearer Differentialausdruck x^{ter} Ordnung, welcher für die x den Gleichungen P(y) = 0 und Q(y) = 0 gemeinsamen Integrale verschwindet, wozu nothwendig $\mathfrak{D}_{n-x,0} \neq 0$, und der andererseits auch nicht identisch verschwinden kann, da alsdann den Gleichungen P(y) = 0 und Q(y) = 0, der Voraussetzung entgegen, mehr als x Integrale gemeinsam sein könnten.

Die aufgestellten Bedingungen sind also nothwendig. Dieselben sind aber auch hinreichend. Bestehen nämlich die Gleichungen

6) $\mathfrak{D}_{n-x+1,0} = 0$, $\mathfrak{D}_{n-x+1,1} = 0$, ..., $\mathfrak{D}_{n-x+1,x-1} = 0$, so folgt, dass

$$P_{n-x+1}Q + Q_{n-x+1}P = 0;$$

der Ausdruck $Q_{n-x+1}P(y)$ verschwindet für die m Fundamentalintegrale von P(y)=0, für ebendieselben muss daher auch $P_{n-k+1}Q(y)=0$ sein; weil aber der Ausdruck $P_{n-x+1}(s)$, der von der Ordnung m-x ist; für nicht mehr als m-x linear unabhängige Functionen s verschwinden kann, so müssen die übrigen s Integrale der Gleichung Q(y)=0 angehören. Finden demnach die Gleichungen 6) statt, so haben P(y)=0 und Q(y)=0 wenigstens s Integrale gemeinsam. Ist nebstdem die Bedingung erfüllt, dass $\mathfrak{D}_{n-s,0}$ von Null verschieden, so folgt, dass die Gleichung

$$F_{n-x} = \mathfrak{D}_{n-x,0} y^{(x)} + \ldots + \mathfrak{D}_{n-x} x y = 0$$

von der sten Ordnung ist und dass somit wegen

$$P_{n-x}Q+Q_{n-x}P=F_{n-x}$$

den Gleichungen P(y) = 0 und Q(y) = 0 κ und nicht mehr als κ Fundamentalintegrale gemeinsam sein können.

Aus dem Obigen folgt noch:

II. "Diejenige homogene lineare Differentialgleichung, welche die den beiden Differentialgleichungen P(y) = 0 und Q(y) = 0 gemeinsamen Lösungen zulässt, ist

$$\mathfrak{D}_{n-x,\,0}y^{(x)} + \mathfrak{D}_{n-x,\,1}y^{(x-1)} + \ldots + \mathfrak{D}_{n-x,\,n}y = 0.$$

Der Satz I kann durch den folgenden ersetzt werden:

III. "Die nothwendigen und hinreichenden Bedingungen, dass die beiden Differentialgleichungen P(y) = 0 und Q(y) = 0 z und nur z linear unabhängige Integrale gemeinsam haben, sind

7)
$$\mathfrak{D}_{n,0} = 0$$
, $\mathfrak{D}_{n-1,0} = 0$, ..., $\mathfrak{D}_{n-x+1,0} = 0$
 $\mathfrak{D}_{n-x,0} \neq 0$.

Beweis.

k

Kimmt man x = 1 an, so ist der Satz III von I nicht verschieden, in die Bedingungen 7) mit denen in 6) zusammenfallen und die in Betracht kommende x in beiden Sätzen

214

Angenommen, derselbe wäre für den Fall von κ gemeinsamen Integralen erwiesen, so ist zu zeigen, dass er auch noch für $\kappa+1$ Geltung besitzt.

Unter der gemachten Voraussetzung ist klar, dass die nothwendigen Bedingungen für das Vorhandensein von wenigstens x+1 gemeinsamen Integralen ausgedrückt werden durch die Gleichungen

$$\mathfrak{D}_{n,0}=0$$
, $\mathfrak{D}_{n-1,0}=0$, ..., $\mathfrak{D}_{n-s+1,0}=0$

und

$$\mathfrak{D}_{n-x,0} = 0.$$

Dieselben sind aber auch hinreichend; denn es kann einerseits die Anzahl der gemeinsamen Integrale nicht unter z herabgehen, andererseits ist

8)
$$F_{n-x} = P_{n-x}Q + Q_{n-x}P$$

und der Ausdruck

$$F_{n-x} = \mathfrak{D}_{n-x,0} y^{(x)} + \mathfrak{D}_{n-x,1} y^{(x-1)} + \ldots + \mathfrak{D}_{n-x,x} y$$

wegen $\mathfrak{D}_{n-x,0}=0$ von niederer als der x^{ten} Ordnung; der zweite Theil der Gleichung 8) verschwindet für die der Annahme nach vorhandenen x gemeinsamen Integrale von P(y)=0 und Q(y)=0, daher auch der erste Theil. Dieser ist jedoch, wie eben bemerkt, von niederer als der x^{ten} Ordnung, muss also identisch verschwinden, woraus folgt:

$$\mathfrak{D}_{\mathbf{n}-\mathbf{x},0} = 0$$
, $\mathfrak{D}_{\mathbf{n}-\mathbf{x},1} = 0$, ..., $\mathfrak{D}_{\mathbf{n}-\mathbf{x},\mathbf{x}} = 0$

und somit diejenigen Bedingungen erfüllt sind, welche der Satz I für das Vorhandensein von wenigstens n+1 gemeinsamen Integralen als nothwendig und hinreichend vorschreibt.

Hiernach haben P(y) = 0 und Q(y) = 0 wenigstens x+1 Integrale gemeinsam; damit sie nicht noch eines mehr haben, muss gleichfalls nach Satz I

$$\mathfrak{D}_{n-x-1,0} \neq 0$$

sein.

Gilt demnach der Satz III für den Fall von \varkappa gemeinsamen Integralen, so gilt er auch noch für $\varkappa+1$ derselben. Nun gilt er für $\varkappa=1$, daherauch für $\varkappa=2$, und allgemein.

Was das Bildungsgesetz der im Satze III auftretenden Determinantenbetrifft, so ist Folgendes zu bemerken:

Die Determinante $\mathfrak{D}_{n,0}$, deren Verschwinden anzeigt, dass den Gleich—ungen P(y)=0 und Q(y)=0 überhaupt gemeinsame Integrale zukommen ist mit der Determinante d des Gleichungssystems 2) identisch. Die Determinante $\mathfrak{D}_{n-1,0}$ geht aus $\mathfrak{D}_{n,0}$ hervor, indem man in jeder der beider Gruppen, aus denen das System 2) besteht, die erste Gleichung unterdrückt — wodurch die erste Colonne von $\mathfrak{D}_{n,0}$ ausfällt —, und hieraum noch die letzte Colonne in $\mathfrak{D}_{n,0}$ weglässt. Verfährt man hinsichtlich \mathfrak{D}_{n-1} —in ähnlicher Weise, wie zuerst hinsichtlich $\mathfrak{D}_{n,0}$, so wird die Determinant $\mathfrak{D}_{n-2,0}$ gebildet, u. s. f.

Es ist demnach jede dieser Determinanten von einer um zwei Einheiten niedrigeren Ordnung als die unmittelbar vorhergehende.

Ist z. B. m=3 und n=2, demnach:

9)
$$\begin{cases} P(y) = \frac{d^3y}{dx^3} + p_1 \frac{d^2y}{dx^2} + p_2 \frac{dy}{dx} + p_3 y = 0 \\ \text{und} \\ Q(y) = \frac{d^2y}{dx^2} + q_1 \frac{dy}{dx} + q_2 y = 0, \end{cases}$$

so ist

$$\mathfrak{D}_{2,0} = \begin{vmatrix} 1 & q_1 & 2q_1' + q_2 & 2q_2' + q_1'' & q_2'' \\ 0 & 1 & q_1 & q_1' + q_2 & q_2' \\ 0 & 0 & 1 & q_1 & q_2 \\ 1 & p_1 & p_1' + p_2 & p_2' + p_3 & p_3' \\ 0 & 1 & p_1 & p_2 & p_3 \end{vmatrix}$$

$$\mathfrak{D}_{1,0} = \begin{vmatrix} 1 & q_1 & q_1' + q_2 \\ 0 & 1 & q_1 \\ 1 & p_1 & p_2 \end{vmatrix}.$$

und

$$\mathfrak{D}_{1,0} = \begin{vmatrix} 1 & q_1 & q'_1 + q_2 \\ 0 & 1 & q_1 \\ 1 & p_1 & p_2 \end{vmatrix}.$$

Im Falle, dass die obigen zwei Differentialgleichungen zwei linear unabhängige partikuläre Integrale gemeinsam haben, muss

$$\mathfrak{D}_{2,0} = 0$$

und

$$\mathfrak{D}_{1,0} = 0$$

sein. Aus der Gleichung 11) ergiebt sich

12)
$$p_2 = p_1 q_1 - q_1^2 + q_1' + q_2'$$

und wenn für p_2 dieser Werth in die Gleichung 10), nachdem zuvor noch die im ersten Theile derselben stehende Determinante $\mathfrak{D}_{2,0}$ ausgerechnet worden, substituirt wird, so erhält man nach gehöriger Reduction die Gleichung

13)
$$\mathfrak{D}_{2,0} = (p_8 - p_1 q_2 + q_1 q_2 - q_2)^2 = 0.$$

Le drücken daher die Gleichungen 12) und 13), für welche auch die zwei folgenden:

¹⁴)
$$p_2 - p_1 q_1 + q_1^2 - q_1^2 - q_2^2 = 0$$
, $p_3 - p_1 q_2 + q_1 q_2 - q_2^2 = 0$

geschrieben werden können, die nothwendigen und hinreichenden Bedingungen aus, damit sämmtliche Integrale der Differentialgleichung

$$Q(y) = \frac{d^2y}{dx^2} + q_1 \frac{dy}{dx} + q_2 y = 0$$

anch der Differentialgleichung

$$P(y) = \frac{d^3y}{dx^3} + p_1 \frac{d^2y}{dx^2} + p_2 \frac{dy}{dx} + p_3 y = 0$$

**Gehoren. Sind die Bedingungen 14) erfüllt, so ergiebt sich in der That and denselben die Beziehung

$$P(y) = \frac{dQ(y)}{dx}$$

Die Ebene als bewegtes Element.

Von

D. ING. F. WITTENBAUER,
Docent an der k. k. techn. Hochschule in Graz.

Hierzu Taf. VI Fig. 1-6.

Die Lehre der Bewegung pflegt den Punkt als bewegtes Element vorauszusetzen, selbst dann, wenn es sich um rein geometrische Eigenschaften derselben handelt.

Ebenso wie der Punkt, kann jedoch auch die Ebene als bewegtes geometrisches Element betrachtet und auf ihre Bewegung im Raume hin untersucht werden. Insbesondere lassen sich die Begriffe der Geschwindigkeit und Beschleunigung. sowie die aus ihnen folgenden Beziehungen in beiden Fällen vollkommen klar zur Anschauung bringen. Da Punkt und Ebene die einander entsprechenden Elemente des Raumes sind, so steht zu erwarten, dass auch die mechanischen Folgerungen einander dual gegenüberstehen.

Obwohl sich diese Vermuthung thatsächlich bewahrheitet, so erfordert die Ebene dennoch eine ihr eigenthümliche analytische Behandlung, welche in ihren hauptsächlichen Grundzügen im Folgenden gegeben werden soll.

Etwas Aehnliches gilt für die Bewegung eines Strahles in der Ebene und jene des Strahlensystems, bezüglich welcher Untersuchung auf einen bereits gemachten Versuch hingewiesen werden möge.*

1. Die elementare Ortsveränderung einer Ebene im Raume kann nur in einer Drehung um eine in ihr liegende Gerade, die Drehaze, bestehen. Bei Voraussetzung einer allgemeinen Bewegung wird in jedem Zeitelemente eine andere Gerade der Ebene als Axe auftreten; alle diese Axen bilden in ihrer Aufeinanderfolge eine abwickelbare Fläche, da jede Lage der Axe die beiden unmittelbar benachbarten Lagen schneiden muss. Durch die Bewegung der Ebene wird also eine Curve erzeugt, die Wendecurve jener Fläche; die aufeinanderfolgenden Lagen der bewegten Ebene werden zu Schmiegungsebenen der erzeugten Curve. Das Resultat dieser Bewegung ist somit dasselbe, wie bei der Bewegung des Punktes; wir wollen deshalb übereinstimmend jene Curve die Bahn der Ebene nennen.

^{*} Kinematik des Strahles. Graz 1883.

Beziehen wir nun sofort den elementaren Drehungswinkel $d\sigma$ der Ebene um eine in ihr liegende Gerade auf die während der Drehung verflossene Zeit dt, so entsteht nach Analogie mit geläufigen Begriffen jener der Drehgeschwindigkeit der Ebene:

$$V = \frac{d\sigma}{dt}.$$

2. Im Allgemeinen wird während der Bewegung der Ebene die Drehgeschwindigkeit jederzeit eine andere sein und zwar wird sich sowohl die Grösse als auch die Drehaxe derselben stetig ändern. Diese zweifache Aenderung wird hervorgerufen werden durch das Auftreten einer elementaren Drehgeschwindigkeit Γdt um eine ebenfalls in der Ebene gelegene Axe, welche mit jener der Drehgeschwindigkeit einen Winkel α einschliessen möge. Denn nach dem bekannten Princip der Zusammensetzung von Drehgeschwindigkeiten um sich schneidende Axen werden jene V und Γdt sich zu einer Resultirenden V' (Fig. 1) vereinen, deren Grösse und Axe durch die Diagonale eines Parallelogramms Ompn über jenen beiden als Seiten dargestellt werden.

Wir nennen Γ die *Drehbeschleunigung* der Ebene. Der Effect, den sie bervorruft, ist die Verrückung der Drehaxe der Ebene und die Veränderung der Grösse der Drehung. Es bleibt noch zu beleuchten, welcher Theil der Drehbeschleunigung den einen Einfluss und welcher den andern hervorbringt. Dies sind offenbar die Componenten von Γdt , senkrecht und parallel zur ursprünglichen Drehgeschwindigkeit, also pq und mq; wir schreiben hierfür

$$\Gamma_1 = \frac{mq}{dt} = \Gamma \cos \alpha, \quad \Gamma_2 = \frac{pq}{dt} = \Gamma \sin \alpha.$$

Die erstere dieser Componenten verändert nur die Grösse der Drehgeschwindigkeit, es ist also

$$\Gamma_{i} = \frac{dV}{dt}.$$

Die zweite verrückt die Drehaxe um den Winkel $d\tau$; nach dem Princip der Zusammensetzung von Drehgeschwindigkeiten gilt nun die Relation

$$V: \Gamma dt = \sin(\alpha - d\tau): d\tau$$

oder mit entsprechender Vernachlässigung von Grössen niederer Ordnung

$$\Gamma \sin \alpha = V \cdot \frac{d\tau}{dt}.$$

Construirt man nun den Kreiskegel, dessen Spitze in O liegt und der drei unmittelbar aufeinanderfolgende Lagen der bewegten Ebene berührt, nennt man ferner 2ϱ den Winkel seiner Oeffnung, so gilt

$$d\tau = tang \varrho . d\sigma$$
,

somit mit Hinweis auf Gleichung 1)

Bewegung der Ebene im Ebenenbündel.

- 3. Die bewegte Ebene wird stets durch den Mittelpunkt O des Bündels gehen; wir wählen denselben als Schnittpunkt dreier aufeinander senkrechten Coordinatenaxen ξ , η , ζ , bezeichnen die Winkel der Ebene mit denselben durch λ , μ , ν und verstehen unter den Coordinaten der Ebene die drei Grössen
 - 4) $\xi = \sin \lambda, \quad \eta = \sin \mu, \quad \zeta = \sin \nu.$

Sie sind nicht unabhängig von einander, sondern genügen jederzeit der Bedingung

5)
$$\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = 1.$$

Wir geben ferner diesen Coordinaten das gleiche oder entgegengesetzte Vorzeichen, je nachdem sich die Coordinatenaxen auf derselben oder auf verschiedenen Seiten der Ebene befinden.

Es sei nun OG (Fig. 2) eine in der Ebene liegende Gerade, um welche die Drehgeschwindigkeit $V = \frac{d\sigma}{dt}$ herrschen möge. Ihre Componenten nach den drei Axen seien

$$V_{\xi} = V \cos \alpha$$
, $V_{\eta} = V \cos \beta$, $V_{\zeta} = V \cos \gamma$.

worin α , β , γ die Winkel der Drehaxe OG mit den Coordinatenaxen bezeichnen.

Projicirt man die Coordinatenaxen senkrecht auf die Ebene nach $O\xi'$ $O\eta'$, $O\zeta'$ und bezeichnet die Winkel

$$GO\xi'=a$$
, $GO\eta'=b$, $GO\xi'=c$,

vorausgesetzt, dass dieselben in gleicher Richtung gezählt werden; beden ferner, dass die Winkel

$$\xi O \xi' = \lambda$$
, $\eta O \eta' = \mu$, $\xi O \xi' = \nu$

sind, so folgt zunächst aus dem bei l' rechtwinkligen sphärischen DreieGll'

 $\cos \alpha = \cos \lambda . \cos \alpha$ und ebenso $\cos \beta = \cos \mu . \cos b$, $\cos \gamma = \cos \nu . \cos \alpha$ die Ebene nach einer unendlich kleinen Verdra

und beschtet, dass $l'_1 r = d\lambda$ gesetzt werden darf, so folgt aus dem rechtwinkligen sphärischen Dreiecke Grl'_1

 $d\sigma.sina = d\lambda$ und ebenso $d\sigma.sinb = d\mu$, $d\sigma.sinc = d\nu$.

Werden diese Gleichungen quadrirt, der Reihe nach mit $\cos^2 \lambda$, $\cos^2 \mu$, $\cos^2 \nu$ multiplicirt und addirt, so ergeben sie

 $ds^{3}[sin^{2}a\cos^{2}\lambda + sin^{2}b\cos^{2}\mu + sin^{2}c\cos^{2}\nu] = \overline{d\sin\lambda^{2}} + \overline{d\sin\mu^{2}} + \overline{d\sin\nu^{2}};$ der in der Klammer stehende Ausdruck ergiebt sich nach Gleichung 6) der Einheit gleich und es ist somit mit Hinweis auf die Gleichung 4)

$$d\sigma^2 = d\xi^2 + d\eta^2 + d\xi^2$$

oder die Drehgeschwindigkeit der Bewegung

7)
$$V^{2} = \left(\frac{d\xi}{dt}\right)^{2} + \left(\frac{d\eta}{dt}\right)^{2} + \left(\frac{d\xi}{dt}\right)^{2}.$$

Um Ausdrücke für die Componenten V_{ξ} , V_{η} , V_{ζ} der Drehgeschwindigkeit nach den Coordinatenaxen zu erhalten, beachten wir die drei Gleichungen

$$\cos \alpha \cdot \cos \alpha + \cos \beta \cdot \cos \beta + \cos \gamma \cdot \cos \gamma = 1,$$

 $\xi \cdot \cos \alpha + \eta \cdot \cos \beta + \zeta \cdot \cos \gamma = 0,$
 $d\xi \cdot \cos \alpha + d\eta \cdot \cos \beta + d\zeta \cdot \cos \gamma = 0,$

von denen die erste eine bekannte Beziehung ausspricht, während die zweite und dritte aus dem Grunde gilt, weil die Drehaxe sowohl vor als nach der Drehung $d\sigma$ der Ebene angehört, also zu deren Perpendikel senkrecht bleibt. Bezeichnet R die Determinante der Coefficienten von $\cos\alpha$, $\cos\beta$, $\cos\gamma$ in obigen drei Gleichungen, so folgt durch Auflösung

8) $R\cos\alpha = \eta d\zeta - \zeta d\eta$, $R\cos\beta = \zeta d\xi - \xi d\zeta$, $R\cos\gamma = \xi d\eta - \eta d\xi$. Diese Gleichungen, quadrirt und addirt, ergeben mit Benutzung der Relation 5)

$$R^2 = \overline{d\xi^2} + \overline{d\eta^2} + \overline{d\zeta^2} - (\xi d\xi + \eta d\eta + \zeta d\zeta)^2$$

und, da der Ausdruck in den Klammern verschwindet,

$$R^2 = d \sigma^2$$

Wir wählen $R = -d\sigma$, wodurch die Gleichungen 8) in folgende übergehen:

9)
$$V_{\xi} = -\eta \frac{d\xi}{dt} + \xi \frac{d\eta}{dt}$$
, $V_{\eta} = -\xi \frac{d\xi}{dt} + \xi \frac{d\zeta}{dt}$, $V_{\zeta} = -\xi \frac{d\eta}{dt} + \eta \frac{d\xi}{dt}$

Die Vorzeichen dieser Ausdrücke sind richtig unter der Voraussetzung, dass die Drehungsrichtung entgegen der Uhrzeigerbewegung als die positive bezeichnet wird.

4. Da sich die Drehgeschwindigkeit und Drehbeschleunigung einer Ebene in gleicher Weise combiniren, wie die Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Punktes, so werden auch für die Componenten der Beschleunigung Γ nach den drei Axen analoge Resultate gelten wie dort, nämlich:

$$\Gamma_{\xi} = \frac{dV_{\xi}}{dt}, \quad \Gamma_{\eta} = \frac{dV_{\eta}}{dt}, \quad \Gamma_{\zeta} = \frac{dV_{\zeta}}{dt}$$

oder mit Einführung der Gleichungen 9)

10)
$$\Gamma_{\xi} = -\eta \frac{d^3 \xi}{dt^2} + \xi \frac{d^3 \eta}{dt^2}, \quad \Gamma_{\eta} = -\xi \frac{d^3 \xi}{dt^2} + \xi \frac{d^3 \xi}{dt^2}, \quad \Gamma_{\xi} = -\xi \frac{d^3 \eta}{dt^2} + \eta \frac{d^3 \xi}{dt^2}$$

5. Es soll noch auf die eigentliche Bedeutung der Componenten der Drehgeschwindigkeit und Drehbeschleunigung hingewiesen werden. Projicirt man die drei Componenten V_{ξ} . V_{η} , V_{ζ} auf die bewegte Ebene, so erhält man drei neue Drehgeschwindigkeiten $V_{\xi}\cos\lambda$, $V_{\eta}\cos\mu$, $V_{\zeta}\cos\nu$ um die Axen O_{ξ}' , O_{η}' , O_{ζ}' , welche in der Ebene liegen. Projicirt man hingegen V_{ξ} , V_{η} , V_{ζ} auf eine Gerade senkrecht zur bewegten Ebene, so ist die Summe dieser Projectionen

11)
$$\xi V_{\xi} + \eta V_{\eta} + \zeta V_{\zeta} = 0,$$

wie sich aus 9) unmittelbar ergiebt.

Die Drehung der Ebene um OG wird also eigentlich durch drei andere Drehungen ersetzt, welche um die Projectionen der Coordinatenaxen auf die Ebene stattfinden.

Gleiches gilt von der Drehbeschleunigung der Ebene. Auch diese kann jederzeit ersetzt werden durch drei andere Drehbeschleunigungen, die man der Grösse und Axe nach erhält, wenn man die Componenten Γ_{ξ} , Γ_{η} , Γ_{ζ} auf die Ebene projicirt.

Die Projectionen dieser Componenten senkrecht zur Ebene ergeben als Summe

12)
$$\xi \Gamma_{\xi} + \eta \Gamma_{\eta} + \zeta \Gamma_{\zeta} = 0,$$

wie aus den Gleichungen 10) zu entnehmen ist.

6. Multiplicirt man von den letztgenannten Gleichungen die erste mit η , die zweite mit ξ und subtrahirt dieselben, so folgt

$$\xi \Gamma_{\eta} - \eta \Gamma_{\xi} = \frac{d^{2}\zeta}{d^{2}t} (\xi^{2} + \eta^{2}) - \zeta \left(\xi \frac{d^{2}\xi}{dt^{2}} + \eta \frac{d^{2}\eta}{dt^{2}}\right)$$

und da

$$\xi^2 + \eta^2 = 1 - \zeta^2,$$

so ist auch

$$\xi \Gamma_{\eta} - \eta \Gamma_{\xi} = \frac{d^{2} \zeta}{dt^{2}} - \zeta \left(\xi \frac{d^{2} \xi}{dt^{2}} + \eta \frac{d^{2} \eta}{dt^{2}} + \zeta \frac{d^{2} \zeta}{dt^{2}} \right)$$

und analog

$$\eta \Gamma_{\xi} - \xi \Gamma_{\eta} = \frac{d^{2}\xi}{dt^{2}} - \xi \left(\xi \frac{d^{2}\xi}{dt^{2}} + \eta \frac{d^{2}\eta}{dt^{2}} + \xi \frac{d^{2}\xi}{dt^{2}} \right),$$

$$\xi \Gamma_{\xi} - \xi \Gamma_{\zeta} = \frac{d^2 \eta}{dt^2} - \eta \left(\xi \frac{d^2 \xi}{dt^2} + \eta \frac{d^2 \eta}{dt^2} + \xi \frac{d^2 \xi}{dt^2} \right).$$

Multiplicirt man diese Gleichungen der Reihe nach mit $d\zeta$, $d\xi$, $d\eta$ und addirt sie, so erhält man mit Berücksichtigung der Relation

$$\xi d\xi + \eta d\eta + \zeta d\zeta = 0$$

die Gleichung

$$d\xi \cdot \frac{d^3\xi}{dt^2} + d\eta \cdot \frac{d^2\eta}{dt^2} + d\zeta \cdot \frac{d^2\zeta}{dt^2} = (\eta \Gamma_{\xi} - \zeta \Gamma_{\eta}) d\xi + (\zeta \Gamma_{\xi} - \xi \Gamma_{\zeta}) d\eta + (\xi \Gamma_{\eta} - \eta \Gamma_{\xi}) d\zeta.$$
ist nach Gleichung 7)

Nun ist nach Gleichung 7)
$$dV^2 = 2\left(\frac{d\xi}{dt}d\frac{d\xi}{dt} + \frac{d\eta}{dt}d\frac{d\eta}{dt} + \frac{d\zeta}{dt}d\frac{d\zeta}{dt}\right);$$

es folgt somit

13) $\frac{1}{2}dV^2 = (\eta \Gamma_{\xi} - \xi \Gamma_{\eta}) d\xi + (\xi \Gamma_{\xi} - \xi \Gamma_{\xi}) d\eta + (\xi \Gamma_{\eta} - \eta \Gamma_{\xi}) d\xi,$

eine Beziehung, welche für Bewegungsprobleme der Ebene von ähnlichem Nutzen ist, wie das Princip der lebendigen Kraft für die Bewegung des Punktes.

Die bis hierher abgeleiteten Relationen sollen zunächst in einigen speciellen Fällen Anwendung finden.

7. Die Beschleunigung der Ebene bleibe constant der Grösse und Axe nach; es seien also

$$\Gamma_{\xi} = a$$
, $\Gamma_{\eta} = b$, $\Gamma_{\xi} = c$.

Die Gleichung 12) liefert dann

$$a\xi + b\eta + c\xi = 0$$
,

- d. i. die Gleichung einer Geraden. Die Ebene beschreibt somit bei ihrer Bewegung einen Ebenenbüschel, und zwar gleichförmig beschleunigt.
- 8. Die bewegte Ebene werde in jedem Augenblicke um zwei Axen gleichzeitig beschleunigt und zwar um ihre Schnittlinien OB und OC mit beiden Coordinatenebenen $\xi O \eta$ und $\xi O \zeta$. Die Grösse jeder der Beschleunigungen sei proportional dem Sinus des Neigungswinkels der bewegten mit der betreffenden Coordinatenebene. Man untersuche die Bewegung der-Ebene.

Bezeichnen wir mit φ und ψ (Fig. 3) die letzterwähnten Neigungskel, im Sinne der Drehbeschleunigung gezählt, so sind zunächst die ge Sebenen Beschleunigungen um die Axen OB, OC

$$\Gamma_B = b \sin \varphi$$
, $\Gamma_C = c \sin \psi$

und sonach die Componenten der gesammten Beschleunigung

$$\Gamma_{\xi} = \Gamma_{B} \cos \beta + \Gamma_{C} \cos \gamma, \quad \Gamma_{\eta} = \Gamma_{B} \sin \beta, \quad \Gamma_{\zeta} = \Gamma_{C} \sin \gamma,$$

wenn man die Winkel

$$\xi OB = \beta$$
, $\xi OC = \gamma$

bezeichnet. Beschreibt man nun aus O eine Kugel, welche das sphärische Dreieck ABC ausschneidet, und fällt aus A das Bogenperpendikel AA' auf die Basis BC, so folgt aus dem rechtwinkligen sphärischen Dreiecke ABA'

und ebenso aus
$$ACA'$$

$$sin \beta. sin \varphi = sin \lambda = \xi$$
$$sin \gamma. sin \psi = sin \lambda = \xi.$$

Analog wird man erhalten, wenn man statt $O\xi$ die Axen $O\eta$ und $O\zeta$ auf die Ebene projicirt und die when Schnitt entstehenden Dreiecke zaterocht,

 $\cos \beta . \sin \varphi = -\sin \mu = -\eta$, $\cos \gamma . \sin \psi = -\sin \nu = -\zeta$,

daher wird nach Substitution

14)
$$\Gamma_{\xi} = -(b\eta + c\xi), \quad \Gamma_{\eta} = b\xi, \quad \Gamma_{\zeta} = c\xi,$$

welche Ausdrücke wieder der Bedingung 12)

$$\xi \Gamma_{E} + \eta \Gamma_{n} + \xi \Gamma_{C} = 0$$

genügen müssen.

Um die Geschwindigkeit der Drehbewegung zu ermitteln, benutzen wir Gleichung 13); dieselbe nimmt nach Substitution obiger Ausdrücke für die Componenten die Form an

$$\frac{1}{2}dV^2 = (c\eta - b\zeta)(\xi d\xi + \eta d\eta + \zeta d\zeta) - c d\eta + b d\zeta$$

oder, da der zweite Klammerausdruck verschwindet,

$$\frac{1}{2} d \nabla^2 = -c d\eta + b d\zeta,$$

woraus nach Integration

$$V^2 = 2(b\zeta - c\eta) + k.$$

Um die Gleichung der Bahn zu finden, bemerken wir, dass

$$c\Gamma_n = b\Gamma_{\zeta}$$
 oder $c.dV_n = b.dV_{\zeta}$.

woraus

$$cV_n = bV_{\zeta}$$
.

Die Integrationsconstante verschwindet, wenn wir annehmen, dass die anfängliche Geschwindigkeit der Ebene null ist. Mit Benützung der Gleichungen 9) wird somit

 $c(\xi d\zeta - \zeta d\xi) = b(\eta d\xi - \xi d\eta)$

oder

$$\frac{d\xi}{\xi} = \frac{b\,d\eta + c\,d\zeta}{b\,\eta + c\,\zeta},$$

woraus durch Integration

$$a\xi + b\eta + c\xi = 0$$
,

d. i. die Gleichung einer Geraden, folgt. Die Ebene bewegt sich also wieder in einem Ebenenbüschel; die Axe desselben besitzt die Richtungscosinusse

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$
, $\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$, $\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

Mit Benutzung obiger Gleichung des Ebenenbüschels gehen die Gleichungen 14) jetzt über in

$$\Gamma_{\xi} = a\xi, \quad \Gamma_{\zeta} = b\xi, \quad \Gamma_{\eta} = c\xi$$

und es ist somit die Drehbeschleunigung der Ebene

$$\Gamma = \xi \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

Sie verschwindet, wenn die Ebene bei ihrer Drehung die Og-Axe passirt.

9. Die Bewegung einer Ebene entstehe dadurch, dass sich eine um die Oξ-Axe wirkende Drehgeschwindigkeit von constanter Grösse sir Moment auf die Ebene projicirt; die Grösse und Richtung dieser? werde zur Drehgeschwindigkeit der Ebene. Man untersuche nigungszustand und die Bahn dieser Ebene.

Zunächst ist

$$V = a \cos \lambda$$

und

$$V_{\xi} = V \cos \lambda = a \cos^2 \lambda = a(1 - \xi^2).$$

Benützt man nun die bekannten Beziehungen

$$V_{t}^{2} + V_{n}^{2} + V_{t}^{2} = V^{2}, \quad \xi V_{t} + \eta V_{n} + \zeta V_{t} = 0,$$

so findet sich

$$V_{\eta} = -a\xi\eta, \quad V_{\zeta} = -a\xi\zeta.$$

Es folgt also

$$\zeta V_{\eta} = \eta V_{\zeta}$$

und nach Einführung der Werthe aus 9)

$$\zeta(\xi d\zeta - \zeta d\xi) = \eta(\eta d\xi - \xi d\eta).$$

Es ergiebt sich hieraus

$$d\xi = \xi(\xi d\xi + \eta d\eta + \xi d\xi) = 0$$
 und $\xi = c = const.$

Die Ebene bewegt sich somit längs einer Kreiskegelfläche um die Oξ als Axe. Schreibt man Gleichung 15) in der Form

$$-\eta \frac{d\zeta}{dt} + \zeta \frac{d\eta}{dt} = a(1-c^2)$$

und bemerkt, dass

$$\xi^2 + \eta^2 + \xi^2 = 1$$
, $\xi d\xi + \eta d\eta + \zeta d\zeta = 0$

oder im gegenwärtigen Falle

$$\eta^2 + \zeta^2 = 1 - c^2$$
, $\eta d\eta + \zeta d\zeta = 0$

ist, so folgt

$$\frac{d\eta}{dt} = a\zeta, \quad \frac{d\zeta}{dt} = -a\eta,$$

woraus nach Integration folgt

$$\eta = \sqrt{1-c^2}\sin(at+k), \quad \zeta = \sqrt{1-c^2}\cos(at+k).$$

Hierin bezeichnet k eine Constante.

Die Componenten der Beschleunigung ergeben sich jetzt folgendermassen:

$$\Gamma_{\xi} = 0$$
, $\Gamma_{\eta} = -a^2c\zeta$, $\Gamma_{\zeta} = a^2c\eta$,

woraus die Drehbeschleunigung selbst

$$\Gamma = a^2 c \sqrt{1 - c^2} = V^2 \tan \alpha.$$

Sie bleibt also der Grösse nach constant; ihre Axe liegt stets in der Coordinatenebene $\eta O \xi$, sie ist der Schnitt der letzteren mit der bewegten Ebene und dreht sich während der Bewegung der Ebene mit constanter Winkelgeschwindigkeit um den Punkt O.

10. Für gewisse Bewegungen der Ebene erscheint es vortheilhaft, der analytischen Untersuchung eine Art Polarcoordinatensystem zu Grunde zu legen. Wir nehmen zu diesem Zwecke eine fixe Ebene, die Grundebene, and in dieser eine Axe OA mit dem Pole O, welch' letzterer zugleich in Scheitel des Eben undels ist, in welchem sich die Ebene bewegt. Es mit der Grundebene, ψ den Winkel wer gezählt, φ den Neigungswinkel

s gemessen, und zwar positiv

oder negativ, je nachdem die Drehung der Grundebene in die bewegte Ebene um OS, von S aus gesehen, entgegen oder mit dem Uhrzeiger geschehen müsste. Wir nennen die Winkel φ und ψ die Coordinaten der Ebene im Ebenenbündel.

Beschreibt nun die Ebene im Raume eine unendlich kleine Drehung $d\sigma$ um eine in ihr liegende Axe OG (Fig. 4), so lässt sich dieselbe nach dem bekannten Princip ersetzen durch zwei andere unendlich kleine Drehungen $d\varphi$ und $d\omega$ um die Axen OS und OR, welche ebenfalls in der Ebene liegen und aufeinander senkrecht stehen sollen, so zwar, dass die Relation gilt

$$d\,\sigma^2 = d\,\varphi^2 + d\,\omega^2.$$

Diese beiden Drehungen werden die Coordinaten der Ebene verändern, und zwar die Drehung $d\varphi$ die Coordinate φ , $d\varpi$ die Coordinate ψ ; bezüglich letzterer ist leicht ersichtlich, dass

$$d\omega = \sin \varphi . d\psi,$$

sobald man untersucht, welcher Veränderung ψ unterliegt, wenn die Ebene um OR gedreht wird. Man hat also

$$d\sigma^2 = d\varphi^2 + \sin^2\varphi \ d\psi^2$$

und wenn man durch

$$V = \frac{d\sigma}{dt}, \quad V_{\varphi} = \frac{d\varphi}{dt}, \quad V_{\infty} = \frac{d\omega}{dt}$$

die Drehgeschwindigkeit und ihre Componenten nach OS und OR bezeichnet:

18)
$$V_{\varphi} = \frac{\varphi}{dt}$$
, $V_{\omega} = \sin \varphi \frac{d\psi}{dt}$, $V^{2} = \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^{2} + \sin^{2}\varphi \left(\frac{d\psi}{dt}\right)^{2}$.

Bei fortgesetzter Drehung der Ebene um OG werden V_{φ} und V_{ϖ} gewisse Aenderungen erleiden, selbst wenn φ constant bleibt; dies rührt von der Veränderung des Winkels α , welchen die Axe der Drehgeschwindigkeit OG mit OR einschliesst, her. Es ist nämlich

$$V_{\varphi} = V. \sin \alpha$$
, $V_{\omega} = V. \cos \alpha$,

somit

$$\partial V_{\varphi} = V \cos \alpha . \partial \alpha = V_{\varpi} . \partial \alpha, \quad \partial V_{\varpi} = - V \sin \alpha . \partial \alpha = - V_{\varphi} . \partial \alpha.$$

Nun lehrt eine einfache Betrachtung, dass

$$\partial \alpha = \cos \varphi \cdot d \psi$$

es ergiebt sich also mit Hinweis auf die Gleichungen 18)

$$\partial V_{\varphi} = \sin \varphi \cos \varphi \left(\frac{d \psi}{d t}\right)^2 d t, \quad \partial V_{\omega} = -\cos \varphi \frac{d \varphi}{d t} \frac{d \psi}{d t},$$

vorausgesetzt, dass sich die Drehgeschwindigkeit V nicht ändert.

Tritt nun noch eine Drehbeschleunigung Γ um eine Axe OB hinzu. welche mit OR einen Winkel β einschließen möge, so werden die Geschwindigkeitscomponenten V_{φ} und V_{ω} neuerdings verändert und zwar um die Beträge $\Gamma \sin \beta \ dt = \Gamma_{\omega} . dt, \quad \Gamma \cos \beta \ dt = \Gamma_{\omega} . dt,$

1 000 p ut = 1 g. ut 1 1 000 p ut = 1 g. ut 1

so zwar, dass die Gesammtveränderungen jetzt betragen werden

$$dV_{\varphi} = \Gamma_{\varphi} dt + \sin\varphi \cos\varphi \left(\frac{d\psi}{dt}\right)^{2} dt, \quad dV_{\varpi} = \Gamma_{\varpi} dt - \cos\varphi \frac{d\varphi}{dt} \frac{d\psi}{dt} dt,$$

woraus sich mit Beziehung auf die Gleichungen 16) und 17) ergiebt

$$\Gamma_{\varphi} = \frac{d^2 \varphi}{dt^2} - \cot ang \varphi \left(\frac{d \omega}{dt}\right)^2, \quad \Gamma_{\omega} = \frac{d^2 \omega}{dt^2} + \cot ang \varphi \frac{d \varphi}{dt} \frac{d \omega}{dt}$$

oder nach Einführung des Winkels ψ

19)
$$\begin{cases} \Gamma_{\varphi} = \frac{d^{2} \varphi}{dt^{2}} - \sin \varphi \cos \varphi \left(\frac{d \psi}{dt}\right)^{2}, \\ \Gamma_{\varpi} = \frac{d^{2} \psi}{dt^{2}} \sin \varphi + 2 \cos \varphi \frac{d \varphi}{dt} \frac{d \psi}{dt}. \end{cases}$$

Man dürfte den analogen Bau dieser Formeln mit jenen für die Beschleunigungscomponenten eines Punktes in Polarcoordinaten sofort erkennen.

 $\Gamma_{\omega} d\varphi + \Gamma_{\omega} \sin \varphi \cdot d\psi$

11. Bildet man mit Hilfe obiger Formeln den Ausdruck

so findet man hierfür

$$\frac{d^2 \varphi}{dt^2} d\varphi + \sin \varphi \cos \varphi \left(\frac{d \psi}{dt}\right)^2 d\varphi + \sin^2 \varphi \frac{d^2 \psi}{dt^2} d\psi$$

und dies ist identisch mit $\frac{1}{4}dV^2$, wenn man nach 18)

$$V^{2} = \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^{2} + \sin^{2}\varphi \left(\frac{d\psi}{dt}\right)^{2}$$

berücksichtigt. Es ist also auch

20)
$$V^2 = 2 \int (\Gamma_{\varphi} d\varphi + \Gamma_{\omega} \sin\varphi d\psi).$$

12. Die soeben abgeleiteten Formeln gestatten eine besonders passende Anwendung in dem Falle, wenn die bewegte Ebene jederzeit um ihre Schnittlinie mit einer festen Ebene beschleunigt wird, d. h. wenn sämmtliche Beschleunigungsaxen in einer Ebene liegen. Wählt man diese letztere zur Grundebene eines Coordinatensystems von eben behandelter Art, so bleibt während der Bewegung

$$\Gamma_{\omega} = \frac{1}{\sin \varphi} \frac{d}{dt} \left(\sin^2 \varphi \frac{d\psi}{dt} \right) = 0,$$

worsus unmittelbar folgt

$$\sin^2 \varphi \, \frac{d \, \psi}{dt} = c = const.$$

oder mit Beziehung auf Gleichung 18)

$$V_{m}$$
 sin $\varphi = c$,

d. h.: die Projection der Drehgeschwindigkeit V auf eine Gerade senkrecht zur Grundebene bleibt während der Bewegung constant. Diese Gattung von Bewegungen der Ebene bildet eine Analogie zu der Centralbewegung des Punktes.

13. Ein specielles Interesse hat in suggest jene, bei welcher die F

ran Guadrat. Jes dus Be-

28)
$$T = \pi \sqrt{2} \frac{\sqrt{b + \sqrt{b^2 + 4a^2}}}{\sqrt{b^2 + 4a^2}}.$$

Um die kleinste Oeffnung 2ω der Kegelfläche zu erhalten, deren Gleichung in 25) gegeben ist, ermitteln wir aus letzterer jene Werthe $\varphi = \varphi_0$ und $\varphi = \varphi_1$, für welche $\psi = 0$ und $\psi = \pi$, oder kürzer: für welche $\frac{d \varphi}{dt} = 0$ ist; es wird für dieselben die Beziehung gelten

$$c^2 \cot g^2 \varphi + 2a \cot g \varphi - b + c^2 = 0$$

oder auch

$$29) \qquad \cot g \, \varphi_0 + \cot g \, \varphi_1 = -\frac{2 \, a}{c^2},$$

$$\cot \varphi_0 \cdot \cot \varphi_1 = 1 - \frac{b}{c^2}.$$

Es ist nun

$$\sin 2\omega = \sin(\varphi_0 + \varphi_1)$$

und da nach 29)

$$\frac{\sin(\varphi_0+\varphi_1)}{\sin\varphi_0\cdot\sin\varphi_1}=-\frac{2a}{c^2},$$

sowie nach 30)

$$\sin \varphi_0 \cdot \sin \varphi_1 = \frac{c^2 \sin \varphi_0 \cos \varphi_0}{\sqrt{c^4 - (2bc^2 - b^2)\sin^2 \varphi_0}},$$

so ergiebt sich mit Benutzung der Relation 24)

$$\sin 2\omega = \frac{-2a}{\sqrt{b^2 + 4a^2}}$$

und daher

$$\cot 2 \omega = -\frac{b}{2a}$$

Mit Hilfe dieser Beziehung nimmt jetzt Gleichung 28) die Form an

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{-a}} \sqrt{\sin \omega \cdot \cos^3 \omega}.$$

Besitzt die Ebene im Beginn ihrer Bewegung eine andere Neigung φ_0 gegen dieselbe Grundebene, so wird auch die Kegelfläche, welche jene umhüllt, und die Umlaufszeit eine andere werden; es gilt für letztere

$$T_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{-a}} \sqrt{\sin \omega_1 \cdot \cos^3 \omega_1}$$

und es besteht für die beiden Umlaufszeiten das Verhältniss

$$\frac{T^{3}}{T_{1}^{2}} = \frac{\sin \omega \cdot \cos^{3} \omega}{\sin \omega_{1} \cdot \cos^{3} \omega_{1}}$$

Das hier behandelte Beispiel, eine Analogie zu der Centralbewegung des Punktes nach dem Anziehungsgesetze $\gamma = \frac{a}{r^2}$, lässt die Dualität der Bewegung des Punktes und der Ebene sehr deutlich erkennen.*

^{*} Vergl.: Die Linearbewegung des Strahles a. a. O. S. 53.

Diese Gleichung gehört einer Kegelfläche zweiter Classe an, welche die Ebene bei ihrer Bewegung umhüllt. Bemerkenswerth ist die Lage dieser Kegelfläche; es ist nämlich eine ihrer Schaaren von Kreisschnittsebenen zur Grundebene parallel, wie eine einfache Untersuchung lehrt.

Um eine Beziehung zwischen der Bahn der Ebene und der aufgewendeten Zeit zu ermitteln, schreiben wir Gleichung 25) in der Form

26)
$$A \cos \psi - a = c^{3} \cot a \varphi.$$

worin

$$A = a + c^{q} \cot q \varphi_0$$

bezeichnet, und beachten, dass

$$\frac{d\psi}{dt} = \frac{c}{\sin^2 \omega}.$$

Es wird sich dann Gleichung 26) durch Elimination von φ in der Form schreiben lassen: $dt = \frac{c^3 d \psi}{c^4 + (A \cos \psi - a)^2},$

welche mittels der Substitutionen

$$\cos \alpha = -\frac{c^2 i + a}{A}, \quad \cos \beta = \frac{c^2 i - a}{A},$$

übergeführt werden kann in $i = \sqrt{-1}$,

$$dt = \frac{c}{2Ai} \left\{ \frac{1}{\cos \psi + \cos \alpha} - \frac{1}{\cos \psi + \cos \beta} \right\} d\psi,$$

woraus sich durch Integration ergiebt

$$t = \frac{c}{2 A i} l \left\{ \frac{\cos \frac{\psi - \alpha}{2}}{\cos \frac{\psi + \alpha}{2}} \right\}^{\cos c \alpha} \left(\frac{\cos \frac{\psi + \beta}{2}}{\cos \frac{\psi - \beta}{2}} \right)^{\cos c \beta} \right\}.$$

Hierbei verschwindet die Integrationsconstante unter den für den Anfangszustand gemachten Voraussetzungen und wurde ferner

$$l(+1) = 0$$

gesetzt. Die Zeit eines vollen Umlaufs der Ebene an der Kegelfläche ergiebt sich hieraus für $\psi=2\pi$ mit

$$T = \frac{c}{2 \operatorname{A} i} \left(\frac{1}{\sin \alpha} + \frac{1}{\sin \beta} \right) l(+1).$$

Setzt man hierin

$$k = \frac{1}{\sin \alpha} + \frac{1}{\sin \beta}$$
 und $l(+1) = 2\pi i$,

d. i. den nach O folgenden Werth, so wird

$$T = \frac{c \, k \, \pi}{A}$$

k ist eine reelle Constante, man findet für sie mittels der Substitutionen 27)

$$k = \sqrt{2} \frac{A}{a} \sqrt{b} + \frac{1}{a}$$

and a wird demnach die Umlas

28)
$$T = \pi \sqrt{2} \frac{\sqrt{b + \sqrt{b^2 + 4a^2}}}{\sqrt{b^2 + 4a^2}}.$$

Um die kleinste Oeffnung 2ω der Kegelfläche zu erhalten, deren Gleichung in 25) gegeben ist, ermitteln wir aus letzterer jene Werthe $\varphi = \varphi_0$ und $\varphi = \varphi_1$, für welche $\psi = 0$ und $\psi = \pi$, oder kürzer: für welche $\frac{d \varphi}{dt} = 0$ ist; es wird für dieselben die Beziehung gelten

$$c^2 \cot g^2 \varphi + 2 a \cot g \varphi - b + c^2 = 0$$

oder auch

$$cotg\,\varphi_0 + cotg\,\varphi_1 = -\frac{2\,a}{c^2},$$

$$\cot \varphi_0 \cdot \cot \varphi_1 = 1 - \frac{b}{c^2}.$$

Es ist nun

$$\sin 2\omega = \sin (\varphi_0 + \varphi_1)$$

und da nach 29)

$$\frac{\sin(\varphi_0+\varphi_1)}{\sin\varphi_0\cdot\sin\varphi_1}=-\frac{2a}{c^2},$$

sowie nach 30)

$$\sin \varphi_0 \cdot \sin \varphi_1 = \frac{c^2 \sin \varphi_0 \cos \varphi_0}{\sqrt{c^4 - (2bc^2 - b^2)\sin^2 \varphi_0}}$$

so ergiebt sich mit Benutzung der Relation 24)

$$\sin 2\omega = \frac{-2a}{\sqrt{b^2 + 4a^2}}$$

und daher

$$\cot 2 \omega = -\frac{b}{2a}$$

Mit Hilfe dieser Beziehung nimmt jetzt Gleichung 28) die Form an

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{-a}} \sqrt{\sin \omega \cdot \cos^3 \omega}.$$

Besitzt die Ebene im Beginn ihrer Bewegung eine andere Neigung φ_0 gegen dieselbe Grundebene, so wird auch die Kegelfläche, welche jene umhüllt, und die Umlaufszeit eine andere werden; es gilt für letztere

$$T_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{-a}} \sqrt{\sin \omega_1 \cdot \cos^3 \omega_1}$$

und es besteht für die beiden Umlaufszeiten das Verhältniss

$$\frac{T^2}{T_1^2} = \frac{\sin \omega \cdot \cos^3 \omega}{\sin \omega_1 \cdot \cos^3 \omega_1}$$

Das hier behandelte Beispiel, eine Analogie zu der Centralbewegung des Punktes nach dem Anziehungsgesetze $\gamma = \frac{a}{r^3}$, lässt die Dualität der Bewegung des Punktes und der Ebene sehr deutlich erkennen.*

^{*} Vergl.: Die Linearbewegung des Strahles a. a. O. S 53.

Bewegung der Ebene im Raume.

- 14. Die allgemeine Bewegung einer Ebene im Raume, deren Grundzüge in der Einleitung bereits gegeben wurden, kann behufs ihrer analytischen Einkleidung stets auf zwei einfache Bewegungen zurückgeführt werden, nämlich auf:
 - 1. die Bewegung der Ebene im Ebenenbündel,
 - 2. die parallele Verschiebung oder Translation der Ebene.

Führt man durch einen beliebigen Punkt O des Raumes eine Parallele zu der bewegten Ebene und ebenso zu der in letzterer gelegenen Geschwindigkeits- resp. Beschleunigungsaxe, und überträgt die Grössen der Drehgeschwindigkeit und Drehbeschleunigung jederzeit ungeändert auf die neue Ebene, so wird sich diese hinsichtlich ihrer Richtung genau so bewegen, wie die Ebene im Raume, d. h. die beiden Ebenen werden während ihrer Bewegung stets parallel bleiben. Wir wollen die so hervorgerufene Bewegung einer Ebene im Ebenenbündel die nach O reducirte Bewegung der Ebene im Raume nennen.

15. Projicirt man die Geschwindigkeitsaxe der reducirten Bewegung jederzeit orthogonal auf die Ebene im Raume, so wird diese Projection zwar zur Geschwindigkeitsaxe der räumlichen Bewegung parallel sein, jedoch in einem Abstande p von ihr liegen. Um also die Projection der reducirten Drehgeschwindigkeit in die wirkliche der Ebene überzuführen, ist die Hinzufügung einer Translationsgeschwindigkeit nothwendig, welche die Ebene parallel zu sich verschiebt und deren Grösse

$$\mathfrak{V} = V. p$$

ist. Bezeichnen wir nun mit ϱ den Abstand der Ebene im Raume von O, so wird für eine unendlich kleine Drehung $d\sigma$ der Ebene um ihre wirkliche Geschwindigkeitsaxe die Beziehung stattfinden

$$d\varrho = p \ d\sigma$$

and mit Berticksichtigung von

$$V = \frac{d\sigma}{dt}$$

erhalten wir jetzt für die Translationsgeschwindigkeit der Ebene

$$\mathfrak{B} = \frac{d\varrho}{dt}.$$

16. Aehnliche Ueberlegungen gelten für die Drehbeschleunigung der wirklichen Bewegung und ihre Beziehung zur Drehbeschleunigung der reducirten Bewegung. Projicirt man nämlich die Beschleunigungsaxe der letztem auf die Ebene im Raume, so wird diese Projection zwar parallel sein zur wirklichen Beschleunigungsaxe der Ebene, aber in einem Abstande quant ihr entfernt liegen; um deshalb die Projection der reducirten Drehe

beschleunigung in die wirkliche zu überführen, ist eine Translationsbeschleunigung senkrecht zur Ebene hinzuzufügen. Die Grösse derselben ist

$$\mathfrak{T} = \Gamma \cdot q,$$

wenn Γ , wie bisher, die Drehbeschleunigung der Ebene bezeichnet.

Es erübrigt noch, einen analytischen Ausdruck für q zu gewinnen, und hierzu dient folgende Ueberlegung.

Bezeichnen V und Γ (Fig. 5) die Geschwindigkeits- resp. Beschleunigungsaxe der Ebene, V' die aus beiden resultirende Geschwindigkeitsaxe. $OR = \varrho$ das aus O auf die Ebene errichtete Perpendikel, Rr = p, Rs = q, $Rr' = \bar{p}$ die Abstände jener Axen vom Fusspunkte R, so gilt zunächst nach einem bekannten Gesetze (analog dem Momentensatze in der Mechanik des Punktes)

 $\Gamma q = \frac{d}{dt}(Vp)$

oder

$$\Gamma q dt = V'\bar{p} - Vp.$$

Nun bleibt aber die Ebene nicht in ihrer Lage, sondern wird sich während des folgenden Zeitelementes um ihre neue Axe V' drehen; es käme hierdurch der Fusspunkt R nach R', während der Fusspunkt r' seinen Ort nicht ändert. Bezeichnen wir jetzt

 $OR'=\varrho', R'r'=p',$

so gilt offenbar

$$\rho^2 + \bar{p}^2 = \rho'^2 + p'^2$$

oder

$$\varrho'^2 - \varrho^2 = \bar{p}^2 - p'^2, \quad d\varrho^2 = (\bar{p} + p')(\bar{p} - p')$$

und mit erlaubter Annäherung

$$\varrho \, d\varrho = p(\bar{p} - p'),$$

woraus

$$\vec{p} = \frac{\varrho}{p} d\varrho + p'.$$

Führt man diese Beziehung in Gleichung 35) ein, so wird

$$\Gamma q dt = d(\nabla p) + \frac{\nabla \varrho}{p} d\varrho,$$

woraus sich mit Benützung der Gleichungen 31) - 34)

$$\Gamma q = \mathfrak{T}, \quad \nabla p = \frac{d\varrho}{dt}, \quad p = \frac{d\varrho}{d\sigma}$$

für die Translationsbeschleunigung der Ebene der Ausdruck ergiebt

$$\mathfrak{T} = \frac{d^2 \varrho}{dt^2} + \varrho V^2.$$

Es sollen im Folgenden noch einige Anwendungen dieser Theorie gemacht werden.

17. Eine Ebene besitze ausser einer anfänglichen Drehgeschwindigkeit c um eine beliebige Axe nur eine Translationsbeschleunigung von constanter Grösse, d. h. es sei

$$\Gamma = 0$$
, $\mathfrak{T} = a$.

Die reducirte Bewegung der Ebene ist dann eine solche im Ebenenbüschel. Wählen wir die Axe des letzteren zur $O\xi$ -Axe, so ist

$$\xi = 0 \quad \text{oder} \quad \eta^2 + \zeta^2 = 1$$

die Gleichung des Ebenenbüschels. Die Drehgeschwindigkeit um die Axe $O\xi$ bleibt constant, d. h.

$$V = V_k = c$$

oder auch

$$\zeta d\eta - \eta d\zeta = c dt$$
.

Geht man nun von der reducirten Bewegung auf jene im Raume über, so erhält man durch Benützung der Gleichung 36) zunächst

$$a = \frac{d^2 \varrho}{dt^2} + \varrho c^2,$$

woraus sich durch einmalige Integration ergiebt

$$\frac{d\varrho}{dt} = \sqrt{k+2a\varrho - c^2\varrho^2}.$$

Hierbei ist die Integrationsconstante

$$k = c^2 \varrho_0^2 - 2 a \varrho_0$$

wenn angenommen wird, dass die Ebene im Beginne der Bewegung den Abstand ϱ_0 von O besitzt und ihre Drehaxe anfänglich mit der Projection der $O\xi$ zusammenfällt, d. h. wenn $p_0 = 0$ wird.

Die zweite Integration giebt sodann die Beziehung

$$sinct = \frac{\varrho c^2 - a}{\varrho_0 c^2 - a}$$

zwischen der verflossenen Zeit und der Entfernung ϱ vom Ursprunge. Vergleicht man ferner die oben abgeleitete Relation

 $\zeta d\eta - \eta d\zeta = c dt$

mit der hier geltenden

$$\eta \, d\eta + \zeta \, d\zeta = 0,$$

so findet man

$$c dt = \frac{d\eta}{\sqrt{1-\eta^2}} = -\frac{d\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

und nach Integration

$$\eta = sin ct, \quad \zeta = cos ct,$$

wenn das Coordinatensystem so gelegt wird, dass ausser der $O\xi$ - auch noch die $O\eta$ -Axe zur Anfangslage der Ebene parallel ist. Durch Vergleich mit 38) erhält man jetzt die Beziehung

$$\eta = \frac{\varrho c^2 - a}{\varrho_0 c^2 - a},$$

welche in Verbindung mit der bereits bekannten

$$\xi = 0$$

die Behn der Ebene charakterisiren. Man tiberzeugt sich leicht, dass die Bene bei ihrer Bewegung eine Cylinde t, deren Erzeugende Inde zur Of sind.

Giebt man noch der Gleichung 37) die Form

$$\frac{d \varrho}{d t} = \frac{1}{c} \sqrt{(c^2 \varrho_0 - a)^2 - (c^2 \varrho - a)^2} = \frac{c^2 \varrho_0 - a}{c} \cos ct$$

und besitzt die Drehgeschwindigkeit der Ebene die Grösse

 $c = \sqrt{\frac{a}{\varrho_0}}$

so wird

 $\frac{d\varrho}{dt} = 0$

oder es bleibt

$$\varrho = 0$$
.

Die Ebene umhüllt in diesem Falle eine Kreiscylindersläche.

18. Eine Ebene werde bei ihrer Bewegung durch eine Drehbeschleunigung von constanter Grösse b angeregt, deren Axe stets die $O\xi$ -Axe schneidet und zu ihr senkrecht bleibt. Die anfängliche Geschwindigkeitsaxe der Ebene sei zur Beschleunigungsaxe senkrecht. Man untersuche die Bewegung der Ebene.

Reducirt man dieselbe zunächst nach O (Fig. 6), so hat man es mit dem in Art. 9 behandelten Falle zu thun. Die Ebene umhüllt dann bei ihrer Bewegung eine Kreiskegelfläche mit der Axe $O\xi$ und es gelten sowohl für die reducirte als für die wirkliche Bewegung der Ebene die an erwähnter Stelle gefundenen Relationen

$$V = V_0$$
, $\Gamma = V_0^2 \tan \beta$,

woraus sich in unserem Falle für die halbe Oeffnung λ der Kegelfläche ergiebt

 $tang \lambda = \frac{b}{V_0^2}.$

Geht man nun dazu über, die Translation der Ebene zu untersuchen, so ist zunächst im gegenwärtigen Falle

$$q = \varrho \cot g \lambda$$
.

Beachtet man, dass nach Gleichung 34) und 36)

$$\mathfrak{T} = \frac{d^2\varrho}{dt^2} + \varrho V^2 = q\Gamma$$

und weiter aus der reducirten Bewegung

$$\varrho V^2 = \varrho V_0^2 = q \Gamma$$

gefolgert werden kann, so bleibt

$$\frac{d^2\varrho}{dt^2}=0,$$

woraus nach Integration und mit Rücksicht auf die Gleichungen 31) und 33) folgt

 $\frac{d\varrho}{dt} = c = V_0 p_0$

und weiter

$$\varrho = \nabla_{o} \mathbf{p}_{o} \mathbf{t}$$
,

wenn p_0 den constant bleibenden Abstand der Geschwindigkeitsaxe vom Fusspunkte R bezeichnet und angenommen wird, dass die Ebene im Beginn ihrer Bewegung durch O geht. Die Ebene entfernt sich somit gleichförmig vom Pole O.

Um noch die Gleichung der Bahn zu ermitteln, benütze man die Beziehung

 $V_{\xi} = V_0 \cos \lambda = \zeta \frac{d\eta}{dt} - \eta \frac{d\zeta}{dt}$

und verbinde sie mit der oben gefundenen

$$d\varrho = V_0 p_0 dt.$$

Es ergiebt sich dann

$$d\varrho = \frac{p_0}{\cos 1} (\zeta \, d\eta \, - \eta \, d\zeta),$$

woraus man mit Berticksichtigung von

$$\eta d\eta + \zeta d\zeta = 0$$

erhält

$$d\varrho = p_0 \cos \lambda \frac{d\eta}{\sqrt{\cos^2 \lambda - \eta^2}} = -p_0 \cos \lambda \frac{d\zeta}{\sqrt{\cos^2 \lambda - \zeta^2}}.$$

Die Integration ergiebt jetzt

$$\varrho = p_0 \cos \lambda \arcsin \frac{\eta}{\cos \lambda} = p_0 \cos \lambda \arccos \frac{\zeta}{\cos \lambda}$$

wenn für die Anfangslage der Ebene

$$\varrho_0 = 0$$
, $\xi_0 = \sin \lambda$, $\eta_0 = 0$, $\zeta_0 = \cos \lambda$

gewählt wird. Mit Hilfe obiger Gleichungen erhält man endlich in

$$\varrho = p_0 \cos \lambda \arctan g \frac{\eta}{\xi}, \quad \xi = const.$$

die Gleichung der Bahn der Ebene. Es ist dies eine gemeine Schraubenlinie, welche die $O\xi$ zur Axe hat.

19. Ebenso, wie es hier mit den Grundzügen der Bewegung geschah, könnte eine grosse Anzahl der Probleme aus der Bewegungslehre des Punktes und Punktsystems, soweit sie eben von dem Begriffe der Masse absehen, auf die Bewegung der Ebene übertragen werden und man würde auf diesem Wege zu manchen geometrisch interessanten Resultaten gelangen. So kann z. B. eine Ebene gezwungen werden, bei ihrer Bewegung eine bestimmte vorgeschriebene Curve zu beschreiben oder aber eine bestimmte vorgeschriebene Fläche fortwährend zu berühren, und man wird zu analogen Resultaten gelangen, wie bei der Bewegung eines Punktes auf gegebener Bahn oder auf gegebener Fläche.

Die Bewegungslehre der Ebene, auf den oben skizzirten Grundsätzen erbaut, wird gewiss im Stande sein, die geläufige Vorstellung von der Bewegung im Raume im dualen Sinne zu ergänzen.

XII.

Ueber n simultane Differentialgleichungen der Form

$$\sum_{\mu=1}^{n+m} X_{\mu} \cdot dx_{\mu} = 0.$$

Von

Dr. Otto BIERMANN, Docent a. d. deutschen Universität in Prag.

Das Pfaff'sche Problem besteht darin, einem gegebenen Differential-ausdruck

$$\sum_{\kappa=1}^{2\kappa} X_{\kappa} dx_{\kappa} \text{ oder } \sum_{\kappa=1}^{2\kappa+1} X_{\kappa} dx_{\kappa},$$

in welchem die X_{π} irgend Functionen der Variablen x_{π} bedeuten, die Gestalt zu geben

$$\sum_{\varrho=1}^{n} U_{\varrho} \, du_{\varrho} \text{ resp. } U \, du + \sum_{\varrho=1}^{n} U_{\varrho} \, du_{\varrho},$$

wo die Grössen U_{ϱ} , U, u_{ϱ} wieder Functionen der x_{π} sind und u eine ganz willkürliche Function der Veränderlichen bezeichnet. Die Integrale der Differentialgleichungen

$$\sum_{\kappa=1}^{2\kappa} X_{\kappa} dx_{\kappa} = 0, \quad \sum_{\kappa=1}^{2\kappa+1} X_{\kappa} dx_{\kappa} = 0$$

sind

$$u_1 = c_1, \quad u_2 = c_2, \quad \dots, \quad u_n = c_n$$

beziehungsweise

$$u = c, \quad u_1 = c_1, \quad u_2 = c_2, \quad \ldots, \quad u_x = c_x,$$

wenn die c beliebige Constante sind.

Wir wollen für ein System von n Differentialausdrücken mit n+m Variabeln

$$X_1^{(1)} dx_1 + X_2^{(1)} dx_2 + \ldots + X_n^{(1)} dx_n + X_{n+1}^{(1)} dx_{n+1} + \ldots + X_{n+m}^{(1)} dx_{n+m},$$

$$X_1^{(2)} dx_2 + X_2^{(2)} dx_2 + \ldots + X_n^{(2)} dx_n + X_{n+1}^{(2)} dx_{n+1} + \ldots + X_{n+m}^{(2)} dx_{n+m},$$

$$X_1^{(n)} dx_1 + X_2^{(n)} dx_2 + \dots + X_n^{(n)} dx_n + X_{n+1}^{(n)} dx_{n+1} + \dots + X_{n+m}^{(n)} dx_{n+m}$$
das entsprechende Problem aufstellen. Dabei werden wir dem von Na
bei Behandlung des Pfaff'schen Problems eingehaltenen Gedanks

folgen. (Siehe Borchardt's Journ. Bd. LVIII.) Wir werden vor Allem fragen, welches die Definition eines Integrals des Gleichungssystems

1)
$$\sum_{\mu=1}^{n+m} X_{\mu}(v) dx_{\mu} = 0 \quad (v = 1, 2 \dots n)$$

ist und wieviel Integrale diese Differentialgleichungen im Allgemeinen besitzen — wenn zwischen den n(n+m) Functionen $X_{\mu}^{(r)}$ der Variabeln x_{μ} keine Bedingungsgleichungen bestehen.

Dann werden wir das dem Pfaff'schen analoge Problem erkennen. Weiterhin soll uns die Frage nach der Ermittelung der Integrale beschäftigen.

Statt der n+m Grössen x_{μ} denken wir ebensoviel neue Variable v_1 , $v_2 \dots v_p$; $u_1, u_2 \dots u_r$ eingeführt, die Functionen der x_{μ} sind. Die beliebigen Aenderungen δx_{μ} , für welche die n Ausdrücke

$$\sum_{\mu} X_{\mu}(\bullet) \, \delta x_{\mu}$$

nicht Null zu sein brauchen, sind dann in der Form

$$\delta x_{\mu} = \sum_{n=1}^{p} \frac{\partial x_{\mu}}{\partial v_{n}} \delta v_{n} + \sum_{\varrho=1}^{r} \frac{\partial x_{\mu}}{\partial v_{\varrho}} \delta u_{\varrho}$$

darstellbar. Drückt man die Functionen $X_{\mu}^{(r)}$ auch durch die neuen Variabeln v_{π} und u_{ℓ} aus, so erhält man n identische Gleichungen:

$$\sum_{\mu} X_{\mu}(^{\bullet}) \, \delta \, x_{\mu} = \sum_{\pi} \, V_{\pi}(^{\bullet}) \, \delta \, v_{\pi} + \sum_{\varrho} \, U_{\varrho}(^{\bullet}) \, \delta \, u_{\varrho},$$

in denen die Functionen $V_{\pi^{(r)}}$ und $U_{\varrho^{(r)}}$ in folgender Weise bestimmt sind:

$$V_{\pi}^{(r)} = \Sigma X_{\mu}^{(r)} \frac{\partial x_{\mu}}{\partial v_{\pi}}, \quad U_{\varrho}^{(r)} = \Sigma X_{\mu}^{(r)} \frac{\partial x_{\mu}}{\partial u_{\varrho}}.$$

Ersetzt man die allgemeinen Aenderungen δx_{μ} wieder durch die besonderen dx_{μ} , so resultirt mit dem gegebenen Gleichungssystem 1) das folgende: $\sum V_{n}^{(\nu)} d\nu_{n} + \sum U_{\varrho}^{(\nu)} d\nu_{\varrho} = 0, \quad (\nu = 1, 2 \dots n),$

und dieses ist erfüllt, wenn entweder alle Differentiale dv_{π} und du_{Q} Null, d. h. die v_{π} und u_{Q} constant gesetzt werden, oder die Coefficienten der nicht verschwindenden Differentiale Null sind.

Sind die Functionen v_{π} und u_{ϱ} derart gewählt, dass alle Grössen $V_{\pi}^{(r)}$ verschwinden und die u_{ϱ} constant sind, so bestehen die n_{ϱ} Gleichungen:

2)
$$\Sigma X_{\mu}^{(1)} \frac{\partial x_{\mu}}{\partial v_{\pi}} = 0$$
, $\Sigma X_{\mu}^{(2)} \frac{\partial x_{\mu}}{\partial v_{\pi}} = 0$, ..., $\Sigma X_{\mu}^{(n)} \frac{\partial x_{\mu}}{\partial v_{\pi}} = 0$ $(n = 1, 2 \dots p)$,

and diese ersetzen das gegebene System. Fassen wir nämlich in dem letztern die v_{π} als die nothwendig vorkommenden unabhängigen Variablen auf und differentiiren nach dieser, so ergiebt 2).

Die r Grössen up Constanter

ichangen

gelegten Systems von Differentialgleichungen. Je geringer die Anzahl der Integrale ist, um so mehr Variable bleiben willkürlich und um so allgemeiner ist die Lösung. Daher kommt die Frage nach der allgemeinsten Lösung der Differentialgleichungen mit der nach der kleinsten Anzahl von Integralen überein. Diese wollen wir jetzt aufsuchen.

Es ist:

3)
$$\sum_{\mu} X_{\mu}^{(\nu)} \delta x_{\mu} = \sum_{\varrho} U_{\varrho}^{(\nu)} \delta u_{\varrho} \quad (\nu = 1, 2 \dots n),$$

also:

4)
$$X_{\mu}^{(\nu)} = \sum U_{\varrho}^{(\nu)} \frac{\partial u_{\varrho}}{\partial x_{\mu}} \quad (\mu = 1, 2 \dots n + m),$$

und aus diesen n(n+m) Gleichungen sind die r(n+1) Grössen $U_{e}^{(r)}$ und u_{e} zu berechnen.

Ist zuerst n(n+m) durch (n+1)r, also auch n+m durch n+1 theilbar, etwa

$$n+m=k(n+1),$$

so kann r nicht kleiner sein als kn, sonst ergäben sich Bedingungsgleich ungen zwischen den Grössen $X_{\mu}^{(\nu)}$, was ausgeschlossen werden mag.

Im Falle die Anzahl der Variabeln x_{μ} durch die um Eins vermehrte Zahl der gegebenen Gleichungen theilbar ist, besteht daher das allgemeinste Problem der Integration in einer Transformation, durch welche die Identitäten

I)
$$\sum_{\mu=1}^{k(n+1)} X_{\mu}^{(\nu)} \, \delta x_{\mu} = \sum_{\varrho=1}^{kn} U_{\varrho}^{(\nu)} \, \delta u_{\varrho} \quad (\nu = 1, \, 2 \, \dots \, n)$$

entstehen, und die Anzahl der Integrale $u_{\varrho}=c_{\varrho}$ der Gleichungen:

ist dasjenige Vielfache der Anzahl der Gleichungen, welches der Quotient $\frac{m+n}{n+1}$ angiebt.

Ist aber

$$m+n=k(n+1)+\kappa,$$

wo κ die Werthe von 1 bis n annehmen kann, dann giebt es neben kn bestimmten κ willkürliche Integrale. Hier dienen nämlich die n(n+m) Gleichungen 4) dazu, $n(nk+\kappa)$ Grössen U zu bestimmen; doch weil dann für die $nk+\kappa$ Grössen u_Q nur mehr nk Gleichungen übrig sind, bleiben κ willkürlich. Wir bezeichnen diese mit $\varphi_1, \varphi_2 \ldots \varphi_n$ und die zugehörigen Coefficienten $U^{(p)}$ mit $A^{(p)}$. Nun ist das Problem der Integration der Gleichungen:

B)
$$\sum_{\mu=1}^{k(n+1)+x} X_{\mu}^{(\nu)} dx_{\mu} = 0 \quad (\nu = 1, 2 \dots n)$$

in einer Transformation zu suchen, durch welche die Identitäten:

II)
$$\sum_{\mu} X_{\mu}^{(\nu)} \delta x_{\mu} = A_{1}^{(\nu)} \delta \varphi_{1} + A_{2}^{(\nu)} d \varphi_{2} + \dots + A_{n}^{(\nu)} \delta \varphi_{n} + \sum_{q=1}^{nk} U_{q}^{(\nu)} \delta u_{q}$$

$$(\nu = 1, 2 \dots n)$$

hergestellt werden. Die Integrale sind:

$$\varphi_1 = C_1$$
, $\varphi_2 = C_2$, ..., $\varphi_x = C_x$; $u_1 = c_1$, $u_2 = c_2$, ..., $u_{nk} = c_{nk}$, wo die C und c will kürliche Constanten bedeuten.

Ist die Anzahl der Variabeln k(n+1)-n, so giebt es (k-1)n bestimmte und n+1-x willkürliche Integrale.

Die Integrale ändern sich nicht, was für Functionen von x_{μ} auch für die k als unabhängig betrachteten Variabeln v_{π} gewählt werden mögen; denn nehmen wir $\mu = n + m$ Gleichungen

$$x_{\mu} = f_{\mu}(v_1, v_2 \dots v_k, u_1, u_2 \dots u_r)$$

an, in denen die v willkürlich sind, aber die ue die in den Identitäten

$$\sum_{\mu=1}^{n+m} X_{\mu}^{(r)} \, \delta x_{\mu} = \sum_{\varrho=1}^{r} U_{\varrho}^{(r)} \, \delta u_{\varrho}$$

ausgesprochene Bedeutung haben, so ist

$$\sum_{\mu=1}^{n+m} X_{\mu}^{(*)} dx_{\mu} = \sum_{\varrho=1}^{r} U_{\varrho}^{'(*)} \delta u_{\varrho} + \sum_{\pi=1}^{k} V_{\pi}^{'(*)} \delta v_{\pi}.$$

Doch weil die hierauf folgenden Identitäten

$$\sum_{\mathbf{Q}} U_{\mathbf{Q}}^{(\mathbf{r})} \delta u_{\mathbf{Q}} = \sum_{\mathbf{Q}} U_{\mathbf{Q}}^{'(\mathbf{r})} \delta u_{\mathbf{Q}} + \sum_{\mathbf{\pi}} V_{\mathbf{\pi}}^{'(\mathbf{r})} \delta v_{\mathbf{\pi}}$$

nur zu erfüllen sind, wenn
$$U_{\varrho}^{'(i)} = U_{\varrho}^{(i)}, \quad V_{\pi}^{'(i)} = 0$$

ist, so sind die u_{ϱ} Integrale, was immer die v_{π} für Functionen der x_{μ} sein

In den obengenannten Transformationsproblemen erkennen wir die den Pfaff'schen analogen Aufgaben.

Die Integration der Gleichungen B) ist mit Hilfe der Elimination von z Variabeln und deren Differentialen aus den willkürlich zu wählenden Gleichungen

md

$$\varphi_1 = C_1, \quad \varphi_2 = C_2, \quad \dots, \quad \varphi_n = C_n$$
 $\delta \varphi_1 = 0, \quad \delta \varphi_2 = 0, \quad \dots, \quad \delta \varphi_n = 0$

auf die Integration eines Systems der Form A) zurückzuführen, indem in den Identitäten II) links nur k(n+1) Variable x und deren Differentiale stehen bleiben und rechts die z ersten Glieder ausfallen.

Die Integrale der Gleichungen A) sind

$$u_1 = c_1, \quad u_2 = c_2, \quad \ldots, \quad u_{n\,k} = c_{n\,k}.$$

Differentiirt man diese Gleichungen und addirt die mit gewissen Grössen multiplicirten Differentiale du, so entstehen die Gleichungen A)

der Integrale kann man auch $\Sigma X_{\mu}^{(\nu)} \delta x_{\mu}$ auf die Form $\Sigma U_{\varrho}^{(\nu)} \delta u_{\varrho}$ bringen, und zwar sind die n^2k Grössen $U_{\varrho}^{(\nu)}$ durch die Gleichungen

$$U_{\varrho}^{(\nu)} = \Sigma X_{\mu}^{(\nu)} \frac{\partial x_{\mu}}{\partial u_{\varrho}}$$

definirt, in welchen die x_{μ} als Functionen der u_{ϱ} und der k willkürlichen v_{π} aufzufassen sind.

Es giebt noch Integrale, welche statt der willkürlichen Constanten willkürliche Functionen enthalten.

Alle Beziehungen zwischen den U und u, welche die n Ausdrücke zum Verschwinden bringen, haben die Gleichungen A) zur Folge und geben auch ein System von Integralen ab. Bestehen nun etwa die kn-q willkürlichen Relationen:

$$u_{q+1} = f_1(u_1, u_2 \dots u_q), \quad u_{q+2} = f_2(u_1, u_2 \dots u_q), \quad \dots,$$

$$\dots, \quad u_{kn} = f_{kn-q}(u_1, u_2 \dots u_q),$$

so werden die Ausdrücke:

$$\sum_{\boldsymbol{\varrho}} U_{\boldsymbol{\varrho}^{(\boldsymbol{v})}} \delta u_{\boldsymbol{\varrho}} = \sum_{i=1}^{q} \left(U_{i}^{(\boldsymbol{v})} + U_{q+1}^{(\boldsymbol{v})} \frac{\partial f_{1}}{\partial u_{i}} + U_{q+2}^{(\boldsymbol{v})} \frac{\partial f_{2}}{\partial u_{i}} + \ldots + U_{kn}^{(\boldsymbol{v})} \frac{\partial f_{kn-q}}{\partial u_{i}} \right) \delta u_{i}$$

$$(\boldsymbol{v} = 1, 2 \ldots n),$$

und diese verschwinden, wenn

$$U_i^{(v)} + U_{q+1}^{(v)} \frac{\partial f_1}{\partial u_i} + \ldots + U_{kn}^{(v)} \frac{\partial f_{kn-q}}{\partial u_i} \quad (i = 1, 2 \ldots q, v = 1, 2 \ldots n)$$

Null sind. Die neuen kn + (n-1)q Relationen sind auch Integrale, enthalten aber statt Constanten kn - q willkürliche Functionen von q Variabeln.

Je grösser q ist, um so weniger willkürliche Functionen giebt es, aber desto mehr Integrale. Blos im Falle einer Gleichung A) mit 2k Variabeln bleibt die Anzahl der Integrale constant 2k.

Die Ausdrücke $\Sigma U_{\varrho}^{(r)} \delta u_{\varrho}$ können endlich dadurch zum Verschwinden gebracht werden, dass alle $U_{\varrho}^{(r)}$ Null sind, und dieses System von Integralen ohne willkürliche Constante und Functionen heisse das singuläre.

Wenn wir in den Gleichungssystemen A) und B) k=1 setzen, so gelangen wir einerseits zu dem System totaler Differentialgleichungen

$$\sum_{\mu=1}^{n+1} X_{\mu}(x) dx_{\mu} = 0,$$

andererseits zu dem System

$$\sum_{\mu=1}^{k+1+x} X_{\mu}(x) dx_{\mu} = 0.$$

Das erste System schreibt man nach Berechnung der n Verhältnisse

$$\frac{dx_{\mu}}{dx_{1}} = \frac{Y_{\mu}}{Y_{1}} \quad (\mu = 2, 3 \dots n+1)$$

in der Form

$$dx_1: dx_2: \ldots: dx_{n+1} = Y_1: Y_2: \ldots: Y_{n+1}.$$

Dieses System ist integrirt, wenn man n von einander unabhängige Integrale $u_1 = c_1$, $u_2 = c_2$, ..., $u_n = c_n$ der linearen partiellen Differentialgleichung

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} Y_1 + \frac{\partial u}{\partial x_2} Y_2 + \ldots + \frac{\partial u}{\partial x_{n+1}} Y_{n+1} = 0$$

kennt. Dasselbe ist aber auch integrirt, wenn man n aus den angenommenen Gleichungen

$$\frac{\partial u_{\nu}}{\partial x_1} Y_1 + \frac{\partial u_{\nu}}{\partial x_2} Y_2 + \ldots + \frac{\partial u_{\nu}}{\partial x_{n+1}} Y_{n+1} = 0 \quad (\nu = 1, 2 \ldots n)$$

ableitbare identische Beziehungen

$$Y_1 \delta x_{\mu} - Y_{\mu} \delta x_1 = A_1^{(\mu)} \delta u_1 + A_2^{(\mu)} \delta u_2 + \ldots + A_n^{(\mu)} \delta u_n$$

 $(\mu = 2, 3 \ldots n + 1)$

aufstellen kann, in denen $A_1^{(\mu)}$, $A_2^{(\mu)}$... $A_n^{(\mu)}$ Functionen der x sind. Nach Multiplication der letzten n Identitäten mit geeigneten Factoren und Addition derselben ergiebt sich ein System der Gestalt I).

Das zweite der obigen Systeme besitzt k willkürliche Integrale und ist auf das System totaler Differentialgleichungen zurückführbar.

Setzen wir in den Gleichungen A) und B) n = 1, so kommen wir auf die beiden Pfaff'schen Gleichungen. Die Uebertragung der bekannten

Methode der Lösung der Gleichung
$$\sum_{\mu}^{2k} X_{\mu} dx_{\mu} = 0$$
 auf das System
$$\sum_{\mu}^{(n+1)k} X_{\mu}^{(\nu)} dx_{\mu} = 0 \quad (\nu = 1, 2 \dots n)$$

würde verlangen, dass wir die n Gleichungen in n andere mit k(n+1)-1 neuen Variabeln $x^{(1)}$ transformiren, welche Functionen der k(n+1) Variabeln x sind. Gelingt das, so kann man n derselben Constanten gleich setzen und die entstehenden Gleichungen mit (k-1)(n+1) Variabeln wieder auf ein System von n Gleichungen mit (k-1)(n+1)-1 neuen Variabeln $x^{(2)}$ zu transformiren suchen und wieder n Functionen Constanten gleich setzen, da ja n willkürliche Integrale existiren werden. Fährt man in gleicher Weise fort, so erhält man schliesslich n Gleichungen mit n+1 Variabeln, welche n Integrale besitzen. Im Ganzen hat man k n Functionen der Variabeln x Constanten gleich gesetzt und diese sind Integrale des Systems.

Man überzeugt sich jedoch leicht, dass eine Transformation der verlangten Art ohne Bedingungsgleichungen für die Functionen $X_{\mu}^{(r)}$ nur dann möglich ist, wenn die Anzahl der Gleichungen Eins ist. Auch wenn wir das gegebene System in ein anderes mit gleichviel Variabeln überführen, ist im Allgemeinen nicht zu erreichen, dass das neue System die verlangte Transformation zulässt.

Wenn darnach die Integrationsmethode von Pfaff nicht verwendet werden kann und offenbar auch die Verallgemeinerung der Methode von

Clebsch nicht möglich ist, beschränken wir uns darauf, aus den n Gleichungen

 $\sum_{\mu=1}^{k(n+1)} X_{\mu}^{(\nu)} dx_{\mu} = \sum_{\varrho=1}^{kn} U_{\varrho}^{(\nu)} du_{\varrho}$

Differentialgleichungen für die Functionen $U_{\varrho}^{(\nu)}$ und u_{ϱ} abzuleiten, welche das "erste Pfaff'sche System" als specielles System enthalten.

Mit Hilfe der nk(n+1) Grössen $X_{\mu}^{(\nu)}$ können wir $(nk(n+1))^2$ Grössen

$$\frac{\partial X_{\lambda}^{(\nu)}}{\partial x_{\mu}} - \frac{\partial X_{\mu}^{(\nu')}}{\partial x_{1}} = a_{\lambda\mu}^{(\nu\nu')}$$

definiren und darnach lassen sich durch die nk(n+1) linearen Gleichungen

6)
$$X_{\mu^{(\nu)}} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{\alpha = 1}^{k(n+1)} a_{\lambda \mu}^{(\nu \nu)} \varepsilon_{(\nu'-1) k(n+1) + \lambda}$$

ebensoviele Grössen z bestimmen. Die Determinante dieses Gleichungssystems:

$$D = \Sigma + a_{11}^{(11)} a_{22}^{(11)} \dots a_{k(n+1), k(n+1)}^{(11)}, \ a_{11}^{(22)} \dots a_{k(n+1), k(n+1)}^{(n,n)},$$

ist eine schiefe und symmetrische, da

$$a_{\lambda\mu}^{(\mathbf{v}\,\mathbf{v})} = 0\,,\quad a_{\lambda\mu}^{(\mathbf{v}\,\mathbf{v}')} = -\,a_{\mu\,\lambda}^{(\mathbf{v}'\mathbf{v})}$$

ist, und ohne eine Bedingungsgleichung in den $X_{\mu}^{(r)}$ verschwindet sie auch nicht, da ihre Ordnungszahl nk(n+1) jedenfalls gerade ist.

Beachtet man die nk(n+1) Gleichungen:

$$X_{\mu}^{(\mathbf{v})} = U_1^{(\mathbf{v})} \frac{\partial u_1}{\partial x_{\mu}} + U_2^{(\mathbf{v})} \frac{\partial u_2}{\partial x_{\mu}} + \ldots + U_{kn}^{(\mathbf{v})} \frac{\partial u_{kn}}{\partial x_{\mu}}$$

und die Darstellungen:

$$\begin{split} a_{\pmb{\lambda}\,\pmb{\mu}}^{(\pmb{\nu}\,\pmb{\nu}')} = & \left(\frac{\partial U_1^{(\pmb{\nu})}}{\partial x_u} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial x_{\pmb{\lambda}}} + \frac{\partial U_2^{(\pmb{\nu})}}{\partial x_{\pmb{\mu}}} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial x_{\pmb{\lambda}}} + \ldots + \frac{\partial U_{kn}^{(\pmb{\nu})}}{\partial x_{\pmb{\mu}}} \cdot \frac{\partial u_{kn}}{\partial x_{\pmb{\lambda}}}\right) \\ & - \left(\frac{\partial U_1^{(\pmb{\nu}')}}{\partial x_{\pmb{\lambda}}} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial x_{\pmb{\mu}}} + \frac{\partial U_2^{(\pmb{\nu}')}}{\partial x} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial x_{\pmb{\mu}}} + \ldots + \frac{\partial U_{kn}^{(\pmb{\nu}')}}{\partial x_{\pmb{\lambda}}} \cdot \frac{\partial u_{kn}}{\partial x_{\pmb{\lambda}}}\right) \\ & + (U_1^{(\pmb{\nu})} - U_1^{(\pmb{\nu}')}) \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_{\pmb{\mu}} \partial x_{\pmb{\lambda}}} + (U_2^{(\pmb{\nu})} - U_2^{(\pmb{\nu}')}) \frac{\partial^2 u_2}{\partial x_{\pmb{\mu}} \partial x_{\pmb{\lambda}}} + \ldots \\ & + (U_{kn}^{(\pmb{\nu})} - U_{kn}^{(\pmb{\nu}')}) \cdot \frac{\partial^2 u_{kn}}{\partial x_{\pmb{\mu}} \partial x_{\pmb{\lambda}}}, \end{split}$$

so lassen sich die Gleichungen 6) auf die Form bringen:

$$\sum_{\boldsymbol{v}=1}^{k} U_{\boldsymbol{\varrho}}(\boldsymbol{v}) \frac{\partial u_{\boldsymbol{\varrho}}}{\partial x_{\mu}}$$

$$= \sum_{\boldsymbol{v}=1}^{n} \sum_{\boldsymbol{\ell}=1}^{k(n+1)} \sum_{\boldsymbol{\varrho}=1}^{kn} \left(\frac{\partial U_{\boldsymbol{\varrho}}(\boldsymbol{v})}{\partial x_{\mu}} \frac{\partial u_{\boldsymbol{\varrho}}}{\partial x_{\lambda}} - \frac{\partial U_{\boldsymbol{\varrho}}(\boldsymbol{v}')}{\partial x_{\lambda}} \frac{\partial u_{\boldsymbol{\varrho}}}{\partial x_{\mu}} + (U_{\boldsymbol{\varrho}}(\boldsymbol{v}') - U_{\boldsymbol{\varrho}}(\boldsymbol{v}')) \frac{\partial^{2} u_{\boldsymbol{\varrho}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{\lambda}} \right)$$

$$\times \mathcal{E}_{(\boldsymbol{v}'-1)} k(n+1) + 1,$$

oder bei anderer Anordnung der Summanden auf die Form:

$$\sum_{\mathbf{q}} \frac{\partial U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y})}}{\partial x_{\mu}} \left[\frac{\partial u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{1}} z_{1} + \frac{\partial u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{2}} z_{2} + \dots + \frac{\partial u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{k(n+1)}} z_{k(n+1)} + \dots + \frac{\partial u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{k(n+1)}} z_{nk(n+1)} \right] \\ - \sum_{\mathbf{q}} \frac{\partial u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu}} \left[\frac{\partial U_{\mathbf{q}}^{(1)}}{\partial x_{1}} z_{1} + \frac{\partial U_{\mathbf{q}}^{(1)}}{\partial x_{2}} z_{2} + \dots + \frac{\partial U_{\mathbf{q}}^{(1)}}{\partial x_{k(n+1)}} z_{k(n+1)} + \dots + \frac{\partial U_{\mathbf{q}}^{(n)}}{\partial x_{k(n+1)}} z_{nk(n+1)} + U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y})} \right] \\ = \sum_{\mathbf{q}=1}^{kn} \sum_{\mathbf{y}=1}^{n} \left(U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y}')} - U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y})} \right) \left[\frac{\partial^{2} u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{1}} z_{(\mathbf{y}'-1)} z_{k(n+1)+1} + \dots + \frac{\partial^{2} u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{k(n+1)}} z_{nk(n+1)} \right] \\ = \sum_{\mathbf{q}=1}^{kn} \sum_{\mathbf{y}=1}^{n} \left(U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y}')} - U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y})} \right) \left[\frac{\partial^{2} u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{1}} z_{(\mathbf{y}'-1)} z_{k(n+1)+1} + \dots + \frac{\partial^{2} u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{k(n+1)}} z_{nk(n+1)} \right] \\ = \sum_{\mathbf{q}=1}^{kn} \sum_{\mathbf{y}=1}^{n} \left(U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y}')} - U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y})} \right) \left[\frac{\partial^{2} u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{1}} z_{(\mathbf{y}'-1)} z_{nk(n+1)+1} + \dots + \frac{\partial^{2} u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{k(n+1)}} z_{nk(n+1)} \right] \\ = \sum_{\mathbf{q}=1}^{kn} \sum_{\mathbf{y}=1}^{n} \left(U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y}')} - U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y})} \right) \left[\frac{\partial^{2} u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{1}} z_{(\mathbf{y}'-1)} z_{nk(n+1)+1} + \dots + \frac{\partial^{2} u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{k(n+1)}} z_{nk(n+1)} \right] \\ = \sum_{\mathbf{q}=1}^{kn} \sum_{\mathbf{y}=1}^{n} \left(U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y}')} - U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y})} \right) \left[\frac{\partial^{2} u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{1}} z_{(\mathbf{y}'-1)} z_{nk(n+1)+1} + \dots + \frac{\partial^{2} u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{k(n+1)}} z_{nk(n+1)} \right] \\ = \sum_{\mathbf{q}=1}^{n} \sum_{\mathbf{y}=1}^{n} \left(U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y}')} - U_{\mathbf{q}}^{(\mathbf{y})} \right) \left[\frac{\partial^{2} u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{1}} z_{nk(n+1)} + \dots + \frac{\partial^{2} u_{\mathbf{q}}}{\partial x_{\mu} \partial x_{k(n+1)}} z_{nk(n+1)} \right]$$

Diese Gleichungen fassen wir als linear in den nk Grössen

$$Y_{\varrho} = \sum_{k=1}^{k(n+1)} \frac{\partial u_{\varrho}}{\partial x_{k}} \left(s_{k} + s_{k(n+1)+k} + \dots + s_{(n-1)k(n+1)+k} \right)$$

und den nºk Grössen

$$Z_{\boldsymbol{\varrho}^{(r)}} = \frac{\partial U_{\boldsymbol{\varrho}^{(1)}}}{\partial x_1} \boldsymbol{\varepsilon}_1 + \frac{\partial U_{\boldsymbol{\varrho}^{(1)}}}{\partial x_2} \boldsymbol{\varepsilon}_2 + \ldots + \frac{\partial U_{\boldsymbol{\varrho}^{(n)}}}{\partial x_{k(n+1)}} \boldsymbol{\varepsilon}_{n \, k(n+1)} + U_{\boldsymbol{\varrho}^{(r)}}$$

auf und lösen sie nach diesen Unbekannten.

Die Determinante des Systems 7) lautet nach Einführung der Zeichen

$$\frac{\partial U_{\boldsymbol{\varrho}^{(\boldsymbol{v})}}}{\partial x_{\mu}} = P_{\boldsymbol{\varrho},\mu}^{(\boldsymbol{v})}, \quad \frac{\partial u_{\boldsymbol{\varrho}}}{\partial x_{\mu}} = Q_{\boldsymbol{\varrho},\mu}:$$

(wo den Nullen Indices beigesetzt sind, dass man deren Anzahl ersehe), and wird im Allgemeinen nicht verschwinden. Sie ist in eine Summe von Producten von je n Determinanten der Ordnung k(n+1) zerlegbar, und zwar sind diese Producte so gebildet, dass eine erste Determinante lautet:

$$\begin{vmatrix} P_{\lambda_{1},1}^{(\tau_{1})} & \dots & P_{\lambda_{k},1}^{(\tau_{l})}, & Q_{11} & \dots & Q_{kn,1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ P_{\lambda_{1},k(n+1)}^{(\tau_{1})} & \dots & P_{\lambda_{k},k(n+1)}^{(\tau_{l})}, & Q_{1,k(n+1)} & \dots & Q_{kn,k(n+1)} \end{vmatrix},$$

wo $\lambda_1, \lambda_2 \ldots \lambda_k$ irgend k Zahlen der Reihe, $1, 2 \ldots kn$ und ν_1 eine der Zahlen $1, 2 \ldots n$ bedeutet. Die weiteren n-1 Determinanten sind ebenso gebildet, nur bedeuten $\lambda_1 \ldots \lambda_k$ dort andere und andere der Zahlen $1, 2 \ldots kn$ und auch ν' hat in jeder Det

Beseichnet man mit

tionen β^{ter} Classe mit

a Borratez, so giel

$$C_{n\,k}^{(k)} \cdot C_{n\,k-k}^{(k)} \dots C_{n\,k-(n-1)\,k}^{(k)} = \frac{(n\,k)!}{(k!)^n}$$

Producte besagter Art. Die Summe dieser Glieder - jedes mit dem gehörigen Zeichen versehen — ist gleich A, wie man bei Beachtung des Satzes: "Wenn ein System von nº Elementen in m Zeilen mehr als n-m Colonnen Nullen hat, so ist seine Determinante Null" leicht ersieht.

Bei Berechnung des Zählers von $(-1)^{n^2k} Y_{\varrho}$ hat man in den eben beschriebenen $\frac{(nk)!}{(k!)^n}$ Producten die Colonnen $P_{\varrho,1}^{(r)}$... $P_{\varrho,k(n+1)}^{(r)}$ (v=1, 2 ... n)

durch

$$P_{\ell}^{(r)} \dots P_{\ell, k(n+1)}^{(r)} \quad (r = 1, 2 \dots n)$$

$$A_{\ell}^{(r)} \dots A_{\ell, n+1}^{(r)}$$

zu ersetzen, wo unter $A_{\mu}^{(v)}$ die Doppelsumme auf der rechten Seite der Gleichung 7) zu verstehen ist.

In dem Zähler von $(-1)^{n^2k-1}Z_{\varrho}^{(r)}$ kommen vor Allem $\frac{(nk)!}{(k!)^n}$ Glieder vor, die aus der früher zerlegten Determinante d dadurch hervorgehen, dass man in denjenigen Determinanten der n-gliedrigen Producte, welche Elemente $P^{(v)}$ enthalten, die Verticalreihen

 $Q_{01}, Q_{02} \dots Q_{0k(n+1)}$

durch

$$A_1^{(r)}, A_2^{(r)} \dots A_{k(n+1)}^{(r)}$$

ersetzt. — Daneben giebt es andere n-gliedrige Producte von Determinanten $k(n+1)^{\text{ter}}$ Ordnung, die folgendermassen gebildet sind. Eine erste Determinante lautet:

wo $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{k+1}$ irgend k+1 Zahlen der Reihe 1, 2 ... kn bezeichnen. Die zweite, dritte ... $(n-2)^{to}$ Determinante des Productes hat die Form:

$$\begin{vmatrix} P_{k_1,1}^{(r')} & \dots & P_{k_h,1}^{(r)}, & Q_{11} & \dots & Q_{kn,1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ P_{k_1,k(n+1)}^{(r')} & \dots & P_{k_h,k(n+1)}^{(r')}, & Q_{1,k(n+1)} & \dots & Q_{kn,k(n+1)} \end{vmatrix}$$

und darin bedeuten $\lambda'_1 \dots \lambda'_k$ immer andere und andere Zahlen der Reihe 1, 2... kn und ν' nimmt der Reihe nach n-2 von ν verschiedene Werthe aus der Reihe 1, 2 ... n an. Bleiben dann unter den Zahlen 1, 2 ... kn resp. 1, 2... n noch die folgenden übrig: $\lambda''_1 \ldots \lambda''_{k-1}$ resp. ν'' , so hat die letzte Determinante des Productes die Form:

$$P_{k''_{k-1},1}^{(g'')} \dots P_{k''_{k-1},1}^{(g'')}, \qquad A_{1}^{(g'')}, \qquad Q_{11} \dots Q_{kn,1}$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$P_{k''_{1},k(n+1)}^{(g'')} \dots P_{k''_{k-1},k(n+1)}^{(g'')}, \qquad A_{k(n+1)}^{(g'')}, \qquad Q_{1,k(n+1)} \dots Q_{kn,k(n+1)}$$

Solcher Producte lassen sich

$$(n-1)! C_{kn}^{(k+1)} \cdot C_{kn-k-1}^{(k)} \dots C_{kn-(n-2)k-1}^{(k)} \cdot C_{kn(n-1)k-1}^{(k-1)}$$

$$= (n-1)! \frac{(kn)!}{(k+1) \cdot (k-1) \cdot (k!)^{n-1}}$$

bilden, darum giebt es im Zähler von $(-1)^{n^2k-1}Z_0^{(y)}$ im Ganzen

$$\frac{(nk)!}{(k+1)(k!)^n(k-1)!}[(k+1).(k-1)!+(n-1)!k!]$$

n-gliedrige Producte von Determinanten der Ordnung k(n+1) und weitere Glieder der Ordnung kommen nicht vor.

Aus dieser Beschreibung des Baues der Werthe für die nk(n+1) Unbekannten Y_{ℓ} und $Z_{\ell}^{(v)}$ ersieht man, dass diese Werthe im Allgemeinen verschieden ausfallen, ausser in dem Falle n=1, wo alle Grössen $A_{\mu}^{(v)}$ verschwinden. Die Lösungen des Systems 7) sind dann:

$$\frac{\partial u_{\varrho}}{\partial x_1} z_1 + \frac{\partial u_{\varrho}}{\partial x_2} z_2 + \ldots + \frac{\partial u_{\varrho}}{\partial x_{2k}} z_{2k} = 0,$$

$$\frac{\partial U_{\varrho}}{\partial x_1} z_1 + \frac{\partial U_{\varrho}}{\partial x_2} z_2 + \ldots + \frac{\partial U_{\varrho}}{\partial x_{2k}} z_{2k} + U_{\varrho} = 0,$$

weil die Determinante

.

$$\Delta = (-1)^k \Sigma \pm \frac{\partial U_1}{\partial x_1} \frac{\partial U_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial U_k}{\partial x_n} \frac{\partial u_1}{\partial x_{k+1}} \frac{\partial u_2}{\partial x_{k+2}} \cdots \frac{\partial u_k}{\partial x_{2k}}$$

im Allgemeinen nicht verschwindet. (Hier ist U_{ϱ} für $U_{\varrho}^{(1)}$ geschrieben.) Die k Gleichungen β) ziehen die folgenden k-1 nach sich:

$$\begin{aligned} \mathbf{s}_{1} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{1}} \left(\frac{U_{\mathbf{Q}}}{U_{k}} \right) + \mathbf{s}_{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{2}} \left(\frac{U_{\mathbf{Q}}}{U_{k}} \right) + \ldots + \mathbf{s}_{2 k} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{2 k}} \left(\frac{U_{\mathbf{Q}}}{U_{k}} \right) = 0 \\ (\mathbf{Q} = 1, 2 \ldots k - 1), \end{aligned}$$

and darum gentigen die 2k-1 Functionen $u_1, u_2 \ldots u_k, \frac{U_1}{U_k}, \frac{U_2}{U_k} \cdots \frac{U_{k-|l|}}{U_k}$ alle derselben linearen partiellen Differentialgleichung:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_1} z_1 + \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} z_2 + \ldots + \frac{\partial \varphi}{\partial x_{2k}} z_{2k} = 0,$$

deren allgemeine Lösung φ eine willkürliche Function der letztgenannten Functionen ist. Diese ist aber auch eine Lösung des ersten Pfaff'schen Problems und $\varphi = c$ ist ein erstes Integral der Pfaff'schen Gleichung

$$\sum_{n=1}^{1} X_n dx_n = 0.$$
 Wie man mit dessen Hilfe die Bestimw

tegrale einzuleiten und durchzuführen hat, (Borehardt's Journal Bd. LX).

Hier ist klar geworden, warum man bei dem Pfaff'schen Problem einen successiven Fortgang von einem Integral $\varphi=c$ zu einem zweiten, von dem zweiten zu einem dritten u. s. w. nehmen muss. Wegen des Zusammenfallens der Werthe für Y_{Q} und Z_{Q} oder wegen der Uebereinstimmung der Differentialgleichungen für die Functionen u_{Q} und $\frac{U_{Q}}{U_{k}}$ kann man nämlich ein System zusammengehöriger Functionen u_{Q} und $\frac{U_{Q}}{U_{k}}$, welche das Problem lösen, nicht finden.

Der Umstand, dass man in dem allgemeinen Falle von n Gleichungen A) mit k(n+1) Variabeln nk(n+1) Differentialgleichungen, die man in den nk(n+1) Lösungen des Systems 7) findet, gleichzeitig betrachten und diesen ein System zusammengehöriger Functionen u_{ℓ} und $U_{\ell}^{(n)}$ entnehmen muss, welche das Problem lösen, erschwert natürlich gerade die fernere Untersuchung, und die Complication der Differentialgleichungen, welche in Bezug auf die Functionen u_{ℓ} von der zweiten, in Bezug auf die Functionen $U_{\ell}^{(n)}$ von der ersten Ordnung sind, lässt selbst bei niedrigen Werthen für n und k nicht leicht eine Discussion zu. Hier kam es darauf an, das Verhältniss des Pfaff'schen Problems zu dem allgemeinen zu charakterisiren.

Prag, den 18. December 1884.

Kleinere Mittheilungen.

XI. Der Doppelpunkt symmetrischer räumlicher Systeme.

Die Thatsache, dass der Schnittpunkt der normalhalbirenden Ebenen der Strecken, welche entsprechende Ecken zweier in verschiedenen Ebenen liegenden congruenten Dreiecke verbinden, mit diesen Dreiecken zwei Tetraeder bestimmt, die im Allgemeinen symmetrisch, nicht congruent sind, ist zwar schon längst bekannt (vergl. u. A. Magnus, Aufg. aus der analyt. Geometrie des Raumes, sowie Baltzer, Die Gleichheit und Achnlichkeit der Figuren und die Achnlichkeit derselben, Dresden 1852); wegen der Einfachheit des Gedankenganges erschien trotzdem die folgende Derstellung der Mittheilung werth.

l. Zu zwei gleichen Strecken AB und A'B', die auf derselben Ebene & enthalten sind und nicht zusammenfallen, giebt es immer auf & einen eindeutig bestimmten Punkt S, welcher mit AB und A'B' gleichsinnig congruente Eiguren bildet.

Ist S der Schnittpunkt der Normalhalbirenden von AA' und BB', so ist SA = SA', SB = SB'; hieraus und aus AB = A'B' folgt $SAB \cong SA'B'$.

Angenommen, die beiden Dreiecke SAB und SA'B' wären ungleichsinig congruent, so wäre, unter Berücksichtigung des Sinnes,

Wird eine durch S gehende Gerade MN durch die Gleichung bestimmt

so folgt aus 1) und 2)

LASM = MSA'.

Hieraus und aus der gleichen Länge der Strecken SA = SA', SB = SB' folgt, dass A und A', sowie B und B' symmetrisch gegen SM liegen; daher ist MN die gemeinsame Normalhalbirende von AA' und BB', und fir jeden Punkt P derselben ist PA = PA', PB = PB', PAB ungleichsing congruent PA'B'. Der Schnittpunkt S_0 von AB und A'B' liegt auf MN; die verschwindenden Dreicke S_0AB und $S_0A'B'$ können als gleichting congruent angesehen werden. —

Wenn di "B' gleichsinnig parallel sind, so ist
Punkt S liegt unendlich fern in der

2. Zwei auf derselben Ebene E liegende gleichsing. 2. und 2' haben nuch 1. einen eindeutig bestimmt. Inch fernen selbstentsprechenden Punkt S und köndenselben zur Deckung gebracht werden.

Zwei auf & symmetrisch liegende Systeme Σ entaprechande Gerade, die Symmetrieaxe; jeder punkt. Wenn zwei auf & liegende Syste sinnig congruent sind und nicht symnes keinen Punkt, der von den Ecken e den Dreiscks ABC in Σ ebenso weit den entsprechenden Punkten A'', B' Systeme 2 und Σ' symmetrisch und habse ist durch PA = PA' und PB = PB' de Σ' und Σ' bestimmt; für denselben ist P' so wäre PC' = PC' und daher P auf dann würde P auch auf AB liegen, im 'nicht symmetrisch liegen.

3. In ewei congruenten Preiecker. Thenen to und to hegen und von et to aus geschen ungleichsinnig er mit ihnen symmetrische Tetra-

Ist A S C die Normalproje and A S C glerchsinnig co-

Ween CSC mit ABC blome 3, welche die Schieht 6 men sche Teinweier.

We will S. C. and A. A. come so home square branches Paris, & No. 3. Normal project.

West A. S. and A.B. C.

e. east it] '/ Alama '/ Alama

in the State of

her mi

in English in English in Falle die syn en Basen ABC un

risch liegen und EE
Lalhalbirenden Ebener
r Systeme Eund E' ein
te EE trifft; jeder Punk
Preiecken von E und E
rankt von s und EE' kan
tiender symmetrischer Te

R. HEGER.

ME ME BETWEEN

mente d'une en entre d'essemblure umité mente d'une en entre d'essemblure umité mente de la desente des des des entre de mente de la desente de la contraction de mente de la desente de la contraction de mente de la desente de la contraction de mente de la contraction de la contraction de la contraction de mente de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de mente de la contraction de la contraction de la contraction de mente de la contraction de la cont

🚅 🧩 🗫 😘 marat edener veränderlich

suf $\mathfrak E$ and $\mathfrak E'$ würden entsprechende Punkte der congruenten Systeme $\mathcal E$ und $\mathcal E'$ sein, die Normalprojection T desselben auf die Ebene $\mathfrak E$ würde daher so gelegen sein, dass TA = TA'', TB = TB'', TC = TC''; ein solcher Punkt ist nach Nr. 2 nicht vorhanden.

Hieraus folgt, dass die drei normalhalbirenden Ebenen der Strecken AA, BB, CC einen endlichen Punkt nicht gemeinsam haben.

Aus 3) und 4) ergiebt sich der Satz: Wenn die congruenten Systeme Σ und Σ' auf parallelen Ebenen so liegen, dass die Normalprojection Σ'' von Σ' auf Σ mit Σ ungleichsinnig congruent ist, so haben die Ebenen, welche die Strecken entsprechender Punkte normal halbiren, entweder eine gemeinsame Gerade oder nur einen gemeinsamen unendlich fernen Punkt, je nachdem Σ'' und Σ symmetrisch liegen oder nicht.

6. Wenn die congruenten Dreiecke ABC und A'B'C' auf Ebenen $\mathfrak E$ und $\mathfrak E'$ liegen, die einander schneiden, so giebt es unter den zwei Paar Scheitellichenwinkeln, welche $\mathfrak E$ und $\mathfrak E'$ bestimmen, ein Paar α und α_1 , von dessen Innern aus ABC und A'B'C' ungleichsinnig congruent erscheinen; von den Punkten im Innern des andern Paares β und β_1 aus erscheinen sie gleichsinnig.

Der Schnittpunkt der normalhalbirenden Ebenen der Strecken AA', BB', CC' sei S. Da S gleiche Abstände von $\mathfrak E$ und $\mathfrak E'$ hat, so ist S auf einer der beiden Ebenen $\mathfrak H$ und $\mathfrak H'$ enthalten, welche die Winkel α und β halbiren. Sind T und T' die Normalprojectionen von S auf $\mathfrak E$ und $\mathfrak E'$, so kommen diese Punkte zur Deckung, wenn man $\mathfrak E'$ durch Drehung um die Gerade $\mathfrak E$ mit $\mathfrak E$ vereint, und zwar indem die Winkel α , α_1 oder die Winkel β , β , beschrieben werden, je nachdem S auf $\mathfrak H$ oder $\mathfrak H'$ enthalten ist.

Nach der Drehung deckt sich Σ' im ersten Falle mit einem System Σ'' , das mit Σ gleichsinnig ist, im andern mit einem System Σ''' , das mit Σ ungleichsinnig ist.

Wenn Σ'' und Σ identisch sind, so sind Σ''' und Σ symmetrisch und haben die Gerade $\mathfrak{C}\mathfrak{C}'$ zur Symmetrieaxe; jeder Punkt von \mathfrak{H} giebt mit ABC und A'B'C' symmetrische, jeder Punkt der Kante $\mathfrak{C}\mathfrak{C}'$ verschwindende congruente Tetraeder.

Wenn Σ'' und Σ nicht identisch sind, so haben sie nur einen selbstentsprechenden Punkt T; der Punkt S von S, welcher T zur Normalprojection auf E hat, ist der einzige Punkt S, der mit ABC und A'B'C' symmetrische Tetraeder bestimmt. S kann auch unendlich fern sein; die Richtung, in der er liegt, bestimmt die Längskanten zweier symmetrischer dreiseitiger Prismen, welche ABC und A'B'C' zu Basen haben.

Wenn die ungleichsinnig congruenten Dreiecke A'''B'''C''' und ABC nicht symmetrisch liegen, so haben sie keinen Punkt, der von den Ecken des einen dieselben Entfernungen hätte, wie von den entsprechenden des andem; aledann giebt es auf \mathfrak{H}' keinen Punkt, für welchen SA = SA', SB

=SB', SC=SC' ware, also giebt es dann keinen Punkt, welcher mit ABC und A'B'C' congruente Tetraeder bestimmt.

Wenn daher die Systeme Σ und Σ''' nicht symmetrisch liegen, so haben die normalhalbirenden Ebenen der Strecken entsprechender Punkte der Systeme Σ und Σ' einen Punkt gemein, der auf \mathfrak{H} in endlicher oder unendlicher Entfernung liegt und nicht in die Schnittlinie \mathfrak{GG}' fällt.

Wenn die Systeme Σ und Σ'' nicht zusammenfallen und Σ und Σ''' gegen eine Gerade t symmetrisch liegen, so bestimme man die Gerade s auf Σ' , deren Normalprojection auf $\mathfrak E$ mit t zusammenfallt. Jeder Punkt von t giebt alsdann mit ABC und A'B'C' congruente Tetraeder und Σ und Σ' kommen durch Drehung um s zur Deckung. Der Schnittpunkt der Geraden $\mathfrak E\mathfrak E'$ mit t ist in diesem Falle der selbstentsprechende Punkt von Σ und Σ'' , da Σ und Σ''' symmetrisch gegen t und Σ''' und t symmetrisch gegen t und t und t symmetrischen Tetraeder mit gemeinsamer Spitze und den Basen t und t und

Wenn die Systeme Σ und Σ''' symmetrisch liegen und $\Sigma\Sigma''$ nicht zusammenfallen, so haben die normalhalbirenden Ebenen der Strecken entsprechender Punkte der Systeme Σ und Σ' eine gemeinsame Gerade s, welche die Kante $\mathfrak{C}\mathfrak{C}'$ trifft; jeder Punkt von s bestimmt mit entsprechenden Dreiecken von Σ und Σ' congruente Tetraeder; der Schnittpunkt von s und $\mathfrak{C}\mathfrak{C}'$ kann als gemeinsame Spitze verschwindender symmetrischer Tetraeder betrachtet werden.

Dresden.

R. HEGER.

XII. Ueber einen Satz von Burmester.

Herr Burmester hat folgenden, die Bewegung ebener veränderlicher Systeme betreffenden Satz ausgesprochen:*

"Die Curve, welche von den Bahnen der Punkte einer Systemcurve umhüllt wird, ist zugleich die Enveloppe verschiedener Phasen derselben Systemcurve."

Dieser Satz, welcher ursprünglich nur auf collinear-veränderliche ebene Systeme bezogen wurde, kann nicht nur auf jedes continuirlich-veränderliche ebene System übertragen werden, wie es Herr Geisenheimer bemerkt hat,** sondern auch auf ein räumliches, continuirlich-veränderliches System bezogen werden.

Die Richtigkeit dieses Satzes ist auf geometrischem Wege nicht schwer einzusehen; ich erlaube mir aber, grösserer Genauigkeit wegen, einen analytischen Beweis desselben anzuführen.

^{*} Diese Zeitschrift Bd. XIX und XX.

^{**} Diese Zeitschrift Bd. XXIV.

Es seien a, b, c die Anfangscoordinaten eines Systempunktes, x, y, zdessen Coordinaten zur Zeit t und

 $x = f_1(a, b, c, t), y = f_2(a, b, c, t), z = f_3(a, b, c, t)$ 1) die Bewegungsgleichungen. Es sei weiter eine Systemfläche

2)
$$F(a, b, c) = 0$$

gegeben. Es möge die Lage dieser Fläche zur Zeit t durch die Gleichung $\Phi(x, y, z, t) = 0$

bestimmt werden; wir erhalten bekanntlich diese Gleichung, wenn wir a, b, c aus den Gleichungen 1) und 2) eliminiren. Die Enveloppe, welche von den Bahnen verschiedener Punkte der Fläche 2) gebildet wird, wollen wir im folgenden Sinne verstehen. Es seien M(a, b, c) und M'(a + da, b + db,c+dc) zwei Punkte der gegebenen Fläche, o und o die Bahnen derselben. Diese Bahnen schneiden sich im Allgemeinen nicht; wir können jedoch die Differentiale da, db, dc so wählen, dass der Durchschnitt derselben stattfindet. Da der gesuchte Durchschnittspunkt Q zugleich den beiden Curven o und o' angehört, so müssen wir die genannten Differentiale so nehmen, dass die Coordinaten des Punktes M auf der Curve o zur Zeit t den Coordinaten des Punktes M' auf der Curve σ' zur Zeit t+dt gleich seien. Es ist also

$$f_1(a+da, b+db, c+dc, t+dt) = f_1(a, b, c, t),$$

 $f_2(a+da, b+db, c+dc, t+dt) = f_2(a, b, c, t),$
 $f_3(a+da, b+db, c+dc, t+dt) = f_3(a, b, c, t)$

und folglich

4)
$$\begin{cases} \frac{\partial f_1}{\partial a} da + \frac{\partial f_1}{\partial b} db + \frac{\partial f_1}{\partial c} dc + \frac{\partial f_1}{\partial t} dt = 0, \\ \frac{\partial f_2}{\partial a} da + \frac{\partial f_2}{\partial b} db + \frac{\partial f_2}{\partial c} dc + \frac{\partial f_2}{\partial t} dt = 0, \\ \frac{\partial f_3}{\partial a} da + \frac{\partial f_3}{\partial b} db + \frac{\partial f_3}{\partial c} dc + \frac{\partial f_3}{\partial t} dt = 0. \end{cases}$$

Die Differentiale da, db, dc müssen ausserdem der Bedingung

$$\frac{\partial F}{\partial a}da + \frac{\partial F}{\partial b}db + \frac{\partial F}{\partial c}dc = 0$$

Eliminiren wir aus den Gleichungen 4) und 5) die Differentiale, so erhalten wir die Gleichung

6)
$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial a}, & \frac{\partial f_1}{\partial b}, & \frac{\partial f_1}{\partial c}, & \frac{\partial f_1}{\partial t} \\ \frac{\partial f_2}{\partial a}, & \frac{\partial f_2}{\partial b}, & \frac{\partial f_2}{\partial c}, & \frac{\partial f_2}{\partial t} \\ \frac{\partial f_3}{\partial a}, & \frac{\partial f_3}{\partial b}, & \frac{\partial f_3}{\partial c}, & \frac{\partial f_3}{\partial t} \\ \frac{\partial F}{\partial a}, & \frac{\partial F}{\partial b}, & \frac{\partial F}{\partial c}, & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

welche, mit der Gleichung 2) verbunden, diejenige Curve auf der gegebenen Systemfläche bestimmt, für deren Punkte die Bahncurven mit den Bahncurven unendlich naher Punkte derselben Systemfläche sich zur Zeit t schneiden.

Alle der Zeit t entsprechende Durchschnittspunkte bilden im Raume eine Curve und wir erhalten die Gleichung derselben, wenn wir aus fünf Gleichungen 1), 2) und 6) die drei Coordinaten a, b und c eliminiren. Wenn wir aus den so erhaltenen zwei Gleichungen die Zeit t oder, was dasselbe ist, a, b, c, t aus den fünf Gleichungen 1), 2) und 6) eliminiren so erhalten wir die Gleichung einer Fläche K, welche durch alle solche Curven gebildet wird.

Die Verallgemeinerung des Satzes von Burmester besteht darin, dass diese Fläche mit der Enveloppe verschiedener Phasen der gegebenen Systemfläche zusammenfällt. In der That kann die Gleichung dieser Enveloppe auch folgendermassen abgeleitet werden. Die Verschiebung eines Systempunktes, welcher zur Zeit t sich in der Enveloppe befindet, geschieht in der Tangentialebene zur Fläche 3); sie muss daher der Bedingung

7)
$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t} = 0$$

genügen. Das erste Glied dieser Gleichung wird mit der Determinante 6) identisch, wenn man nur in diese Gleichung anstatt x, y, z die Variablen a, b, c einführt. Wenn man nämlich in die Function $\Phi(x, y, z, t)$ mit Hilfe der Gleichungen 1) wieder a, b, c einsetzt, so verwandelt sich diese Function in F(a, b, c); daher

$$\begin{split} &\frac{\partial \Phi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial a} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial a} + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial a} = \frac{\partial F}{\partial a}, \\ &\frac{\partial \Phi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial b} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial b} + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial b} = \frac{\partial F}{\partial b}, \\ &\frac{\partial \Phi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial c} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial c} + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial c} = \frac{\partial F}{\partial c}. \end{split}$$

Wenn wir hieraus $\frac{\partial \Phi}{\partial x}$, $\frac{\partial \Phi}{\partial y}$, $\frac{\partial \Phi}{\partial z}$ bestimmen und in die Gleichung 7) einsetzen, erhalten wir die Gleichung 6). Es kann also die Gleichung der von der Systemfläche gebildeten Enveloppe durch die Elimination von a, b, c, t aus den Gleichungen 1), 2) und 6) erhalten werden, wodurch die Identität dieser Enveloppe und der Fläche K bewiesen ist.

P. Somoff.

XIII. Ueber einen aus der Potentialtheorie hergeleiteten geometrischen Satz.

Auf einer Geraden XY seien die Punkte A, B, C etc. gegeben und zwar in der Reihenfolge X, A, B, C ... Y. Wir setzen die zwischen je zwei benachbarten Punkten liegenden Entfernungen AB, BC, CD etc. resp. gleich a_1 , a_2 , a_3 etc. Die Gerade XY sei gleichmässig mit Masse belegt und zwar auf jeder Längeneinheit mit der Masseneinheit. Das Potential jeder Strecke a1, a2 ... für einen ausserhalb der Geraden XY liegenden Punkt P lässt sich leicht angeben, wenn man die Strecken PA, PB, PC... besiglich mit r_1, r_2, r_3 etc. bezeichnet. Durch Integration findet man, dass das Potential von a_1 für den Punkt P den Werth $log\left(\frac{r_1+r_2+a_1}{r_1+r_3-a_1}\right)$ besitzt,

und das Potential von a_2 den Werth $log(\frac{r_2+r_3+a_2}{r_3+r_5-a_6})$. Das Potential

der ganzen Strecke $a_1 + a_2$ ist aber $= log \left(\frac{r_1 + r_3 + a_1 + a_2}{r_1 + r_3 - a_1 - a_2} \right)$. Da nun das

Potential der Summe zweier Massen gleich der Summe der Potentiale der beiden Massen ist, so muss die Summe der beiden ersten Logarithmen gleich dem dritten Logarithmus sein. Hieraus folgt die Relation:

1)
$$\frac{r_1+r_2+a_1}{r_1+r_3-a_1}\cdot\frac{r_2+r_3+a_2}{r_2+r_3-a_2}=\frac{r_1+r_3+a_1+a_2}{r_1+r_3-a_1-a_2}$$

Diese Beziehung lässt sich auch direct nachweisen.

Wir wollen Gleichung 1) noch auf andere Form bringen. Das Dreieck **ABP** habe den Umfang S_1 , das Dreieck BCP den Umfang S_2 , das Dreieck $A \subset P$ den Umfang S, so ist

$$\frac{S_1}{S_1 - 2a_1} \cdot \frac{S_2}{S_2 - 2a_2} = \frac{S}{S - 2(a_1 + a_2)}$$

Sei nun d_i der Durchmesser des dem $\triangle ABP$ einbeschriebenen Kreises, so ist $S_1d_1 = 4J = 2a_1h$, wo h den Abstand des Punktes P von der Geraden

X Y bedeutet, also $\frac{2a_1}{S_1} = \frac{d_1}{h}$. Demnach geht 2) über in

3)
$$\frac{1}{1 - \frac{d_1}{h}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{d_2}{h}} = \frac{1}{1 - \frac{d}{h}},$$

▼o d der Durchmesser des dem △ ACP einbeschriebenen Kreises ist.

Die Relation 1) lässt sich sofort verallgemeinern, wenn man statt der wei Potentiale von a_1 und a_2 gleich n Potentiale der Strecken a_1 bis a_n einführt. Man erhält so folgenden Satz:

Wenn in einem Dreiecke n-1 Gerade von der Spitze Cnach der Basis AB gezogen werden, so gilt für die Durchmesser $d_1, d_2 \dots d_n$ der in die n Theildreiecke eingezeichneten Kreise die Gleichung

4)
$$\left(1-\frac{d_1}{h}\right)\left(1-\frac{d_2}{h}\right)\cdots\left(1-\frac{d_n}{h}\right)=1-\frac{d}{h},$$

worin h die Höhe des Dreiecks ABC und d den Durchmesser des ihm einbeschriebenen Kreises bezeichnet.

Von Interesse ist folgende Bemerkung, die aus der Vertauschbarkeit der Factoren in 4) folgt. Zeichnet man im $\triangle ABC$ n-1 andere Gerade von C nach AB und zwar so, dass n-1 in der neuen Figur gezeichnete eingeschriebene Kreise mit n-1 Kreisen aus der alten Figur übereinstimmen, so muss auch der n^{te} Kreis in der neuen Figur gleich den n^{ten} in der alten Figur sein. — Mit Hilfe von 4) lässt sich eine Reihe geometrischer Aufgaben lösen. Wenn verlangt wird, dass im $\triangle ABC$ von C nach AB n-1 Gerade so gezogen werden sollen, dass die in den n entstehenden Dreiecken gezeichneten eingeschriebenen Kreise gleich gross sind, so findet sich der Durchmesser x jedes dieser Kreise aus $\left(1-\frac{x}{h}\right)^n=1-\frac{d}{h}$, also ist die Construction geometrisch nur ausführbar, wenn n eine Potenz von 2 ist. — Vergleicht man die identische Gleichung

$$(1-k)\left(1-\frac{k}{1-k}\right)\left(1-\frac{k}{1-2k}\right)\cdots\left(1-\frac{k}{1-(n-1)k}\right)=1-nk$$

mit 4), so kann man die n Kreise so wählen, dass $\frac{d_1}{h} = k$, $\frac{d_2}{h} = \frac{1}{1-k}$ etc. ist; nur muss dann $nk = \frac{d}{h}$ oder $k = \frac{d}{nh}$ sein.

Zeichnet man für die n Dreiecke die die Basis berührenden angeschriebenen Kreise und nennt ihre Durchmesser δ_1 , δ_2 ... δ_n , so ist

$$\left(1-\frac{d_{\lambda}}{h}\right)\left(1+\frac{d_{\lambda}}{h}\right)=1,$$

wie sich leicht geometrisch nachweisen lässt. Man kann demnach statt 4) auch folgende Gleichung aufstellen:

5)
$$\left(1 + \frac{\delta_1}{h}\right) \left(1 + \frac{\delta_2}{h}\right) \cdots \left(1 + \frac{\delta_n}{h}\right) = 1 + \frac{\delta}{h},$$

wo δ der Durchmesser des die Basis berührenden angeschriebenen Kreises ist. Leipzig. Dr. Niemöller.

XIV. Bemerkung zum vorigen Aufsatze.

Den von Herrn Dr. Niemöller gefundenen Relationen 4) und 5) lässt sich eine dritte Gleichung von besonderer Einfachheit zugesellen, nämlich

$$\frac{d_1}{\delta_1} \cdot \frac{d_2}{\delta_2} \cdots \frac{d_n}{\delta_n} = \frac{d}{\delta_n}.$$

Dieselbe ist geometrisch leicht herzuleiten und führt mittels der Formeln

$$\frac{d}{\delta} = 1 - \frac{d}{h} = \frac{1}{1 + \frac{\delta}{h}}$$

auf die Resultate 4) und 5) zurück.

Schlömilch.

XV. Zum Schwering'schen Liniencoordinatensystem.

(Hierzu Taf. VI Fig. 7 u. 8.)

§Ι.

Im Nach tehenden werde ich zeigen, wie die im obigen System höchst einfachen Gleichungsformen der Centralkegelschnitte $uv = \pm b^2$ und der Parabel $u^2 - v^2 = e^2$ (vergl. Bd. XXI S. 278 dieses Journals) durch Sätze der projectivischen Geometrie zu erklären sind. Die duale Herleitung der entsprechenden Gleichungen in Cartesischen Punktcoordinaten giebt die Verwandtschaft beider Systeme zu erkennen.

1. Man denke sich zwei projectivische Punktreihen. Auf jedem Träger ist der unendlich ferne Punkt bemerkenswerth. Mögen die beiden Punkte e, n, heissen, die ihnen entsprechenden e, n. Dann ist

$$\varrho_1 \alpha_1 \cdot \eta \alpha = const.$$

wenn α , α_1 entsprechende Punkte sind.

2. Die unendlich fernen Punkte ϱ und η_1 können zusammenfallen. Die Träger sind dann parallel. (Fig. 7.)

$$\xi \alpha_1 = u$$
, $\eta \alpha = v$, $\xi \varrho_1 = m$.
Es ist $(u - m) v = const$.

3. Die einfachste Gleichung womb resultirt nur dann, wenn der die Träger bestimmende nendlich ferne Punkt richtig gewählt wird. Hier kann jeder der mendlich fernen Punkte der beiden Rechahnittsaxen gewählt werden.

1. Man denke sich zwei projectivische Strahlbüschel. In jedem derselben ist ein rechtwinkliges Strahlenpaar bemerkenswerth. Es seien dies die Strahlen st und s₁t₁. Dann ist

$$tg(t s) tg(s_1 s_1) = const.,$$

wenn z und z_1 entsprechende Strahlen sind.

2. Der Strahl s kann mit t_1 zusammenfallen. (Fig. 8.)

$$AB = 2a,$$

$$tg(ts) = \frac{PC}{AC} = \frac{a+x}{y},$$

$$tg(s_1 s_1) = \frac{PD}{DB} = \frac{a-x}{y},$$

$$\frac{a^2 - x^2}{y^2} = \frac{a^2}{b^2}, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

3. Die einfachste Gleichung resultirt nur dann, wenn der Anfangspunkt der Zählung der z und y richtig gewählt wird, nämlich der Mittelpunkt.

In diesem Verhalten erblicken wir den wahren Zusammenhang beider Systeme.

- 4. Beim Kreise ist die Wahl des unendlich fernen Punktes beliebig. Immer kommt man zur einfachsten Gleichungsform.
- 5. Beim Centralkegelschnitt bestimmt die Forderung: $\eta \varrho_1$ soll mit η zusammenfallen und die Gleichungsform möglichst einfach sein" zwei allein mögliche Systeme.
- 4. Beim Kreise bestimmt die Forderung, dass s mit t_1 zusammenfallen soll, nicht die Axen. Die Wahl derselben ist willkürlich und führt immer zur einfachsten Gleichungsform.
- 5. Beim Centralkegelschnitt bestimmt im Allgemeinen die Forderung: "s soll mit t_1 zusammenfallen und die Gleichungsform möglichst einfach sein" zwei allein mögliche Systeme.
- 6. Für die Parabel wird die vorige Darstellung illusorisch. In Linien-coordinaten haben wir die Gleichung $u^2 v^2 = e^2$. Wenn wir den Analogieschluss machen, so müssen wir setzen

$$\frac{u}{e} = tg \, m = \frac{x + \frac{e}{2}}{y} \quad \text{und} \quad \frac{v}{e} = tg \, n = \frac{x - \frac{e}{2}}{y}.$$

Es resultirt sodann

$$e^{3}\left(\frac{x+\frac{e}{2}}{y}\right)^{3}-e^{3}\left(\frac{x-\frac{e}{2}}{y}\right)^{3}=e^{3}$$

oder

$$y^2 = 2ex.$$

7. Wir wenden dasselbe Verfahren auf die Gleichungen des Punktes und der geraden Linie an.

Es sei gegeben

$$Au + Bv + C = 0$$
.

Es folgt

$$A tqm + B tqn + C = 0$$

oder

$$(A+B)x + Cy + \frac{A-B}{2}e = 0$$
$$-\frac{x}{a} + y + \frac{e-2c}{2a}e = 0$$

oder

als Gleichung der dem Punkte entsprechenden Geraden.

Umgekehrt sei die Gleichung einer Geraden gegeben

$$ax + by + c = 0$$
.

Für
$$x_0 = \frac{e}{2}$$
 sei

^{*} Vergl.: Theorie und Anwendung der Liniencoordinaten, von K. Schwering. Leipzig, Teubner. 1884.

$$y_0 = v = \frac{\xi - \frac{e}{2}}{n} e$$

und für $x_1 = -\frac{e}{2}$ sei

$$y_1 = u = \frac{\xi + \frac{e}{2}}{r}e.$$

Es folgt dann aus
$$\frac{x-x_0}{y-y_0} = \frac{x_1-x_0}{y_1-y_0}$$
$$ex+ny-e\xi = 0$$

als Gleichung der dem Punkte (ξ, η) entsprechenden Geraden.

§ II.

Es sei noch gestattet, hier einige kleine Bemerkungen zum System anzuschliessen.

1. "Die unendlich ferne Gerade ist Doppeltangente einer Curve n^{ter} Classe, wenn die Glieder n^{ten} Grades den Factor $(u-v)^2$ und die Glieder $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades den Factor u-v enthalten."

Der Beweis folgt sofort aus dem Umstande, dass die Punkte der unendlich fernen Geraden durch die Gleichung $u-v=\alpha$ dargestellt werden.

2. Der Krümmungsradius der Curve F(u, v) = 0 wird gefunden durch die Formel

$$R = -\frac{1}{e} \frac{rq^2 - 2spq + tp^3}{(p+q)^3} (e^2 + (u-v)^2)^{1/2}.$$

 $(p, q, r, s, t \text{ sind Abkürzungen für die ersten und zweiten partiellen Ableitungen von <math>F(u, v)$ nach u und v.)

3. Um eine Gleichung in Cartesischen Punktcoordinaten in Schwering'sche Liniencoordinaten überzuführen, dienen die Gleichungen

$$u=y+\frac{dy}{dx}(a-x), \quad v=y-\frac{dy}{dx}(a+x).$$

Bekanntlich lautet die Gleichung der Tangente

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x-x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(y-y_0) = 0.$$

Nimmt man nun für $x = \pm a$ y = u resp. v, so folgert man dieselben sofort, wenn man noch

Die Auflösung dieser Aufgaben bedarf einiger Vorbereitungen. Es ist zunächst die partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung:

$$\Delta V \equiv \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0,$$

welcher jedes Potential zu gentigen hat, für den elliptischen Cylinder zu integriren. Die Integration erfolgt durch Reduction obiger Gleichung auf gewöhnliche Differentialgleichungen. Die hierbei entstehende Frage, bei welchen Cylinderflächen eine Reduction dieser Gleichung auf gewöhnliche Differentialgleichungen möglich ist, wird dahin beantwortet, dass nur Cylinderflächen zweiten Grades eine Reduction zulassen. – Nachdem wir den allgemeinen Ausdruck für V hergestellt haben, entwickeln wir die reciproke Entfernung zweier Punkte und gelangen dann zur Lösung unserer zwei Hauptaufgaben.

Von besonderem Interesse wird die Aufgabe dadurch, dass zu ihrer Lösung die wohl zuerst von Heine eingeführten, von ihm als "Functionen des elliptischen Cylinders" bezeichneten Functionen angewandt werden, welche sich zu den allgemeineren Lamé'schen Functionen ähnlich verhalten, wie die Cylinder- oder Bessel'schen Functionen zu den Laplaceschen Kugelfunctionen. Ich bemerke, dass diese Functionen, wie a priori zu erwarten war, auch bei der Lösung der auf das elliptische Paraboloid sich beziehenden Potentialaufgaben auftreten, dessen Untersuchung ich später auszuführen gedenke.

Heine behandelt von Potentialaufgaben, betreffend den elliptischen Cylinder, nur eine: das Potential für innere Punkte zu bestimmen, wenn sein Werth auf dem Mantel und den beiden Grenzflächen gegeben ist. Ich beschränke mich auf die Betrachtung eines unendlich langen Cylinders.

§ 1.

Integration der Gleichung $\Delta V = 0$.

Man integrirt bekanntlich die Differentialgleichung des Potentials

1)
$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

dadurch, dass man zunächst statt der rechtwinkligen Coordinaten x, y, z orthogonale krummlinige Coordinaten ϱ , ϱ_1 , ϱ_2 von solcher Beschaffenheit einführt, dass die den betrachteten Körper begrenzende Fläche zu einer der Schaaren $\varrho = const.$, $\varrho_1 = const.$, $\varrho_2 = const.$ gehört. Dann versucht man der Gleichung 1) durch eine partikuläre Lösung von der Form $U(\varrho)$. $V(\varrho_1)$. $W(\varrho_2)$ zu genügen, wo die Functionen U, V, W nur von je einem Argumente abhängen und sich durch gewöhnliche Differentialgleichungen zweiter Ordnung bestimmen. Nicht für alle Flächengattungen ist eine solche Re-

XIII.

Ueber die Vertheilung der inducirten Elektricität auf einem unbegrenzten elliptischen Cylinder.

Von

Dr. RUDOLF BESSER in Dreeden.

Die Untersuchungen über die Vertheilung der Elektricität und Wärme, welche im Wesentlichen auf die Integration der Differentialgleichung des Potentials $\Delta V = 0$ hinauskommen, sind auf fast alle Körper, die von Flächen zweiten Grades begrenzt werden, ausgedehnt worden. Nachdem schon früher die geschlossenen Flächen zweiten Grades behandelt worden waren, hat man sodann auch ungeschlossene Flächen in das Bereich der Betrachtung gezogen, so z. B.: den Kreiscylinder durch Kirchhoff und Heine*, den Kreiskegel durch Herrn Mehler**, das Rotationsparaboloid***, bei welchem Herr Baer die Theorie der Wärmevertheilung behandelte, während sich die Formeln für die elektrische Vertheilung, wie ich mich überzeugte, ebenfalls sehr leicht aufstellen lassen, und schliesslich auch das zweitheilige Rotationshyperboloid durch Herrn Arendt†.

Ich versuche in den nachstehenden Zeilen einige der Fundamentalaufgaben, betreffend das Flächenpotential eines elliptischen Cylinders, in ähnlicher Weise und mit Anwendung derselben Methoden zu bearbeiten, wie dies von Heine a. a. O. mit den entsprechenden Aufgaben für den Kreiscylinder gethan worden ist.

Diese Aufgaben sind im Wesentlichen folgende:

- 1. Das Potential einer durch ihre Dichtigkeit gegebenen Flächenbelegung eines elliptischen Cylinders für äussere und innere Punkte desselben zu bestimmen:
- 2. das Potential für äussere und innere Punkte zu ermitteln, wenn sein Werth auf der Oberfläche des Cylinders gegeben ist.

Im Anschluss an diese beiden Aufgaben wird noch die Green'sche Belegung und Green'sche Function eines elliptischen Cylinders aufgesucht und damit das Problem der inducirten Elektricität gelöst.

 $^{^{\}circ}$ Creife's Journal, Bd. 48 S. 848-876; — Heine, Kugelfunctionen, II. Bd. 8. 173 $g_{\rm g}$

^{*} Programm des Gymnasiums zu Elbing. 1870.

Programm des Gymnasiums zu Cüstrin. 1881.

[†] Dias. Deseau, 1884.

Macht man nun mit Wangerin die Annahme:

$$V_{k} = \lambda R(\varrho) . R_{1}(\varrho_{1}),$$

wo λ von ϱ und ϱ_1 , aber nicht von h abhängt, so findet man, dass sic und R_1 nur dann aus gewöhnlichen Differentialgleichungen zweiter Ordn bestimmen lassen, wenn erstens zwischen y und z die Gleichung:

$$6a) y+iz=F(t+iu)$$

besteht und zweitens F(t+iu) so beschaffen ist, dass

6b)
$$F'(t+iu).F'(t-iu) = g(t)+h(u).$$

t und u sind dabei gewisse nur von ϱ bez. ϱ_1 abhängende Functionen. I erhält also ganz ähnliche Bedingungen wie bei den Rotationsflächen. Einzelheiten der Untersuchung glaube ich hier übergehen zu dürfen, da Wangerin'schen Formeln fast unverändert angewandt werden, und weise deshalb auf die schon citirte Abhandlung des Herrn Wangerin.

Ist zur Abkürzung:

$$t + iu = \omega$$
, $t - iu = \tilde{\omega}$,

so führt die Bedingungsgleichung 6b) leicht zu der Differentialgleichu

 $\frac{F'''(\omega)}{F'(\omega)} = \frac{F'''(\check{\omega})}{F'(\check{\omega})}$

oder:

$$\frac{F'''(\omega)}{F'(\omega)} = const. = m^2.$$

Die Integration dieser Differentialgleichung dritter Ordnung aber liefer

$$F(\omega) = F(t+iu) = \gamma + \frac{\alpha}{m} e^{m(t+iu)} + \frac{\beta}{m} e^{-m(t+iu)},$$

worin α , β , γ neue beliebige Constanten bezeichnen. Somit folgt:

Die Differentialgleichungen 4) oder 4a) lassen sich nur dann auf wöhnliche Differentialgleichungen reduciren, wenn zwischen den rechtwligen Coordinaten y und z der Directrix des Cylinders die Gleichung:

7)
$$y + iz = \gamma + \frac{\alpha}{m} e^{m(t+iu)} + \frac{\beta}{m} e^{-m(t+iu)}$$

besteht. Dann sind t und u die Parameter confocaler Kegelschnitte.

Dies giebt also das weitere Resultat:

Die Differentialgleichung des Potentials

$$\Delta V = 0$$

lässt sich nur bei Cylinderflächen zweiten Grades auf gewöliche Differentialgleichungen reduciren.

Die Aufstellung dieser Differentialgleichungen, welche keinen Schrigkeiten unterliegt, möge hier unterbleiben, da es bequemer ist, die Claderflächen zweiten Grades gesondert zu betrachten.*

$$\frac{\partial^2 V_{\mu}}{\partial x_{\mu}} + \frac{\partial^2 V_{\mu}}{\partial x_{\mu}} - \mu_5 \Lambda^{\mu} = 0$$

^{*} Der Nachweis, dass die Differentialgleichung 4):

Beim elliptischen Cylinder kann die Gleichung 7) durch die einfachere Gleichung:

8)
$$y + iz = c \cdot \cos(t + iu)$$

ersetzt werden, aus welcher

9)
$$y = c \cos t \cos iu$$
, $z = ic \sin t \sin iu$ folgt.

Aus 9) ergiebt sich:
10)
$$\frac{y^2}{c^2 \cos^2 i u} + \frac{z^2}{c^2 (\cos^2 i u - 1)} = 1, \quad \frac{y^2}{c^2 \cos^2 t} - \frac{z^2}{c^2 \sin^2 t} = 1,$$

so dass die Gleichung u = const. confocale Ellipsen mit den Halbaxen c cosiuand ic sin is, die Gleichung t = const. confocale Hyperbeln mit der gemeinsamen Excentricität c darstellt.

Die Gleichungen:

11)
$$x = x$$
, $y = c \cos t \cos iu$, $z = ic \sin t \sin iu$

repräsentiren daher

für x = const. parallele Ebenen,

für u = const. elliptische Cylinder,

für t = const. hyperbolische Cylinder.

Aus ihnen folgt für das Quadrat des Linienelements ds der Werth:

12)
$$ds^2 = dx^2 + \psi(du^2 + dt^2),$$

Wenn:

13)
$$\psi = \frac{c^2}{2}(\cos 2iu - \cos 2t).$$

Da allgemein:

$$\psi = F'(t+iu).F'(t-iu),$$

ist die Bedingung 6b) erfüllt, und zwar ist:

$$g(t) = -\frac{c^2}{2}\cos 2t$$
, $h(u) = \frac{c^2}{2}\cos 2iu$.

Wir sind nun im Stande, die Differentialgleichungen, welche für die unbekannten Functionen bestehen, aufzustellen.

Die Gleichung 4a) für V_h geht, wenn man darin die Coordinaten ϱ and o, mit t und u vertauscht, da

sich nur dann, wenn y und z durch eine Gleichung von der Form 7) verbunden and, auf gewöhnliche Differentialgleichungen reduciren lässt, ist zum Theil schon Von Herrn Weber in seiner Abhandlung "Ueber die Integration der partiellen

Differentialgleichung $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + k^2 u = 0^a$ (Math. Annal., Bd. I. S. 1-32) geführt

Forden (l. c. S. 27). Herr Weber nimmt indessen von vornherein an, dass die Beam Coordinaten ξ, η mit den gegebenen x, y durch eine Gleichung

$$x + iy = f(\xi + i^{-1})$$

Verbunden sind, und bestimmt unter wir die Nothwendigkeit +

n. 400 {(\$+in); * huben.

$$A = B = \psi = \frac{c^2}{2} (\cos 2iu - \cos 2t),$$

über in:

14)
$$\frac{\partial^2 V_h}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 V_h}{\partial t^2} - \frac{h^2 c^2}{2} (\cos 2iu - \cos 2t) V_h = 0$$

Setzt man:

$$V_h(u,t) = U(u).T(t),$$

so ergeben sich für U und T die Gleichungen:

15)
$$\frac{d^2U}{du^2} - \left(\frac{h^2c^2}{2}\cos 2iu + k^2\right)U = 0,$$

16)
$$\frac{d^2T}{dt^2} + \left(\frac{h^2c^2}{2}\cos 2t + k^2\right)T = 0,$$

worin k eine neue willkürliche Constante bezeichnet, welche neben k als Parameter in U und T eingeht,

Die Gleichung 15) geht durch die Substitution u = i w in die der Gleichung 16) analog gebaute Gleichung:

$$\frac{d^2U}{dw^2} + \left(\frac{h^2c^2}{2}\cos 2w + k^2\right)U = 0$$

über; die Integration von 15) wird daher durch die von 16) geleistet.

Die durch die Gleichungen 15) und 16) definirten Functionen sind zuerst von Heine näher untersucht und von ihm Functionen erster Art des elliptischen Cylinders genannt worden. Wir bezeichnen sie nach ihm durch $\mathfrak{E}(iu)$, bez. $\mathfrak{E}(t)$, und die zweiten partikulären Integrale von 15) und 16), die Functionen zweiter Art des elliptischen Cylinders, durch $\mathfrak{F}(iu)$, bez. $\mathfrak{F}(t)$, indem wir einstweilen von der Abhängigkeit dieser Functionen von den Parametern h und k noch absehen.

Heine nimmt c=1 an und führt zwei Constanten β und s statt h und k ein, welche mit h und k durch die Gleichungen:

$$8\beta^2 = \frac{h^2c^2}{2}, \quad k^2 = 4z$$

zusammenhängen.

Die Gleichung 14) wird nach dem Obigen durch Producte:

$$\mathfrak{E}(t)\,\mathfrak{E}(iu),\,\,\,\,\mathfrak{E}(t)\,\mathfrak{F}(iu),\,\,\,\,\,\mathfrak{E}(iu)\,\mathfrak{F}(t),\,\,\,\,\,\mathfrak{F}(t)\,\mathfrak{F}(iu)$$

integrirt. Mit Rücksicht auf die Gleichung 3) finden wir dann, dass sich die Lösung der Gleichung:

$$\Delta V = 0$$

aus Partikularlösungen von den Formen:

^{*} Kugelfunctionen I, S. 401, 404, 405 flg.

Die allgemeine Lösung V erhält man durch Summation aller besonderen Lösungen, die dadurch entstehen, dass man den Parametern h und k alle zulässigen Werthe beilegt. Denkt man sich V, als Function von x betrachtet, in ein Fourier'sches Integral entwickelt, so folgt, dass man nach h integriren darf, während man für jedes einzelne h eine unendliche Menge von k findet und also alle Partikularlösungen, die zu demselben h gehören, zu summiren sind.

V lässt sich sonach unter der Form:

$$V = \int_{0}^{\infty} dh (a_h \cos hx \, V_h + b_h \sin hx \, W_h)$$

darstellen, wo Vh und Wh Aggregate von Producten der & und & sind.

§ 2.

Entwickelung der Functionen erster Art des elliptischen Cylinders.*

Zur weiteren Entwickelung der Functionen & gehen wir am bequemsten von der Gleichung 16) aus, welche lautet:

16)
$$\frac{d^2 \mathfrak{E}}{dt^2} + \left(\frac{h^2 c^2}{2} \cos 2t + k^2\right) \mathfrak{E} = 0.$$

Heine integrirt diese Gleichung durch die trigonometrische Reihe

17)
$$\mathfrak{E} = \frac{1}{2} c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos nt + s_n \sin nt).$$

Die Substitution von 17) in 16) ergiebt die Gleichung:

$$\frac{1}{2}c_{0}\left(k^{2}+\frac{\lambda^{2}}{2}\cos 2t\right)+\sum_{1}^{\infty} \left\{c_{n}\left(k^{2}-n^{2}\right)\cos nt+\frac{\lambda^{2}}{4}c_{n}\cos (n-2)t+\frac{\lambda^{2}}{4}c_{n}\cos (n+2)t\right\} \\
+\sum_{1}^{\infty} \left\{s_{n}\left(k^{2}-n^{2}\right)\sin nt+\frac{\lambda^{2}}{4}s_{n}\sin (n-2)t+\frac{\lambda^{2}}{4}s_{n}\sin (n+2)t\right\}=0,$$

wobei zur Abkürzung $hc = \lambda$ gesetzt worden ist. Hieraus erhält man folgende Gleichungen zur Bestimmung der c_n und s_n :

Vorher ist diese Gleichung auch von Herrn Émile Mathieu in seiner Abhadlung "Sur le mouvement vibratoire d'une membre "Nec" (Jean r. Liouville, II. Serie, T. XIII. S. 137—20

^{*}Ueber die Integration der Gleichung 16) handelt neuerdings Herr Lindemans (Math. Ann., Bd. 22, S. 117—123). Er betrachtet aber nicht unsern Fall, bei
welchem die Auswahl der Constanten & beschränkt ist, sondern integrirt die Gleichme mit Anwendung Hermite'scher Methoden für beliebige h und &

$$(q_{1}+1)c_{1} + c_{3} = 0,$$

$$c_{1} + q_{3} c_{3} + c_{5} = 0,$$

$$c_{2m-1} + q_{2m+1}c_{2m+1} + c_{4m+3} = 0,$$

$$m = 1, 2, 3, ...;$$

dann:

$$\begin{array}{rcl}
 s_2 & q_2 & + s_1 & = 0, \\
 s_2 & + s_1 & q_4 & + s_6 & = 0, \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 s_{2m-2} + s_{2m} q_{2m} + s_{2m+2} = 0, \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 m = 2, 3, \ldots;
 \end{array}$$

endlich:

Dabei ist überall

$$q_n = \frac{4(k^2 - n^2)}{1^2} = \frac{4(k^2 - n^2)}{k^2 c^2}.$$

Diese Gleichungen, aus denen man alle c_n und s_n durch c_0 , c_1 bez. s_1 ausdrücken kann, zeigen, dass für jedes k die Functionen \mathfrak{E} Classen zerfallen, von denen die erste und zweite nach den Cosin geraden und ungeraden, die dritte und vierte nach den Sinus der unt und geraden Vielfachen von t fortschreitet. Bezeichnet man daher \mathfrak{E}^I , \mathfrak{E}^{II} , \mathfrak{E}^{III} und \mathfrak{E}^{IV} diese vier Classen, so ist:

Die Coefficienten c und s jeder Reihe hängen vom ersten Coefficien und sind im Uebrigen ganze Functionen von k^2 und λ^{-2} .

Man erkennt leicht die Analogie der vier Classen der E mit d Classen der Lamé'schen Functionen; sie lassen sich aber nicht w durch endliche Reihen darstellen. Denn setzt man in die Gleicht statt der unendlichen Reihe 17) eine mit cosnt und sinnt abbrechen liche Reihe ein, bestimmt dann die Coefficienten c und s aus den ungen 18), so würden diese, was z. B. die c anlangt, mit

$$c_n = 0$$
, $c_n q_n + c_{n-2} = 0$

a.b. schliessen. c_n ist der Coefficient von cos(n+2)t, $c_nq_n+c_{n-2}$ der Coefficient von $\cos nt$. Diese Gleichungen sind aber nur durch $c_n = 0$, $c_{n-2} = 0$ zzz erfüllen, und dann würden auch alle anderen c, also c_{n-4} , c_{n-6} , ... gleich Null sein müssen. Das Gleiche gilt von den s. Hierdurch ist die Richtigkeit der vorigen Behauptung erwiesen. Damit aber die Reihen 19) convergiren, müssen in ihnen die unendlich weit entfernten Coefficienten verschwinden. Diese Bedingung, welche sich, wie Heine zeigt, auch als das Verschwinden der unendlich entfernten Näherungsnenner und -Zähler zweier Kettenbrüche darstellen lässt, giebt eine Gleichung unendlich hohen Grades in k und h, aus der sich für jedes h unendlich viele **Lösungen** k ergeben. Dieselben mögen der Reihe nach mit k_0, k_1, k_2, \ldots Es ist nicht schwierig, die ungefähre Form dieser bezeichnet werden. Gleichungen festzustellen. So findet man z.B., dass sich c2m durch eine Gleichung der Form

$$20) c_{2m} = c_0[(q_{2m-2}q_{2m-4}\dots q_0) + G_{m-2} + G_{m-4} + \dots]$$

ausdrückt, worin die G Aggregate von q-Producten sind, deren jedes aus soviel Factoren q besteht, als der Index von G angiebt. Der erste Posten besteht aus m Factoren q, in den folgenden fällt die Factorenzahl immer um 2, mithin, da jeder Factor q vom zweiten Grade in k und λ^{-1} ist, der Grad in k und λ^{-1} um 4. Hebt man λ^{-2m} aus, so kann man auch

21)
$$c_{2m} = \frac{C}{\lambda^{2m}} \left[(k^2 - \overline{2m - 2^2}) (k^2 - \overline{2m - 4^2}) \dots (k^2 - 2^2) . k^2 + \lambda^4 . G_{m-2} + \lambda^8 . G_{m-4} + \dots \right]$$

setzen. Aehnliche Formen besitzen auch die Werthe für c_{2m+1} , s_{2m} und s_{2m+1} .

Die Integrale der Differentialgleichung 15) ergeben sich nach früheren Bemerkungen aus denen der Gleichung 16) durch Vertauschung von t mit iu. Sie lauten also:

Worin die Coefficienten c und s genau dieselben Werthe wie in 19) haben. Noch sei bemerkt, dass man durch die Substitution:

$$c sint = x$$

die Integrale 19) in Form von Potenzreihen darstellen kann, nämlich:

kann. Es ist vielmehr gleich einer gewissen Constanten, deren Werth vor dem Werthe des Anfangsgliedes in der Entwickelung von \mathfrak{S}_{μ} abhängt. Widenken uns dasselbe so bestimmt, dass die Constante = π gesetzt werde kann, so dass:

28a)
$$\int_{0}^{2\pi} [\mathfrak{S}_{\mu}(t)]^{2} dt = \pi.$$

Die Gründe für diese Wahl werden später erhellen.

Man bemerkt, dass diese Formeln den bekannten Integraleigenschafte der Kreisfunctionen:

$$\int_{0}^{2\pi} \cos m \varphi \cos n \varphi \, d\varphi = 0, \quad m \neq n,$$

$$\int_{0}^{2\pi} \sin n \varphi \sin n \varphi \, d\varphi = 0, \quad m \neq n,$$

$$\int_{0}^{2\pi} \cos m \varphi \sin n \varphi \, d\varphi = 0$$

entsprechen. Für m=n nehmen die beiden ersten Integrale den gemeinsamen Werth π an, mit Ausschluss des Falles m=n=0.*

Mit Benutzung der Gleichungen 28) und 28a) löst man die Aufgabe Die von t abhängende Function f(t) in eine nach den Functionen $\mathfrak{E}(t)$ fortschreitende Reihe zu entwickeln.

Setzt man nämlich:

$$f(t) = \sum_{0}^{\infty} \sigma a_{\mathbf{r}} \mathfrak{E}_{\mathbf{r}}(t, h, k_{\mathbf{r}}),$$

* Für die Functionen G(iu) scheinen ähnliche Integraleigenschaften nicht z existiren. Aus der Differentialgleichung 15) für G(iu):

15)
$$\frac{d^2(\hat{\mathbf{r}}(i\mathbf{u}))}{d\mathbf{u}^2} - \left(\frac{h^2c^2}{2}\cos 2i\mathbf{u} + k^2\right) \mathfrak{F}(i\mathbf{u}) = 0,$$

erhält man zwar gerade wie vorher, falls \mathfrak{E}_{μ} und \mathfrak{E}_{τ} zwei verschiedene $\mathfrak{E}(is)$ to deuten:

$$\left[\mathfrak{E}_{\mu}\frac{d\mathfrak{E}_{\nu}}{du}-\mathfrak{E}_{\tau}\frac{d\mathfrak{E}_{\mu}}{du}\right]_{a}^{b}=(k_{\mu}^{2}-k_{\tau}^{2}).\int_{a}^{b}\mathfrak{E}_{\mu}\cdot\mathfrak{E}_{\tau}\cdot du,$$

aber es lassen sich keine Grenzen a und b angeben, für die die linke Seite di Gleichung verschwände. Dies abweichende Verhalten der Functionen Gius darin begründet, dass für c=0 sich die Giu) in Bessel'sche Functionen mit in ginärem Argumente verwandeln, während die Git) in Kreisfunctionen übergeh Für die Cylinderfunctionen existiren aber Integraleigenschaften, die denen für Kreisfunctionen entsprechen, nicht.

Aus diesen Gleichungen folgt, dass das Product $\mathfrak{E}(t)$. $\mathfrak{E}(iu)$ im Coordinatenanfang, also für $t=\frac{\pi}{2}$, u=0, oder auch für Punkte auf der Cylinderaxe verschwindet, wenn die Functionen \mathfrak{E} von 2., 3., 4. Classe sind, dagegen für \mathfrak{E} der 1. Classe $=C_1^2$ ist. Für Punkte, die auf den Azen der Directrix oder einer zu ihr parallelen Ellipse liegen, verschwindet dies Product aber nur für zwei Classen der \mathfrak{E} .

§ 3.

Integraleigenschaften der Functionen & mit reellem Argumente. Entwickelung gegebener Functionen nach den &.

Die Functionen E(t) besitzen zwei Arten von Integraleigenschaften, welche sie, ebenso wie die trigonometrischen, die Kugel- und Lamé'schen Functionen, zur Vornahme von Entwickelungen gegebener Functionen geeignet machen. Ich betrachte hier nur die erste Art dieser Integraleigenschaften, welche auf die Verwandtschaft der E mit den Kreisfunctionen hin weist, und welche auch Heine erwähnt (Kugelfunct. I, S. 415), ohne sie indess abzuleiten.

Seien \mathfrak{E}_{μ} und \mathfrak{E}_{ν} zwei Functionen $\mathfrak{E}(t)$, die zu gleichem h, aber zwei verschiedenen Werthen k_{μ} und k_{ν} von k gehören sollen. Sie genügen den Gleichungen:

$$\begin{split} \frac{d^2 \mathfrak{E}_{\mu}}{dt^2} + \left(\frac{\hbar^2 c^2}{2} \cos 2t + k_{\mu}^2\right) \mathfrak{E}_{\mu} &= 0, \\ \frac{d^2 \mathfrak{E}_{\tau}}{dt^2} + \left(\frac{\hbar^2 c^2}{2} \cos 2t + k_{\tau}^2\right) \mathfrak{E}_{\tau} &= 0. \end{split}$$

Aus diesen folgt:

$$\mathfrak{E}_{\mu} \frac{d^2 \mathfrak{E}_{\tau}}{dt^2} - \mathfrak{E}_{\tau} \frac{d^2 \mathfrak{E}_{\mu}}{dt^2} = (k_{\tau}^2 - k_{\mu}^2) \mathfrak{E}_{\tau} \mathfrak{E}_{\mu},$$

mithin durch Integration nach t zwischen 0 und 2π :

$$(k_{\mathbf{v}^2}-k_{\boldsymbol{\mu}^2})\int\limits_0^{2\pi} \mathfrak{S}_{\mathbf{v}}\mathfrak{S}_{\boldsymbol{\mu}}.\,dt = \left[\mathfrak{S}_{\boldsymbol{\mu}}\frac{d\mathfrak{S}_{\mathbf{v}}}{dt} - \mathfrak{S}_{\mathbf{v}}\frac{d\mathfrak{S}_{\boldsymbol{\mu}}}{dt}\right]_0^{2\pi}.$$

Nun verschwindet aber die rechte Seite dieser Gleichung, wie eine einfache Rechnung lehrt, an den Grenzen 0 und 2π stets, sofern nicht die Functionen \mathfrak{E}_{μ} und \mathfrak{E}_{τ} derselben Classe angehören und $k_{\mu}=k_{\tau}$ ist. Dann ist aber die Gleichung an sich identisch. Man findet also, da $k_{\mu}^2-k_{\tau}^2$ nicht \mathfrak{E}_{τ} 0. dass:

28)
$$\int_{0}^{2\pi} \mathfrak{E}_{\mu}(t) \, \mathfrak{E}_{\nu}(t) \, dt = 0, \quad \mu \neq \nu.$$

Pur $\mu = \nu$ besteht diese Gleichung nicht ν Punction, $[\mathcal{E}_{\mu}(t)]^2$, stets positiv in

ntegrirende aebaiwde

$$a_{\nu}(h) = \frac{1}{\pi^{2}} \int_{0}^{2\pi} \int_{-\infty}^{2\pi + \infty} \mathfrak{E}_{\nu}(t) \cosh x \, F(x, t) \, dt \, dx,$$

$$b_{\nu}(h) = \frac{1}{\pi^{2}} \int_{0}^{2\pi + \infty} \mathfrak{E}_{\nu}(t) \sinh x \, F(x, t) \, dt \, dx.$$

Man kann der Gleichung 31) auch folgende symbolische Form geben:

31a)
$$F(x,t) = \frac{1}{\pi^2} \int_0^\infty dh \sum_{k=0}^\infty \mathbb{E}_{\mathbf{v}}(t) \int_0^{2\pi} \mathbb{E}_{\mathbf{v}}(\psi) d\psi \int_{-\infty}^{+\infty} F(\xi,\psi) \cosh(\xi - x) d\xi.$$

§ 4.

Die Functionen sweiter Art $\Re(iu)$ des elliptischen Cylinders. Verhalten von $\Re(iu)$ und $\Re(iu)$ für sehr grosse Argumente.

Wir geben der Differentialgleichung 16) für $\mathfrak{E}(iu)$ und $\mathfrak{F}(iu)$ durch die Substitution:

$$\mathbf{a}) \qquad \qquad \mathbf{ic} \ \mathbf{siniu} = \mathbf{\varrho}$$

die Form:

b)
$$(\varrho^2 + c^2) \frac{d^2 y}{d \varrho^2} + \varrho \frac{d y}{d \varrho} - (h^2 \varrho^2 + k_1^2) y = 0,$$
 wo:
$$k_1^2 = k^2 + \frac{h^2 c^2}{\Omega} \cdot$$

Aus ihren Integralen, welche mit $\mathfrak{E}(\varrho)$ und $\mathfrak{F}(\varrho)$ bezeichnet werden sollen, können wir durch die Substitution a) sofort $\mathfrak{E}(iu)$ und $\mathfrak{F}(iu)$ bilden. —

Aus b) folgt: c) $\mathfrak{F}(\varrho) \frac{d\mathfrak{E}}{d\varrho} - \mathfrak{E}(\varrho) \frac{d\mathfrak{F}}{d\varrho} = \frac{\Gamma}{1/\varrho^2 + \varrho^2}$

und:

d)
$$\mathfrak{F}(\varrho) = \Gamma \mathfrak{E}(\varrho) \int_{\varrho}^{\infty} \frac{d\varrho}{\sqrt{\varrho^2 + c^2} [\mathfrak{E}(\varrho)]^2}.$$

Zur Bestimmung der Constanten Γ setze man in c) oder d) für ϱ einen unendlich grossen Werth ein. Dann lassen sich die Beträge von $\mathfrak{E}(\varrho)$ und $\mathfrak{F}(\varrho)$ a priori angeben, da man in der Gleichung b) bei dem Factor $\varrho^2 + c^2$ von $\frac{d^2y}{d\,\varrho^2}$ c^2 gegen das unendlich grosse ϱ^2 vernachlässigen kann und so die einfachere Gleichung:

$$e^{2} \frac{d^{2}y}{d\rho^{2}} + e \frac{dy}{d\rho} - (h^{2} e^{2} + k_{1}^{2}) y = 0$$

erhält. Deren Integrale sind aber die Cylinderfunctionen $J_{i_1}(hi\varrho)$ und $Y_{i_1}(hi\varrho)$. Für sehr grosse Werthe von ϱ nehmen also die Functionen des elliptischen Cylinders $(\mathfrak{F}(\varrho))$ und $\mathfrak{F}(\varrho)$ angenähert die Werthe der Functionen.

des Kreiscylinders $J_{k_1}(hi\varrho)$, $Y_{k_1}(hi\varrho)$ an. Und da, wie aus a) folgt, mit ϱ auch u unendlich wird, so gilt das Gleiche auch von den Functionen $\mathfrak{E}(iu)$, $\mathfrak{F}(iu)$.

Nun giebt Heine* folgende Formeln, in denen statt des Index ν k_1 , statt K für die Function zweiter Art Y geschrieben worden ist:

$$J_{k_1}(p+qi) = \frac{i^{k_1}e^{q-pi}}{\sqrt{2q\pi}}, \quad Y_{k_1}(p+qi) = (-i)^{k_1}e^{-q+pi}\sqrt{\frac{\pi}{2q}}.$$

giltig für positive unendlich grosse q. In unserem Falle ist $q = h \varrho$, also positiv, da h und ϱ es sind, mithin können beide Formeln angewandt werden, und geben, wenn p = 0, $q = h \varrho$ gesetzt wird:

e)
$$J_{k_1}(h \varrho i) = \frac{i^{k_1} e^{h \varrho}}{\sqrt{2 \pi h \varrho}}, \quad Y_{k_1}(h \varrho i) = (-i)^{k_1} e^{-h \varrho} \sqrt{\frac{\pi}{2 h \varrho}}.$$

Dieselben Werthe haben also auch $\mathfrak{E}(\varrho)$ und $\mathfrak{F}(\varrho)$. — Setzt man dies in d) ein, führt rechts die Integration aus, wobei im Nenner des Integranden einfach ϱ statt $\sqrt{\varrho^2+c^2}$ geschrieben werden darf, so erkennt man, dass

$$\Gamma = 1$$

wird. Dasselbe Ergebniss liefert auch Gleichung e).

Ersetzen wir in c) und d) ϱ durch u, so resultirt:

32)
$$\Re(iu)\frac{d\mathfrak{E}(iu)}{du} - \mathfrak{E}(iu)\frac{d\mathfrak{F}(iu)}{du} = 1,$$

33)
$$\Re(iu) = \Re(iu) \int_{u}^{\infty} \frac{du}{[\Re(iu)]^2}.$$

Setzt man endlich in e) $\varrho = \infty$, so folgt:

34)
$$\mathfrak{E}(iu) = \infty$$
, $\mathfrak{F}(iu) = 0$, $u = \infty$ for jedes h and k .

§ 5.

Betrachtung zweier Specialfälle.

Ist h=0 oder c=0, so lassen sich die Integrale von 15) und 16) sofort angeben, was des Folgenden wegen hier geschehen soll.

Für h=0 lauten die Gleichungen 15) und 16):

$$\frac{d^2\mathfrak{E}(t)}{dt^2} + k^2\mathfrak{E}(t) = 0,$$

$$\frac{d^2\mathfrak{E}(iu)}{dt^2} - k^2\mathfrak{E}(iu) = 0;$$

also gehen die Functionen E_v(t) in coskt. sinkt die Functionen E_v(iu) in coskiu, sinkiu über, wobei für die anzen Zahlen zu

..

[•] Kugeifunctionen IL

nehmen sind, wie aus den Gleichungen 18), die man sich zuvor mit k^2c^2 multiplicirt zu denken hat, hervorgeht. Der constante Factor, mit dem die $\mathfrak{E}(t)$ noch behaftet sind, sei =1; dagegen setze man für k=0 $\mathfrak{E}_0(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}$ damit die Integralformel

$$\int_{0}^{2\pi} [\mathfrak{S}_{k}(t)]^{2} dt = \pi$$

such für k=0 gelte.

 $\Re(iu)$ verwandelt sich in $\frac{1}{k}e^{-ku}$, wobei der Factor $\frac{1}{k}$ der Gleichungen 32) und 33) wegen nicht fehlen darf.

Ist c=0, d. h. tritt an die Stelle des elliptischen Cylinders ein Kreiscylinder, so sind statt der elliptischen Coordinaten t, u die gewöhnlichen Polarcoordinaten r, φ einzuführen, was durch die Substitutionen

$$u = \omega + \log r$$
, $t = \varphi$, $c = 2e^{-\omega}$, $\omega = \infty$

geschieht. In den Gleichungen 9) darf c nicht = 0 gesetzt werden. Die Ausdrücke:

$$\frac{c}{2}(e^{u}+e^{-u}), \quad \frac{c}{2}(e^{u}-e^{-u}),$$

welche die Axen der Ellipse w = const. repräsentiren, gehen für $\omega = \infty$ beide in r tiber, während für ein endliches ω r die halbe Summe der Axen bedeutet.

Gleichung 15) lautet in r:

35)
$$\frac{d^2y}{dr^2}r^2 + \frac{dy}{dr}r - \left(h^2r^2 + \frac{h^2e^{-4\omega}}{r^2} + k^2\right)y = 0,$$

also für $\omega = \infty$:

$$\frac{d^2y}{dr^2}r^2 + \frac{dy}{dr}r - (h^2r^2 + k^2)y = 0.$$

Demnach werden die Functionen $\mathfrak{E}_{\tau}(iu)$, $\mathfrak{F}_{\tau}(iu)$ ersetzt durch die Cylinderfunctionen $J_k(hir)$, $Y_k(hir)$, was ohne Weiteres evident ist. — Die $\mathfrak{F}_{\tau}(t)$ gehen, wie im ersten Falle, in $\cos k\varphi$, $\sin k\varphi$ über.

Denkt man sich das Product:

$$\mathfrak{E}_{r}(iu)\,\mathfrak{F}_{r}(iu_1)\,\mathfrak{E}_{r}(t)\,\mathfrak{E}_{r}(t_1)$$

ertsprechend den vier Classen der \mathfrak{E} in seine vier Theile zerlegt, so erkennt man, dass für c=0 sich dasselbe in:

$$\frac{\epsilon_k}{2}J_k(hir)Y_k(hir_1)\cos k(\varphi-\varphi_1)$$

verwandelt, wobei $\varepsilon_k = 1$ für k = 0, $\varepsilon_k = 2$ für $k = 1, 2, \ldots$ Die Hinzufügung jenes Factors wird durch das abweichende Verhalten von $\mathfrak{E}_0(t)$ nothwendig. k ist gerade für die \mathfrak{E} 1. und 4., ungerade für die \mathfrak{E} 2. und
3. Classe.

Wir haben hier die einfacheren Functionen, in welche die Efür c=0 übergehen, durch Betrachtung der Differentialgleichung gefunden. Es ist nicht ohne Interesse, auch an den von uns gegebenen Entwickelungen diese Uebergänge zu verificiren. Die Entwickelungen der E(iu) nach den coskiu und sinkiu sind hierzu nicht verwendbar. Man gelangt zum Ziele, wenn man die Lösung der Gleichung b), S. 270, in eine nach Potenzen von ϱ fortschreitende Reihe entwickelt und in deren Coefficienten c=0 setzt, oder noch einfacher, wenn man das Integral gedachter Gleichung durch eine Cylinderfunctionenreihe $\Sigma a_n J_n(hi\varrho)$ darstellt. Wie Heine zuerst bemerkte, bestimmen sich die Coefficienten dieser Reihe aus denselben Gleichungen, welche die Coefficienten in der trigonometrischen Reihe liefern.* Für c=0 bleibt von der Reihe nur das Glied $J_k(hi\varrho)$ oder $J_k(hir)$ stehen, da die übrigen Coefficienten verschwinden.

(Schluss folgt.)

^{*} Vergl. Kugelfunct. I, S. 414. Heine betrachtet daselbst nur Cylinderfunctionen $\mathfrak{E}(\varphi)$, nach unserer Bezeichnung $\mathfrak{E}(t)$, und entwickelt sie in Bessel'sche Functionen mit dem Argument $i\lambda\cos\varphi$; doch erhält man dieselben Resultate auch für Cylinderfunctionen $\mathfrak{E}(i\omega)$, deren Entwickelung, wie oben bemerkt wurde, nach den $J_n(hi\varrho)$ fortschreitet.

XIV.

Ueber die Lage der Verschwindungspunkte einer ganzen Function.

Von

A. WITTING,

Caud. math. in Leipzig.

In Gauss' Werken* findet sich in einer Anmerkung der Satz:

"Sind a, b, c, \ldots, m , n die Wurzeln einer Gleichung f(x) = 0. a', b', c', \ldots, m' die Wurzeln der Gleichung f'(x) = 0, wo $f'(x) = \frac{df(x)}{dx}$.

und werden durch dieselben Buchstaben die entsprechenden Punktin plano bezeichnet, so ist, wenn man sich in a, b, c, \ldots, m , gleiche abstossende oder anziehende Massen denkt, die im umgekelten Verhältniss der Entfernungen wirken, in a', b', c', \ldots, m' Gleicz gewicht."

Herr F. Lucas sprach denselben in den Comptes rendus** in einer Form aus, durch welche ein bekanntes Theorem über Gleichungen mit nur reellen Wurzeln auf das complexe Gebiet ausgedehnt wird:

"Tout contour fermé convexe environnant le groupe des point racines de l'équation proposée environne aussi le groupe des point racines de l'équation dérivée."

Der Beweis ist daselbst mit Hilfe mechanischer Principien im Sinnedes Gauss'schen Satzes geführt.***

Ein geometrischer Beweis, der zugleich eine strengere Fassung des Satzes liefern wird, ist folgendermassen möglich.

Betrachten wir die Gleichung:

$$f(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) = 0,$$

^{*} Gauss' Werke Bd. III S. 112.

^{**} Comptes rendus, t. 89 p. 224: Sur une application de la mécanique rationelle à la théorie des équations,

^{***} Eine nicht ganz correcte Fassung des Theorems gaben Herr Legebeke mit einem auf functionentheoretische Betrachtungen gegründeten Beweise und Varr Stieltjes, dessen Entwickelungen der Analysis situs angehören; Arch. néerl. 4. XVII p. 278-278 und t. XVII p. 1.

deren linke Seite eine ganze transcendente Function ist, bei welcher die Summe der reciproken Moduln der Verschwindungspunkte

$$\sum \left| \frac{1}{a_n} \right|$$

convergirt, und nehmen wir weiter an, dass sämmtliche Punkte a_n in einer Halbebene liegen. Dann lässt sich nach Analogie des Puiseux'schen Verfahrens bei der Untersuchung algebraischer Functionen in den kritischen Punkten derselben ein ganz bestimmtes Polygon construiren, dessen Ecken Wurzelpunkte von f(z) sind. Ein Eckpunkt, welcher mehrfacher Verschwindungspunkt von f(z) ist, heisse kurz vielfache Ecke. Auf jeder Seite des Polygons befinden sich nur zwei Nullpunkte der Function, es können aber mehrere aufeinander folgende, ja alle Seiten in eine Gerade fallen. Das Polygon zerlegt die Ebene in zwei Theile, in deren einem alle Wurzelpunkte von f(z) gelegen sind. Dieser Theil heisse das Innere des Polygons, welches letztere wir das Wurzelpolygon von f(z) nennen. Dasselbe ist mach aussen überall convex.

Es lässt sich nun zeigen, dass die Wurzelpunkte der Ableitung f'(z) nicht ausserhalb, noch auf den Seiten des Wurzelpolygons von f(z) liegen können. Dazu ordnen wir jedem Punkte z durch die Gleichung:

$$\zeta = -\frac{f'(z)}{f(z)} = \sum \frac{1}{a_n - z} \equiv \sum \frac{1}{r_n e^{i\varphi_n}}$$

einen Punkt ξ zu. Liegt z ausserhalb des Polygons, das wir zunächst als nicht ganz in eine Gerade fallend voraussetzen, so verbinden wir den Punkt mit einer Ecke a_1 des Wurzelpolygons, so dass letzteres ganz auf einer Seite der Verbindungsgeraden sich befindet, und wählen die Indices der Wurzelpunkte von f(z) so, dass von der um z rotirenden Geraden $\overline{za_1}$ beim Durchstreichen des Polygons der Reihe nach die Punkte a_2 , a_3 , ..., a_n , ... getroffen werden. Construiren wir dann geometrisch die convergente Summe:

$$\sum_{i}^{\infty} \frac{1}{r_n e^{i\varphi_n}},$$

we erhalten wir einen vom Coordinatenanfang ausgehenden, sich nicht selbst durchschneidenden Linienzug, dessen Endpunkt ξ ist. Da bei der Lage von sausserhalb des Wurzelpolygons die Drehung von $\overline{\epsilon a_1}$ bis zum Austritt aus dem Polygon immer kleiner als π ist, so kann der zur Construction von s dienende Linienzug niemals ein geschlossener werden. Dies ist aber erforderlich, wenn s eine Wurzel von f'(z) ist, denn dann fällt ξ in den Coordinatenanfang. Es kann also keine Wurzel z von f'(z) = 0 ausserhalb des Polygons gelegen sein. Ebenso wenig kann aber auch z auf einer Polygonseite liegen, sondern nur noch in einer vielfachen Ecke. Wir erhalten also den Satz:

Die Wurzelpunkte der Ableitung f'(z) einer ganzen transcendenten Function von der Form was unmöglich ist, da die $\beta_n + \beta$ sämmtlich positiv sind. Ebenso wenig kann aber bei endlichem α $\sum_{\alpha_n = \alpha^2 + \beta_n^2} = 0$

sein, d. h.: die Ableitung kann im Endlichen auch keine reellen Wurzelpunkte besitzen — die vielfachen reellen Verschwindungspunkte von f(z) ausgenommen. Man erkennt auch, dass die Wurzelpunkte der Ableitung im Endlichen nicht beliebig nahe an die reelle Axe heranrücken können; verschwinden aber alle β_n der Wurzeln von f(z) = 0, so werden für die Ableitung alle β gleich Null.

Durch Coordinatentransformation erhält man demnach folgenden Satz:*

Befinden sich die Wurzelpunkte einer ganzen transcendenten
Function

 $f(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n} \right)$

entweder innerhalb, oder doch nicht alle auf der Grenze einer Halbebene, so liegen innerhalb derselben auch sämmtliche Wurzelpunkte der Ableitung f'(s) — mit Ausnahme der in die vielfachen Verschwindungspunkte von f(s) auf der Geraden fallenden.

Als Grenze einer Halbebene, in welcher sich alle Wurzelpunkte von f(z) befinden, kann man aber jede Seite des Wurzelpolygons von f(z) ansehen, und es ergiebt sich somit auch hier der weiter oben ausgesprochene Satz. Für die Function

$$\prod_{1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) e^{\frac{z}{a_n} + \frac{z^2}{2a_n^2} + \dots + \frac{z^k}{k a_n^k}}$$

ist der Beweis mutatis mutandis derselbe. Bei ungeradem k = 2m + 1 hat man wieder die Summe: $\sum \left(\frac{1}{a^{2m}(a_2 - z)} - \frac{1}{a^{2m+1}}\right)$

zu betrachten.

Nimmt man statt der ganzen transcendenten Function ein Polynom n^{ten} Grades, so ist das Wurzelpolygon im Endlichen geschlossen; der Satz bleibt ersichtlich bestehen, gestattet aber hier noch eine Umkehrung. Wenn die Wurzelpunkte der Ableitung nicht alle auf einer Geraden liegen, so muss auch f(s) ein wirkliches Wurzelpolygon besitzen, welches mithin wenigstens ein Dreieck ist. Wir haben also die Umkehrung:

Im Innern des Wurzelpolygons der Ableitung eines Polynoms n^{ten} Grades f(x) liegen höchstens (n-3) Wurzelpunkte von f(x).

Durch das Auftreten von vielfachen Ecken wird diese obere Grenzenoch reducirt.

^{*} Im Wesentlichen findet sich dieser Satz schon bei Herrn Laguerre a. a. O. S. 250. Etwas anders giebt Herr Berloty den Beweis: C. B. Nr. 18, 3. Nov. 1884. t. XCIX p. 745-747, Sur les équations alg.; nur ist die Fassung des Satzes nicht correct, dass die Wurzelpunkte auch auf dem Perimeter des Polygons (polygons des racines) liegen können, was bei einer algebraischen Gleichung unmöglich ist. Dres den, April 1885.

Auf eine Strecke $\frac{1}{a_n^{2m}(a_n-s)}$ folgt dann die positive oder negative, der reellen Axe parallele Strecke $-\frac{1}{a_n^{2m+1}}$, so dass man einen Linienzug erhält, der sich nicht durchsetzt und auch nicht schliesst; denn die Strecken $\frac{1}{a^{2m}(a_n-s)}$ vollführen wieder höchstens eine Drehung um π , so dass jede der Parallelen $-\frac{1}{a_n^{2m+1}}$ weiter von der reellen Axe abliegt, als alle vorber construirten. Es ergiebt sich mithin der Satz:*

Besitzt die ganze transcendente Function:

$$f(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) e^{\frac{z}{a_n} + \frac{z^2}{2a_n^2} + \dots + \frac{z^k}{k a_n^k}}$$

nur reelle Wurzelpunkte, so verschwindet auch ihre Ableitung nur auf der reellen Axe.

Einen rein algebraischen Beweis statt des geometrischen kann man mit Hilfe einer Betrachtungsweise führen, welche von F. Chio herrührt und schon häufig zur Ableitung verwandter Sätze benutzt wurde.**

Wir nehmen dazu von den Wurzeln

der Gleichung

$$a_n = \alpha_n + i\beta_n$$

$$f(s) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{s}{a_n} \right) = 0$$

an, dass die Coefficienten von i sämmtlich positiv oder wenigstens nicht alle Null sind, keiner aber negativ ist. Dann sind für die Ableitung alle $\beta > 0$ — wenn man von den in die mehrfachen reellen Wurzelpunkte von f(s) fallenden Verschwindungspunkten absieht.

Durch die Gleichung

$$f'(z) = -f(z) \sum_{\alpha = -z} \frac{1}{\alpha - z}$$

whilt man, dass f'(s) in einem k-fachen Wurzelpunkte von f(s) (k-1)mal verschwindet. Aus einer Wurzel

$$s = \alpha - i\beta \quad (\beta > 0)$$

wirde nun folgen

$$\sum_{\alpha, \alpha, \beta} \frac{1}{(\alpha_n - \alpha) + i(\beta_n + \beta)} = \sum_{\alpha, \beta} \frac{\overline{\alpha_n - \alpha} - i\overline{\beta_n + \beta}}{\overline{\alpha_n - \alpha}^2 + \beta_n + \overline{\beta}^2} = 0,$$

also insbesondere

$$\sum \frac{\beta_n + \beta}{\alpha_n - \alpha^2 + \beta_n + \beta^2} = 0.$$

[•] Für k=1 ist der Satz von Herrn Laguerre in den Comptes rendus t, 94
• Seweis gegeben. Ein algebraischer Beweis f
• ite, Cours
Fül à la fac. des sciences de Paris, p. 70.

[&]quot;Hermite, a. a. O.; Laguerr

$$(1-3)+(3-5)+(5-1)\equiv 0$$
, $(1-3)5+(3-5)1+(5-1)3\equiv 0$ die folgende:

Ebenso ist
$$(1-3)(5+2)+(3-5)(1+2)+(5-1)(3+2) \equiv 0.$$

 $(2-4)(6+5)+(4-6)(2+5)+(6-2)(4+5) \equiv 0.$

Wenn man von diesen Identitäten die vorletzte mit (6-4), die letzte mit (1-3) multiplicirt und addirt, so erhält man

$$(3-5)(6-4)(1+2)+(1-3)(6-2)(4+5)$$

$$\equiv (5-1)(4-6)(2+3)+(3-1)(2-4)(6+5).$$

In gleicher Weise ergiebt sich, wenn man die Identitäten

$$(1-3)(5+6) + (3-5)(1+6) + (5-1)(3+6) \equiv 0,$$

 $(2-4)(6+3) + (4-6)(2+3) + (6-2)(4+3) \equiv 0$

der Reihe nach mit (2-4) und (1-5) multiplicirt und addirt.

$$(5-1)(4-6)(2+3) + (3-1)(2-4)(6+5)$$

$$\equiv (2-4)(3-5)(1+6) + (1-5)(6-2)(4+3).$$

Daher hat man

$$(3-5)(6-4)(1+2) + (1-3)(6-2)(4+5)$$

$$\equiv (5-1)(4-6)(2+3) + (3-1)(2-4)(6+5)$$

$$\equiv (2-4)(3-5)(1+6) + (1-5)(6-2)(4+3).$$

Wenn man die Identitäten

 $(1-3)5+(3-5)1+(5-1)3\equiv 0$, $(2-4)6+(4-6)2+(6-2)4\equiv 0$ zuerst nach einander mit (6-4)2 und (1-3)5 und dann mit (2-6)4 und (3-5)1 multiplicirt und dann addirt, so erhält man

III)
$$(3-5)(6-4)12 + (1-3)(6-2)45$$

$$\equiv (5-1)(4-6)23 + (3-1)(2-4)56$$

$$\equiv (1-5)(6-2)34 + (3-5)(2-4)61.$$

Setzt man nun zur Abkürzung

$$m_{13} \equiv (3-5)(6-4)$$
. $m_{45} \equiv (1-3)(6-2)$, $m_{23} \equiv (5-1)(4-6)$, $m_{56} \equiv (3-1)(2-4)$, $m_{34} \equiv (1-5)(6-2)$, $m_{61} \equiv (2-4)(3-5)$,

so hat man aus I), II) und III)

3. Ersetzt man hierin 1, 2, ... durch die gleichbezifferten 1, so erkennt man die Identitäten

$$\mathfrak{T} \equiv m_{12} T_{12} + m_{45} T_{45} \equiv m_{25} T_{23} + m_{56} T_{56} \equiv m_{34} T_{34} + m_{61} T_{61}$$

Hierin ist der Beweis des Pascal'schen Satzes enthalten; wenn man die Multiplicationen ausführt und alsdann λ durch $\lambda:\mu$ ersetzt und λ_i und μ_i durch i und i' andeutet, so erhält man für die Pascal'sche Gerade die Gleichung

¥.

$$\mathfrak{X} = (1'2'3'4'56 - 2'3'4'5'61 + 3'4'5'6'12 - 4'5'6'1'23). T_0$$

$$+ [(14' - 41')(253'6' - 2'5'36) + (36' - 3'6)(142'5' - 1'4'23)$$

$$+ (52' - 25')(361'4' - 3'6'14)]. T_1$$

$$+ (12345'6' - 23456'1' + 3456'1'2' - 45612'3'). T_2 = 0.$$

4. Wenn man zwei projective Curvenbüschel hergestellt hat, die eine gegebene Curve C erzeugen, so werden durch dieselben auf C Punktgruppen ausgeschnitten; jede solche Gruppe kann als Vertreter einer bestimmten Zahl 1 angesehen werden, nämlich des Doppelverhältnisses, welches die durch diese Gruppe gehenden Büschelcurven mit drei festen Grundcurven des Büschels bestimmen. Es gelingt alsdann immer, eine Function in der Weise zusammenzusetzen:

$$F_{ik} \equiv F_0 - (\lambda_i + \lambda_k) F_1 + \lambda_i \lambda_k F_2,$$

und zwar so, dass $F_{ik} = 0$ die Gruppen λ_i und λ_k enthält. Man kann alsdann, ganz ähnlich wie beim Pascal'schen Sechseck, von sechs Gruppen $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_6$ ausgehen und die sechs Curven $F_{12}, F_{23}, \ldots, F_{61}$ erzeugen. Die soeben für den Pascal'schen Satz gegebene Ableitung lässt sich dann auf das Curvensechseck anwenden, und man erhält damit den Satz, dass alle Schnittpunkte, welche von den Gegenseiten F_{12} und F_{45} , F_{23} und F_{56} , F_{34} und F_{61} des Curvensechsecks bestimmt werden, auf einer Curve \mathfrak{F} liegen, die, ebenso wie die F_{ik} , alle Punkte enthält, für welche

$$F_0 = F_1 = F_2 = 0.$$

5. Sind T_0 , T_1 , S_0 , S_1 lineare Functionen, also $T_0 - \lambda T_1 = 0$, $S_0 - \lambda S_1 = 0$ entsprechende Strahlen zweier projectiven Büschel, so enthält der Kegelschnitt

$$F_{ik} \equiv T_0 S_0 - (\lambda_i + \lambda_k) T_1 S_0 + \lambda_i \lambda_k T_1 S_1 = 0$$

die Punkte λ_t und λ_k des von den Büscheln erzeugten Kegelschnittes K und die festen Punkte

$$T_0 = T_1 = 0$$
, $S_0 = S_1 = 0$, $T_1 = S_0 = 0$,

von denen die beiden ersten auf K liegen; zwei F_{ik} haben ausser diesen drei Punkten noch einen realen Schnittpunkt. Hieraus folgt: Wird einem Kegelschnitte K ein Sechseck eingeschrieben, dessen Seiten Kegelschnitte sind, die einem Netze angehören, das zwei Träger auf K hat, so liegen die drei Punkte, die durch den Schnitt gegenüberliegender Seiten des Curvensechsecks neu bestimmt werden, auf einem Netzkegelschnitte.

6. Zwei Punkte einer Curve dritter Ordnung C_8 , die mit einem Punkte A der Curve in einer Geraden liegen, sollen als ein Begleiterpaar des A bezeichnet werden. Hat C_3 einen Doppelpunkt Δ , so werden alle Begleitermare des A von Δ aus durch eine quadratische Strahlinvolution projicirt, die mit dem Strahlbüschel A projectiv ist.

Ist T_0 die Tangente in A, wird mit T_1 der T_2 der nach dem Begleiter von A gehende!

die Doppelpunktstangenten, so sind T_1 , T_2 und S_1 , S_2 Paare der Involution Δ und entsprechen den Strahlen T_0 und T_1 ; entsprechende Strahlen von Δ und Strahlenpaare von Δ sind

Der Kegelschnitt $T_0 - \lambda T_1 = 0$, $T_1 T_2 - \lambda S_1 S_2 = 0$. $F_{ik} \equiv T_0 T_2 - (\lambda_i + \lambda_k) T_1 T_2 + \lambda_i \lambda_k S_1 S_2 = 0$

enthält die Punktpaare λ_i und λ_k der C_3 und berührt T_2 im Schnittpunkte mit S_1 und S_2 , d. i. in Δ . Jeder Kegelschnitt, der zwei Begleiterpaare des A und den Doppelpunkt Δ enthält, wird daher in Δ von der Geraden berührt, welche Δ mit dem Begleiter des A verbindet.

Zwei F_{ik} haben ausser Δ noch zwei gemeinsame Punkte. Daher folgt: Wählt man auf einer Curve dritter Ordnung mit Doppelpunkt sechs Begleiterpaare 1, 2, 3, 4, 5, 6 eines Punktes A der Curve und construirt die Kegelschnitte F_{12} , F_{23} , ..., F_{61} , welche zwei benachbarte Begleiterpaare mit dem Doppelpunkte verbinden, so liegen die drei Punktpaare, welche durch die gegenüberliegenden F_{ik} bestimmt werden, auf einem Kegelschnitte, der in Δ mit den F_{ik} eine einfache Berührung hat.

7. Drei Begleiterpaare eines realen Wendepunktes A einer Curve dritter Ordnung sind immer auf einem Kegelschnitte enthalten; daher ist A Träger eines Strahlenbüschels und irgend zwei Begleiterpaare des A sind Träger eines projectiven Kegelschuittbüschels, das mit dem Büschel A zusammen die C_3 erzeugt. Der Wendetangente T_0 in A entspricht ein Kegelschnitt, der aus den beiden durch A gehenden, die Träger enthaltenden Strahlen T_1 und T_2 besteht; dem Strahle T_1 des A entspricht ein Kegelschnitt K_1 , der in den auf T_1 enthaltenen Trägern des Kegelschnittbüschels mit C_3 eine einfache Berührung hat; die Punktpaare der C_3 werden bestimmt durch

$$T_0 - \lambda T_1 = 0, \quad T_1 T_2 - \lambda K_1 = 0.$$

Der Kegelschnitt

$$F_{ik} \equiv T_0 T_2 - (\lambda_i + \lambda_k) T_1 T_2 + \lambda_i \lambda_k K_1 = 0$$

enthält die Punktepaare λ_i und λ_k und das auf T_2 und K_1 enthaltene Begleiterpaar. Daher folgt: Sechs Begleiterpaare λ_1 , ... λ_6 eines Wendepunktes A einer C_3 geben mit einem festen Begleiterpaare zusammen Anlass zur Entstehung von sechs Kegelschnitten F_{12} , F_{23} , ..., F_{6i} ; die drei Punktpaare, die durch den Schnitt der gegenüberliegenden F_{ik} neu bestimmt werden, sind mit dem festen Begleiterpaare zusammen auf einem Kegelschnitte enthalten.

8. Durch ein Kegelschnittbüschel, dessen Träger auf einer C_3 enthalten sind, werden Punktpaare auf C_3 ausgeschnitten, die von einem Punkte der C_3 aus durch ein dem Kegelschnittbüschel projectives Strahlbüschel projecirt werden. Sind

$$T_0 - \lambda T_1 = 0$$
, $K_0 - \lambda K_1 = 0$

Gleichungen entsprechender Strahlen und Kegelschnitte, so enthält die Curve dritter Ordnung

$$F_{ik} \equiv T_0 K_0 - (\lambda_i + \lambda_k) T_1 K_0 + \lambda_i \lambda_k T_1 K_1 = 0$$

die Punktpaare λ_i und λ_k der C_2 , sowie die sieben festen Punkte

$$T_0 = T_1 = 0$$
, $K_0 = K_1 = 0$, $K_0 = T_1 = 0$,

von denen die beiden ersten Gruppen von zusammen fünf Punkten auf C_3 liegen; die übrigen vier Schnittpunkte von C_3 und F_{ik} sind die Paare λ_i und λ_k . Da die sämmtlichen F_{ik} sieben Punkte gemein haben, so bilden sie ein Netz von doppelt unendlicher Mächtigkeit.

Die drei Paare Schnittpunkte, welche durch die Paare Segenüberliegender Curven

$$F_{12}$$
 und F_{45} , F_{23} und F_{56} , F_{34} und F_{61}

en bestimmt werden, liegen auf einer Curve des Netzes.

9. Ein Strahlbüschel und eine projective cubische Involution

$$T_0 - \lambda T_1 = 0$$
, $T_1 T_2 T_3 - \lambda V_1 V_2 V_3 = 0$

Lestimmen Punkttripel einer Curve vierter Ordnung; dieselbe hat den Träger des Büschels zum einfachen Punkte und den Strahl T_0 des Büschels zur Tangente; der Träger Δ der Involution ist dreifacher Punkt der Curve; T_1 und T_3 verbinden Δ mit den Punkten. welche T_0 ausser A noch mit der C_4 gemein hat; V_1 , V_2 und V_3 sind die Tangenten in Δ . Die Curve dritter Ordnung

$$F_{ik} \equiv T_0 T_2 T_3 - (\lambda_i + \lambda_k) T_1 T_2 T_3 + \lambda_i \lambda_k V_1 V_2 V_3 = 0$$

enthalt die beiden Tripel λ_i und λ_k , sowie die festen Punkte $T_1 T_2 = V_1 V_2 V_3 = 0$, hat also Δ zum Doppelpunkte, T_1 und T_2 zu Tangenten in Δ . Beiden sechs Curven F_{12} , F_{23} , F_{34} , F_{45} , F_{56} , F_{61}

haben die gegenüberliegenden ausser dem sechs einfache Schnittpunkte ersetzenden Punkte Δ noch je drei Schnittpunkte, und diese neun Punkte liegen auf einer Curve dritter Ordnung, welche Δ zum Doppelpunkte und T_1 und T_2 zu Doppelpunktstangenten hat.

10. Zwei projective Kegelschnittbüschel

$$K_0 - \lambda K_1 = 0$$
, $L_0 - \lambda L_1 = 0$

erzeugen eine Curve vierter Ordnung, welche die acht Träger der Büschel enthält, und zwar als einfache Punkte, ausser wenn die Büschel einen oder mehr Träger gemein haben. Die Curve vierter Ordnung

$$F_{ik} \equiv K_0 L_0 - (\lambda_i + \lambda_k) K_1 L_0 + \lambda_i \lambda_k K_1 L_1 = 0$$

enthalt die Quadrupel λ_i und λ_k der C_{λ} und die zwölf festen Punkte

$$K_0 = K_1 = 0$$
, $L_0 = L_1 = 0$, $K_1 = L_0 = 0$.

Deler bilden die sämmtlichen $F_{\ell k}$ ein Netz.

Man erhält nun: Die drei Quadrupel, welche von je zwei gegenüberliegenden der sechs Curven

$$F_{12}, F_{23}, F_{34}, F_{45}, F_{56}, F_{61}$$

bestimmt werden, sind auf einer Curve des Netzes enthalten.

11. In dem Aufsatze: "Das Imaginäre in der Geometrie und das Rechnen mit Würfen" (Math. Ann. Bd. VIII, 1875) beweist Lüroth für die geometrisch definirten Begriffe der Summe und des Productes von Würfen auf Kegelschnitten die Giltigkeit der Sätze

$$a+b+c=a+c+b$$
, $abc=acb$

mit Hilfe des Pascal'schen Satzes. Sehr einfach ist das umgekehrte Verfahren, auf analytisch-geometrischem Wege reale (und imaginäre) Zahlen durch Punkte eines Kegelschnittes darzustellen; alsdann erscheint der Pascal'sche Satz als der geometrische Ausdruck der beiden arithmetischen Fundamentalsätze.

Hat man auf einem Kegelschnitte K die Punkte 0, a, b, c (d. i. die diese realen Zahlen repräsentirenden. vergl. Nr. 1), und ist T_2 die Tangente im Punkte ∞ , so erhält man die Punkte a+b, a+c, wenn man die Spuren der Geraden a, b und a, c auf T_2 von 0 aus auf K projicirt. Die beiden Geraden. welche c mit a+b und b mit a+c verbinden, treffen T_2 in demselben Punkte, weil a+b+c=a+c+b. Dies ist aber der Pascal'sche Satz, nämlich für das Sechseck a, b, a+c, b, c.

Ist ferner T_1 die Gerade, welche die Punkte 0 und ∞ verbindet, und projicirt man die Spuren der Geraden a, b und a, c auf der Geraden T_1 vom Punkte 1 aus auf die Curve, so erhält man die Punkte a.b und a.c; verbindet man diese der Reihe nach mit c und b, so schneiden sich diese Geraden auf T_1 , weil a.b.c=a.c.b. Auch hier hat man den Pascalschen Satz vor sich, nämlich für das Sechseck a, b, a.c, 1.a.b, c.

Derselbe Gedankengang bleibt verwendbar, wenn die Pascal'sche Gerade weder zwei reale zusammenfallende Punkte enthält, wie T_2 , noch zwei reale getrennte, wie T_1 .

12. Hat die Gerade T_1 mit dem Kegelschnitte zwei conjugirt complexe Schnittpunkte, so sind auch die Curventangenten in denselben conjugirt complex; haben dieselben die Gleichungen $U \pm iV = 0$, so ist die Gleichung der Curve $T_1^2 - U^2 - V^2 = 0;$

in der That hat jede der Geraden $U \pm iV = 0$ mit der Curve zwei zusammenfallende, auf T_1 liegende Punkte gemein. Setzt man, wie früher.

$$T_0 = U + iV$$
, $T_1 = U - iV$.

und ist

so haben die entsprechenden imaginären Strahlen der beiden Strahlbüschel $T_0 - \lambda T_1 = 0$, $T_1 - \lambda T_2 = 0$

einen realen Schnittpunkt, wenn für die Coordinaten desselben und für μ und ν die Gleichungen erfüllt sind, welche durch Sonderung des Realen und Imaginären aus

$$U+iV-(\mu+i\nu)T_1=0$$
 und $T_1-(\mu+i\nu)(U-iV)=0$

hervorgehen, nämlich

$$U - \mu T_1 = 0$$
, $V - \nu T_1 = 0$, $T_1 - \mu U - \nu V = 0$, $\nu U - \mu V = 0$.

Die letzte folgt ohne Weiteres aus den beiden ersten, und die dritte geht aus den beiden ersten hervor, wenn man in der Curvengleichung

$$T_1^2 - U^2 - V^2 = 0$$

durch T_1 dividirt und die Quotienten $U:T_1$ und $V:T_1$ durch μ und ν ersetzt. Es bleiben daher nur die ersten zwei Gleichungen übrig; dieselben liefern für gegebene Werthe von x und y die zugehörigen Werthe von μ und ν ; sie zeigen also, welche complexe Zahl $\lambda \equiv \mu + i\nu$ durch jeden realen Punkt des K repräsentirt wird, wenn man die auf T_1 gelegenen imaginären Curvenpunkte als Repräsentanten der realen Zahlen 0 und ∞ annimmt.

Die Gleichung

$$T_0 - (\lambda_i + \lambda_k) T_1 + \lambda_i \lambda_k T_2 = 0$$

der Geraden $\lambda_i \lambda_k$ tritt zwar, wenn λ_i und λ_k die complexen Argumente zweier auf dem Kegelschnitt enthaltenen realen Punkte sind, in complexer Form auf; man überzeugt sich aber leicht, dass es die Gleichung einer realen Geraden ist.

Zum Beweise des Pascal'schen Satzes kann man in diesem Falle den Kinheitspunkt nicht verwenden; man kommt aber ebenso leicht folgendermassen zum Ziele: Wenn ABCDEF ein Kegelschnittsechseck ist und die Gerade mit T_1 bezeichnet wird, auf welcher die Schnittpunkte von AF und CD, sowie von AB und DE liegen, so ordne man die Kegelschnittpunkte in der angegebenen Weise realen oder complexen Parametern zu, so dass die realen oder complexen Schnittpunkte der Curve und der T_1 die Parameter 0 und ∞ erhalten; werden alsdann die Parameter von ABFD der Reihe nach mit α , β , γ , δ bezeichnet, so haben nach der Voraussetzung E und E die Parameter E und E die Parameter E und E die Voraussetzung E and E sowie die von E und E soch auf E schneiden.*

13. Die letzteren Betrachtungen können auf Raumcurven dritter Ordnung übertragen werden. Sind T_0 , T_3 Osculationsebenen einer R_3 in den Punkten P_0 und P_3 , sind ferner T_1 und T_2 die Ebenen, welche P_3 bez. P_0 mit der Tangente in P_0 bez. P_3 verbinden, so sind die Punkte R_3 durch entsprechende Ebenen

1)
$$T_0 - \lambda T_1 = 0$$
, $T_1 - \lambda T_2 = 0$, $T_2 - \lambda T_3 = 0$

Vergl. Kotanyi, Constr. algebr. Ausdrücke mit Hilfe von Involutional Legischnitten, diese Zeitschr. Bd. XXVII S. 248, 1882.

dreier projectiven Ebenenbüschel bestimmt. Sind P_1 und P_3 real, so wird durch 1. jedem realen Curvenpunkte ein realer Parameter λ zugeordnet; ist dagegen P_0P_3 eine imaginäre Secante der R_3 , so sind P_0 und P_3 und damit auch P_0 und P_3 , sowie P_1 und P_3 conjugirt complex. Setzt man

$$T_0 = U_0 + iV_0$$
, $T_1 = U_1 + iV_1$, $T_2 = U_1 - iV_1$, $T_3 = U_0 - iV_0$,

so hat man für die Gleichungen entsprechender Ebenen

$$\begin{split} &U_0 + i V_0 - \lambda (U_1 + i V_1) = 0, \\ &U_1 + i V_1 - \lambda (U_1 - i V_1) = 0, \\ &U_1 - i V_1 - \lambda (U_0 - i V_0) = 0. \end{split}$$

Diesen drei Gleichungen genügt ein realer Punkt unter Bedingungen, die sich durch Elimination von λ aus je zweien dieser Gleichungen und Sonderung des Realen und Imaginären ergeben. Man erhält so die drei Gleichungen $U^2 - V^2 + V^2 - V^2 = 0$

$$U_0^2 - U_1^2 + V_0^2 - V_1^2 = 0,$$

$$U_0 V_1 - U_1 V_0 + 2 U_1 V_1 = 0,$$

$$U_0 U_1 + V_0 V_1 - U_1^2 + V_1^2 = 0.$$

Die beiden letzten lassen folgende Schreibweise zu:

$$V_1(U_0+U_1)-U_1(V_0-V_1)=0$$
, $V_1(V_0+V_1)+U_1(U_0-U_1)=0$.

Die zugehörigen Flächen zweiter Ordnung haben daher die Gerade $V_1 = U_1 = 0$ gemein. Für alle Punkte, welche beiden Flächen gemeinsam und nicht auf $V_1 = U_1 = 0$ enthalten sind, besteht die Gleichung

$$\begin{vmatrix} (U_0 + U_1) & -(V_0 - V_1) \\ (V_0 + V_1) & (U_0 - U_1) \end{vmatrix} = 0;$$

dies ist die erste der obigen drei Gleichungen. Aus den Coordinaten eines realen Curvenpunktes erhält man für den Parameter λ die drei gleichbedeutenden Formen

$$\lambda = \frac{U_0 + i V_0}{U_1 + i V_1} = \frac{U_1 + i V_1}{U_1 - i V_1} = \frac{U_1 - i V_1}{U_0 - i V_0}$$

Die Secante A, A, liegt bekanntlich in den Ebenen

$$T_0 - (\lambda_1 + \lambda_2) T_1 + \lambda_1 \lambda_2 T_2 = 0, \quad T_1 - (\lambda_1 + \lambda_2) T_2 + \lambda_1 \lambda_2 T_3 = 0;$$
die Ebene $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$ hat die Gleichung

$$T_0-\left(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3\right)T_1+\left(\lambda_1\lambda_2+\lambda_2\lambda_3+\lambda_3\lambda_1\right)T_2-\lambda_1\lambda_2\lambda_3\ T_3=0.$$

14. Haben die Parameter α und β zweier Punkte ein constantes Product p, so gelten für die Secante dieser Punkte die Gleichungen

$$T_0 - (\alpha + \beta) T_1 + p T_2 = 0$$
, $T_1 - (\alpha + \beta) T_2 + p T_3 = 0$.

Eliminirt man $\alpha + \beta$, so erhält man

$$T_0 T_2 - T_1^2 - p (T_3 T_1 - T_2^2) = 0.$$

Daher folgt: Die Secanten einer R_3 , welche Punkte der R_3 verbinden, die ein constantes Product haben, erfüllen eine Regelfläche zweiter Ordnung, welche R_3 und die Secante 0∞ enthält (vergl. Nr. 16).

15. Haben die Parameter α , β , γ dreier Punkte das Product p, so hat die Ebene dieser Punkte die Gleichung

$$T_0 - (\alpha + \beta + \gamma) T_1 + (\alpha \beta + \alpha \gamma + \gamma \beta) T_2 - p T_3 = 0;$$

dieselbe enthält den Punkt der Ebenen

$$T_0 - p T_3 = T_1 = T_2 = 0.$$

Hieraus folgt: Die Ebenen, welche Punkte verbinden, die ein constantes Product haben, treffen die Secante 0∞ in einem festen Punkte.

Ein Tetraeder sei einer R_3 eingeschrieben und werde von einer Secante s der Curve durchsetzt.

Man ertheile den realen oder imaginären auf der Secante enthaltenen Curvenpunkten die Parameterwerthe 0 und ∞ und richte nun in der angegebenen Weise eine Parametervertheilung auf der Curve ein; dabei mögen die Eckpunkte des Tetraeders die Parameter α , β , γ , δ erhalten. Durch die Spuren der Tetraederebenen $\beta \gamma \delta$, $\gamma \delta \alpha$, $\delta \alpha \beta$, $\alpha \beta \gamma$ auf s und durch die Secante t der beliebig gewählten realen oder conjugirt complexen Curvenpunkte $s \zeta$ lege man Ebenen und erhalte dadurch auf der R_3 der Reihe nach die Punkte α' , β' , γ' , δ' . Alsdann hat man die gleichen Producte

$$\alpha' \epsilon \zeta = \beta \gamma \delta, \quad \beta' \epsilon \zeta = \alpha \gamma \delta, \quad \gamma' \epsilon \zeta = \alpha \beta \delta, \quad \delta' \epsilon \zeta = \alpha \beta \gamma.$$
 Hieraus folgt
$$\alpha \alpha' = \beta \beta' = \gamma \gamma' = \delta \delta'.$$

Dies ergiebt den Satz: Wenn man die Spuren, welche eine Secante s einer R_3 auf den Flächen eines eingeschriebenen Tetraeders erzeugt, von einer andern Secante t aus auf die Curve projicirt, so sind die Geraden, welche diese Projectionen mit den gegenüberliegenden Tetraederecken verbinden, mit s auf einer Regelfläche zweiter Ordnung enthalten.

16. Secanten einer R_3 . welche Punktpaare einer Involution enthalten, erfüllen eine Regelfläche zweiter Ordnung F_2 .*

Denn aus den Gleichungen

$$a - b \cdot (\lambda_1 + \lambda_2) + c \cdot \lambda_1 \lambda_2 = 0,$$

$$T_0 - T_1 \cdot (\lambda_1 + \lambda_2) + T_2 \cdot \lambda_1 \lambda_2 = 0,$$

$$T_1 - T_2 \cdot (\lambda_1 + \lambda_2) + T_3 \cdot \lambda_1 \lambda_2 = 0$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ T_0 & T_1 & T_2 \end{vmatrix} = 0;$$

$$T_1 - T_2 \cdot T_3$$

die drei Plächen

^{*} Schröter, Theorie der Oberflächen zweiter Ordnung, Leipzig 1890, 8. 235.

$$\begin{vmatrix} T_0 & T_1 \\ T_1 & T_2 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} T_1 & T_2 \\ T_2 & T_3 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} T_2 & T_0 \\ T_3 & T_1 \end{vmatrix} = 0$$

enthalten die R_3 .

Umgekehrt: Die Secanten einer R_3 , welche auf einer die R_3 enthaltenden F_2 liegen, bestimmen auf R_3 die Punktpaare einer Involution.

Denn jede die R_3 enthaltende F_2 hat eine Gleichung von der Form 1). Sind λ_1 und λ_2 die Parameter zweier Punkte auf R_3 , welche eine auf F_2 enthaltene Secante s bestimmen, so gelten für jeden Punkt von s ausser 1) noch die Gleichungen

2) $T_0 - (\lambda_1 + \lambda_2) T_1 + \lambda_1 \lambda_2 T_2 = 0$, $T_1 - (\lambda_1 + \lambda_2) T_2 + \lambda_1 \lambda_2 T_3 = 0$. Multiplicirt man in 1) die zweite und dritte Columne mit $-(\lambda_1 + \lambda_2)$ und $\lambda_1 \lambda_2$ und addirt dieselben dann zur ersten, so folgt unter Rücksicht auf 2) $a - b(\lambda_1 + \lambda_2) + c \lambda_1 \lambda_2 = 0$.

17. Den Identitäten Nr. 2, IV) kann man den Satz entnehmen: Die drei Involutionen, welche durch die Elementenpaare

 $\lambda_1 \lambda_2$ und $\lambda_4 \lambda_5$, $\lambda_2 \lambda_3$ und $\lambda_5 \lambda_6$, $\lambda_3 \lambda_4$ und $\lambda_6 \lambda_1$ bestimmt sind, haben ein gemeinsames (reales oder complexes) Paar. Bezeichnet man die Zahlen dieses Paares mit μ und μ' , so erfordert der Satz, dass sich die Zahlen a, b, c; a₁, b₁, c₁; a₂, b₃, c₃ so bestimmen lassen, dass folgende drei Systeme erfüllt sind:

1)
$$\begin{cases} a - b (\mu + \mu') + c \mu \mu' = 0, \\ a - b (\lambda_1 + \lambda_2) + c \lambda_1 \lambda_2 = 0, \\ a - b (\lambda_4 + \lambda_5) + c \lambda_4 \lambda_5 = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 - b_1 (\mu + \mu') + c_1 \mu \mu' = 0, \\ a_1 - b_1 (\lambda_2 + \lambda_3) + c_1 \lambda_2 \lambda_3 = 0, \\ a_1 - b_1 (\lambda_5 + \lambda_6) + c_1 \lambda_5 \lambda_6 = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_2 - b_2 (\mu + \mu') + c_2 \mu \mu' = 0, \\ a_2 - b_2 (\lambda_5 + \lambda_4) + c_2 \lambda_5 \lambda_4 = 0, \\ a_3 - b_3 (\lambda_6 + \lambda_1) + c_3 \lambda_6 \lambda_1 = 0. \end{cases}$$

Setzt man nun

 $m_{12} + m_{45} = m_{23} + m_{56} = m_{34} + m_{61}$ $A_1 \equiv (1+2) m_{12} + (4+5) m_{45} = (2+3) m_{23} + (5+6) m_{56} = (3+4) m_{34} + (6+1) m_{61},$ $\Delta_2 \equiv 12 m_{12} + 45 m_{45} = 23 m_{23} + 56 m_{56} = 34 m_{34} + 61 m_{61}$ so erkennt man, dass den Systemen 1), 2), 3) durch die Annahme genügt wird:

 $1: (\mu + \mu'): \mu \mu' = \Lambda_0: \Lambda_1: \Lambda_2.$

18. Der letzte Satz in Verbindung mit dem vorletzten ergiebt sofort: Die drei Flächen zweiter Ordnung, welche durch die Paare Gegenseiten eines unebenen Sechsecks und die demselben umgeschriebene R_s bestimmt sind, haben eine Secante der R_s gemein (bilden also ein Flächenbüschel).

19. Die Gleichung der Fläche, welche eine Secante einer R_3 beschreibt, wenn sie sich entlang einer Geraden P_1P_2 bewegt, kann auf folgendem Wege gewonnen werden.

Bezeichnet T_{ik} den Werth, welchen T_i für die homogenen Coordinaten eines Punktes P_k annimmt, so liegt der Punkt P_i , für den

$$x_k = \frac{\mu_1 x_{k_1} + \mu_2 x_{k_2}}{\mu_1 + \mu_2},$$

auf der Secante 1, 1, wenn die Gleichungen erfüllt sind

$$\begin{array}{l} \mu_1 \left[T_{01} - \left(\lambda_1 + \lambda_2 \right) T_{11} + \lambda_1 \lambda_2 T_{21} \right] + \mu_2 \left[T_{02} - \left(\lambda_1 + \lambda_2 \right) T_{12} + \lambda_1 \lambda_2 T_{22} \right] = 0, \\ \mu_1 \left[T_{11} - \left(\lambda_1 + \lambda_2 \right) T_{21} + \lambda_1 \lambda_2 T_{31} \right] + \mu_2 \left[T_{12} - \left(\lambda_1 + \lambda_2 \right) T_{22} + \lambda_1 \lambda_2 T_{32} \right] = 0. \end{array}$$

Hieraus folgt die gesuchte Gleichung durch Elimination von μ_1 und μ_2 zu

1)
$$\begin{vmatrix} T_{01} - (\lambda_1 + \lambda_2) T_{11} + \lambda_1 \lambda_2 T_{21} & T_{02} - (\lambda_1 + \lambda_2) T_{12} + \lambda_1 \lambda_2 T_{22} \\ T_{11} - (\lambda_1 + \lambda_2) T_{21} + \lambda_1 \lambda_2 T_{31} & T_{12} - (\lambda_1 + \lambda_2) T_{22} + \lambda_1 \lambda_2 T_{32} \end{vmatrix} = 0.$$

Aus den Gleichungen der Secante

$$T_0 - (\lambda_1 + \lambda_2) T_1 + \lambda_1 \lambda_2 T_2 = 0$$
, $T_1 - (\lambda_1 + \lambda_2) T_2 + \lambda_1 \lambda_2 T_3 = 0$ folgen die Verhältnisse

2)
$$1: (\lambda_1 + \lambda_2): \lambda_1 \lambda_2 = \begin{vmatrix} T_1 & T_2 \\ T_2 & T_3 \end{vmatrix}: - \begin{vmatrix} T_2 & T_0 \\ T_1 & T_3 \end{vmatrix}: \begin{vmatrix} T_0 & T_1 \\ T_1 & T_2 \end{vmatrix}.$$

Wird dies in 1) substituirt, so ergiebt sich die gesuchte Flächengleichung. Sie ist vom vierten Grade. Liegt P_1 auf R_3 , so zerfällt die Fläche in den Kegel zweiter Ordnung, der R_3 von P_1 aus projieirt, und die durch R_3 und P_1 P_2 bestimmte Fläche zweiter Ordnung; liegen P_1 und P_2 auf R_3 , so besteht die Fläche aus den beiden Kegeln, welche die R_3 von P_1 und P_2 aus projiciren.

Die Secanten, welche zwei Gerade P_1P_2 und P_3P_4 treffen, ermittelt man, indem man zu 1) noch die Gleichung fügt, die aus 1) hervorgeht, wenn P_1 und P_2 gegen P_3 und P_4 vertauscht werden. Für die Unbekannten $\lambda_1 + \lambda_2$ und $\lambda_1 \lambda_2$ erhält man so zwei quadratische Gleichungen: zu jedem der vier Wurzelsysteme gehört eine Secante der R_3 . Daher folgt: Zwei Gerade werden von vier Secanten einer R_3 getroffen.

20. Das Achteck 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (wobei die Ziffern statt gleichbezifferter λ stehen) sei einer R_3 eingeschrieben. Die Gegenebenen 123 und 567 bestimmen eine Gerade a, die Gegenebenen 234 und 678 bestimmen eine zweite Gerade b. Diese Geraden werden von den Secanten 23 und 67 getroffen, begegnen also ausserdem noch zwei Secanten der R_3 . Eine derselben sei als Träger der Punkte 0 und ∞ gewählt. Nach Feststall (willkriehen) Einheitspunktes ist alsdann jedem Pu

gewiesen, und diese Parameter seien durch die Ziffern 1...8 bezeichnet. Dann gelten, weil 0∞ die Geraden 123, 567 und 234, 678 trifft (Nr. 15), die Gleichungen der Producte

$$1.2.3 = 5.6.7$$
, $2.3.4 = 6.7.8$.

Hieraus folgt

$$1.8 = 4.5$$
.

In Rücksicht auf Nr. 14 folgt daher:

Construirt man die beiden Schnittlinien von zwei Paaren Gegenebenen eines einer R_3 eingeschriebenen Achtecks, sowie die beiden Secanten der R_3 , welche diese Geraden treffen und nicht zugleich Seiten des Achtecks sind, so liegen diese beiden Secanten mit den auf den construirten Gegenebenen nicht enthaltenen beiden Seiten des Achtecks auf einer die R_3 enthaltenden Fläche zweiter Ordnung.

Kleinere Mittheilungen.

XVI. Ueber einen von Steiner entdeckten Satz und einige verwandte Eigenschaften der Flächen zweiter Ordnung.

Der Satz, welchen ich beweisen will, wurde von Steiner Bd. XXXI S. 90 des Crelle'schen Journals gegeben; von demselben kenne ich keinen Beweis und ich halte es daher nicht für unnöthig, die folgenden Zeilen zu veröffentlichen.

Der Gedankengang, welcher mich zu dem obengenannten Lehrsatze führte, zeigt die Verbindung desselben mit den Resultaten neuerer Untersuchungen über die Invarianteneigenschaften einiger algebraischen Formen gegen gewisse specielle lineare Transformationen und der entsprechenden geometrischen Figuren. Derselbe Gedanke hat mich auch zu einigen verwandten Sätzen geführt, die mir bemerkenswerth scheinen und welche theils Chasles angehören, theils neu sind; sie können als ein Beitrag zum Studium der metrischen Invarianten** des von einer Fläche zweiter Ordnung und einem Punkte zusammengesetzten Systems angesehen werden.

§ 1.

Ich führe hier sogleich den folgenden Hilfssatz an, von welchem ich in Nachstehendem mehrmals Gebrauch machen werde:

Ist f(x, y, s) eine algebraische ganze Function der rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes im Raume, und führt man eine Coordinatentransformation aus, bei welcher der Anfangspunkt fest bleibt, so behält nicht nur die gegebene Function selbst, sondern auch jede der folgenden Functionen:

$$\Delta_1 f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2}, \quad \Delta_2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

ihren Werth für jeden beliebigen Punkt bei.

Der Fall, auf welchen wir diesen Satz anwenden wollen, ist derjenige, wo

1)
$$f(x, y, s) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{23}yz + 2a_{31}zx + 2a_{12}xy + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} \quad (a_{ik} = a_{ki})$$

ist; setzt man der Kürze halber

^{*} Vergl. Jacob Steiner's Gesammelte Werke, II. Bd., 1882, S. 357.

Siehe: Elling Holst, Ein Paar synthetischer Methoden in der metrischen Geometrie mit Anwendungen. Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Sivende Bind. 1882, S. 240 flgg.

Lamé, Leçons sur les coordonnées curvilignes, Paris 1859, S. 6. Die Functiones $\Delta_1 f$ und $\Delta_2 f$ sind die Differential parameter der Function f.

2)
$$\begin{cases} f_1 = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}, \\ f_2 = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}, \\ f_3 = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34}, \\ f_4 = a_{41}x + a_{42}y + a_{43}z + a_{44}, \end{cases}$$

so wird man finden, dass für eine orthogonale Substitution die Functionen

3)
$$\Delta_1 f = 2\sqrt{f_1^2 + f_2^2 + f_3^2}, \quad \Delta_2 f = 2(a_{11} + a_{22} + a_{33})$$

ihren Werth beibehalten; insbesondere kann man schliessen, dass die Summe

$$a_{14}^2 + a_{24}^2 + a_{34}^2$$

diese Eigenschaft hat.

Der folgende Satz wird in vorliegender Arbeit keine Anwendung finden; doch werde ich ihn auseinandersetzen, da er bemerkenswerth ist und als eine Verallgemeinerung eines Theiles obigen Hilfssatzes angesehen werden kann.

Sind x, y, s die Cartesischen Coordinaten eines Raumpunktes in Bezug auf ein Coordinatensytem, dessen Axen die Winkel yz, zx, xy zu zweien bilden, und haben f(x, y, s), f_1 , f_2 , f_3 , f_4 die vorhergehenden Bedeutungen, so bleibt der Werth der Function

$$f_4^2 \sin^2 x \, y \, z : \begin{vmatrix} 0 & f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1 & 1 & \cos x \, y & \cos x \, z \\ f_2 & \cos y \, x & 1 & \cos y \, z \\ f_3 & \cos z \, x & \cos z \, y & 1 \end{vmatrix} *$$

bei allen Coordinatentransformationen unverändert.

In der That, geben wir diesem Ausdrucke das entgegengesetzte Zeichen, so ei halten wir das Quadrat der Entfernung des Punktes (x, y, z) von seiner Polarebene in Bezug auf die Fläche zweiter Ordnung f(x, y, z) = 0, und da dieses vom Coordinatensystem unabhängig ist, so schliesst man den Lehrsatz.

Setzt man insbesondere voraus, dass der betrachtete Punkt der Anfangspunkt sei, und erinnert man sich, dass eine Coordinatentransformation, bei welcher der Anfangspunkt fest bleibt, das constante Glied von f(x, y, z) unverändert lässt, so kann man folgenden Zusatz erhalten:

Führt man eine Coordinatentransformation aus, bei welcher der Anfangspunkt fest bleibt, so behält die Function

ihren Werth bei.

$$sin^2xyz = \begin{vmatrix} 1 & cosxy & cosxz \\ cosyx & 1 & cosyz \\ cosxx & coszy & 1 \end{vmatrix}.$$

^{*} Es ist, wie gewöhnlich:

Sind endlich die Coordinatenaxen rechtwinklig, so wird diese Function $-(a_{14}^2 + a_{24}^2 + a_{34}^2)$; daher kommt man zu einem schon erhaltenen Resultate zurück.

§ 2.

Mit Hilfe des angesührten Hilfssatzes ist der fragliche Steiner'sche Satz leicht zu beweisen. Derselbe lautet:

Wird eine gegebene Fläche F zweiter Ordnung auf ein rechtwinkliges Coordinatensystem XYZ bezogen, dessen Anfangspunkt A beliebig liegt, so entstehen in jeder $Axe\ X,\ Y,\ Z$ zwei Abschnitte, die beziehentlich durch x_1 und x_2 , y_1 und y_2 , z_1 und z_2 bezeichnet werden sollen, und ferner drei Abschnitte oder Sehnen zwischen den Schnittpunkten, die α , β , γ heissen mögen. Wird das rechtwinklige Coordinatensystem um den nämlichen festen Anfangspunkt A auf beliebige Art herumbewegt, so bleibt der Ausdruck

$$\frac{a^2}{x_1^2 x_2^2} + \frac{\beta^2}{y_1^2 y_2^2} + \frac{\gamma^2}{z_1^2 z_2^2}$$

constant.*

* Herr Catalan legt in seinem Manuel des candidats à l'école polytechnique (T. II, Paris 1858, S. 38) folgende Aufgabe vor:

"Thé orème. Si l'on désigne par x', x'', y', y'', z', z'' les distances comprises entre le sommet d'un angle trièdre trirectangle et les poits où les arêtes de ce trièdre rencontrent une surface du second ordre, la fonction

$$\frac{(\mathbf{x'}\!+\!\mathbf{x''})^2}{\mathbf{x'}^2\!+\!\mathbf{x''}^2}\!+\!\frac{(\mathbf{y'}\!+\!\mathbf{y''})^2}{\mathbf{v'}^2\!+\!\mathbf{v''}^2}\!+\!\frac{(\mathbf{z'}\!+\!\mathbf{z''})^2}{\mathbf{z'}^2\!+\!\mathbf{z''}^2}$$

est invariable, quelle que soit la position de l'angle trièdre. (Théorème de M. Steiner.)"

Dieser Satz hat einige Aehnlichkeit mit demjenigen, welcher uns jetzt be schäftigt; doch wurde er nie von Steiner ausgesprochen, wie man sich aus seinen "Gesammelten Werken" sehr leicht überzeugen kann. Ueberdies ist er unrichtig: das folgende Raisonnement beweist in der That, dass die Flächen zweiter Ordnung die obige Eigenschaft nicht haben.

Betrachten wir das Trieder in einer gewissen Lage, halten seinen Scheitelpunkt A und eine seiner Kanten, z. B. AZ, fest und lassen es um diese drehen. Die Punkte, in denen AZ die Fläche schneidet, werden auch fest sein, während die Schnittpunkte von AX und AY sich bewegen werden und als die Durchschnitte eines rechten Winkels, welcher sich um A und in der Ebene XAY dreht, mit dem Kegelschnitte, in welchem XAY die gegebene Fläche schneidet, angesehen werden können. Daraus folgt, dass, wenn der Catalan'sche Satz wahr wäre, jeder Kegelschnitt die folgende Eigenschaft haben würde:

"Sind x', x''; y', y'' die Entfernungen der Spitze eines rechten Winkels von den Schnittpunkten seiner Seiten mit einem in derselben Ebene gelegenen Kegelschnitte, so hat die Function $\frac{(x'+x'')^2}{x'^2+x''^2} + \frac{(y'+y'')^2}{y'^2+y''^2}$ einen von der Lage des Winkels unabhängigen Werth."

Seien x, y, z die Coordinaten des Punktes A in einem Coordinatensystem, dessen Axen den Kanten des gegebenen Trieders in seiner ursprünglichen Lage parallel sind; sei f(x, y, z) = 0

die Gleichung der gegebenen Fläche F, wo der Ausdruck von f(x, y, z) aus 1) zu nehmen ist.

Die Abscissen ξ_1 und ξ_2 der Punkte, in welchen die Gerade AX die Fläche F schneidet, werden die Wurzeln der Gleichung

a)
$$a_{11}\xi^2 + 2(a_{12}y + a_{13}z + a_{14})\xi + (a_{22}y^2 + 2a_{23}yz + 2a_{33}z^2 + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44})$$

sein; man hat daher

$$x_1 = x - \xi_1$$
, $x_2 = x - \xi_2$, $\pm \alpha = x_2 - x_1 = \xi_1 - \xi_2$

und folglich

b)
$$x_1 x_2 = x^2 - (\xi_1 + \xi_2) x + \xi_1 \xi_2 = \frac{f(x, y, z)}{a_{11}},$$

$$\alpha^2 = (\xi_1 - \xi_2)^2 = (\xi_1 + \xi_2)^2 - 4 \xi_1 \xi_2$$

$$= \frac{4}{a_{11}^2} \{ (a_{11} x + a_{12} y + a_{13} z + a_{14})^2 - a_{11} f(x, y, z) \},$$

$$\frac{\alpha^2}{x_1^2 x_2^2} = 4 \left\{ \left[\frac{a_{11} x + a_{12} y + a_{13} z + a_{14}}{f(x, y, z)} \right]^2 - \frac{a_{11}}{f(x, y, z)} \right\}.$$

Schreibt man der Kürze wegen f statt f(x, y, z) und bezeichnet die Werthe, welche die Ableitungen von f(x, y, z) im Punkte A annehmen, mit $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial z}$, so erhält man:

4)
$$\begin{cases} \frac{a^{2}}{x_{1}^{2}x_{2}^{2}} = \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^{2}}{f^{2}} - 2\frac{\frac{\partial^{2} f}{\partial x^{2}}}{f} = 4\left\{\frac{f_{1}^{2}}{f^{2}} - \frac{a_{11}}{f}\right\},\\ \text{ebenso:}\\ \frac{\beta^{2}}{y_{1}^{2}y_{2}^{2}} = \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^{2}}{f^{2}} - 2\frac{\frac{\partial^{2} f}{\partial y^{2}}}{f} = 4\left\{\frac{f_{2}^{2}}{f^{2}} - \frac{a_{22}}{f}\right\},\\ \frac{\gamma^{2}}{z_{1}^{2}z_{2}^{2}} = \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^{2}}{f^{2}} - 2\frac{\frac{\partial^{2} f}{\partial z^{2}}}{f} = 4\left\{\frac{f_{3}^{2}}{f^{2}} - \frac{a_{33}}{f}\right\}.\end{cases}$$

Um am leichtesten zu sehen, dass dieser Satz falsch ist, setzen wir den Scheitelpunkt des beweglichen Winkels in eine ausgezeichnete Lage, z.B. in den Brennpunkt des gegebenen Kegelschnittes. Ist

$$\varrho = \frac{a}{1 + e \cos \varphi}$$

die Polargleichung derselben, und betrachtet man den beweglichen Winkel im Augenblicke, wo eine seiner Seiten mit den Axen den Winkel α , die andere den Winkel $\frac{\pi}{\alpha} + \alpha$ bildet, so findet man

$$\frac{(x'+x'')^2}{x'^2+x''^2} + \frac{(y'+y'')^2}{y'^2+y''^2} = 2 \frac{1+e^2}{1+e^2+e^4\sin^2\alpha\cos^2\alpha}$$

und dieser Werth ist von a nicht unabhängig, wie es sein müsste, wonn der Catalan'sche Satz richtig wäre.

Aus diesen drei Gleichungen folgt:

$$\frac{\alpha^2}{{x_1}^2{x_2}^2} + \frac{\beta^2}{{y_1}^2{y_2}^2} + \frac{\gamma^2}{{s_1}^2{s_2}^2} = \left\{ \left(\frac{\varDelta_1 f}{f} \right)^2 - 2 \, \frac{\varDelta_2 f}{f} \right\} \cdot$$

Aus dem schon angeführten Hilfssatze kann man nun schliessen, dass die Grösse zur rechten Hand dieser Gleichung bei einer Drehung des Coordinatensytems um seinen Anfangspunkt ihren Werth beibehält; dasselbe gilt also von der Grösse linker Hand. Und da endlich die Drehung des Coordinatensystems um seinen Anfangspunkt einer Drehung des gegebenen Coordinatensystems um den Punkt A entspricht, und umgekehrt, so ist damit die Wahrheit des Steiner'schen Theorems nachgewiesen.*

Demselben mögen hier folgende Bemerkungen beigefügt werden.

Wenn eine Fläche zweiter Ordnung gegeben ist, so kann man jedem Punkte des Raumes eine bestimmte Zahl beilegen, diejenige nämlich, welche den Werth der Function $\left(\frac{\Delta_1 f}{f}\right)^2 - 2\frac{\Delta_2 f}{f}$ in diesem Punkte ergiebt. Der Ort der Punkte, in welchen diese Function einen gegebenen Werth (-4c) hat, ist die Fläche vierter Ordnung, deren Gleichung

oder

k

$$f_1^2 + f_2^2 + f_3^2 - (a_{11} + a_{22} + a_{33})f + cf^2 = 0$$

$$cf^2 = (a_{11} + a_{22} + a_{33})f - (f_1^2 + f_2^2 + f_3^2)$$

ist. Aus dieser letzteren folgt sogleich **, dass diese Fläche einen Doppelkegelschnitt hat, nämlich denjenigen, in welchem die unendlich ferne Ebene von der Fläche F geschnitten wird. Lässt man c variiren, so erhält man ein ganzes Büschel von Flächen dieser Art, welche die Doppelcurve gemeinsam haben und durch die (imaginäre) Curve vierter Ordnung erster Species gehen, in welcher die gegebene Fläche von dem (imaginären) Quadrikegel

geschnitten wird.

$$f_1^2 + f_2^2 + f_3^2 = 0$$

§ 3.

Setzen wir jetzt voraus, dass die gegebene Fläche einen Mittelpunkt habe und dass man in denselben den Anfangspunkt \boldsymbol{A} des Coordinatensystems lege, so wird man folgende Gleichungen haben:

$$\frac{\alpha^2}{x_1^2x_2^2} + \frac{\beta^2}{y_1^2y_2^2} + \frac{\gamma^2}{x_1^2x_2^2} = 4 \left\{ \frac{a_{14}^2 + a_{24}^2 + a_{34}^2}{a_{14}^2} - \frac{a_{11} + a_{22} + a_{23}}{a_{44}} \right\},$$

deren rechte Seite aus den Functionen:

$$a_{44}$$
, $a_{11} + a_{22} + a_{33}$, $a_{14}^2 + a_{24}^2 + a_{34}^2$

tet ist, deren Invarianz bekannt ist. Analoge Bemerkungen kann * Sätzen machen.

^{*} Will man den Steiner'schen Satz beweisen, ohne Lamé's Hilfssatz zu gebrauchen, so nehme man die Kanten des gegebenen Trieders in seiner ursprünglichen Lage als Coordinatenaxen; man wird dann die Gleichung erhalten:

$$x_1 = -x_2 = \frac{\alpha}{2}$$
, $y_1 = -y_2 = \frac{\beta}{2}$, $z_1 = -z_2 = \frac{\gamma}{2}$

us man schliessen kann, dass

$$\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2}$$

stant ist. Das drückt die bekannte von Chasles entdeckte Eigenschaft aus:

Die Summe der Quadrate der reciproken Werthe irgend reier zu einander rechtwinkligen Durchmesser einer Fläche weiter Ordnung ist constant.*

Es ist bemerkenswerth, dass es ausser dem Steiner'schen noch einen andern Satz giebt, welcher als eine Verallgemeinerung des Chasles'schen Satzes angesehen werden kann. Es ist der folgende:

Wird eine gegebene Fläche zweiter Ordnung auf ein rechtwinkliges Coordinatensystem XYZ bezogen, dessen Anfangspunkt beliebig liegt, so entstehen in jeder Axe XYZ zwei Abschnitte, die beziehentlich durch x_1 und x_2 , y_1 und y_2 , z_1 und z_2 bezeichnet werden sollen. Wird das rechtwinklige Coordinatensystem um den Anfangspunkt auf beliebige Art herumbewegt, so bleibt der Ausdruck

$$\frac{1}{x_1x_2} + \frac{1}{y_1y_2} + \frac{1}{z_1z_2}$$

constant.**

In der That haben wir im vorigen Paragraphen [Gleich. b)] gesehen dass

5)
$$\frac{1}{x_1 x_2} = \frac{a_{11}}{f(x, y, z)}$$
 ist, ebenso $\frac{1}{y_1 y_2} = \frac{a_{11}}{f(x, y, z)}$, $\frac{1}{z_1 z_2} = \frac{a_{11}}{f(x, y, z)}$ und daher
$$\frac{1}{x_1 x_2} + \frac{1}{y_1 y_2} + \frac{1}{z_1 z_2} = \frac{1}{2} \frac{\Delta_{\gamma} f}{f}$$
,

woraus mittels des Hilfssatzes unser Theorem unmittelbar folgt.

Der Ort der Punkte des Raumes, für welche obige Function e gegebenen Werth hat, ist eine Fläche zweiter Ordnung, ähnlich und lich gelegen mit der gegebenen.

[•] Chasles, Propriétés des Diamètres de l'ellipsoïde, Corresp. sur l'Ec. T. III, 1815, S. 305, und Aperçu historique u. s. w., 2. Aufl. 1875, S. 824. — auch: Démonstration de deux théorèmes par un Abonné, Annales de Mathém de M. Gergonne, T. XVIII S. 369.

^{**} Die Function $\frac{1}{\frac{1}{x_1 x_2} + \frac{1}{y_1 y_2} + \frac{1}{z_1 z_2}} = \frac{2f}{\Delta_2 f} \text{ kann wohl die Potenz de}$

ruz in Bezug auf die Fläche F genannt werden; denn wenn F e

§ 4.

Zu einem andern Lehrsatze, welcher, wie die vorigen, von der gegenseitigen Lage eines rechtwinkligen Trieders und einer Fläche zweiter Ordnung handelt, gelangt man mittels folgender Betrachtungen.

Wie gewöhnlich, seien x, y, z die rechtwinkligen Coordinaten eines festen Punktes P, welcher die Spitze eines rechtwinkligen Trieders ist, dessen Kanten den Coordinatenaxen parallel sind; seien noch A_1 , A_2 ; B_1 , B_2 ; C_1 , C_2 die Punkte, in denen die Kanten des Trieders die Fläche schneiden, deren Gleichung

(1)
$$f(x, y, s) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{23}yz + 2a_{31}zx + 2a_{12}xy + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$$

ist; seien endlich ξ_1 , ξ_2 die Werthe der x-Coordinate der Punkte A_1 , A_2 ; η_1 , η_2 die Werthe der y-Coordinate der Punkte B_1 , B_2 ; ζ_1 , ζ_2 die Werthe der x-Coordinate der Punkte C_1 , C_2 . Sehr leicht findet man [vergl. § 2 Gleich. a)]

6)
$$\begin{cases} \xi_1 + \xi_2 = -2 \frac{f_1 - a_{11}x}{a_{11}}, & \xi_1 \xi_2 = \frac{f - 2xf_1 + a_{11}x^2}{a_{11}}; \\ \eta_1 + \eta_2 = -2 \frac{f_2 - a_{22}y}{a_{22}}, & \eta_1 \eta_2 = \frac{f - 2yf_2 + a_{22}y^2}{a_{22}}; \\ \zeta_1 + \zeta_2 = -2 \frac{f_3 - a_{33}z}{a_{33}}, & \zeta_1 \zeta_2 = \frac{f - 2zf_3 - a_{33}z^2}{a_{33}}, \end{cases}$$

wo f, f_1 , f_2 , f_3 , f_4 die Bedeutung haben, welche in § 1 auseinandergesetzt wurde. Da man nun annehmen kann, dass f_1 , f_2 , f_3 , f_4 die Coefficienten der Gleichung der Polarebene π des Punktes P seien, so ist es nicht schwer, die Entfernungen zu finden, welche die Punkte A_1 , A_2 , B_1 , B_2 , C_1 , C_2 von der Ebene π haben. Führt man diese Rechnung aus, so kann man mit leichter Mühe folgende Gleichungen erhalten:

7)
$$\begin{cases} \frac{\overline{A_{1}\pi^{2}}}{\overline{A_{1}P^{2}}} + \frac{\overline{A_{2}\pi^{2}}}{\overline{A_{2}P^{2}}} = 2 \frac{f_{1}^{2} - a_{11}f}{f_{1}^{2} + f_{2}^{2} + f_{3}^{2}}, \\ \frac{\overline{B_{1}\pi^{2}}}{\overline{B_{1}P^{2}}} + \frac{\overline{B_{2}\pi^{2}}}{\overline{B_{2}P^{2}}} = 2 \frac{f_{2}^{2} - a_{22}f}{f_{1}^{2} + f_{2}^{2} + f_{3}^{2}}, \\ \frac{\overline{C_{1}\pi^{2}}}{\overline{C_{1}P^{2}}} + \frac{\overline{C_{2}\pi^{2}}}{\overline{C_{2}P^{2}}} = 2 \frac{f_{3}^{2} - a_{33}f}{f_{1}^{2} + f_{2}^{2} + f_{3}^{2}}, \end{cases}$$

İ

we überhaupt $M\nu$ die Entfernung des Punktes M von der Ebene ν bezeichnet. Hieraus folgt unmittelbar:

$$\frac{\overline{A_1\pi^2}}{\overline{A_1P^2}} + \frac{\overline{A_2\pi^2}}{\overline{A_2P^2}} + \frac{\overline{B_1\pi^2}}{\overline{B_1P^2}} + \frac{\overline{C_1\pi^2}}{\overline{B_2P^2}} + \frac{\overline{C_1\pi^2}}{\overline{C_1P^2}} + \frac{\overline{C_2\pi^2}}{\overline{C_2P^2}} = 2\left\{1 - \frac{2f\Delta_2f}{(\Delta_1f)^2}\right\}.$$

Geht man zu einem andern rechtwinkligen Coordinatensystem, welches deselben Anfangspunkt habe, über, so bleibt der zweite Theil dieser Gleich-

ung unverändert (§ 1); dasselbe kann man daher betreffs des ersten sagen. Andererseits entspricht die Bewegung des Coordinatensystems einer Bewegung des gegebenen Trieders, und umgekehrt. Infolge dessen können wir endlich schliessen:

Ist P die Spitze eines beweglichen rechtwinkligen Trieders, π die Polarebene von P in Bezug auf eine gegebene Fläche zweiter Ordnung F, sind endlich A_1 , A_2 ; B_1 , B_2 ; C_1 . C_2 die Durchschnitte der Kanten des Trieders mit F, so hat die Function

$$\frac{\overline{A_1 \pi^2}}{\overline{A_1 P^2}} + \frac{\overline{A_2 \pi^2}}{\overline{A_1 P^2}} + \frac{\overline{B_1 \pi^2}}{\overline{B_1 P^2}} + \frac{\overline{B_2 \pi^2}}{\overline{B_2 P^2}} + \frac{\overline{C_1 \pi^2}}{\overline{C_1 P^2}} + \frac{\overline{C_2 \pi^2}}{\overline{C_2 P^2}}$$

denselben Werth bei jeder Lage des Trieders.*

Der Ort der Punkte des Raumes, in welchen diese Function einen gegebenen Werth hat, ist eine Fläche zweiter Ordnung, welche denselben Mittelpunkt und dieselben Axen wie F hat.

Auch die Eigenschaften der conjugirten Durchmesser, die Livet und Binet, wie analog den wohlbekannten Apollonischen Lehrsätzen über die Kegelschnitte, gegeben haben, können verallgemeinert werden, wie ich jetzt beweisen will.

Die Gleichung jeder centrischen Fläche zweiter Ordnung kann auf die folgende Form gebracht werden:

8) $f(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$; es ist dazu nothwendig und hinreichend, dass man zu Coordinatenaxen drei Gerade wählt, welche zu drei conjugirten Durchmessern parallel sind. Drei solche Geraden bilden ein Trieder, das wir conjugirtes Trieder in Bezug auf die gegebene Fläche nennen wollen.

Sind yz, zx, xy die Winkel, welche die Coordinatenaxen je zu zweien bilden, so bleiben die Werthe der Functionen:

$$\frac{a_{11} a_{22} a_{33}}{\sin^2 x y z},$$

$$\frac{a_{22} a_{33} + a_{33} a_{11} + a_{11} a_{22}}{\sin^2 x y z},$$

$$\frac{a_{11} \sin^2 y z + a_{22} \sin^2 z x + a_{33} \sin^2 x y}{\sin^2 x y z},$$

wenn man von einem Coordinatensystem, dessen Axen ein conjugirtes Trieder bilden, zu einem andern Coordinatensystem derselben Art und mit demselben Anfangspunkt übergeht, unverändert.** Nennen wir B, C, D

^{*} Chasles, Aperçu historique u. s. w., S. 713.

Siehe das vortreffliche Lehrbuch meines verehrten Lehrers Prof.
Le proprietà fondamentali delle superficie di second'ordine (Turis

resp. die Werthe dieser Functionen, so ist $B \ge 0$, und daher können wir schreiben:

$$B = \frac{a_{11}a_{22}a_{33}}{\sin^2 x y z}, \quad \frac{C}{B} = \frac{1}{a_{11}} + \frac{1}{a_{22}} + \frac{1}{a_{33}}, \quad \frac{D}{B} = \frac{\sin^2 y z}{a_{22}a_{33}} + \frac{\sin^2 z x}{a_{33}a_{11}} + \frac{\sin^2 x y}{a_{11}a_{22}}.$$

Nun haben wir aus der Betrachtung eines Trieders, dessen Spitze der Punkt (x, y, s) ist und dessen Kanten den Coordinatenaxen parallel sind, erhalten [§ 3 Gl. 5)]:

$$a_{11} = \frac{f}{x_1 x_2}$$
, $a_{22} = \frac{f}{y_1 y_2}$, $a_{33} = \frac{f}{z_1 z_2}$ *;

daher gehen die vorigen Gleichungen in die folgenden über:

$$x_{1}y_{1}z_{1}x_{2}y_{2}z_{2}\sin^{2}xyz = \frac{f^{3}}{B},$$

$$x_{1}x_{2} + y_{1}y_{2} + z_{1}z_{2} = \frac{Cf}{B},$$

$$y_{1}z_{1}y_{2}z_{2}\sin^{2}yz + z_{1}x_{1}z_{2}x_{2}\sin^{2}zx + x_{1}y_{1}x_{2}y_{2}\sin^{2}xy = \frac{Df^{2}}{B}.$$

Nach dem früher Auseinandergesetzten folgt nun unmittelbar, dass die Grössen rechter Hand unverändert bleiben, wenn wir das conjugirte Trieder, welches unserem Coordinatensystem zu Grunde liegt, verändern; somit bleiben auch die Grössen linker Hand constant. Hiermit ist der folgende Satzbewiesen:

Wird eine gegebene Fläche zweiter Ordnung, die kein Paraboloid ist, auf ein conjugirtes Trieder XYZ bezogen, dessen Anfangspunkt P beliebig ist, so entstehen auf jeder Axe zwei Punkte, die wir beziehungsweise A_1 und A_2 , B_1 und B_2 , C_1 und C_2 nennen wollen. Wird das conjugirte Trieder um den Punkt P gedreht, so bleiben die folgenden Grössen constant:

- I. das Product der Volumina der Tetraeder $PA_1B_1C_1$ und $PA_2B_3C_3$;
- II. die Summe der Producte der Flächen der Dreiecke PB_1C_1 und PB_2C_2 , PC_1A_1 und PC_2A_2 , PA_1B_1 und PA_2B_2 ;
- III. die Summe der Producte $PA_1.PA_2$, $PB_1.PB_2$, $PC_1.PC_2^{**}$.
- Ist P insbesondere der Mittelpunkt der Fläche, so schliesst man:

In einer Fläche zweiter Ordnung, die einen Mittelpunkt hat:

I. das Tetraeder, welches drei conjugirte Halbmesser zu seinen Kanten hat, hat einen constanten Inhalt. (Livet's Satz):

[•] f=f= 4,5) ist aus 8) zu entnehmen.

- II. die Summe der Quadrate der Flächen der Dreiecke, die drei conjugirte Halbmesser zu je zweien bestimmen, ist constant. (Binet's Satz);
- III. die Summe der Quadrate dreier conjugirten Halbmesser ist constant. (Livet's Satz.)

Um zu einem ähnlichen Satze über die Flächen zweiter Ordnung ohne Mittelpunkt zu gelangen, bemerken wir, dass die Gleichung eines Paraboloids immer auf die folgende Form gebracht werden kann:

10) $f(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$; es ist zwar die z-Axe parallel der Axe des Paraboloids und die zwei anderen Axen sind parallel zweien conjugirten Durchmessern eines ebenen Querschnittes

Drei solche Geraden bilden ein Trieder, das wir wieder ein conjugirtes Trieder nennen wollen, wovon die z-Axe die Hauptkante, die anderen die Nebenkanten genannt werden mögen. man von dem gewählten Coordinatensystem zu einem andern derselben Art und mit demselben Anfangspunkte über, so bleiben die Werthe der folgenden Functionen:

$$C = \frac{a_{11} a_{22}}{\sin^2 x y z}, \quad D = \frac{a_{11} \sin^2 y z + a_{22} \sin^2 x z}{\sin^2 x y z}$$

Andererseits hat uns die Betrachtung eines Trieders, dessen Kanten den Coordinatenaxen parallel sind und dessen Spitze ein fester Punkt ist, zu folgenden Gleichungen geführt:

$$a_{11} = \frac{f}{x_1 x_2}, \quad a_{22} = \frac{f}{y_1 y_2}.$$

Daher kann man schliessen, dass
$$x_1x_2\sin^2\mathbf{x}\,\mathbf{z} + y_1y_2\sin^2\mathbf{y}\,\mathbf{z} = \frac{Df}{C}$$

ist; und es ist leicht zu sehen, dass diese Gleichung als der analytische Ausdruck des folgenden Satzes angesehen werden kann:

Wird ein gegebenes Paraboloid auf ein conjugirtes Trieder bezogen, dessen Spitze P beliebig liegt, so entstehen auf jeder seiner Nebenkanten zwei Punkte; sind h1, h2 und k1, k. die Entfernungen derselben von seinen Hauptaxen, so ist die Summe $h_1 h_2 + k_1 k_2$ von dem gewählten conjugirten Trieder unabhängig.

Endlich will ich noch bemerken, dass alle die Sätze, mit welchen wir uns beschäftigt haben, ihre entsprechenden nicht nur in der Theorie der Kegelschnitte haben (wie schon Steiner für sein Theorem bemerkte), sondern auch in derjenigen der Flächen zweiter Ordnung in einem linearen Raume von beliebig vielen Dimensionen mit einer Euclidischen Maassbestimmung.

^{*} f = f(x, y, z) ist aus 10) zu entnehmen.

XVII. Ueber gewisse Schaaren von Dreieckskreisen.

Es bezeichne ϱ den Radius des in ein Dreieck ABC beschriebenen Kreises, r den Halbmesser desjenigen Aussenkreises, welcher AB nebst den Verlängerungen von CA und CB berührt, endlich R den Radius des um ABC construirten Kreises; nach bekannten Formeln ist dann

$$\frac{\varrho + r}{2R} = (a+b) \frac{c^2 - (a-b)^2}{2 a b c}$$

oder, wenn man das arithmetische Mittel zwischen ϱ und r mit μ bezeichnet und die Seiten durch die Winkel ausdrückt,

1)
$$\frac{\mu}{R} = \cos\alpha + \cos\beta.$$

Ebenso leicht findet man

2)
$$\frac{\varrho}{r} = \frac{a+b-c}{a+b+c} = \tan \frac{1}{2}\alpha \cdot \tan \frac{1}{2}\beta.$$

Von diesen Relationen lassen sich folgende Anwendungen machen.

Auf der Seite AB wähle man beliebig die Funkte P_1 , P_2 , P_3 , ..., P_{n-1} , ebenso willkürlich auf AC den Punkt Q_1 , auf P_1Q_1 den Punkt Q_2 , auf P_2Q_2 den Punkt Q_3 u. s. w., endlich heisse D der Durchschnitt von $P_{n-1}Q_{n-1}$ und BC; wendet man nun mutatis mutandis die Gleichung 1) auf die n Dreiecke AP_1Q_1 , $P_1P_2Q_3$, $P_2P_3Q_3$, ..., $P_{n-1}BD$ an, so erhält man

$$\begin{split} \frac{\mu_1}{R_1} &= \cos \alpha + \cos A P_1 Q_1, & \frac{\mu_2}{R_2} &= \cos Q_2 P_1 P_2 + \cos P_1 P_2 Q_2, & \dots, \\ & \cdot & \cdot & \frac{\mu_n}{R_n} &= \cos D P_{n-1} B + \cos \beta. \end{split}$$

Durch Addition dieser Gleichungen unter Berticksichtigung des Umstandes, dass die Summe der Cosinus zweier Nebenwinkel verschwindet, ergiebt sich rechter Hand $\cos \alpha + \cos \beta$, d. i. nach Nr. 1

3)
$$\frac{\mu_1}{R_1} + \frac{\mu_2}{R_2} + \dots + \frac{\mu_n}{R_n} = \frac{\mu}{R}.$$

In analoger Weise kann die Relation 2) auf die vorhin genannten n Dreiecke angewendet werden; zunächst erhält man

$$\begin{split} \frac{\varrho_1}{r_1} &= \tan \frac{1}{2} \alpha . \tan \frac{1}{2} A P_1 Q_1, & \frac{\varrho_2}{r_2} &= \tan \frac{1}{2} Q_2 P_1 P_2 . \tan \frac{1}{2} P_1 P_2 Q_2, & \dots, \\ & \dots, & \frac{\varrho_n}{r_n} &= \tan \frac{1}{2} D P_{n-1} B . \tan \frac{1}{2} \beta. \end{split}$$

Multiplicirt man diese Gleichungen und beachtet, dass das Product der Tangenten zweier halben Nebenwinkel = 1 ist, so findet man rechter Hand den Ausdruck $tan 1 a.tan 1 \beta$, mithin nach Nr. 2)

$$\frac{\varrho_1}{r_1} \cdot \frac{\varrho_2}{r_2} \cdots \frac{\varrho_n}{r_n} = \frac{\varrho}{r}.$$

In dem sehr speciellen Falle, wo die beliebigen Punkte $Q_1, Q_2, \ldots, Q_{n-1}$ durch den einen Punkt C vertreten werden, geht die Gleichung 4) in den auf S. 252 des laufenden Jahrgangs dieser Zeitschrift erwähnten Satz über.

SCHLÖMILCH.

XVIII. Zwei Sätze über die Integrale simultaner Differentialgleichungen.

Sind

$$y_k = c_1 y_{k1} + c_2 y_{k2} + ... + c_k y_{kn}, \quad k = 1, 2, ..., n$$

die Integrale des Systems linearer Differentialgleichungen

a)
$$\begin{cases} p \frac{dy_1}{dx} + p_{11}y_1 + p_{12}y_2 + \dots + p_{1n}y_n \\ \dots & \dots & \dots \\ p \frac{dy_n}{dx} + p_{n1}y_1 + p_{n2}y_2 + \dots + p_{nn}y_n \end{cases}$$

und man setzt

$$\begin{vmatrix} y_{11} & \dots & y_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ y_{n1} & \dots & y_{nn} \end{vmatrix} = D, \quad \begin{vmatrix} y'_{11} & \dots & y'_{1n} \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ y'_{n1} & \dots & y'_{nn} \end{vmatrix} = D_1; \quad y'_{ik} = \frac{dy_{ik}}{dx},$$

so lässt sich zeigen, dass diese Integraldeterminanten in einfacher Weise durch die Coefficienten des Gleichungssystems a) ausgedrückt werden können, und zwar ergiebt sich.

1)
$$D = ce^{-\int_{-p}^{1} \sum_{i}^{n} \sum_{l=1}^{n} t_{l}}, \quad c = const.;$$

2)
$$D_{1} = \frac{(-1)^{n}}{p^{n}} \cdot P. D, \quad P = \begin{vmatrix} p_{11} & \dots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & \dots & p_{nn} \end{vmatrix}.$$

Die Richtigkeit des ersten Satzes wird folgendermassen erkannt:

Man setzt die entsprechenden partikulären Lösungen in die k^{to} Differentialgleichung des Systems a) ein und gelangt dadurch zu n identischen Gleichungen der Form

b)
$$py'_{ki} + p_{k1}y_{1i} + ... + p_{kn}y_{ni}, i = 1, 2, ..., n.$$

Eliminirt man aus diesen die Coefficienten p_{ki} mit Ausnahme von p_{kk} , so erscheint eine verschwindende Determinante

$$\begin{vmatrix} py'_{k1} + p_{kk}y_{k1}, & y_{11} \dots y_{n1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ py'_{kn} + p_{kk}y_{kn}, & y_{1n} \dots y_{nn} \end{vmatrix} = 0,$$

in welcher die Colonne $y_{k1} \dots y_{kn}$ fehlt.

^{*} Vergl. Darboux, Comptes Rendus XC, p. 526. Es finde wie ich nachträglich gesehen habe, die Formel 1) - ohne Bewe

Die letzte Gleichung gestattet auch folgende Schreibweise:

$$p\begin{vmatrix} y_{11} & \dots & y'_{k1} & \dots & y_{n1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{1n} & \dots & y'_{kn} & \dots & y'_{nn} \end{vmatrix} + p_{kk}D = 0,$$

und solcher Gleichungen giebt es n; dieselben unterscheiden sich — abgesehen von p_{kk} — insbesondere dadurch, dass der Reihe nach die Elemente der verschiedenen Colonnen differenzirt sind. Addirt man alle diese Gleichungen, so hat man ohne Weiteres

$$p\frac{dD}{dx} + D.\sum_{k=0}^{n} p_{kk} = 0$$
, d. h. $D = ce^{-\int_{a}^{b} \frac{dx}{p} \sum_{k=0}^{n} p_{kk}}$.

Der durch die letzte Formel ausgedrückte Satz kann als eine Verallgemeinerung des bekannten Abel-Liouville'schen Satzes gelten.

Sehr leicht lässt sich nun auch der zweite Satz verificiren. — Substituirt man nämlich in

$$D_1 = \begin{vmatrix} y'_{11} & \dots & y'_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ y'_{n1} & \dots & y'_{nn} \end{vmatrix}$$

nacheinander die Ausdrücke

b)
$$y'_{ki} = -\frac{1}{p} [p_{k1}y_{1i} + ... + p_{kn}y_{ni}], i = 1, 2, ..., n,$$

so zerfällt die Determinante D_1 in das Product zweier Determinanten, so dass man unmittelbar zu der Formel

$$D_{1} = \frac{(-1)^{n}}{p^{n}} \begin{vmatrix} p_{11} & \dots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ p_{n1} & \dots & p_{nn} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} y_{11} & \dots & y_{1n} \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ y_{n1} & \dots & y_{nn} \end{vmatrix},$$

$$D_{1} = \frac{(-1)^{n}}{p^{n}} P_{\cdot} D$$

d. h.

relangt.

Es verdient noch Folgendes bemerkt zu werden.

Ist ein System linearer simultaner Differentialgleichungen höherer Ordnung gegeben, so kann man dasselbe immer durch ein System von entsprechend mehr Gleichungen der ersten Ordnung ersetzen und hierauf die erwähnten Sätze anwenden. In die Determinanten treten alsdann auch die höheren Ableitungen der partikulären Integrale.

So findet man beispielsweise für die Gleichungen

$$\left\{ \begin{array}{l} p \frac{d^2y}{dx^3} + q_1 \frac{dy}{dx} + q_2 \frac{ds}{dx} + q_3y + q_4s = 0, \\ p \frac{d^2s}{dx^3} + r_1 \frac{dy}{dx} + r_2 \frac{ds}{dx} + r_3y + r_4s = 0, \end{array} \right.$$

* tegrale $y_1, z_1, \ldots, y_4, z_4$ sein mögen, Folgendes:

daher nur in der Differentialgleichung $\Delta T = 0$, nicht aber in der fertigen Entwickelung zulässig. Dagegen dürfen auch in der Entwickelung x und x_1 , t und t_1 vertauscht werden.

Gehen wir nun zur Bestimmung der α und β über.

Fällt der Punkt 0 unendlich weit oder ist $u = \infty$, so wird T = 0. Da aber nach Gleichung 34) für unendliche $u \in (iu)$ gleichfalls unendlich gross wird, so müssen in den Gleichungen b) die Coefficienten $\alpha_{\varphi}(h)$ und $\alpha'_{\varphi}(h)$ identisch verschwinden. Also:

$$\alpha_{\bullet}(h) = 0, \quad \alpha'_{\bullet}(h) = 0.$$

Da ferner T nur von $x-x_1$ abhängt [denn es ist

$$E^2 = (x - x_1)^2 + R^2$$
, $R^2 = (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2$,

so dürfen in der Entwickelung x und x_1 auch nur in der Verbindung $x-x_1$ enthalten sein; ein Vorkommen des Sinus ist ausgeschlossen, da E^2 , also auch T eine gerade Function von $x-x_1$ ist. Hieraus folgt:

d)
$$\beta_{\boldsymbol{v}}(h) = A_{\boldsymbol{v}}(h) \cosh x_1, \quad \beta'_{\boldsymbol{v}}(h) = A_{\boldsymbol{v}}(h) \sinh x_1.$$

Die Constante A_{ν} hängt nur noch von t_1 und u_1 ab. Aus Gründen der Symmetrie schliesst man, dass t_1 nur in der Verbindung $\mathfrak{E}_{\nu}(t_1)$ in A_{ν} vorkommen darf, so dass die Annahme:

e)
$$A_{\nu}(h, t_1, u_1) = B_{\nu}(h, u_1) \cdot \mathfrak{G}_{\nu}(t_1)$$

berechtigt ist. Wegen der Gleichungen b), c), d), e) erhält die Entwickelung a) die Form:

f)
$$T = \int_{0}^{\infty} dh \cosh(x - x_1) \sum_{0}^{\infty} \mathcal{P} B_{\boldsymbol{v}}(u_1) \otimes_{\boldsymbol{v}} (t) \otimes_{\boldsymbol{v}} (t_1) \otimes_{\boldsymbol{v}} (iu).$$

Zur Ermittelung der hierin noch vorkommenden Function $B_{\nu}(u_1)$ setze man f) in die Gleichung $\Delta T = 0$ ein, nachdem in derselben u mit u_1 vertauscht worden ist, d. h. in die Gleichung:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial u_1^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} - \frac{h^2 c^2}{2} (\cos 2 i u_1 - \cos 2 t) T = 0.$$

Dies giebt:

$$\begin{split} \int_{0}^{\infty} dh \cos h(x-x_{1}) \sum_{0}^{\infty} \mathbf{F}_{\boldsymbol{v}}(t_{1}) \, \mathbf{F}_{\boldsymbol{v}}(iu) \, \left\{ \left[\frac{d^{2}B_{\boldsymbol{v}}}{du_{1}^{2}} - \frac{h^{2}c^{2}}{2} \cos 2 \, i \, u_{1} \, . \, B_{\boldsymbol{v}} \right] \, \mathbf{F}_{\boldsymbol{v}}(t) \right. \\ \left. + \left[\frac{d^{2}\mathbf{F}_{\boldsymbol{v}}}{dt^{2}} + \frac{h^{2}c^{2}}{2} \cos 2 \, t \, . \, \mathbf{F}_{\boldsymbol{v}} \right] B_{\boldsymbol{v}}(u_{1}) \right\} = 0. \end{split}$$

Wegen der Differentialgleichung:

$$\frac{d^{2} \mathfrak{E}_{y}}{d t^{2}} + \left(\frac{h^{2} c^{2}}{2} \cos 2 t + k_{y}^{2}\right) \mathfrak{E}_{y} = 0$$

ist aber:

$$\frac{d^3 \mathfrak{E}_{\nu}}{dt^2} + \frac{h^2 c^2}{2} \cos 2t \cdot \mathfrak{E}_{\nu} = -k_{\nu}^2 \mathfrak{E}_{\nu}(t),$$

demnsch lautet obige Gleichung:

XVI.

Ueber die Vertheilung der inducirten Elektricität auf einem unbegrenzten elliptischen Cylinder.

Von

Dr. Rudolf Besser

in Dresden.

(8 ch l u s s.)

§ 6.

Entwickelung der reciproken Entfernung aweier Punkte.

Zwei Punkte 0 und 1 selen durch ihre Coordinaten xtu, $x_1t_1u_1$ gegeben, und zwar sei u>u.

d. h. der Punkt 1 liege innerhalb des Cylinders u = Const. Denkt man sich den Punkt 1 als fest, so ist die reciproke Entfernung T beider Punkte eine auf der Oberfläche des Cylinders u = Const. allenthalben endliche Function von x und t, und kann daher zufolge der Formel 31) folgendermassen in Bezug auf diese Variabeln entwickelt werden:

a)
$$T = \int_{0}^{\infty} dh \sum_{n=0}^{\infty} \{a_{r}(h) \cos hx + b_{r}(h) \sin hx\} \mathcal{E}_{r}(t, k_{r}, h).$$

Die hierin vorkommenden Constanten hängen ausser von h und k auch von u, sowie den Coordinaten x_1 , t_1 , u_1 des Punktes 1 ab. Da T der Gleichung $\Delta T = 0$ genügt, so haben mit Rücksicht auf S. 262 a_v und b_v , als Functionen von u betrachtet, die Formen:

b)
$$\begin{cases} a_{\nu} = \alpha_{\nu} (h) \mathfrak{E}_{\nu}(iu) + \beta_{\nu} (h) \mathfrak{F}_{\nu}(iu), \\ b_{\nu} = \alpha'_{\nu}(h) \mathfrak{E}_{\nu}(iu) + \beta'_{\nu}(h) \mathfrak{F}_{\nu}(iu), \end{cases}$$

we jetzt und auch im Folgenden die Parameter h und k_{σ} in \mathfrak{E}_{σ} und \mathfrak{F}_{σ} micht besonders bezeichnet werden sollen.

T ist in Beaug auf x, x_1 ; u, u_1 ; t, t_1 symmetrisch, von seiner Ent
*leiche; nur in Bezug auf u und u_1 hört die

*roll. Die Vertauschung von u und u_1 ist

Die reciproke Entfernung zweier durch ihre cylindrischen Coordinaten xtu, x_1t , u, gegebener Punkte hat den Werth:

36a)
$$T = \frac{4}{\pi} \int_{0}^{\infty} dh \cosh(x - x_1) \sum_{v}^{\infty} \mathfrak{E}_{\varphi}(t) \mathfrak{E}_{\varphi}(t_1) \mathfrak{F}_{\varphi}(iu) \mathfrak{E}_{\varphi}(iu_1), \quad u > u_1.$$

Ist $u < u_1$, so lautet die Entwickelung:

36 b)
$$T = \frac{4}{\pi} \int_{0}^{\infty} dh \cos h(x - x_{1}) \sum_{0}^{\infty} \Psi \mathfrak{E}_{\Psi}(t) \mathfrak{E}_{\Psi}(t_{1}) \mathfrak{E}_{\Psi}(iu) \mathfrak{F}_{\Psi}(iu_{1}), \quad u < u_{1}.$$

Wir haben nun noch den Nachweis zu führen, dass die Function zweiter Art $\mathfrak{F}_{\varphi}(iu_1)$ in der Entwickelung von T nicht vorkommen darf. Beim Kreiscylinder ergiebt sich dies sofort daraus, dass die Cylinderfunction zweiter Art $Y_k(hir_1)$ für $r_1=0$ unendlich wird. Hier scheint ein ähnlich einfacher Umstand nicht vorzuliegen. Wir wenden deshalb zum Beweise der Richtigkeit unseres Ansatzes ein Verfahren an, das wir Herrn F. Neumann verdanken.

Es muss nämlich nicht blos T, sondern auch jeder Differentialquotient von T, nach irgend einer Richtung genommen, endlich sein. Denken wir uns also den Punkt 1 beweglich und differenziren T nach der Normale ds_{u_1} auf dem Cylinder u_1 , so muss $\frac{dT}{ds_{u_1}}$ endlich sein, wo auch der Punkt 1 liege.

Käme nun $\mathfrak{F}_{\nu}(iu_1)$ in der Entwickelung von T vor, so enthielte $\frac{dT}{ds_{u_1}}$ den Differentialquotienten:

$$\frac{d \mathcal{K}_{y}(iu_{1})}{ds_{u}}$$

oder, für ds_{u_1} seinen Werth $\sqrt{\psi_1} du_1$ gesetzt, wo:

$$\psi_1 = \frac{c^2}{2} (\cos 2 i u_1 - \cos 2 t_1)$$
 [S. 261 Nr. 13)],

den Differentialquotienten:

$$\frac{d\mathfrak{F}_{\boldsymbol{v}}(iu_1)}{du_1} \cdot \frac{1}{\sqrt{w}}.$$

Nun ist:

$$\mathfrak{F}_{\boldsymbol{\varphi}}(iu_1) = \mathfrak{E}_{\boldsymbol{\varphi}}(iu_1) \int_{u_1}^{\infty} \frac{du_1}{[\mathfrak{E}_{\boldsymbol{\varphi}}(iu_1)]^2} \quad [8.\ 271\ \text{Nr.}\ 33)],$$

also:

$$\frac{d\mathfrak{F}_{\boldsymbol{v}}(iu_1)}{du_1} = \frac{d\mathfrak{F}_{\boldsymbol{v}}(iu_1)}{du_1} \int_{0}^{\infty} \frac{du_1}{[\mathfrak{F}_{\boldsymbol{v}}(iu_1)]^2} - \frac{1}{\mathfrak{F}_{\boldsymbol{v}}(iu_1)}.$$

daher weiter:

^{*} Crelle's Journal Bd. 87: "Entwickelung der in elliptischen Coordinaten ausgedräckten reciproken Entfernung zweier Punkte", S. 21—50.

$$\frac{d\,\mathfrak{F}_{\pmb{v}}(i\,u_1)}{d\,s_{\pmb{u}_1}} = \frac{1}{\cancel{\textstyle\sqrt{\psi_1}}} \cdot \frac{d\,\mathfrak{E}_{\pmb{v}}(i\,u_1)}{d\,u_1} \int_{\stackrel{\mathbf{u}_1}{\psi_1}}^{\mathfrak{S}} \frac{d\,u_1}{[\mathfrak{E}_{\pmb{v}}(i\,u_1)]^2} - \frac{1}{\cancel{\textstyle/\psi_1}} \cdot \frac{1}{\mathfrak{E}_{\pmb{v}}(i\,u_1)}.$$

Setzt man nun zuerst $t_1 = 0$, verlegt also den Punkt 1 auf das rechts von dem einen Brennpunkte gelegene Stück der grossen Axe der Directrix, so wird:

$$\psi_1 = \frac{c^2}{2}(\cos 2iu_1 - 1) = -c^2 \sin^2 iu_1$$

also ist:

$$\sqrt{\psi_1} = ic \sin iu$$

also ist: $\sqrt{\psi_1} = ic \sin iu_1$ und dann ist im Minuenden obiger Differenz $\frac{d\mathfrak{E}_{\nu}(iu_1)}{du_1}$ stets durch $\sqrt{\psi_1}$ **theilbar.** Denn für $t_1 = 0$ verschwinden laut den Gleichungen 24), S. 266, die 🗲 (t1) der dritten und vierten Classe, mithin enthält die Entwickelung von T nur noch Functionen erster und zweiter Classe. Die Gleichungen 22), S. 265, zeigen nun, dass der Differentialquotient $\frac{d\mathfrak{E}_{\nu}(iu_1)}{du_1}$ für Functionen erster und zweiter Classe eine nach den Sinus der Vielfachen von iu, fortschreitende Reihe ist, und daraus folgt die Richtigkeit unserer Behauptung. Setzt man nun noch:

$$u_1 = 0$$

d. h. verlegt den Punkt 1 in den Brennpunkt der Directrix selbst, so wird $\sqrt{\psi_1} = 0$, also wird der Subtrahend obiger Differenz, mithin auch $\frac{d \, \mathcal{E}_{\nu}(i \, u_1)}{d \, s_{\nu}}$ unendlich gross. Der Minuend bleibt endlich, da $\sqrt[4]{\psi_1}$ nach dem Vorigen durch Division entfernt worden ist.

Somit würde $\frac{dT}{ds}$ unendlich werden, wenn der Ausdruck für T die Functionen zweiter Art $\mathcal{F}_{\bullet}(iu_i)$ enthielte, und zwar, wenn der Punkt 1 in den Brennpunkt der Basisellipse fällt. Demnach darf & (iu) in dem Ausdrucke für T nicht vorkommen.

§ 7.

Bestimmung des Potentials einer auf der Fläche des elliptischen Cylinders ausgebreiteten Massenbelegung.

Der elliptische Cylinder u sei mit Masse von der Dichte q_{σ} belegt. Diese Belegung erzeugt in einem beliebigen Punkte $1(x_1t_1u_1)$ das Potential:

$$V_1 = \int q_{\sigma} T_{1\sigma} d\sigma$$

oder, für das Flächenelement do seinen Werth $\sqrt{\psi} \, dx \, dt$ gesetzt:

37)
$$V_{1} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{0}^{2\pi} dt \sqrt{\psi} q_{\sigma} T_{1\sigma}.$$

Zur Vereinfachung dieses Ausdruckes machen wir für die Function $\sqrt{\psi}$, q_{ϕ} nach der Gleichung 31), S. 269, folgenden Ansatz:

38)
$$\sqrt{\psi} \cdot q_{\sigma} = \int_{0}^{\infty} dh \sum_{q}^{\infty} \psi(\alpha_{q}(h) \cos hx + \beta_{q}(h) \sin hx) \mathfrak{E}_{q}(t),$$

wo die Coefficienten a_y und β_y auf bekannte Weise aus q gefunden werden können. Es sei hier daran erinnert, dass dieser Ansatz nur dann brauchbar ist, wenn q_σ ausser gewissen Eigenschaften bezüglich der Endlichkeit und Stetigkeit auch noch die besitzt, dass:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} q(x) dx$$

endlich ist, so dass z. B. die folgenden Betrachtungen sich nicht mehr anwenden lassen, wenn q von x unabhängig ist.

Setzen wir dann für $T_{1\sigma}$ seinen Werth aus 36a) in 37) ein, wobei wir den Punkt 1 als innerhalb des Cylinders gelegen ansehen, und ihn deshalb durch $j(x_j t_j u_j)$ bezeichnen wollen, so folgt:

$$V_{j} = \frac{4}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{0}^{2\pi} dt \cdot \left\{ \int_{0}^{\infty} dh \sum_{0}^{\infty} v\left(\alpha_{y}(h) \cosh x + \beta_{y}(h) \sinh x\right) \mathfrak{E}_{y}\left(t\right) \right\} \\ \times \left\{ \int_{0}^{\infty} dh \cosh(x - x_{j}) \sum_{0}^{\infty} v \mathfrak{E}_{y}\left(t\right) \mathfrak{E}_{y}\left(t_{j}\right) \mathfrak{F}_{y}\left(i u\right) \mathfrak{E}_{y}\left(i u_{j}\right) \right\}.$$

Das nach x zu nehmende Integral lässt sich mit Hilfe einer von Herrn Professor C. Neumann angegebenen Integralformel ausführen, der Formel nämlich:

a)
$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{0}^{h} A(h) \cos hx \, dh \int_{0}^{h} B(h) \cos hx \, dx = \pi \int_{0}^{\infty} A(h) B(h) \, dh,$$

welche auch noch gilt, wenn links statt coshx sinhx steht, wogegen die rechte Seite Null ist, wenn links verschiedene Functionen in den nach h zu nehmenden Integralen stehen. — Denkt man sich nämlich den $cosh(x-x_j)$ aufgelöst, so zerfällt V_j in vier Theile, von denen zwei verschwinden, während der Werth der beiden anderen nach a) angegeben werden kann.

In dem verbleibenden Doppelintegral lässt sich die Integration nach t mit Benutzung der Integralformeln 28) und 28a), S. 267 und 268, erledigen, so dass man als Endresultat findet:

39)
$$\mathcal{V}_{j} = 4\pi \int_{0}^{\infty} dh \sum_{i=1}^{\infty} \left(\alpha_{\varphi}(h) \cosh x_{i} + \beta_{\varphi}(h) \sinh x_{i}\right) \mathfrak{E}_{\varphi}(t_{j}) \mathfrak{E}_{\varphi}(iu_{j}) \mathfrak{F}_{\varphi}(iu_{j}).$$

Diese Formel giebt das Potential der Belegung q auf einen beliebigen innern Punkt des Cylinders an.

Liegt nun zweitens der Punkt 1 ausserhalb des Cylinders, in a ($x_a t_a u_a$), bedeutet V_a das auf ihn ausgeübte Potential, so liefert dieselbe Rechnung sogleich:

40)
$$V_a = 4 \pi \int_0^\infty dh \sum_{u=0}^\infty \left(\alpha_y(h) \cosh x_a + \beta_y(h) \sinh x_a \right) \mathfrak{E}_y(t_a) \mathfrak{F}_y(iu_a) \mathfrak{E}_y(iu).$$

Die Formeln 39) und 40) unterscheiden sich nur durch die Vertauschung von & mit &. Fällt der Punkt 1 auf die Fläche des Cylinders, so werden die Gleichungen 39) und 40) identisch. Wir haben also:

Denkt man sich einen elliptischen Cylinder mit Masse von der beligbigen Dichte q belegt, so besitzt das Potential der Belegung auf innere und Eussere Punkte die durch 39) und 40) ausgedrückten Werthe. Darin bedeuten $\alpha_{\varphi}(h)$, $\beta_{\varphi}(h)$ gewisse, bei der Entwickelung von $\sqrt{\psi} \cdot q_{\sigma}$ auftretende Constanten, welche sich durch Integrale ausdrücken.

An den Formeln 39) und 40) lässt sich auch die bekannte Laplacesche Relation:

$$-4\pi q_{\sigma} = \frac{\partial V_{a}}{\partial n_{a}} + \frac{\partial V_{j}}{\partial n_{j}}$$

verificiren. In der That erhält man durch Ausführung der Differentiation, wobei die Werthe:

$$dn_a = \sqrt{\overline{\psi_a}} \cdot du_a, \quad dn_j = -\sqrt{\overline{\psi_j}} \cdot du_j,$$

sowie die Gleichung 32):

$$\mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(iu)\frac{d\mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(iu)}{du} - \mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(iu)\frac{d\mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(iu)}{du} = 1$$

benutzen sind, sofort den Werth $-4\pi q_{\sigma}$ für $\frac{\partial V_a}{\partial n_a} + \frac{\partial V_j}{\partial n_j}$.

Jene Laplace'sche Gleichung giebt aber auch den Grund an für die

auf S. 268 getroffene Wahl des Werthes π für das Integral $\int_{0}^{2\pi} [\mathfrak{E}_{\nu}(t)]^{2} dt$.

Bezeichnet man wieder mit Γ und γ_{φ} die bei der Entwickelung der Function zweiter Art \mathfrak{F}_{φ} und der der reciproken Entfernung T auftretenden Constanten (s. S. 270 u. 307), und setzt jenes Integral $= c_{\varphi}$, berechnet dann die Potentiale V_{α} und V_{j} , so erhält man durch die Laplace'sche Gleichung folgende Beziehung zwischen den drei Constanten Γ , c_{φ} und γ_{φ} :

$$\Gamma.c_{\nu}.\gamma_{\nu}=4.$$

Da nun:

$$\Gamma=1, \quad \gamma_{\bullet}=\frac{4}{\pi}$$

gefunden wurde, so muss:

$$c_y = \pi$$

sein. Denselben Werth giebt auch Heine, ohne weitere Ableitung (Kugelfunct., II. Bd. S. 204).

§ 8

Bestimmung der Potentiale V_a und V_j aus den gegebenen Potentialwerthen V_σ an der Mantelfläche des Cylinders.

Wir lösen jetzt die zweite der auf S. 257 angegebenen Hauptaufgaben: Beliebig gegebene Massen erzeugen auf dem Mantel eines elliptischen Cylinders vorgeschriebene Potentialwerthe V_{σ} ; man soll die Potentiale V_{\bullet} und V_{i} für äussere und innere Punkte ermitteln.

Den gegebenen Oberflächenwerth $V_{\sigma} = f_{\sigma}$ können wir in die Form:

41)
$$V_{\sigma} = f_{\sigma} = \int_{0}^{\infty} dh \sum_{k=0}^{\infty} \left[A_{\varphi}(k) \cdot \cos hx + B_{\varphi}(k) \cdot \sin hx \right] \mathfrak{E}_{\varphi}(t)$$

uns gebracht denken, welche indess erfordert, dass $\int_{-\infty}^{+\infty} V(x) dx$ endlich, also z. B. V von x nicht unabhängig sei. Die folgenden Erörterungen sind also auf den Fall $V_{\sigma} = Const.$ nicht anwendbar.

Das gesuchte Potential V wird, als Function von x und t betrachtet, durch einen ähnlichen Ausdruck, etwa:

42)
$$V = \int_{0}^{\infty} dh \sum_{0}^{\infty} \left[\mathfrak{A}_{\psi}(h) \cdot \cos hx + \mathfrak{B}_{\psi}(h) \cdot \sin hx \right] \mathfrak{E}_{\psi}(t)$$

dargestellt. Hierin sind nun die Constanten \mathfrak{A}_{ν} und \mathfrak{B}_{ν} so zu bestimmen, dass 1. V der Gleichung $\Delta V = 0$ genügt, 2. V_{σ} den gegebenen Werth 41) annimmt.

Die Coefficienten \mathfrak{A}_{ν} und \mathfrak{B}_{ν} hängen von u ab. Damit $\Delta V = 0$ sei, muss, wie aus früheren Betrachtungen folgt:

$$\mathfrak{A}_{\mathbf{y}} = \mathbf{a}_{\mathbf{y}} \, \mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(iu) + \mathbf{a}'_{\mathbf{y}} \, \mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(iu), \\
\mathfrak{B}_{\mathbf{y}} = \mathbf{b}_{\mathbf{y}} \, \mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(iu) + \mathbf{b}'_{\mathbf{y}} \, \mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(iu)$$

sein. — Ist nun 1. der Punkt, für den V zu bestimmen ist, ein äusserer, $a\left(x_au_at_a\right)$, so darf in obigen Ausdrücken $\mathfrak{E}_{\varphi}(iu_a)$ nicht vorkommen, da für unendliche u_a diese Function unendlich gross wird, während V endlich bleiben muss. Also ist a_{φ} und $b_{\varphi}=0$ zu setzen, und man findet als allgemeinen Ausdruck eines äusseren Potentials:

43a)
$$V_a = \int_0^{\infty} dh \sum_{k=0}^{\infty} v(a', \cos hx_k + b', \sin hx_k) \mathcal{F}_{\psi}(iu_a) \mathcal{E}_{\psi}(t_a).$$

Befindet sich 2. der angezogene Punkt im Innern des Cylinders, in $j(x_j u_j t_j)$, so darf in den Ausdrücken für \mathfrak{A}_{ν} und \mathfrak{B}_{ν} $\mathfrak{F}_{\nu}(iu_j)$ nicht vorkommen, weil sonst $\frac{dV_j}{du_j}$ nicht für alle inneren Punkte endlich bliebe.*

Der allgemeine Ausdruck eines Potentials für innere Punkte ist daher:

43b)
$$V_{j} = \int_{0}^{\infty} dh \sum_{i}^{\infty} v(a_{i} \cosh x_{i} + b_{i} \sinh x_{i}) \mathfrak{E}_{v}(iu_{i}) \mathfrak{E}_{v}(ij).$$

Nun soll für:

$$u_a = u$$
, $x_a = x$, $t_a = t$, resp. $u_j = u$, $x_j = x$, $t_j = t$

(wenn wir Punkte auf dem Cylindermantel ohne Index bezeichnen) V_a bez. V_j in $V_a = f_a$ übergehen. Dies geschieht, wenn:

$$a'_{y} = \frac{A_{y}}{\mathfrak{F}_{y}(iu)}, \quad b'_{y} = \frac{B_{y}}{\mathfrak{F}_{y}(iu)},$$

$$a_{y} = \frac{A_{y}}{\mathfrak{F}_{x}(iu)}, \quad b_{y} = \frac{B_{y}}{\mathfrak{F}_{x}(iu)}$$

goe tet wird.

Es ergiebt sich dann:

4 a)
$$V_{a} = \int_{0}^{\infty} dh \sum_{0}^{\infty} v \left(A_{y} \cosh x_{a} + B_{y} \sinh x_{a} \right) \frac{\mathfrak{F}_{y}(i u_{a})}{\mathfrak{F}_{y}(i u)} \mathfrak{E}_{y}(t_{a}),$$
b)
$$V_{j} = \int_{0}^{\infty} dh \sum_{0}^{\infty} v \left(A_{y} \cosh x_{j} + B_{y} \sinh x_{j} \right) \frac{\mathfrak{E}_{y}(i u_{j})}{\mathfrak{E}_{y}(i u)} \mathfrak{E}_{y}(t_{j}).$$

Die Formeln lösen die Aufgabe.

Man kann dieselben auch in der Form:

$$V_{a} = \frac{1}{\pi^{2}} \int \frac{d\sigma}{\sqrt{\psi}} f_{\sigma} \int \frac{dh}{dh} \cosh(x - x_{a}) \sum_{v}^{\infty} \left\{ \mathfrak{E}_{v}(t) \mathfrak{E}_{v}(t_{a}) \frac{\mathfrak{E}_{v}(i \cdot u_{a})}{\mathfrak{E}_{v}(i \cdot u)} \right\},$$

$$V_{j} = \frac{1}{\pi^{2}} \int \frac{d\sigma}{\sqrt{\psi}} f_{\sigma} \int \frac{dh}{dh} \cosh(x - x_{j}) \sum_{v}^{\infty} \left\{ \mathfrak{E}_{v}(t) \mathfrak{E}_{v}(t_{j}) \frac{\mathfrak{E}_{v}(i \cdot u_{j})}{\mathfrak{E}_{v}(i \cdot u)} \right\}.$$

darstellen und drückt damit V_{σ} bez. V_{j} direct durch f_{σ} , nicht durch die Entwickelungscoefficienten von f_{σ} aus. Die Integration $d\sigma$ bezieht sich auf den ganzen Cylindermantel.

Liegen nun die Massen auf der Oberfläche des Cylinders selbst, so liest sich ihre Dichte q_{σ} an der Stelle x, t durch die Gleichung:

^{*} Vergl. den Beweis am Ende des § 6.

daher nur in der Differentialgleichung $\Delta T = 0$, nicht aber in der Entwickelung zulässig. Dagegen dürfen auch in der Entwickelung x_1 , t und t_1 vertauscht werden.

Gehen wir nun zur Bestimmung der a und \beta über.

Fällt der Punkt 0 unendlich weit oder ist $u = \infty$, so wird T = aber nach Gleichung 34) für unendliche $u \in (iu)$ gleichfalls unendlich wird, so müssen in den Gleichungen b) die Coefficienten $a_v(h)$ und identisch verschwinden. Also:

c)
$$\alpha_{\mathbf{v}}(h) = 0$$
, $\alpha'_{\mathbf{v}}(h) = 0$.

Da ferner T nur von $x-x_1$ abhängt [denn es ist

$$E^2 = (x-x_1)^2 + R^2, \quad R^2 = (y-y_1)^2 + (z-z_1)^2 \, ,$$

so dürfen in der Entwickelung x und x_1 auch nur in der Verbindenthalten sein; ein Vorkommen des Sinus ist ausgeschlossen, auch T eine gerade Function von $x-x_1$ ist. Hieraus folgt:

d)
$$\beta_{\nu}(h) = A_{\nu}(h) \cosh x_1$$
, $\beta'_{\nu}(h) = A_{\nu}(h) \sinh x_1$

Die Constante A_r hängt nur noch von t_1 und u_1 ab der Symmetrie schliesst man, dass t_1 nur in der Verbind vorkommen darf, so dass die Annahme:

e)
$$A_{\nu}(h, t_1, u_1) = B_{\nu}(h, u_1) \cdot (\delta_{\nu}(h))$$

berechtigt ist. Wegen der Gleichungen b), c), d) lung a) die Form:

f)
$$T = \int_{0}^{\infty} dh \cosh(x - x_{i}) \sum_{v}^{\infty} E_{+}(u_{i})$$

Zur Ermittelung der hierin noch vorkomf) in die Gleichung $\Delta T = 0$ ein, worden ist, d. h. in die Gleichung

$$\frac{\partial^2 T}{\partial u_1^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} -$$

Dies giebt:

$$\int_{0}^{\infty} dh \cosh(x-x_1) \sum_{0}^{\infty}$$

Wegen der D

ist aber:

demnach la

$$V_j = T_{\alpha j},$$

und für einen inneren i durch

$$V_a = T_{\iota a}$$

definirt; j und a sind dabei beliebige innere bez. äussere Punkte. Die Gleichungen a) und b) gelten noch, wenn j bez. a auf die Fläche selbst fällt.

Die Green'sche Function ist das Potential der gefundenen Belegung für Punkte, die mit dem Centralpunkte gleichartig liegen. Sie werde durch G_{ij} bez. $G_{\alpha\alpha}$ bezeichnet. Sie ist symmetrisch in Bezug auf ι und j, α und a.

Die Ermittelung der Green'schen Belegung, wobei für's Erste der Centralpunkt ein äusserer Punkt $\alpha\left(x_{\alpha}t_{\alpha}u_{\alpha}\right)$ sei, lässt sich auf doppelte Weise vornehmen. Man kann erstens die in § 7 gelöste Aufgabe auwenden, indem man die Constanten α_{ν} und β_{ν} in der Gleichung 38) so specialisirt, dass der für diese Belegung sich ergebende Potentialwerth 39) identisch mit $T_{\alpha j}$ wird, wie a) es vorschreibt.

Da

$$T_{ej} = \frac{4}{\pi} \int_{0}^{\infty} dh \, \cos h(x_{j} - x_{\alpha}) \sum_{0}^{\infty} \Psi_{\psi}(t_{\alpha}) \, \Psi_{\psi}(t_{j}) \, \mathcal{F}_{\psi}(i \, u_{\alpha}) \, \Psi_{\psi}(i \, u_{j}) \,,$$

so liefert die Bedingung

$$V_i = T_{\alpha i}$$

80gleich

$$\alpha_{\mathbf{y}} = \frac{1}{\pi^2} \cos h \, x_{\mathbf{z}} \, \frac{\mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(t_{\mathbf{z}}) \, \mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(i \, u_{\mathbf{z}})}{\mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(i \, u)} \,, \qquad \beta_{\mathbf{y}} = \frac{1}{\pi^2} \sin h \, x_{\mathbf{z}} \, \frac{\mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(t_{\mathbf{z}}) \, \mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(i \, u_{\mathbf{z}})}{\mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(i \, u)} \,,$$

und die Substitution dieser Werthe in die Gleichung 38) giebt dann für die gesuchte Belegung η_a den Ausdruck:

47)
$$\eta_{\alpha} = \frac{1}{\pi^{2} \sqrt{\psi}} \int_{0}^{\infty} dh \cosh (x - x_{\alpha}^{b}) \sum_{0}^{\infty} \frac{\mathfrak{E}_{v}(t_{\alpha}) \mathfrak{F}_{v}(iu_{\alpha})}{\mathfrak{F}_{v}(iu)} \mathfrak{E}_{v}(t).$$

Und setzt man dieselben Ausdrücke für α_y und β_y in die Gleichung 40), welche das Potential der durch 38) dargestellten Belegung auf einen äusseren Punkt darstellt, so ergiebt sich:

48)
$$G_{aa} = \frac{4}{\pi} \int_{0}^{\infty} dh \cosh(x_a - x_a) \sum_{v}^{\infty} \nabla_v \mathcal{E}_{v}(t_a) \mathcal{E}_{v}(t_a) \mathcal{E}_{v}(iu_a) \mathcal{E}_{v}(iu_a) \mathcal{E}_{v}(iu_a) \frac{\mathcal{E}_{v}(iu)}{\mathcal{E}_{v}(iu)}.$$

Man erkennt die Symmetrie in Bezug auf a und a.

Eine zweite Methode zur Bestimmung von η_{α} und $G_{\alpha\alpha}$ besteht in der Anwendung der Resultate des § 8, indem man die dort gegebene Function $f_{\alpha} = T_{\alpha\alpha}$ annimmt, daraus die Constanten A_{α} und B_{α} bestimmt und endlich durch Substitution der erhaltenen Werthe in 46), sowie 44a) die Ausdrücke für η_{α} und $G_{\alpha\alpha}$ aufstellt. — Für A_{α} und B_{α} ergeben sich und mittelbar die Werthe:

$$\begin{split} A_{\mathbf{y}} &= \frac{4}{\pi} \cosh x_{\mathbf{a}} \, \mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(t_{\mathbf{a}}) \, \mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(iu) \, \mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(iu_{\mathbf{a}}), \\ B_{\mathbf{y}} &= \frac{4}{\pi} \sinh x_{\mathbf{a}} \, \mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(t_{\mathbf{a}}) \, \mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(iu) \, \mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(iu_{\mathbf{a}}); \end{split}$$

verfährt man mit diesen, wie angegeben, so erhält man 47) und 48) wieder. Ganz ebenso ergiebt sich für einen inneren Centralpunkt ι als Greensche Belegung η_{ι} :

49)
$$\eta_{i} = \frac{1}{\pi^{2} \sqrt{\psi}} \int_{0}^{\infty} dh \cosh(x - x_{i}) \sum_{0}^{\infty} \sqrt{\frac{\mathfrak{E}_{\varphi}(t_{i})}{\mathfrak{E}_{\varphi}(iu)}} \mathfrak{E}_{\varphi}(t),$$

und als Green'sche Function:

50)
$$G_{ij} = \frac{4}{\pi} \int_{0}^{\infty} dh \cosh(x_{j} - x_{i}) \sum_{0}^{\infty} \mathscr{E}_{y}(t_{i}) \mathscr{E}_{y}(t_{j}) \mathscr{E}_{y}(iu_{i}) \mathscr{E}_{y}(iu_{j}) \frac{\mathfrak{F}_{y}(iu)}{\mathfrak{E}_{y}(iu)}.$$

§ 10.

Bestimmung der Massen der in den §§ 7 und 9 betrachteten Belegungen.

In § 7 lösten wir die Aufgabe: das Potential einer durch ihre Dichtigkeit q gegebenen Massenbelegung des elliptischen Cylinders für Zussere und innere Punkte desselben aufzusuchen. Jetzt soll die Gesammtmasse M dieser Belegung bestimmt werden. Die erhaltene allgemeine Formel wenden wir dann auf die im vorigen Paragraphen betrachtete Green'sche Belegung an.

Es ist

$$M = \int_{-\infty}^{1} q \, d\sigma = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{0}^{2\pi} dt \, \sqrt{\psi} \cdot q.$$

Für q wurde in 38), S. 310, der Ansatz:

$$q \sqrt{\psi} = \int_{0}^{\infty} dh \left[A(h) \cos hx + B(h) \sinh x \right],$$

worin:

$$A(h) = \sum_{0}^{\infty} \alpha_{\mathbf{y}}(h) \, \mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(t), \quad B(h) = \sum_{0}^{\infty} \beta_{\mathbf{y}}(h) \, \mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(t)$$

waren, gemacht. Damit ergiebt sich:

51)
$$M = \int_{0}^{2\pi} dt \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{0}^{\infty} dh [A(h) \cos hx + B(h) \sin hx].$$

Die Functionen A(h, t) und B(h, t) drücken sich in bekannter Weise durch die gegebene Function q aus; sie sind als endlich und stetig im ganzen Werthbereich von h und t anzusehen.

In 51) wird nun die Integration nach x und h durch eine von Herrn C. Neumann in seinem schon mehrfach citirten Werke: "Ueber die nach Kreis-, Kugel- und Cylinderfunctionen fortschreitenden Entwickelungen etc." augegebene Integralformel ermöglicht. Dieselbe lautet:

$$\int_{0}^{\infty} dx \int_{0}^{\gamma} dh \cosh x F(h) = \frac{\pi}{2} F(+0).$$

Darin bedeutet γ eine ganze positive Constante, F(h) eine im Intervalle $h = 0 \dots \gamma$ abtheilungsweise stetige und abtheilungsweise monotone Function von h. Nehmen wir in obiger Gleichung das Integral nach x zwischen $-\infty$ und $+\infty$, so ergiebt sich:

a)
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{0}^{\gamma} dh \cos h x F(h) = \pi F(+0).$$

Dagegen ist evident, dass:

b)
$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{0}^{\gamma} dh \sinh x F(h) = 0$$

ist. Diese beiden Formeln dürfen auf 51) angewandt werden, und zwar darf man $\gamma = \infty$ setzen, da, wie schon bemerkt wurde, A(h) und B(h) Functionen von h sind, welche die geforderten Eigenschaften besitzen. Man erhält:

$$\mathbf{M} = \pi \int_{0}^{2\pi} dt . \mathbf{A}(0).$$

Nun ist:

$$A(h,t) = \sum_{0}^{\infty} \varphi \alpha_{\varphi}(h) \mathfrak{E}_{\varphi}(t,h,k_{\varphi}),$$

also:

$$\mathbf{A}(0,t) = \sum_{\mathbf{0}}^{\infty} \mathbf{v} \; \alpha_{\mathbf{y}}(0) \; \mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(t,0,k_{\mathbf{y}}).$$

Wie aber S. 271 gezeigt wurde, nehmen für h=0 die Functionen $\mathfrak{E}_{\varphi}(t)$ die Werthe sinkt, coskt an, die Constanten k_{φ} gehen in die natürlichen Zahlen $0,1,2,\ldots$ über und für k=0 erhält die Function $\mathfrak{E}(t)$ den Werth

^{*} a. L. c. Gleich. C), S. 80; es ist q durch h ersetzt worden.

 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Dann lässt sich die Integration nach t ausführen und giebt das Resultat:

$$\mathbf{M} = \sqrt{2} \cdot \pi^2 \cdot \alpha_0(0).$$

Machen wir eine Anwendung von dieser Formel zur Bestimmung der Masse der Green'schen Belegung.

Nach Gleichung 49) ist für einen inneren Centralpunkt ::

$$\eta_{t} \sqrt{\psi} = \frac{1}{\pi^{2}} \int_{0}^{\infty} dh \cosh(x - x_{t}) \sum_{u}^{\infty} \frac{\mathfrak{E}_{v}(t_{t}) \, \mathfrak{E}_{v}(i \, u_{t})}{\mathfrak{E}_{v}(i \, u)} \, \mathfrak{E}_{v}(t) \,,$$

also, mit Beibehaltung unserer Bezeichnungen:

$$A(h,t) = \frac{1}{\pi^2} \cos h x_t \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\mathfrak{E}_{\mathbf{v}}(t_t) \mathfrak{E}_{\mathbf{v}}(iu_t)}{\mathfrak{E}_{\mathbf{v}}(iu)} \mathfrak{E}_{\mathbf{v}}(t)$$

und weiter:

$$\alpha_{\mathbf{y}}(h) = \frac{1}{\pi^{2}} \cos h \, x_{i} \frac{\mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(t_{i}) \, \mathfrak{E}_{\mathbf{y}}(i \, u_{i})}{\mathfrak{E}_{\mathbf{z}}(i \, u)}.$$

Hieraus folgt:

$$\alpha_0(0) = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

und nach 52):

$$M_{\iota}=1$$
,

so dass ein für beliebige geschlossene Flächen geltender Satz auch auf die hier vorliegende ungeschlossene Fläche Anwendung findet.

Die Masse der auf einen äusseren Centralpunkt α sich beziehenden Green'schen Belegung lässt sich ebenso leicht bestimmen.

Nach Gleichung 47) war:

$$\eta_{\alpha} \sqrt{\psi} = \frac{1}{\pi^2} \int_{0}^{\infty} dh \cos h (x - x_a) \sum_{0}^{\infty} \sqrt{\frac{\mathfrak{E}_{\nu}(t_a) \, \mathfrak{F}_{\nu}(i \, u_a)}{\mathfrak{F}_{\nu}(i \, u)}} \, \mathfrak{E}_{\nu}(t).$$

Es ist also hier:

$$\alpha_{\mathbf{y}}(h) = \frac{1}{\pi^{2}} \cosh x_{\mathbf{z}} \frac{\mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(t_{\mathbf{z}}) \, \mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(i u_{\mathbf{z}})}{\mathfrak{F}_{\mathbf{y}}(i u)} \cdot$$

Für h=0, $\nu=0$ verwandelt sich:

$$\frac{\mathfrak{F}_{\nu}(iu_{\alpha})}{\mathfrak{F}_{\alpha}(iu)} \text{ in } \frac{u_{\alpha}}{u}, \quad \mathfrak{F}_{\nu}(t_{\alpha}) \text{ in } \frac{\sqrt{2}}{2},$$

also wird:

$$a_0(0) = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{u_{\alpha}}{u} \text{ und } M_{\alpha} = \frac{u_{\alpha}}{u}.$$

Hierin liegt das bemerkenswerthe Resultat, dass die Masse der auf einen aussern Centralpunkt α sich beziehenden Green'schen Belegung eines ellip-

tischen Cylinders lediglich von der Coordinate u_{α} desselben abbängt, also ungeändert bleibt, wenn sich α auf einer zur Basis des Cylinders confocalen Ellipse bewegt.

§ 11.

Bestimmung der durch Einwirkung eines elektrischen Massenpunktes auf dem Cylinder inducirten Belegung.

Wir stellen jetzt folgende Aufgabe:

Ein unendlich langer elliptischer Cylinder soll in solcher Weise mit Masse belegt werden, dass deren Potential nebst dem eines mit der Masse + 1 behafteten inneren Punktes für alle äusseren Punkte den Werth Null annimmt.

Oder physikalisch ausgedrückt:

Es soll die Vertheilung der Elektricität auf einem unendlich langen Cylinder ermittelt werden, der von einem inneren Punkte + 1 influenzirt wird und zur Erde abgeleitet ist.

Dabei kann von einer dem Cylinder vorher mitgetheilten Ladung abgesehen werden, denn da derselbe unendlich lang ist, so wird die durch jene Ladung erzeugte Dichte unendlich klein.

Ist nun j der gegebene innere Punkt, a ein beliebiger äusserer Punkt. so muss die an der Stelle σ des Cylinders sich bildende Dichte q_{σ} der Bedingung:

$$T_{ja} + \int d\sigma \ q_{\sigma} T_{\sigma a} = 0$$

gentigen. Dies bedeutet, dass:

$$q_{\sigma} = -\eta_i^{\sigma}$$

zu setzen ist, wodurch die gestellte Aufgabe gelöst ist.

Nach Gleichung 49) hat man also:

53)
$$q_{\sigma} = -\frac{1}{\pi^{2} \sqrt{\psi}} \int_{0}^{\infty} \cosh(x - x_{j}) F(h) dh,$$

$$F(h) = \sum_{0}^{\infty} \sqrt{\frac{\mathfrak{E}_{\nu}(t_{j}) \mathfrak{E}_{\nu}(iu_{j})}{\mathfrak{E}_{\nu}(iu)}} \mathfrak{E}_{\nu}(t).$$

Und auf innere Punkte tibt diese Belegung ein Potential aus, welches $= -G_{ij}$ ist [s. Gl. 50)].

Liegt dagegen der inducirende Punkt ausserhalb des Cylinders, in α , so ist ganz entsprechend:

$$q_{\sigma} = - \eta_{\alpha}^{\sigma}$$

54)
$$q_{\sigma} = -\frac{1}{\pi^{2} \sqrt{\psi}} \int_{0}^{\infty} dh \cos h(x - x_{\sigma}) \cdot F(h),$$

$$F(h) = \sum_{0}^{\infty} \sqrt{\frac{\mathfrak{E}_{\nu}(t_{\sigma}) \mathfrak{F}_{\nu}(iu_{\sigma})}{\mathfrak{F}_{\nu}(iu)}} \mathfrak{E}_{\nu}(t)$$

und das Potential dieser Belegung auf äussere Punkte $=-G_{aa}$.

Die Gesammtmassen der sich bildenden Belegungen werden durch die am Schlusse des vorigen Paragraphen aufgestellten Formeln gegeben.

Die Dichtigkeit q der durch einen elektrischen Massenpunkt +1 auf der Oberfläche eines unendlich langen elliptischen Cylinders inducirten Elektricität stimmt also mit der negativen Dichte η der auf jenen Punkt als Centralpunkt sich beziehenden Green'schen Belegung überein. Dasselbe Resultat ergiebt sich auch bei anderen, geschlossenen Flächen. Es verdient indessen Beachtung, dass nach einer Bemerkung von Heine* in unserem Falle q genau durch $-\eta$ ausgedrückt wird, während bei geschlossenen Flächen diese Annahme eine nur angenäherte Giltigkeit besitzt.

Die Gleichungen 53) und 54) gestatten vorläufig keine weitere Vereinfachung.

Für besondere Lagen des inducirenden Punktes dagegen lassen sich einige Eigenschaften der inducirten Belegung angeben, die ich in Kürze ableiten will.

Der Formel 53), in der man ohne Beschränkung der Allgemeinheit $x_j = 0$ setzen darf, entnimmt man, dass die Dichte q für Punkte, die sich nur im Vorzeichen von x unterscheiden, dieselbe ist. Nimmt x seinem absoluten Werthe nach zu, so nimmt q ab. Denn für einen zweiten Punkt σ_1 , dessen $x_1 > x$, hat man:

$$q_{\sigma_1} = -\frac{1}{\pi^2 \sqrt{\psi}} \int_0^{\infty} dh \cosh x_1 F(h),$$

und da für jeden Werth von h:

$$\cosh x_1 < \cosh x_2$$

so folgt dass:

$$q_{\sigma_1} < q_{\sigma}$$
.

Diese Abnahme von q_{σ} erfolgt bis in die Unendlichkeit, so dass an den unendlich entfernten Enden des Cylinders die Dichtigkeit der Elektricität = 0 ist. Genauer überzeugt man sich hiervon durch Anwendung des Du Bois-Reymond'schen Mittelwerthsatzes, welcher zeigt, dass:

$$\lim_{s=\infty} \int_{0}^{\infty} \cos h x \, dh \, . \, F(h) = 0$$

^{*} Kugelfunctionen, II. Bd. S. 89 Anm. und S. 278.

ist, sobald F(h) den Bedingungen, im Intervalle 0 bis ∞ abtheilungsweise stetig und abtheilungsweise monoton zu sein, genügt. Diese Bedingungen werden aber von F(h) jedenfalls erfüllt. Die Maximaldichte findet also für die Punkte, deren x=0, statt, d. h. die in der Ebene des inducirenden Punktes gelegen sind.

Bei diesen Erörterungen, welche noch für jede Lage des inducirenden Punktes gelten, berücksichtigten wir nur die Abhängigkeit der Dichte q von x. Es möge jetzt q als Function von t betrachtet, es möge also die Vertheilung der Elektricität auf dem Umfange einer zur Basis des Cylinders parallelen Ellipse untersucht werden. Hierzu ist eine Discussion des Ausdruckes:

$$F(h) = \sum_{0}^{\infty} \Psi \frac{\mathfrak{E}_{\boldsymbol{v}}(t_j) \, \mathfrak{E}_{\boldsymbol{v}}(i \, u_j)}{\mathfrak{E}_{\boldsymbol{v}}(i \, u)} \, \mathfrak{E}_{\boldsymbol{v}}(t)$$

nöthig, von welchem jene Vertheilung abhängt.

Wir zerlegen F(h) in vier Theile, entsprechend den vier Classen der Functionen \mathfrak{E} , etwa in folgender Weise:

$$F(h) = M_1 + M_2 + M_3 + M_4,$$

wo nun M1 die Functionen & erster Classe enthält, also gleich

$$\sum_{n}^{\infty} v \frac{\mathfrak{E}_{v}^{\mathbf{I}}(t_{j}) \mathfrak{E}_{v}^{\mathbf{I}}(i u_{j})}{\mathfrak{E}_{v}^{\mathbf{I}}(i u)} \mathfrak{E}_{v}^{\mathbf{I}}(t)$$

ist u. s. w.

Betrachten wir jetzt vier symmetrisch gelegene Punkte auf der Peripherie der Ellipse, so finden wir, Gebrauch machend von der Tabelle 26), S. 266, folgende Werthe für F(h) in den vier Quadranten:

I. Quadrant:
$$F(h) = M_1 + M_2 + M_3 + M_4$$
,
II. $F(h) = M_1 - M_2 + M_3 - M_4$,
III. $F(h) = M_1 - M_2 - M_3 + M_4$,
IV. $F(h) = M_1 + M_2 - M_3 - M_4$.

Man braucht also nur die Dichte q für Punkte eines Quadranten, etwa des ersten, zu kennen, um sie für Punkte der übrigen Quadranten zu bestimmen.

Für die Enden der Axen, d. i. für t=0, $\frac{\pi}{2}$, π , $\frac{3\pi}{2}$, ergiebt sich mit Anwendung von 25), S. 266:

$$t = 0: F(h) = M_1^{(0)} + M_2^{(0)},$$

$$t = \frac{\pi}{2}: F(h) = M_1^{(\frac{\pi}{2})} + M_3^{(\frac{\pi}{2})},$$

$$t = \pi: F(h) = M_1^{(0)} - M_2^{(0)},$$

$$t = \frac{3\pi}{2}: F(h) = M_1^{(\frac{\pi}{2})} - M_3^{(\frac{\pi}{2})}.$$

Die oben angefügten Marken (0) bez. $\left(\frac{\pi}{2}\right)$ sollen die Substitution dieser Werthe von t in die M bezeichnen.

Von Interesse ist es, Punkte der Ellipse aufzusuchen, in denen üsselbe Dichte herrscht, was darauf hinauskommt, zwei Werthe von t zu bestimmen, für welche F(h) gleiche Werthe annimmt. Eine solche Ustrauchung, die beim Kreiscylinder zu sehr einfachen Resultaten führt, ließ sich jedoch hier wohl nicht ausführen, so lange die Lage des inducirenden Punktes j allgemein bleibt.

Wir specialisiren deshalb die Lage von j und nehmen an, dass erstess j auf der kleinen Axe der Ellipse liege, d. h. dass $t_j = \frac{\pi}{2}$ oder $= \frac{3\pi}{2}$ sci. Dann ist aber:

folglich auch:

$$\mathfrak{E}_{\mathbf{r}}^{\mathbf{II}}(t_j) = 0, \quad \mathfrak{E}_{\mathbf{r}}^{\mathbf{IV}}(t_j) = 0,$$

$$\mathbf{M}_{\mathbf{s}} = 0, \quad \mathbf{M}_{\mathbf{s}} = 0,$$

und man bemerkt, dass F(h) für symmetrisch gelegene Punkte des 1. und 2., sowie des 3. und 4. Quadranten gleiche Werthe annimmt; für diese nämlich $M_1 - M_3$, für jene $M_1 + M_3$. Die Vertheilung ist also symmetrisch in Bezug auf die kleine Axe der Directrix.

Liegt zweitens j auf der grossen Axe der Ellipse, so ist entweder $u_j = 0$, oder $t_j = 0$ oder $= \pi$, je nachdem j innerhalb oder ausserhalb der Brennlinie liegt. In beiden Fällen verschwinden die Functionen $\mathfrak{E}_{\varphi}(iu_j)$ resp. $\mathfrak{E}_{\varphi}(t_j)$ der dritten und vierten Classe; es ist also:

$$M_3=0, \quad M_4=0,$$

d. h.: die Vertheilung ist symmetrisch in Bezug auf die grosse Axe der Ellipse.

Liegt endlich drittens j im Coordinatenanfange selbst, so verschwinden die Ausdrücke M_2 , M_3 , M_4 , d. h.: die Elektricität ist symmetrisch in Bezug auf beide Axen der Ellipse vertheilt, denn in allen vier Quadranten besitzt F(h) denselben Werth M_1 .

Anhang. Ist die Excentricität c der Basis des Cylinders so klein, dass höhere als zweite Potenzen derselben vernachlässigt werden können, unterscheidet sich also der elliptische Cylinder nur wenig von einem Kreiscylinder, so gelten folgende Näherungsformeln für die Functionen $\mathfrak{E}_{\varphi}(t)$, $\mathfrak{E}_{\varphi}(iu)$, $\mathfrak{F}_{\varphi}(iu)$.

I. und II. Classe:

$$\mathfrak{E}_{0}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(1 + \frac{h^{2}c^{2}}{8} \cos 2t \right),$$

$$\mathfrak{E}_{1}(t) = \cos t + \frac{h^{2}c^{2}}{32} \cos 3t,$$

$$\mathfrak{E}_{k}(t) = \cos kt + h^{2}c^{2} \left[\frac{\cos(k+2)t}{16(k+1)} - \frac{\cos(k-2)t}{16(k-1)} \right], \quad k=2,3,\ldots,$$

III. und IV. Classe: Dieselben Ausdrücke, nur tritt der Sinus für den Cosinus ein.

Diese Näherungsformeln, deren Ableitung hier übergangen werden möge, befriedigen die Differentialgleichung für $\mathfrak{E}(t)$ bis auf Grössen der Ordnung c^2 und genügen mit demselben Genauigkeitsgrade auch den Integralformeln des § 3.

Als Annäherungen für die Constanten k_{σ} , welche sich als Wurzeln einer Gleichung unendlich hohen Grades darstellen, ergeben sich bis auf Grössen vierter Ordnung genau die ganzen Zahlen $0, 1, 2, \ldots$ Weiter folgt:

$$\mathfrak{E}_{y}(iu) = (1+c^{2}) J_{k}(hir),$$

 $\mathfrak{F}_{y}(iu) = (1+c^{2}) Y_{k}(hir),$

worin:

$$r=\frac{c}{2}e^{u}.$$

Mit Benutzung dieser Werthe wird η_j für einen auf der Axe des Cylinders liegenden Centralpunkt j durch folgenden Ausdruck dargestellt:

$$\begin{split} \eta_{j} &= -\frac{1}{2\,r\,\pi^{2}} \int\limits_{0}^{\infty} \frac{\cos h\,x\,d\,h}{J_{0}(h\,i\,r)} - \frac{c^{2}}{32\,\pi^{2}} \int\limits_{0}^{\infty} \cos h\,x\,G(h)\,d\,h\,, \\ G(h) &= -\frac{h^{2}}{r\,J_{0}(h\,i\,r)} + \cos 2\,t\,\bigg[\frac{h^{2}}{r}\bigg(\frac{2}{J_{0}(h\,i\,r)} + \frac{1}{J_{2}(h\,i\,r)}\bigg) + \frac{\bullet}{r^{3}\,J_{0}(h\,i\,r)}\bigg]. \end{split}$$

Das erste, von c^2 freie Glied repräsentirt die Dichte der Green'schen Relegung oder der inducirten Elektricität eines Kreiscylinders, dessen Basis den Radius r besitzt, falls der mit der Masse +1 geladene Punkt auf der Axe liegt. Das zweite Glied drückt daher die Abweichung der Dichte des elliptischen von der des Kreiscylinders aus. Dieselbe ist verschieden für die Punkte einer Ellipse; doch besitzt sie, da sie nur von $\cos 2t$ abhängt, für symmetrisch gelegene Punkte denselben Werth.

Zum Schlusse sei noch bemerkt, dass die auf den vorstehenden Blättern behandelte Aufgabe auch dadurch gelöst werden kann, dass man den elliptischen Cylinder als Specialfall eines Ellipsoids oder eines elliptischen Kegels betrachtet. Die erste Methode hat sich mir nicht als erfolgreich gezeigt. Die zweite fordert zur Untersuchung der bis jetzt noch nicht behandelten Functionen des elliptischen Kegels auf, deren Grenzfälle die Functionen des elliptischen Cylinders sein werden, genau so, wie die von Herrn Mehler eingeführten Kegelfunctionen die Bessel'schen Functionen als Grenzfälle besitzen.

Mit Anwendung der Methode der reciproken Radien erhält man noch die Lösung der Aufgabe: die Vertheilung einer ohne Einwirkung äusserer Kräfte auf dem Bilde des Cylinders sich befindenden Elektricitätsmenge zu bestimmen. Legt man den Mittelpunkt der Kugel, in Bezug auf welche der Cylinder abgebildet wird, in die Cylinderaxe, so ist das Bild des Cylinders eine geschlossene Fläche, welche von Ebenen, die durch die Axe gehen, in Kreisen geschnitten wird. Diese Kreise, von verschiedener Grösse, berühren die Axe. Bei einem Kreiscylinder sind alle Kreise gleich gross und man kann dessen Bildfläche dann als einen besondern Fall des Kreisringes ansehen, nämlich den, dass der rotirende Kreis nicht ausserhalb der Rotationsaxe liegt, sondern dieselbe tangirt.

XVII.

Näherungsformeln für Inhalt und Oberfläche niedriger Flächenabschnitte.

Von

Dr. L. GEISENHEIMER, Bergschul-Director in Tarnowits, O.-S.

Hierzu Taf. VII Fig. 1.

Die Planimetrie besitzt in den Ausdrücken für den Inhalt J und die angenäherte Bogenlänge l eines beliebigen Parabelsegments, $J = \frac{2}{3}gh$ und $l = g\left[1 + \frac{8}{3}\left(\frac{h}{g}\right)^2\right]$, wo g die Sehne, h die Scheitelhöhe des Segments bedeutet, zwei für die Praxis des Feldmessers werthvolle, viel angewendete Formeln. In nachstehender Entwickelung sollen die entsprechenden stereometrischen Formeln, also Ausdrücke für die näherungsweise Berechnung des körperlichen Volumens, welchen irgend ein kleiner Theil einer Fläche über der schiefen oder orthogonalen Projection seines Umfanges bildet, und der Oberfläche dieses Flächentheils hergeleitet werden. Durch mehrere Beziehungen, welche sich hierbei bezüglich der Trägheitsmomente einer ebenen Figur ergeben, gewinnt die Entwickelung vielleicht ein weiteres Interesse.

Berechnung des Inhalts eines mit flachem Gewölbe überspannten Raumes.

Im Scheitel der überwölbenden Fläche wählen wir zwei beliebige conjugirte Tangenten als X- und Y-Axe; die nach Richtung des Projectionsstrahles fallende Z-Axe bilde mit der Scheitel- (Tangential-) Ebene der Fläche den Winkel $(z, xy) = \gamma$. Die Flächengleichung kann dann in der Form gegeben werden:

$$s = \frac{r}{2} x^2 + \frac{s}{2} y^2 + \frac{t}{6} x^3 + \frac{u}{2} x^2 y + \frac{v}{2} x y^2 + \frac{w}{6} y^3 + \dots$$

und für den Inhalt des durch die Scheitelebene, die Projectionsstrahlen und die Fläche umschlossenen Raumes ergiebt sich, indem wir uns auf die zweiten Potenzen beschränken,

$$J = \int \left(\frac{r}{2}x^2 + \frac{s}{2}y^2\right) \sin(xy) \cdot \sin \gamma \cdot dx dy.$$

Werden die Trägheitsmomente der Projection bezüglich der X- und Y-Axe mit T_{xx} und T_{yy} bezeichnet, so wird:

$$J = \frac{1}{2 \sin^2(xy)} \cdot (r \sin \gamma \, T_{yy} + s \sin \gamma \, T_{xx}).$$

Bedeuten ϱ_x und ϱ_y die Krümmungsradien der längs der X- und Y-Axe fallenden Normalschnitte, so ist

$$r. \sin \gamma = \sin \gamma \lim \frac{2s}{x^2} = \frac{1}{\varrho_x}$$
, ebenso $s. \sin \gamma = \frac{1}{\varrho_y}$

daher

1)
$$J = \frac{1}{2 \sin^2(xy)} \left(\frac{T_{xx}}{\varrho_y} + \frac{T_{yy}}{\varrho_x} \right).$$

Dieser Ausdruck ist von der Neigung der Z-Axe unabhängig; subtrahirt man ihn vom Inhalte des prismatischen Raumes, welchen die Scheitelebene, die Projectionsstrahlen und irgend eine Grundebene begrenzen, so folgt der Inhalt des über der letzteren liegenden, durch die Fläche überspannten Raumes.

Da der Werth für J von der Wahl der X- und Y-Axe unabhängig sein muss und ϱ_x . ϱ_y . $sin^2(xy)$ einen festen Werth, nämlich das Reciproke des Krümmungsmaasses der Fläche im Scheitelpunkte bildet, folgt:

$$T_{xx} \cdot \varrho_x + T_{yy} \cdot \varrho_y = Const.$$

welche Gleichung sich auch, unabhängig von der vorstehenden Entwickelung, folgendermassen herleiten lässt:

a und b seien die nach Richtung der X- und Y-Axe fallenden Halbmesser der Indicatrix der Fläche, p, bezüglich q und R die Abstände eines beliebigen Punktes der XY- Ebene von den Axen X, Y und dem Coordinatenanfangspunkte; so gilt bekanntlich für conjugirte Halbmesser der Indicatrix die Formel:

$$a^2 \sin^2(a, R) + b^2 \sin^2(b, R) = Const.$$
 oder $p^2 \cdot \varrho_x + q^2 \cdot \varrho_y = Const. R^2$,

womit, da R von der Wahl des Coordinatensystems unabhängig, die eben gefundene Gleichung bewiesen ist.*

Falls der Scheitelpunkt der Fläche hyperbolischer Natur ist, die Scheitelebene also die Fläche schneidet, haben ϱ_x und ϱ_y entgegengesetztes Vorzeichen. Formel 1), welche in diesem Falle unbestimmt werden kann, lässt sich alsdann in eine andere Form überführen, indem man die X- und Y-Axe in die Asymptoten der Indicatrix verlegt. Sind ϱ_1 , ϱ_2 die absoluten Werthe der Hauptkrümmungsradien, $\varrho_1 > \varrho_2$, so liefert diese Transformation auf die Inflexionstangenten die Gleichung:

^{*} Der entsprechende planimetrische Satz lautet: Sind a, b zwei conjugirte Halbmesser eines, a_1 , b_1 die nach gleicher Richtung fallenden Halbmesser eines beliebigen andern concentrischen Kegelschnittes, so ist $\frac{a^2}{a \cdot b} + \frac{b^2}{b \cdot b} = \text{Const.}$

Oberfläche einer beliebig begrenzten flachen Kuppe.

Wird das Coordinatensystem wie bei Formel 1) gewählt, so dass X und Y conjugirte Richtungen des Scheitelpunktes, Z beliebig; bedeutet ferner n die Normale der Fläche, (nx), (ny), (nz) deren spitze Winkel mit den Axen, so erhält man für die Oberfläche O:

$$0 = \sin(xy) \sin \gamma \int \frac{dx.dy}{\cos(nz)}.$$

Aus der Flächengleichung:

$$s = \left(\frac{r}{2} x^2 + \frac{s}{2} y^2\right) + \left(\frac{t}{6} x^3 + \frac{u}{2} x^2 y + \frac{v}{2} x y^2 + \frac{w}{6} y^3\right)$$

folgt:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = rx + \frac{1}{2} (tx^2 + 2uxy + vy^2), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = sy + \frac{1}{2} (ux^2 + 2vxy + wy^2),$$
$$\frac{\partial F}{\partial x} = -1.$$

Sind α , β , γ die Höhen des aus den Coordinatenaxen gebildeten körperlichen Dreiecks, also $\alpha = L(x, yz)$ u. s. f., so findet man die Winkel der Normalen mit den Axen durch die Gleichungen:

$$\cos(nx) : \cos(ny) : \cos(nz) = \frac{\partial F}{\partial x} : \frac{\partial F}{\partial y} : \frac{\partial F}{\partial z},$$

$$\frac{\cos^{2}(nx)}{\sin^{2}\alpha} + \frac{\cos^{2}(ny)}{\sin^{2}\beta} + \frac{\cos^{2}(nz)}{\sin^{2}\gamma} - 2\frac{\cos z}{\sin\alpha \cdot \sin\beta} \cdot \cos(nx)\cos(ny)$$

$$-2\frac{\cos y}{\sin\alpha \cdot \sin\gamma} \cdot \cos(nx)\cos(nz) - 2\frac{\cos x}{\sin\beta \cdot \sin\gamma} \cdot \cos(ny)\cos(nz) = 1,$$

wo x, y, s die Winkel des erwähnten körperlichen Dreiecks. Hiernach wird:

1

$$\sqrt{\frac{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^{2}}{sin^{2}\alpha} + \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^{2}}{sin^{2}\beta} + \frac{1}{sin^{2}\gamma} - 2\frac{\cos x}{sin\alpha\sin\beta}\frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{\partial F}{\partial y} + 2\frac{\cos y}{\sin\alpha\sin\gamma}\frac{\partial F}{\partial x} + 2\frac{\cos x}{\sin\beta\sin\gamma}\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

$$\frac{\overline{\cos(nz)}}{1 + \frac{\sin^2 \gamma}{\sin^2 \alpha} \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \frac{\sin^2 \gamma}{\sin^2 \beta} \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 - 2\cos z \frac{\sin^2 \gamma}{\sin \alpha} \frac{\partial F}{\partial x} + 2\cos y \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha} \frac{\partial F}{\partial x} + 2\cos x \frac{\sin \gamma}{\sin \beta} \frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial x}}$$

Da $\frac{\partial F}{\partial x}$ und $\frac{\partial F}{\partial y}$ in der Nähe des Scheitels gegen Null convergiren, kann der binomische Satz angewendet werden. Nach Einsetzung der für die Partiellen Ableitungen bestimmten Werthe kommt:

$$\begin{split} O = & \int\! dx \,.\, dy \,. \sin(xy) \,+ \int\! \left(\cos y \, \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha} \, r \,.\, x + \cos x \, \frac{\sin \gamma}{\sin \beta} \, s \,.\, y\right) dx \,.\, dy \,. \sin xy \\ & + \frac{1}{2} \int\! \left(\frac{\sin^2 \gamma}{\sin^2 \alpha} \sin^2 y \, r^2 \,.\, x^2 \,- 2 \, \frac{\sin^2 \gamma}{\sin \alpha \, \sin \beta} \sin x \, \sin y \, \cos(xy) \, r \, s \,.\, xy \right. \\ & \quad \left. + \frac{\sin^2 \gamma}{\sin^2 \beta} \sin^2 x \, s^2 \,.\, y^2\right) dx \,.\, dy \, \sin xy \\ & \quad \left. + \frac{1}{2} \sin \gamma \int\! \left(\left(\frac{\cos y}{\sin \alpha} \, t + \frac{\cos x}{\sin \beta} u\right) x^2 + 2 \left(\frac{\cos y}{\sin \alpha} \, u + \frac{\cos x}{\sin \beta} v\right) xy \right. \\ & \quad \left. + \left(\frac{\cos y}{\sin \alpha} \, v + \frac{\cos x}{\sin \beta} w\right) y^2\right\} dx \,.\, dy \,. \sin(xy) \,. \end{split}$$

Bezeichnen wir den Inhalt der durch die Z-Axe erhaltenen Projection des die auszurechnende Fläche begrenzenden Umfanges auf die Scheitelebene mit F, die Schwerpunktscoordinaten dieser Projection mit ξ und η , ihre Trägheitsmomente bezüglich der X- und Y-Axe wieder mit T_{xx} und T_{yy} , ferner $sin^2(xy) \int xy . dx . dy . sin(xy)$, also die Summe aus den Flächentheilen multiplicirt mit ihren senkrechten Abständen von der X- und Y-Axe, mit T_{xy} , so ergiebt sich nach einigen einfachen trigonometrischen Umformungen:

$$\begin{split} O &= \mathbb{F}\left\{1 + \cos y \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha} r.\xi + \cos x \frac{\sin \gamma}{\sin \beta} s.\eta\right\} \\ &+ \frac{\sin^2 \gamma}{2 \sin^4(xy)} \{r^2 T_{yy} - 2\cos(xy) rs T_{xy} + s^2 T_{xx}\} \\ &+ \frac{\sin \gamma}{2 \sin^3(xy)} \{(\cot y.t + \cot y.u) T_{yy} + 2(\cot y.u + \cot y.v) T_{xy} \\ &+ (\cot y.v + \cot y.u) T_{xx}\}. \end{split}$$

Bedeutet v die Normale des über dem Schwerpunkte der Grundfläche (der Projection) liegenden Flächenpunktes, so wird:

$$\begin{split} \frac{\sin\gamma}{\cos\left(v\,s\right)} &= 1 + \cos y \frac{\sin\gamma}{\sin\alpha} \, r \cdot \xi + \cos x \frac{\sin\gamma}{\sin\beta} \, s \cdot \eta \\ &\quad + \frac{\sin^2\gamma}{2 \cdot \sin^2\left(xy\right)} \left\{ r^2 \, \xi^2 - 2 \, \cos\left(xy\right) \, r \, s \cdot \xi \, \eta + s^2 \, \eta^2 \right\} \\ &\quad + \frac{\sin\gamma}{2 \cdot \sin\left(xy\right)} \left\{ \left(\cot y \cdot t + \cot y \cdot u\right) \, \xi^2 + 2 \left(\cot y \cdot u + \cot y \cdot v\right) \, \xi \, \eta + \left(\cot y \cdot v + \cot y \cdot u\right) \, \eta^2 \right\} \, . \end{split}$$

welche Gleichung in Verbindung mit der vorletzten liefert:

$$0 = F \frac{\sin \gamma}{\cos(s v)} + \frac{\sin^2 \gamma}{2 \sin^4(xy)} \{ r^2 T_{\eta \eta} - 2 \cos(xy) r s T_{\xi \eta} + s^2 T_{\xi \xi} \}$$

$$+ \frac{\sin \gamma}{2 \sin^3(xy)} \{ (\cot y \cdot t + \cot y \cdot u) T_{\eta \eta} + 2 (\cot y \cdot u + \cot y \cdot v) T_{\xi \eta} + (\cot y \cdot v + \cot y \cdot w) T_{\xi \xi} \},$$

wo Tee, Te, Te, die entsprechenden, auf den Schwerpunkt bezogenen Summen darstellen.

Die in genau entsprechender Weise für die vom Scheitelpunkte gemessene Bogenlänge l einer ebenen Curve, deren Coordinatenaxen den Winkel γ bilden und deren Gleichung $y = \frac{r}{2}x^2 + \frac{t}{6}x^3$ lautet, herzuleitende Gleichung heisst:

 $l = x + \frac{r}{2}\cos y \cdot x^2 + \frac{1}{6}(r^2\sin^2 y + t\cos y)x^3.$

Die vorstehenden Formeln enthalten bei beliebiger Wahl der Z-Axe die Coefficienten t, w, w der Glieder dritter Ordnung; in diesem Falle unterscheiden sich also im Allgemeinen die zu derselben Projection (in der Scheitelebene bez. Tangente) gehörenden Flächenräume einander osculirender Flächen um Grössen vierter, die Bogenlängen osculirender Curven um Grössen dritter Ordnung. Der von diesen meist unbekannten Coefficienten abhängige Theil der Correction verschwindet, wenn die Z-Axe mit der Flächennormalen zusammenfällt, die Projection also orthogonal wird. Für diese in der Praxis fast ausschliesslich angewendete Art der Projection nimmt die Formel 5) die einfachere Gestalt an:

$$O = F + \frac{1}{2 \sin^4(xy)} \{ r^2 T_{yy} - 2 \cos(xy) r s T_{xy} + s^2 T_{xx} \}$$
oder
$$O = \frac{F}{\cos(xy)} + \frac{1}{2 \sin^4(xy)} \{ r^2 T_{\eta\eta} - 2 \cos(xy) r s T_{\xi\eta} + s^2 T_{\xi\xi} \}$$

oder, wieder die Krümmungsradien ϱ_x und ϱ_y der conjugirten Normalschnitte durch die X- und Y-Axe einführend:

$$\begin{cases} O = F + \frac{1}{2\sin^4(xy)} \left\{ \frac{T_{xx}}{\varrho_y^2} - 2\cos(xy) \frac{T_{xy}}{\varrho_x \varrho_y} + \frac{T_{yy}}{\varrho_x^2} \right\}, \\ O = \frac{F}{\cos(xy)} + \frac{1}{2\sin^4(xy)} \left\{ \frac{T_{\xi\xi}}{\varrho_y^2} - 2\cos(xy) \frac{T_{\xi\eta}}{\varrho_x \varrho_y} + \frac{T_{\eta\eta}}{\varrho_x^2} \right\}. \end{cases}$$

Beide Formeln lassen sich in zwei wesentlich verschiedenen Weisen vereinfachen. Zunächst können die X- und Y-Axe so gewählt werden, dass T_{xy} bez. $T_{\xi\eta}$ verschwindet, indem man zwei Richtungen sucht, welche sowohl für die Indicatrix, wie für das zum Scheitel- oder Schwerpunkte der Projection gehörige Centralellipsoid conjugirte Durchmesser bilden. Da die Involution der zum Centralellipsoid, bezüglich der zu dessen Schnitt mit der Scheitelebene gehörigen Durchmesser stets elliptisch ist, existirt immer ein und nur ein Paar solcher Axen, falls nicht dieser Schnitt und die Indicatrix ähnliche Curven sind, in welchem Falle T_{xy} bez. $T_{\xi\eta}$ für jedes Paar conjugirter Tangenten Null wird. In der Praxis wird sich dieses Axenpaar oft als Mittellinie und die hierdurch halbirte Richtung der Projection ergeben.

Ferner können die Hauptkrümmungsrichtungen als Coordinatenaxen genommen werden, wodurch $L(xy) = \frac{\pi}{2}$ wird und die Formeln die Gestalt annehmen:

7)
$$O = \mathbf{F} + \frac{1}{2} \left(\frac{T_{xx}}{\varrho_y^2} + \frac{T_{yy}}{\varrho_x^2} \right) = \frac{\mathbf{F}}{\cos(zy)} + \frac{1}{2} \left(\frac{T_{\xi\xi}}{\varrho_y^2} + \frac{T_{\eta\eta}}{\varrho_x^2} \right).$$

Aus den verschiedenen Gestalten der Formel ergiebt sich der auf die bereits oben hergeleitete Eigenschaft der Trägheitsmomente leicht zurückzuführende Satz: $T_{xx} \rho_x^2 - 2\cos(xy) T_{xy} \rho_x \rho_y + T_{yy} \rho_y^2 = Const.$

Auf weitere Beziehungen, welche sich nach Gleichung 5) zwischen den Trägheitsmomenten und den Coefficienten der Glieder dritter Ordnung ergeben, gehen wir hier nicht weiter ein.

Aus den zuletzt gewonnenen Formeln folgt:

Die Oberfläche ist bei gegebener orthogonaler Projection innerhalb der hier beachteten Grenzen der Genauigkeit, bis auf Grössen einschliesslich vierter Ordnung*, von der Richtung der Krümmungsradien unabhängig, also für Flächen mit gleich und entgegengesetzt gerichteten Krümmungen dieselbe.

Die zu einer bestimmten Projection gehörige Oberfläche einer stetig gekrümmten Fläche wird ein Minimum, wenn der Scheitel mit dem Schwerpunkte der orthogonalen Projection des Umfangs auf die Scheitelebene zusammenfällt.

Damit bei gegebenem Inhalt des überwölbten Raumes die Oberfläche ein Minimum werde, müssen die Gleichungen stattfinden

$$\left(L(xy) = \frac{\pi}{2}\right):$$

$$\frac{T_{xx}}{\varrho_y^3} d\varrho_y = -\frac{T_{yy}}{\varrho_x^3} d\varrho_x$$

$$\frac{T_{xx}}{\varrho_y^3} d\varrho_y = -\frac{T_{yy}}{\varrho_x^3} d\varrho_x$$

$$\varrho_x = \varrho_y.$$

Die überwölbende Fläche ist also als Kugel zu betrachten. Wird das polare Trägheitsmoment des Grundrisses, $T_{xx} + T_{yy}$, mit T_p bezeichnet, so folgt für das körperliche Volumen J über der Scheitelebene und die Oberfläche O, wenn ϱ der Krümmungsradius des Gewölbes (der "Böhmischen Kappe"):

8)
$$J = \frac{1}{2} \frac{T_p}{\varrho}, \quad O = F + \frac{1}{2} \frac{T_p}{\varrho^2}. \bullet \bullet$$

^{*} Bei der Rectification ebener Curven gelten die entsprechenden Entwickelungen bis auf Glieder von höchstens dritter Ordnung.

welche, indem sie ein bestimmtes körperliches Volumen überspannt, die kleinste Oberfläche besitzt, führt bekanntlich auf die Bedingung, dass die Summe der Hauptkrümmungen in der gesuchten Fläche constant sei. Eine specielle Lösung wietet, in Uebereinstimmung mit der obigen Entwickelung, die Kugelfläche.

Oberfläche eines elliptischen Flächenabschnittes.

Bedeuten wieder, wie früher, h die Höhe des Abschnittes, a und b die Halbaxen der zur Indicatrix Shnlichen Grundfische F, so wird:

$$0 = F + \frac{1}{8} F\left(\frac{a^2}{\rho_x^2} + \frac{b^2}{\rho_y^2}\right) \text{ oder } 0 = F\left[1 + \frac{h}{4}\left(\frac{1}{\rho_x} + \frac{1}{\rho_y}\right)\right].$$

Bei Anwendung dieser Formel ist nicht nothwendig, dass der Scheitel des Abschnittes genau über dem Schwerpunkte der Grundfläche liege, da in diesem Falle die Verschiebungen ξ und η des Scheitels gegen den Schwerpunkt proportional mit h sind und somit die hierdurch bedingte Correction, gleich $\frac{1}{2} F\left(\frac{\xi^2}{\varrho_x^2} + \frac{\eta^2}{\varrho_y^2}\right)$, ausserhalb der Grenzen der hier beachteten Genauigkeit fällt.

Für die Calotte einer Kugel mit dem Radius o ergiebt sich hiernach:

$$0 = F\left(1 + \frac{1}{2} \frac{h}{\varrho}\right).$$

Ist der Radius des Grundkreises a, so wird (genau):

$$a^2 = h(2\varrho - h)$$
, daher $O = \frac{\pi}{2} \frac{a^2(2\varrho + h)}{\varrho} = 2\pi \varrho h - \frac{\pi}{2} \frac{h^3}{\varrho}$,

welcher Ausdruck in seinem ersten Gliede den genauen Werth für die Oberfäche des Kugelabschnittes giebt; das den Fehler der Entwickelung darstellende Glied $\frac{\pi}{2} \frac{h^3}{\varrho}$ ist von sechster Ordnung. Der Ausdruck von O für den Abschnitt einer beliebigen Fläche wird aus dem für die Calotte erhalten, indem man statt der Krümmung der Kugel $\left(\frac{1}{\varrho}\right)$ die mittlere Krümmung der Fläche $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\varrho_x}+\frac{1}{\varrho_y}\right)$ einsetzt. Bei gleicher Grundfläche besitzt die Kugelcalotte die kleinste Oberfläche.

Die entsprechende Formel für die Länge l eines Bogens mit dem Krüm- ungsradius ϱ über der Sehne g lautet:

$$l = g \left[1 + \frac{1}{3} \frac{h}{\rho} \right].$$

Die vorstehend entwickelten Formeln für die Fläche (den Bogen) eines Flächen- oder Bogenabschnittes lassen sich noch in der bemerkenswerthen Porm aufstellen:

9)
$$0 = \mathbf{F} + \frac{J}{\varrho}, \quad l = g + \frac{J}{2\varrho},$$

wo J den Inhalt des Abschnittes (Segments), $\frac{1}{\varrho}$ die (mittlere) Krümmung bedeutet.

Inhalt und Oberfläche eines über einem Kreise oder Rechteck liegenden Flächenstückes.

Nach Formel 1) folgt für das Volumen über der Scheitelebene, den Radius des Grundkreises a nennend (der Scheitel liege im Mittelpunkte des Kreises):

ferner nach 7): $J = \frac{\pi}{8} a^4 \left(\frac{1}{\varrho_x} + \frac{1}{\varrho_y} \right),$

 $O = F\left[1 + \frac{a^2}{8}\left(\frac{1}{\varrho_x^2} + \frac{1}{\varrho_y^2}\right)\right].$

Für Inhalt und Oberfläche über einem Rechteck, dessen Seiten 2a und 2b symmetrisch zum Scheitelpunkt parallel den Hauptkrümmungsrichtungen liegen, kommt:

$$J = \frac{1}{6} F\left(\frac{a^2}{\rho_a} + \frac{b^2}{\rho_b}\right), \quad O = F\left[1 + \frac{1}{6} \left(\frac{a^2}{\rho_a^2} + \frac{b^2}{\rho_b^2}\right)\right],$$

wo ϱ_a und ϱ_b die Krümmungsradien der zu a bez. b parallelen Normalschnitte bezeichnen. Diese Formeln können Verwendung finden, wenn enge Röhren eine Fläche durchsetzen.

Berechnung der krummen Oberfläche eines Zweiecks.

Wir legen wieder die zur Axe des Zweiecks parallelen Tangenten der begrenzenden Curven und verbinden deren Scheitelpunkte; der Scheitel der zu ermittelnden Oberfläche liegt bis auf Grössen höherer Ordnung über der Mitte letztgenannter Geraden senkrecht zu der durch diese und die Tangenten bestimmten Ebene. In diesem Scheitel wählen wir eine zur Axe des Zweiecks parallele Gerade zur Y-Axe, eine Parallele zur Verbindungslinie ist die conjugirte X-Axe. Die Projectionen der Grenzcurven auf die Scheitelebene dürfen bei Berechnung der Correction als parabolische Segmente betrachtet werden. Da T_{yy} eine Grösse sechster Ordnung, kann dieser Werth vernachlässigt werden; für T_{xx} ergiebt sich nach bekannten Formeln F. $\frac{1}{20}g^2\sin^2(xy)$, wo F den Flächeninhalt der Projection des Zweiecks auf die Scheitelebene, g dessen Axe bedeutet. Hiernach wird

10)
$$O = F \left(1 + \frac{1}{40 \sin^2(xy)} \cdot \frac{g^2}{\varrho_y^2} \right)$$

und $\varrho_g = \frac{g^2}{8h}$, wo h die Senkrechte aus g zur Scheitelebene oder (angenähert)

zur Ebene der Scheiteltangenten der Grenzcurven bedeutet. F darf hier im Allgemeinen nicht durch die für ein Parabelsegment geltenden Näherungswerthe ausgedrückt werden, da der hierdurch begangene Fehler mit g^2 proportional, also mit der Correction von gleicher Ordnung wäre. —

Die entwickelten Gleichungen mögen noch auf einige zusammengesetzte Echen Anwendung finden.

Berechnung eines flachen Kreuzgewölbes.*

Die Projectionen der einzelnen Kappen sind Dreiecke, deren Mittellinien die Axen der Wölbung ergeben. Eine Seite des überwölbten Vielecks heisse a, die zugehörige Mittellinie der Kappe m, die Scheitelhöhe des Gewölbes sei h, die X-Axe parallel a, die Y-Axe parallel m. Da $\varrho_y = \infty$, folgt für das Volumen einer Kappe unter der Scheitelebene:

$$J = \frac{1}{2\sin^2(xy)} \frac{T_{yy}}{\rho_x}, \quad T_{yy} = \frac{1}{24} \Delta \cdot a^2 \sin^2(xy), \quad \rho_x = \frac{a^2}{8h},$$

daher

 $J = \frac{1}{4} \Delta h$, we Δ die Projection der Kappe bedeutet.

Für den von den Kämpferpunkten aus überwölbten Raum folgt demnach $\frac{5}{6}$ F. h, F der Inhalt des überwölbten Vielecks. Dieses Volumen ist also von der Lage des Scheitels unabhängig. Weiter ergiebt sich für die Oberfläche des Gewölbes:

 $0 = F + \frac{h^2}{3} \sum \frac{m^2}{4}.$

Dieser Ausdruck wird für reguläre Figuren und Parallelogramme ein Minimum, wenn der Scheitel über dem Schwerpunkte der Grundfläche liegt.

Berechnung des flachen Klostergewölbes.

Die Projectionen der einzelnen Kappen sind wieder Dreiecke; die Ueberwölbung steht zu den Seiten der Grundfläche senkrecht, während ihre Axe letzteren parallel läuft.

Bezeichnet p die auf die Seite a des überwölbten Vielecks gefällte Senkrechte, ist ferner X parallel a, Y senkrecht X, so wird $\rho_s = \infty$, somit das Volumen unter der Scheitelebene:

$$J = \frac{1}{2} \sum_{q_{xx}} \frac{T_{xx}}{q_{y}}, \quad T_{xx} = \frac{1}{2} \Delta \cdot p^{2}, \quad q_{y} = \frac{p^{2}}{2h},$$

daher

 $J = \frac{1}{4} \Delta h$, we Δ und h die verige Bedeutung besitzen.

Für das von den Kämpferlinien aus überwölbte Volumen kommt $\frac{1}{4}$ F. h. Weiter wird: $O = F + \frac{h^2}{4} \sum_{i=1}^{4} \frac{a^2}{4}.$

Existirt ein der Grundfläche F eingeschriebener Kreis, so ist für dessen Mittelpunkt $\frac{a}{\Delta}$ constant, daher $\sum \frac{a^2}{\Delta^2} d\Delta = 0$; in diesem Falle wird also O ein Minimum, wenn der Scheitel über dem Mittelpunkte des der Grundfläche eingeschriebenen Kreises liegt. Dasselbe findet bei dem Parallelogramm statt, wenn die Projection des Scheitels in den Schwerpunkt der Grundfläche fällt.

^{*} Ueber die praktische Anwendung dieses und anderer flacher Gewölbe siehe: Breymann, Allgemeine Bau-Constructionslehre, 8. Aufl., Thl. I. S. AA § 10.

XVIII.

Ueber die relative Bewegung eines Punktes in einem in continuirlicher Deformation begriffenen Medium.

Von

Dr. BOBYLEW,
Professor an der Universität in St. Petersburg.

Hierzu Taf. VII Fig. 2.

Der vorliegende Aufsatz enthält einige Verallgemeinerungen der Kinematik der relativen Bewegungen, namentlich einige Sätze über die relative Bewegung eines Punktes in Bezug auf ein veränderliches Medium.

§ 1. Denken wir uns ein veränderliches Medium Π , welches sich bei der Bewegung so deformirt, dass eine jede durch die Punkte desselben gezogene ununterbrochene, endlich gekrümmte und endlich gewundene Curve alle diese Charaktere im Laufe der Bewegung behält.

Es sei ferner ein Punkt M gegeben, welcher in dem vom Medium Π erfüllten Raume irgend eine absolute Bewegung hat, und das Medium Π sei für diesen Punkt vollständig durchdringlich. In jedem Zeitpunkte der Bewegung wird der Punkt M sich in einem Punkte des Raumes befinden und zugleich mit einem Punkte μ des Mediums zusammenfallen.


Unter absoluter Bewegung des Punktes M verstehen wir ein mit der Zeit erfolgendes stetiges und continuirliches Fortschreiten des Punktes M durch die Punkte des Raumes.

Dem entsprechend werden wir unter relativer Bewegung des Punktes in Bezug auf das Medium Π das stetige und continuirliche Fortschreiten desselben durch die Punkte des Mediums verstehen.

Die durch alle Punkte des Mediums gezogene Curve, mit welchen der Punkt *M* im Laufe seiner Bewegung zusammentrifft, heisst die Bahn der relativen Bewegung. Diese Bahn ändert im Laufe der Bewegung nicht nur ihre Lage im Raume, sondern auch ihre Gestalt.

§ 2. Jede continuirliche Bewegung und Deformation eines continuirlichen Mediums kann folgendermassen ausgedrückt werden:

1)
$$\xi = \varphi_1(\alpha, \beta, \gamma, t)$$
, $\eta = \varphi_2(\alpha, \beta, \gamma, t)$, $\zeta = \varphi_3(\alpha, \beta, \gamma, t)$;



schrift für Mathematik u. Physik XXX, 6.



hier bedeuten α , β , γ die Anfangscoordinaten (für den Zeitpunkt t=0) eines beliebigen Punktes des Mediums, ξ , η , ζ die Coordinaten desselben Punktes für den Zeitpunkt t; φ_1 , φ_2 , φ_3 sind continuirliche Functionen von α , β , γ , t; diese Functionen sollen derart sein, dass die Ausdrücke 1) für alle Punkte des Mediums gelten und ihre Bewegungen ausdrücken.

Die Gleichungen der Bahn der absoluten Bewegung eines beliebigen Punktes des Mediums werden wir erhalten, indem wir in den Ausdrücken 1) die α , β , γ den Anfangscoordinaten dieses Punktes gleich machen und aus diesen Ausdrücken die Zeit t eliminiren.

§ 3. Die relative Bewegung des Punktes *M* ist bekannt, sobald wir angeben können, mit welchen Punkten des Mediums derselbe in jedem beliebigen Zeitpunkte der Bewegung zusammentrifft.

Ist die absolute Bewegung des Punktes M gegeben und durch die Formeln

2)
$$x = f_1(t), y = f_2(t), s = f_3(t)$$

ausgedrückt, so bestimmen sich:

die Anfangscoordinaten α_0 , β_0 , γ_0 des Punktes μ_0 des Mediums, mit welchem der Punkt M im Zeitpunkte t=0 zusammentrifft;

die Anfangscoordinaten α_1 , β_1 , γ_1 des Punktes μ_1 des Mediums, mit welchem der Punkt M im Zeitpunkte t_1 zusammentrifft u. s. w.,

überhaupt die Anfangscoordinaten α_{ε} , β_{ε} , γ_{ε} desjenigen Punktes μ_{ε} des Mediums, mit welchem M im Zeitpunkte $t=\tau$ zusammentrifft. Die Grössen α_{ε} , β_{ε} , γ_{ε} müssen bestimmt werden aus den Gleichungen

3)
$$\begin{cases} f_1(\tau) = \varphi_1(\alpha_{\epsilon}, \beta_{\epsilon}, \gamma_{\epsilon}, \tau), \\ f_2(\tau) = \varphi_2(\alpha_{\epsilon}, \beta_{\epsilon}, \gamma_{\epsilon}, \tau), \\ f_3(\tau) = \varphi_3(\alpha_{\epsilon}, \beta_{\epsilon}, \gamma_{\epsilon}, \tau), \end{cases}$$

welche bedeuten, dass in dem Zeitpunkte τ die Punkte M und μ_{τ} in einem Punkte des Raumes zusammenfallen.

Indem wir aus den Gleichungen 3) α_{ε} , β_{ε} , γ_{ε} ermitteln, erhalten wir die Ausdrücke für α_{ε} , β_{ε} , γ_{ε} als Functionen von ε :

4)
$$\alpha_{\epsilon} = F_1(\tau), \quad \beta_{\epsilon} = F_2(\tau), \quad \gamma_{\epsilon} = F_3(t),$$

welche für jeden Zeitpunkt gelten und die Anfangscoordinaten des zugehörigen Punktes μ_τ bestimmen; sie müssen als explicite Ausdrücke der relativen Bewegung des Punktes *M* im Medium *Π* betrachtet werden.

Wird aus den Gleichungen 4) die Zeit τ eliminirt, so erhalten wir die Gleichungen der Curve, welche durch die ursprünglichen Orte aller jener Punkte $\mu_0, \mu_1, \ldots \mu$ des Mediums gebildet ist, durch welche der Punkt während der Bewegung hindurchgeht; diese Curve stellt also die Lage der relativen Bahn im Raume für den Zeitpunkt t=0 vor.

§ 4. Während der Bewegung wird die relative Bahn durch dieselbe Reihe von Punkten μ_0 , μ_1 , ... μ_t des Mediums gebildet, durch welche sie im Zeitpunkte t=0 ging.

Die Bewegungen dieser Punkte werden durch die Ausdrücke 1) bestimmt, wenn wir in letzteren für α , β , γ die Anfangscoordinaten diese Punkte einführen; die Ausdrücke für die Bewegung des Punktes μ_{ε} werde somit:

$$\begin{cases} \xi = \varphi_1(F_1(\tau), F_2(\tau), F_3(\tau), t), \\ \eta = \varphi_2(F_1(\tau), F_2(\tau), F_3(\tau), t), \\ \zeta = \varphi_3(F_1(\tau), F_2(\tau), F_3(\tau), t), \end{cases}$$

wenn man τ als constant und t als variabel betrachtet; nach Eliminativon t aus diesen Gleichungen A) werden die Gleichungen:

5)
$$\Theta_1(\xi,\eta,\zeta,\tau) = 0, \quad \Theta_2(\xi,\eta,\zeta,\tau) = 0$$

der absoluten Bahn des Punktes ur erhalten.

Wird aber in denselben Ausdrücken A) t als eine Constante betractund werden dem τ alle möglichen Werthe gegeben, so werden die Ausdrücke A) die Coordinaten zur Zeit t aller die Bahn der relativen Bewegennt bildenden Punkte $\mu_0, \mu_1, \ldots, \mu_{\tau}$ darstellen. Indem wir also τ aus Gleichungen A) eliminiren, erhalten wir die Gleichungen:

6)
$$\Phi_1(\xi,\eta,\zeta,t) = 0, \quad \Phi_2(\xi,\eta,\zeta,t) = 0$$

der Lage der relativen Bahn im Zeitpunkte t im Raume.

Die Gleichungen A), bei constantem t und variablem τ , drücken die jenige absolute Bewegung aus, welche der Punkt M gehabt hätte, wenn:

1. das Medium von Anfang an unbeweglich und unveränderlich wäre und diejenige Lage im Raume aufbewahrt hätte, in welche es während se iner wirklichen Bewegung zur Zeit t gelangt war; und 2. wenn der Punk t M dabei seine relative Bewegung in Bezug auf das Medium vollkommen beibehalten hätte, d. h. wenn in dieser fingirten Bewegung der Punk t M mit einem jeden Punkte der Reihe $\mu_0, \mu_1, \ldots, \mu_{\tau}, \ldots$, und zwar in denselben Momenten wie bei der wirklichen Bewegung zusammengefallen t

§ 5. Die absolute Bewegung des Punktes M kann als zusammenge setzt aus seiner relativen Bewegung in Bezug auf das Medium H und aus seiner Führungsbewegung* mit diesem Medium im Raume betrachtet werden.

Unter relativer Geschwindigkeit und relativer Besch leunigung des Punktes Min einem beliebigen Zeitpunkte t is to die Geschwindigkeit und die Beschleunigung derjenigen Bewe zu verstehen, die der Punkt M gehabt hätte, wenn die F Chrungsbewegung von diesem Zeitpunkte an aufgehört hätte-

Die Führungsbewegung wird im Zeitpunkte t durch den in diesem Moment plötzlich eintretenden Stillstand des Mediums Π aufgehoben.

Indem dann der Punkt M seine relative Bewegung in Bezug auf des ruhende Medium fortsetzt, wird dieser Punkt M diejenige fingirte Bewegung ausführen, von der wir am Ende des vorigen Paragraphen gesprochen haben.

Mouvement d'entrainement.

Um also die relative Geschwindigkeit und die relative Beschleunigung des Punktes M für den Zeitpunkt t zu erhalten, muss man die Gleichungen A) im Sinne der fingirten Bewegung für den Zeitpunkt t nehmen und aus ihnen die Geschwindigkeit und Beschleunigung dieser fingirten Bewegung für t=t bestimmen.

Wir werden daher den Ausdruck für die Projection der relativen Geschwindigkeit u auf die X-Axe finden, wenn wir von der ersten Gleichung A) die Derivirte nach τ nehmen und dann $\tau = t$ setzen; es wird:

$$u\cos(u,X) = \frac{\partial \xi}{\partial a}F'_{1}(t) + \frac{\partial \xi}{\partial \beta}F'_{2}(t) + \frac{\partial \xi}{\partial \gamma}F'_{3}(t)$$

oder

7a)
$$u\cos(u, X) = \frac{\partial \xi}{\partial \alpha} \frac{d\alpha}{dt} + \frac{\partial \xi}{\partial \beta} \frac{d\beta}{dt} + \frac{\partial \xi}{\partial \gamma} \frac{d\gamma}{dt}$$

und in derselben Weise:

7 b)
$$u \cos(u, Y) = \frac{\partial \eta}{\partial \alpha} \frac{d\alpha}{dt} + \frac{\partial \eta}{\partial \beta} \frac{d\beta}{dt} + \frac{\partial \eta}{\partial \gamma} \frac{d\gamma}{dt}$$

7 c)
$$u\cos(u,Z) = \frac{\partial \zeta}{\partial \alpha} \frac{d\alpha}{dt} + \frac{\partial \zeta}{\partial \beta} \frac{d\beta}{dt} + \frac{\partial \zeta}{\partial \gamma} \frac{d\gamma}{dt}$$

hier sind:

. . .

8)
$$\frac{d\alpha}{dt} = F'_{1}(t), \quad \frac{d\beta}{dt} = F'_{2}(t), \quad \frac{d\gamma}{dt} = F'_{5}(t).$$

Die Richtung der relativen Geschwindigkeit ist zur relativen Bahn tangentiell.

Um die Ausdrücke für die Projectionen der relativen Beschleunigung us auf die Coordinatenaxen zu erhalten, muss man die zweiten Derivirten von den Gleichungen A) nach τ nehmen und dann τ gleich t setzen; wir erhalten:

$$\begin{split} \mathring{\mathbf{u}}\cos(\mathring{\mathbf{u}}, \mathbf{X}) &= \frac{\partial \xi}{\partial \alpha} \frac{d^2 \alpha}{dt^2} + \frac{\partial \xi}{\partial \beta} \frac{d^2 \beta}{dt^2} + \frac{\partial \xi}{\partial \gamma} \frac{d^2 \gamma}{dt^2} \\ \mathbf{9}_{a}) &\qquad + \frac{\partial^2 \xi}{\partial \alpha^2} \left(\frac{d\alpha}{dt}\right)^2 + \frac{\partial^2 \xi}{\partial \beta^2} \left(\frac{d\beta}{dt}\right)^2 + \frac{\partial^2 \xi}{\partial \gamma^2} \left(\frac{d\gamma}{dt}\right)^2 \\ &\qquad + 2 \left[\frac{\partial^2 \xi}{\partial \beta \partial \gamma} \frac{d\beta}{dt} \frac{d\gamma}{dt} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial \gamma \partial \alpha} \frac{d\alpha}{dt} \frac{d\gamma}{dt} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial \alpha \partial \beta} \frac{d\alpha}{dt} \frac{d\beta}{dt} \right]. \end{split}$$

Die Ausdrücke für $u\cos(u, Y)$ und $u\cos(u, Z)$ enthalten partielle Differentialquotienten von η und ξ anstatt solcher von ξ .

§ 6. Unter der Geschwindigkeitund der Beschleunigung der Führungsbewegung des Punktes M im Zeitpunkte t ist die Geschwindigkeit und die Beschleunigung derjenigen Bewegung zu verstehen, die der Punkt M haben würde, wenn die relative Bewegung von diesem Zeitpunkte an aufgehoben wäre.

Die relative Bewegung hört im Zeitpunkte t auf, wenn der Punkt M

von diesem Moment an in demjenigen Punkte des Mediums bleibt, nach

volchem er während der wirklichen Bewegung zur Zeit t gelangt ist.

Um also die Projectionen der Führungsgeschwindigkeit w und der Führungsbeschleunigung w auf die Coordinatenaxen für den Zeitpunkt t zu erhalten, muss man die erste und zweite Derivirte der Gleichungen A) nach t nehmen und dann τ gleich t setzen; man erhält:

10)
$$w \cos(w, X) = \frac{\partial \xi}{\partial t}$$
, $w \cos(w, Y) = \frac{\partial \eta}{\partial t}$, $w \cos(w, Z) = \frac{\partial \zeta}{\partial t}$;

11)
$$\overset{\circ}{w}\cos(\overset{\circ}{w},X) = \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}, \quad \overset{\circ}{w}\cos(\overset{\circ}{w},Y) = \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2}, \quad \overset{\circ}{w}\cos(\overset{\circ}{w},Z) = \frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2}.$$

§ 7. Die Projectionen der absoluten Geschwindigkeit v des Punktes M auf die Coordinatenaxen sind gleich den Derivirten nach der Zeit von den Functionen 2), welche das Gesetz der Veränderung der Coordinaten x, y, s des Punktes M mit der Zeit ausdrücken.

Andererseits werden die Coordinaten x, y, z durch die Functionen φ_1 , φ_2 , φ_3 [1)] ausgedrückt, wenn man in die letzteren $F_1(t)$, $F_2(t)$, $F_3(t)$ anstatt α , β , γ einführt. Es ergiebt sich:

$$v \cos(v, X) = \frac{dx}{dt} = \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial \xi}{\partial \alpha} \frac{d\alpha}{dt} + \frac{\partial \xi}{\partial \beta} \frac{d\beta}{dt} + \frac{\partial \xi}{\partial \gamma} \frac{d\gamma}{dt},$$

$$v \cos(v, Y) = \frac{dy}{dt} = \frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial \eta}{\partial \alpha} \frac{d\alpha}{dt} + \frac{\partial \eta}{\partial \gamma} \frac{d\gamma}{dt} + \frac{\partial \eta}{\partial \gamma} \frac{d\gamma}{dt},$$

$$v \cos(v, Z) = \frac{ds}{dt} = \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial \xi}{\partial \alpha} \frac{d\alpha}{dt} + \frac{\partial \xi}{\partial \beta} \frac{d\beta}{dt} + \frac{\partial \xi}{\partial \gamma} \frac{d\gamma}{dt}.$$

Zieht man die oben angeführten Gleichungen 7) und 10) in Betracht, so drücken die Formeln B) folgende bekannte Abhängigkeit zwischen den Geschwindigkeiten v, u, w aus:

Die Geschwindigkeit der absoluten Bewegung des Punktes M in einem beliebigen Moment t ist die geometrische Summe der gleichzeitigen relativen und Führungsgeschwindigkeit.

§ 8. Die Projectionen der absoluten Beschleunigung v des Punktes M auf die Coordinatenaxen sind gleich den zweiten Derivirten der Coordinaten x, y, s und können ausgedrückt werden entweder durch die zweiten Derivirten der Functionen $f_1(t)$, $f_2(t)$, $f_3(t)$ oder durch die zweiten totalen Differentialquotienten der Functionen φ_1 , φ_2 , φ_3 nach der Zeit, wobei α , β , γ als Functionen $F_1(t)$, $F_2(t)$, $F_3(t)$ zu betrachten sind. Daher erhalten wir mit Rücksicht auf die Ausdrücke 9) und 11) folgende Gleichungen:

$$\overset{\circ}{v}\cos(\overset{\circ}{v},X) = \overset{\circ}{w}\cos(\overset{\circ}{w},X) + \overset{\circ}{u}\cos(\overset{\circ}{u},X) \\
+ 2\left(\frac{\partial^{2}\xi}{\partial\alpha\frac{\partial t}{\partial t}} \frac{d\alpha}{\partial t} + \frac{\partial^{2}\xi}{\partial\beta\frac{\partial t}{\partial t}} \frac{d\beta}{\partial t} + \frac{\partial^{2}\xi}{\partial\gamma\frac{\partial t}{\partial t}} \frac{d\gamma}{\partial t}\right), \\
\overset{\circ}{v}\cos(\overset{\circ}{v},Y) = \overset{\circ}{w}\cos(\overset{\circ}{w},Y) + \overset{\circ}{u}\cos(\overset{\circ}{u},Y) \\
+ 2\left(\frac{\partial^{2}\eta}{\partial\alpha\frac{\partial t}{\partial t}} \frac{d\alpha}{\partial t} + \frac{\partial^{2}\eta}{\partial\beta\frac{\partial t}{\partial t}} \frac{d\beta}{\partial t} + \frac{\partial^{2}\eta}{\partial\gamma\frac{\partial t}{\partial t}} \frac{d\gamma}{\partial t}\right),$$

$$\dot{\mathbf{c}}\cos(\dot{\mathbf{v}}, \mathbf{Z}) = \dot{\mathbf{w}}\cos(\dot{\mathbf{w}}, \mathbf{Z}) + \dot{\mathbf{u}}\cos(\dot{\mathbf{u}}, \mathbf{Z}) \\
+ 2\left(\frac{\partial^2 \zeta}{\partial \alpha \partial t} \frac{d\alpha}{dt} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial \beta \partial t} \frac{d\beta}{dt} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial \gamma \partial t} \frac{d\gamma}{dt}\right).$$

Man ersieht hieraus, dass die absolute Beschleunigung vals geometrische Summe folgender drei Beschleunigungen betrachtet werden kann:

- 1. 4 der relativen Beschleunigung
- 2. w der Führungsbeschleunigung.
- der entgegengesetzt genommenen Rückkehrbeschleunigung[®]
 R, deren Projectionen auf die Coordinatenaxen sich durch die Formeln

$$R\cos(R, X) = -\frac{2}{\varepsilon} \left(\frac{\partial \xi_1}{\partial \alpha} \frac{d\alpha}{dt} + \frac{\partial \xi_1}{\partial \beta} \frac{d\beta}{dt} + \frac{\partial \xi_1}{\partial \gamma} \frac{d\gamma}{dt} \right),$$

$$R\cos(R, Y) = -\frac{2}{\varepsilon} \left(\frac{\partial \eta_1}{\partial \alpha} \frac{d\alpha}{dt} + \frac{\partial \eta_1}{\partial \beta} \frac{d\beta}{dt} + \frac{\partial \eta_1}{\partial \gamma} \frac{d\gamma}{dt} \right),$$

$$R\cos(R, Z) = -\frac{2}{\varepsilon} \left(\frac{\partial \xi_1}{\partial \alpha} \frac{d\alpha}{dt} + \frac{\partial \xi_1}{\partial \beta} \frac{d\beta}{dt} + \frac{\partial \xi_1}{\partial \gamma} \frac{d\gamma}{dt} \right)$$

ausdrücken lassen.

Hier bedeutet ε die Zeiteinheit und ξ_1 , η_1 , ξ_1 sind:

$$1 \ \, \mathbf{3}) \ \, \xi_1 = \frac{\partial \, \varphi_1(\alpha,\,\beta,\,\gamma,\,t)}{\partial \, t} \, \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \, \eta_1 = \frac{\partial \, \varphi_2(\alpha,\,\beta,\,\gamma,\,t)}{\partial \, t} \, \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \, \xi_1 = \frac{\partial \, \varphi_3(\alpha,\,\beta,\,\gamma,\,t)}{\partial \, t} \, \boldsymbol{\varepsilon}.$$

Denkt man sich ausser dem Medium Π noch ein anderes, ebenfalls verlaches Medium Π_1 , dessen Bewegung durch die Formeln 13) aussecht wird, — denkt man sich ferner einen Punkt M_1 , welcher in Bezug Π_1 dieselbe relative Bewegung

$$\alpha = F_1(t), \quad \beta = F_2(t), \quad \gamma = F_3(t)$$

wie M in Bezug auf Π ausführt, so ergiebt sich aus den Formeln 12), dass die Bückkehrbeschleunigung als verdoppelte, mit der Zeiteinheit dividirte und entgegengesetzt genommene Geschwindigkeit der relativen Bewegung des Punktes M_1 in Bezug auf Π_1 betrachtet werden kann.

Dies gilt jedoch nur, wenn die Formeln 13) die Bewegung eines solchen Mediums darstellen, welches continuirlich bleibt und dieselben Anfangsdimensionen wie das Medium Π hat. Letzteres ist unentbehrlich, damit der Punkt M_1 stets innerhalb des Mediums Π_1 bleibe. Im Falle die Formeln 13) diesen Bedingungen nicht entsprechen, muss die Bedeutung von R für jeden speciellen Fall besonders bestimmt werden.

Be is piel 1. Das bewegliche Medium Π sei zwischen zwei parallelen Ebenen x = +A und x = -A so enthalten, dass es in der Richtung der

^{*} Diese Beschleunigung entspricht der "Accélération centrifuge composée", welche in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler in der Kinematik von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbeschler von Som off (übersetzt von A. Ziwet) Rückkehrbes

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = \alpha \frac{d(\psi_1 \lambda_1)}{dt} + \beta \frac{d(\psi_2 \mu_1)}{dt} + \gamma \frac{d(\psi_3 \nu_1)}{dt}$$

oder, mit Rücksicht auf die Formeln 15):

18a)
$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = \frac{d(\psi_1 \lambda_1)}{\psi_1 dt} \varrho \cos(\varrho, X') + \frac{d(\psi_2 \mu_1)}{\psi_2 dt} \varrho \cos(\varrho, Y') + \frac{d(\psi_3 \nu_1)}{\psi_2 dt} \varrho \cos(\varrho, Z'),$$

woraus ferner:

19)
$$\begin{cases} \frac{\partial \xi}{\partial t} = a_{11} \xi + (a_{12} - r) \eta + (a_{18} + q) \zeta, \\ \frac{\partial \eta}{\partial t} = (a_{12} + r) \xi + a_{22} \eta + (a_{23} - p) \zeta, \\ \frac{\partial \zeta}{\partial t} = (a_{13} - q) \xi + (a_{23} + p) \eta + a_{33} \zeta. \end{cases}$$

Hier bedeuten:

$$\begin{aligned} a_{11} &= x_1 \lambda_1^2 + x_2 \mu_1^2 + x_3 \nu_1^2, \\ a_{22} &= x_1 \lambda_2^2 + x_2 \mu_1^2 + x_3 \nu_2^2, \\ a_{33} &= x_1 \lambda_3^2 + x_2 \mu_3^2 + x_3 \nu_3^2, \\ a_{12} &= x_1 \lambda_1 \lambda_2 + x_2 \mu_1 \mu_2 + x_3 \nu_1 \nu_3, \\ a_{23} &= x_1 \lambda_2 \lambda_3 + x_2 \mu_2 \mu_3 + x_3 \nu_2 \nu_3, \\ a_{31} &= x_1 \lambda_3 \lambda_1 + x_2 \mu_3 \mu_1 + x_3 \nu_3 \nu_1, \\ p &= \lambda_2 \lambda_3' + \mu_2 \mu_3' + \nu_2 \nu_3' = -(\lambda_3 \lambda_2' + \mu_3 \mu_2' + \nu_3 \nu_2'), \\ q &= \lambda_3 \lambda_1' + \mu_3 \mu_1' + \nu_3 \nu_1' = -(\lambda_1 \lambda_3' + \mu_1 \mu_3' + \nu_1 \nu_3'), \\ r &= \lambda_1 \lambda_2' + \mu_1 \mu_2' + \nu_1 \nu_2' = -(\lambda_2 \lambda_1' + \mu_2 \mu_1' + \nu_2 \nu_1'). \end{aligned}$$

Für die Ausdrücke der Projectionen der Rückkehrbeschleunigung die Axen X, Y, Z ergiebt sich:

$$R\cos(R, X) = -2\left[\frac{d(\psi_1 \lambda_1)}{dt} \frac{d\alpha}{dt} + \frac{d(\psi_2 \mu_1)}{dt} \frac{d\beta}{dt} + \frac{d(\psi_3 \nu_1)}{dt} \frac{d\gamma}{dt}\right]$$

oder, mit Rücksicht auf die Formeln 17):

$$\begin{array}{l} R\cos(R,X) \\ = -2 \left[\frac{d(\psi_1\lambda_1)}{\psi_1\,dt} u\cos(u,X') + \frac{d(\psi_2\mu_1)}{\psi_2\,dt} u\cos(u,Y') + \frac{d(\psi_3\nu_1)}{\psi_3\,dt} u\cos(u,Z') \right] \end{array}$$

Der eingeklammerte Theil dieser Formel unterscheidet sich von dem zwe Theile der Gleichung 18a) darin, dass in 19) anstatt der Projectionen e diejenigen von u vorkommen; hiermit drückt sich in diesem Beiss die Rückkehrbeschleunigung durch die verdoppelte und entgegengesetzt nommene Geschwindigkeit desjenigen Mediumpunktes aus, dessen Rad vector die relative Geschwindigkeit darstellt. Mit anderen Worten ha in diesem Beispiele dieselbe Bedeutung, wie im Falle eines unveränderlie Mediums.

Beispiel 2. Der Punkt M habe eine beliebige absolute Bewegung 1) und das Medium deformire sich nach dem Gesetze:

14)
$$\begin{cases} \xi = \alpha \psi_1 \lambda_1 + \beta \psi_2 \mu_1 + \gamma \psi_3 \nu_1, \\ \eta = \alpha \psi_1 \lambda_2 + \beta \psi_2 \mu_2 + \gamma \psi_3 \nu_2, \\ \xi = \alpha \psi_1 \lambda_3 + \beta \psi_2 \mu_3 + \gamma \psi_3 \nu_3; \end{cases}$$

hier bedeuten:

$$\psi_1 = e^{\int_{\mathbf{z}_1}^t dt}, \quad \psi_2 = e^{\int_{\mathbf{z}_1}^t dt}, \quad \psi_3 = e^{\int_{\mathbf{z}_1}^t dt}$$

und κ_1 , κ_2 , κ_3 irgendwelche continuirlichen Functionen der Zeit; λ_1 , λ_2 , λ_3 , μ_1 , μ_2 , μ_3 , ν_1 , ν_2 , ν_3 die Cosinusse der Winkel, welche drei unter einander rechtwinklige, sich um den Ursprung O drehende Axen OX', OY', OZ' mit den festen Axen OX, OY, OZ bilden. Diese Cosinusse, welche unter sich durch die sechs bekannten Relationen verbunden sind, können durch trigonometrische Functionen dreier Winkel φ , ϑ , ψ ausgedrückt werden; die Winkel φ , ϑ , ψ seien in unserem Falle als irgendwelche continuirliche Functionen der Zeit gegeben.

Indem man die Relationen, durch welche die Cosinusse λ_1 , λ_2 , ... ν_3 unter sich verbunden sind, berücksichtigt, wird man leicht aus den gegebenen Ausdrücken 14) folgende Formeln finden:

15)
$$\begin{cases} \alpha \psi_{1} = \xi \lambda_{1} + \eta \lambda_{2} + \xi \lambda_{3} = \varrho \cos(\varrho, X'), \\ \beta \psi_{2} = \xi \mu_{1} + \eta \mu_{2} + \xi \mu_{3} = \varrho \cos(\varrho, Y'), \\ \gamma \psi_{3} = \xi \nu_{1} + \eta \nu_{2} + \xi \nu_{3} = \varrho \cos(\varrho, Z'); \end{cases}$$

 ϱ bedeutet hier die Grösse und Richtung des Radiusvectors desjenigen Punktes, welchem die Coordinaten ξ , η , ζ zugehören.

Setzt man die Functionen f_1 , f_2 , f_3 statt ξ , η , ξ in die Formeln 15) ein, so erhält man die expliciten Ausdrücke der relativen Bewegung:

16)
$$\begin{cases} \alpha = \frac{1}{\psi_1} \left(\lambda_1 f_1(t) + \lambda_2 f_2(t) + \lambda_3 f_3(t) \right), \\ \beta = \frac{1}{\psi_2} \left(\mu_1 f_1(t) + \mu_2 f_2(t) + \mu_3 f_3(t) \right), \\ \gamma = \frac{1}{\psi_3} \left(\nu_1 f_1(t) + \nu_2 f_2(t) + \nu_3 f_3(t) \right). \end{cases}$$

Die Ausdrücke für die Projectionen von u auf die Axen X, Y, Z werden in unserem Falle:

$$u\cos(u,X) = \psi_1 \frac{d\alpha}{dt} \lambda_1 + \psi_2 \frac{d\beta}{dt} \mu_1 + \psi_3 \frac{d\gamma}{dt} \nu_1;$$

hieraus folgt, mit Rücksicht auf die Bedeutung der Cosinusse 1, 12, ... vs.

17)
$$\psi_1 \frac{d\alpha}{dt} = u \cos(u, X'), \quad \psi_2 \frac{d\beta}{dt} = u \cos(u, Y'), \quad \psi_3 \frac{d\gamma}{dt} = u \cos(u, Z').$$

Die Ausdrücke der Projectionen der Geschwindigkeit eines Punktes des Mediums auf die Axen X, Y, Z sind:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = \alpha \frac{d(\psi_1 \lambda_1)}{dt} + \beta \frac{d(\psi_2 \mu_1)}{dt} + \gamma \frac{d(\psi_2 \nu_1)}{dt}$$

oder, mit Rücksicht auf die Formeln 15):

18a)
$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = \frac{d(\psi_1 \lambda_1)}{\psi_1 dt} \varrho \cos(\varrho, X') + \frac{d(\psi_2 \mu_1)}{\psi_2 dt} \varrho \cos(\varrho, Y') + \frac{d(\psi_3 \nu_1)}{\varphi_2 dt} \varrho \cos(\varrho, Z'),$$

woraus ferner:

19)
$$\begin{cases} \frac{\partial \xi}{\partial t} = a_{11}\xi + (a_{12} - r)\eta + (a_{18} + q)\zeta, \\ \frac{\partial \eta}{\partial t} = (a_{12} + r)\xi + a_{32}\eta + (a_{33} - p)\zeta, \\ \frac{\partial \zeta}{\partial t} = (a_{18} - q)\xi + (a_{23} + p)\eta + a_{33}\zeta. \end{cases}$$

Hier bedeuten:

$$a_{11} = x_1 \lambda_1^2 + x_2 \mu_1^2 + x_3 \nu_1^2,$$

$$a_{22} = x_1 \lambda_3^2 + x_3 \mu_1^2 + x_3 \nu_2^2,$$

$$a_{33} = x_1 \lambda_3^2 + x_3 \mu_3^2 + x_3 \nu_3^2,$$

$$a_{13} = x_1 \lambda_1 \lambda_2 + x_2 \mu_1 \mu_2 + x_3 \nu_1 \nu_2,$$

$$a_{23} = x_1 \lambda_3 \lambda_3 + x_2 \mu_3 \mu_3 + x_3 \nu_2 \nu_3,$$

$$a_{31} = x_1 \lambda_3 \lambda_1 + x_2 \mu_3 \mu_1 + x_3 \nu_3 \nu_1,$$

$$p = \lambda_2 \lambda_3' + \mu_2 \mu_3' + \nu_2 \nu_3' = -(\lambda_3 \lambda_3' + \mu_3 \mu_2' + \nu_3 \nu_3'),$$

$$q = \lambda_5 \lambda_1' + \mu_3 \mu_1' + \nu_3 \nu_1' = -(\lambda_1 \lambda_3' + \mu_1 \mu_3' + \nu_1 \nu_3'),$$

$$r = \lambda_1 \lambda_2' + \mu_1 \mu_3' + \nu_1 \nu_2' = -(\lambda_2 \lambda_1' + \mu_3 \mu_1' + \nu_2 \nu_1').$$

Für die Ausdrücke der Projectionen der Rückkehrbeschleunigung die Axen X, Y, Z ergiebt sich:

$$R\cos(R,X) = -2\left[\frac{d(\psi_1\lambda_1)}{dt}\frac{d\alpha}{dt} + \frac{d(\psi_2\mu_1)}{dt}\frac{d\beta}{dt} + \frac{d(\psi_3\nu_1)}{dt}\frac{d\gamma}{dt}\right]$$

Si.

oder, mit Rücksicht auf die Formeln 17):

$$= -2 \left[\frac{d(\psi_1 \lambda_1)}{\psi, dt} u \cos(u, X') + \frac{d(\psi_2 \mu_1)}{\psi_2 dt} u \cos(u, Y') + \frac{d(\psi_3 \nu_1)}{\psi, dt} u \cos(u, Z') \right].$$

Der eingeklammerte Theil dieser Formel unterscheidet sich von dem zweiten Theile der Gleichung 18a) darin, dass in 19) anstatt der Projectionen von e diejenigen von u vorkommen; hiermit drückt sich in diesem Beispiele die Rückkehrbeschleunigung durch die verdoppelte und entgegengesetzt genommene Geschwindigkeit desjenigen Mediumpunktes aus, dessen Recliuvector die relative Geschwindigkeit darstellt. Mit anderen Worten hat R in diesem Beispiele dieselbe Bedeutung, wie im Falle eines unveränderlächen Mediums.

Kleinere Mittheilungen.

XX. Wann besitzt eine kubische Parabel eine Directrix ?*

1. Nach Analogie** mit der ebenen Parabel könnte man erwarten, dass auch die räumliche (kubische) Parabel eine "Directrix" besässe, d. h. dass eine Gerade existirte als Ort der Punkte, von denen Tripel je einander senkrechter Ebenen (Osculationsebenen) an die Parabel gingen.

Dies ist aber im Allgemeinen nicht der Fall, wie zunächst geotrisch so zu ersehen ist.

Eine kubische Parabel hat bekanntlich (vergl. z. B. Schröter, Theorie der Oberfischen zweiter Ordnung, S. 307) die Eigenschaft, dass, wenn man durch einen beliebigen Raumpunkt zu den Tangenten und Ebenen der Parabel Parallel-Strahlen und Ebenen legt, diese die Kanten und Ebenen eines Kegels (zweiter Ordnung) sind.

Existirte nun im Allgemeinen eine Directrix der Parabel, so müsste dieser Kegel ein gleichseitiger sein, d. h. es würden ihm unendlich viele Tripel je zu einander senkrechter Tangentialebenen angehören

Es ist aber bekanntlich (vergl. z. B. Schröter, Theorie etc., S. 76, 78 figg.) eine Bedingung erforderlich, damit ein Kegel ein, und damit zu gleich unendlich viele solcher Ebenentripel besitze.

Dass unser Kegel aber in der That ein ganz beliebiger ist (im Allgemeinen), ist leicht zu erkennen.

^{*} Diese Note, ein Wiederabdruck aus den "Mathematisch-naturwissenschaftlichen Mittheilungen von Dr. O. Böklen" (Heft 1, erschienen Ostern 1884), bezieht sich auf die in dieser Zeitschrift (Jahrg. 1884, Heft 4) publicirte Arbeit des Herrn Dr. Böklen, der bei seinen Arbeiten über das Ellipsoid auf kubische Parabeln mit Directrix stiess und dabei die im Titel gestellte Frage gelöst zu wissen wünschte.

Parabel entspricht, das Paraboloid, eine "Directrix", d. i. eine Ebene als Ort der Punkte, von denen Tripel je zu einander senkrechter Ebenen (Tangentialebenen) an das Paraboloid gehen (vergl. Reye, Geometrie der Lage II, S. 268 Nr. 37).

Die Punkte des Kegelschnittes, in dem dieser Kegel die unendlich ferne Ebese trifft, sind die Spuren der Tangenten der Parabel und die Tangenten dieses Regelschnittes die Spuren der Ebenen der Parabel. Denn die Parabel osculirt ja unendlich ferne Ebene.

Es sei ein solcher beliebig gegeben*.

Dann lege man irgend eine Ebene, doch so, dass sie irgend e zer Kegelebene parallel ist, und verzeichne in dieser Ebene irgend eine Parabel. Dann sind die sämmtlichen Ebenen, die diese ele ene Parabel berühren und einer Kegelebene parallel sind, die Schmiegungsebenen einer kubischen Parabel, zu der der Kegel in der oben definirten Beziehung steht.

2. Umgekehrt ist aber die eine Bedingung, die erforderlich ist, damit unser Kegel (er heisse einfach "Parallelkegel der Parabel") ein, und damit unendlich viele Tripel von je auf einander senkrechten Ebenen besitze, auch hinreichend, damit die Parabel eine Directrix besitzt.

Man weiss (vergl. z. B. Reye, Geometrie der Lage I, S. 122), dass, wenn ein Kegel (zweiter Ordnung) diese Eigenschaft besitzt, seine Ebernen eine "Involution dritter Ordnung" bilden, d. h. sie sind so in Tripel getheilt, dass jeder Ebene immer die beiden anderen zugeord zet sind, die mit ihr eines der (orthogonalen) Tripel bilden.

Sodann sind die Ebenen des Kegels vermöge ihrer Construction der Ebenen der Parabel projectivisch zugeordnet, mithin bilden auch die Tripelebenen der Parabel eine solche Involution.

Dann aber liegen nach einem allgemeinen Satze (vergl. 2. B. meine Schrift "Apolarität und rationale Curven" § 14) die Ecken die ser Ebenentripel immer in einer Geraden.

Dies ist dann die Directrix der Parabel.

Analytische Behandlung.

3. Eine kubische Raumcurve (als Curve dritter Classe) kann im dargestellt werden in der Form:

1)
$$u \varphi(\lambda) = f_1(\lambda), \quad v \varphi(\lambda) = f_2(\lambda), \quad w \varphi(\lambda) = f_3(\lambda).$$

Hier sind die u, v, w die Coordinaten einer Ebene der Curve, die f p ganze Ausdrücke dritten Grades in λ .

Jeder Ebene der Curve kommt dann ein Werth 1 zu und umgeke Soll die Curve eine kubische Parabel sein, so muss die unendlich fe

2)
$$u = 0, v = 0, w = 0$$

eine Ebene der Parabel sein. Es komme ihr dann der Werth $\lambda = \alpha$ zu, müssen die drei f den Factor $\lambda - \alpha$ gemein haben, wie folgt:

^{*} Die folgende Construction ist nur das Dualistische zu der bekannten Erzengung der kubischen Raumcurven mittels zweier Kegel, die eine Kanto Stemein haben.

$$\begin{cases} \quad \text{if } \varphi(\lambda) = (\lambda - \alpha)(a_{00}\lambda^2 + a_{01}\lambda + a_{02}) = (\lambda - \alpha)\,g_1(\lambda)\,, \\ \quad v\,\varphi(\lambda) = (\lambda - \alpha)(a_{10}\lambda^2 + a_{11}\lambda + a_{12}) = (\lambda - \alpha)\,g_2(\lambda)\,, \\ \quad \text{if } \varphi(\lambda) = (\lambda - \alpha)(a_{20}\lambda^2 + a_{21}\lambda + a_{22}) = (\lambda - \alpha)\,g_3(\lambda). \end{cases}$$

Dann sind die Ebenen des Parallelkegels, dessen Spitze im Coordinatenursprung liegt, repräsentirt durch

4)
$$x + y + z w \equiv x g_1(\lambda) + y g_2(\lambda) + z g_3(\lambda) = 0$$
 oder auch durch

$$\mathbf{u}:\mathbf{v}:\mathbf{w}=\mathbf{g}_{1}(\lambda):\mathbf{g}_{2}(\lambda):\mathbf{g}_{3}(\lambda).$$

Die Elimination von & liefert (vergl. meine Schrift "Apolarität etc." 8.43 oder auch meine Note im Württembergischen Correspondenzblatt 1883):

6)
$$u^2(A_{00}A_{02}-A_{10}^2)^*+v^2(A_{10}A_{12}-A_{11}^2)+w^2(A_{20}A_{22}-A_{21}^2) +uv()+uw()+vw()=0.$$

Soll nun dieser Parallelkegel 6) die Bedingung erfüllen, ein Tripel von je auf einander senkrechten Ebenen zu besitzen, so besteht diese bekanntlich (vergl. z. B. Hesse, Analytische Raumgeometrie) im Verschwinden der Summe der drei Coefficienten von u^2 , v^2 , w^2 ; sie lautet also:

7)
$$A_{00}A_{02} + A_{10}A_{12} + A_{20}A_{22} = A_{01}^2 + A_{11}^2 + A_{21}^2$$
.

4. Wir wollen nunmehr die Parabel nebst ihrer Directrix und der Involution der Orthogonaltripel in einer canonischen Form analytisch darstellen.

Es mögen nämlich die drei Coordinatenebenen

8)
$$x = 0, y = 0, s = 0$$

eines der Orthogonaltripel bilden. Dann muss die Directrix durch den Ur
sprung hindurchgehen, also in der Form dargestellt sein:

9)
$$x:y:z=\alpha:\beta:\gamma \text{ oder } x=\varrho\alpha, y=\varrho\beta, z=\varrho\gamma,$$

♥o e veränderlich ist.

Den drei Coordinatenebenen als Ebenen der Parabel mögen die resp. Werthe $\lambda = \lambda_1$, λ_2 , λ_3 entsprechen.

Dann ist die kubische Parabel, wie leicht zu erkennen, folgender beider Darstellungen fähig:

10)
$$w = \frac{a}{\lambda - \lambda_1}$$
, $v = \frac{b}{\lambda - \lambda_2}$, $w = \frac{c}{\lambda - \lambda_2}$

11)
$$x = A(\lambda - \lambda_1)^8, \quad y = B(\lambda - \lambda_2)^8, \quad s = \Gamma(\lambda - \lambda_3)^{3+4}.$$

Debei ist der unendlich fernen Ebene der Werth $\lambda = \infty$ beigelegt.

$$aA \cdot bB = c\Gamma = \frac{1}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_2 - \lambda_3)(\lambda_3 - \lambda_1)} = \frac{1}{D}.$$

^{*} Die A12 sind, wie üblich, die zu den Elementen a12 der Determinante letzteren gehörigen Unterdeterminanten.

Eine einfache Rechnung, nach der Clebsch'schen Regel (vergl. Clebsch, "Tober die rationalen Curven", Crelle Bd. 63) ausgeführt, liefert zwischen den b, c und A, B, I die Beziehungen:

Wir suchen die Grössen α , β , γ , d. i. die Neigungen der Directrix gegen die Coordinatenaxen zu bestimmen.

Vom unendlich fernen Punkte der Directrix, dessen Gleichung ist:

12)
$$u\alpha + v\beta + w\gamma = 0,$$

gehen (ausser der unendlich fernen Ebene) noch zwei weitere (zu einsender senkrechte) Ebenen an die Parabel.

Die zugehörigen Werthe 1 für sie erhält man durch Combination von 12) und 10):

13)
$$\frac{a\alpha}{\lambda-\lambda_1} + \frac{b\beta}{\lambda-\lambda_2} + \frac{c\gamma}{\lambda-\lambda_3} = 0.$$

Andererseits ist die Bedingung, dass irgend zwei Ebenen (u, w, w; u_1 , v_1 , w_1) der Parabel (mit den Werthen λ , μ) auf einander $s \Leftrightarrow mk$ -recht stehen, gegeben durch

$$= \frac{uu_1 + vv_1 + ww_1 = 0}{\frac{a^2}{(\lambda - \lambda_1)(\mu - \lambda_1)} + \frac{b^2}{(\lambda - \lambda_2)(\mu - \lambda_2)} + \frac{c^2}{(\lambda - \lambda_3)(\mu - \lambda_3)}}.$$

Hält man hier μ fest, so ergeben sich aus dieser Gleichung gerad die beiden Ebenen, die mit der Ebene μ ein Orthogonaltripel bilden (d. h. "jede Schnittlinie zweier aufeinander senkrec Later Ebenen der Parabel muss die Directrix treffen").

Uebrigens zeigen die Gleichungen 10), 11) sofort das weitere Resultat, dasse für jeden Punkt der Parabel die Producte

je denselben Werth haben, und zwar ist

$$\frac{xu^3}{a^2} = \frac{yv^3}{b^2} = \frac{zw^3}{c^2} = \frac{1}{D^3}.$$

Mit Rücksicht auf die Werthe der Constanten α , β , γ in 9) [vergl. 16)] be seben wir also:

"Für jeden Punkt der kubischen Parabel (für welche die drei Coordinatenebenen ein Ebenentripel bilden) sind die Producte xus, yvs, sws stant und verhalten sich zu einander, wie die Quadrate der Cost aus der Neigungswinkel der Directrix gegen die Coordinatenaxen"

Aus den Gleichungen 10) fliesst sofort eine sehr einfache Construction winer kubischen Parabel mit Directrix.

"Man nehme eine beliebige Gerade an. Eine jede Ebene durch die elbe schneidet aus den Coordinatenaxen, vom Anfangspunkt an gerechnet, drei Absch

Construirt man die reciproken Abschnitte

$$\frac{1}{6}$$
, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$

und verbindet deren drei Endpunkte durch eine Ebene, so umhüllen alle Ebenen eine kubische Parabel mit Directrix, für die das Coordinatenebenen ein Orthogonal-Schmiegungsebenentripel ist.

Jetzt nehme man für die Ebene μ die unendlich ferne Ebene, für die $\mu = \infty$ ist. Dann muss für diesen Werth von μ die quadratische Gleichung 14) mit 13) identisch sein.

Für diesen Werth $(\mu = \infty)$ geht aber 14) über in:

$$\frac{a^2}{\lambda-\lambda_1}+\frac{b^2}{\lambda-\lambda_2}+\frac{c^2}{\lambda-\lambda_3}=0.$$

Sollen die Gleichungen 15) und 13), und zwar für ganz beliebige Werthe von λ_1 , λ_2 , λ_3 identisch sein, so ist dazu nothwendig und hinreichend, dass

16)
$$a:b:c=\alpha:\beta:\gamma.$$

Daher stellt sich die Involution aller Orthogonalebenentripel der Parabel vermöge der Gleichungen 10) und 15) so dar:

$$O = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) + K\{a^2(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) + b^2(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_3) + c^2(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\},$$
we k variabel ist.

Endlich ist noch zu bemerken, dass, wenn man statt des alten rechtwinkligen Coordinatensystems $\begin{pmatrix} x, & y, & s \\ u, & v, & w \end{pmatrix}$ irgend ein neues rechtwinkliges $\begin{pmatrix} X, & Y, & Z \\ U, & V, & W \end{pmatrix}$ mittels bekannter Formeln einführt, und drückt dann in 10) resp. 11) die alten Coordinaten durch die neuen aus, so erhält man die allgemeinste Darstellung einer kubischen Parabel mit Directrix.

Die Rechnung ist dabei so einfach, dass sie hier unterbleiben möge. Tübingen, 1883. Dr. F. MEYER.

XXI. Die Ortsfläche der Spitzen gleichseitiger Tetraeder zu gegebener Geraden der Zeichenebene.

(Hierzu Taf. VII Fig. 8.)

Angeregt durch den Aufsatz des Herrn Dr. A. Schmidt über gleichseitige Tetraeder*, erlaube ich mir, nachstehend einen Ueberblick über die Ortslinien der Spitzen solcher Vierflache zu bieten, welche einer gegebenen Strecke als Basis entsprechen.

Zu einem Dreieck ABC_1 der Zeichenebene findet man die Spitzen congruenter Dreiecke $(C_1 d_2 A, d_1 C_1 B)$ auf dem Umkreise von ABC_1 in $|Bd_2||AC_1|$, $|Ad_1||BC_1|$ und erhält durch Drehung jener beiden Dreiecke um $|AC_1, BC_1|$ die Spitze (D_1) zum gleichseitigen Tetraeder, dessen Grund-

^{*} Zeitschr. f. Math. u. Phys., Jahrg. 1884 S. 321.

fläche ABC_1 . Die Spuren $|d_1d'_1, d_2d'_2|$ der Lothebenen, in welchen sich (d_1, d_2) bewegen, können auch mit Hilfe der Durchmesser $|Ad'_1, Bd'_2|$ des Umkreises bestimmt werden, indem (d'_1, d'_2) auf den Senkrechten $|AC_0, BD_0|$ jenen Spuren angehören. Verschiebung von (C_1) auf |BC| hat Fortrücken des Mittelpunktes (o_1) auf der senkrecht Halbirenden |Oy| zur Folge, was anzeigt, dass die Büschel $A|Oo_0 \propto o_1|B$ auf $|BD_0, AC_0|$ perspectivische Punktreihen beschreiben: $|BD_{01} \propto d'_1 \wedge AC_0 \propto d'_2|$, deren Mittelpunkt (AB_{∞}) ist.

Die Umkreise zu den Dreiecken ABC_i über der gemeinsamen Grundlinie |AB| bilden ein Büschel mit den Grundpunkten (A, B). Da $|d'_1 d_1 \perp BC_1$, $|d'_2 d_2 \perp AC_1|$ mit einander Winkel bilden, welche zu $A\hat{C}_1B$ supplementär sind, so erscheinen die Spitzen (D_1) , welche gleichen Winkeln $A\hat{C}_1B$ entsprechen, in einem Kreise durch (d'_1, d'_2) und gleich dem Umkreise AC_1B .

 $|d_1'D_1| \perp |AC_1|$ geht für (C_1) in $|C_0D_0||AB|$ über, für $(C) = (AC \perp BC)$ dagegen in $|AE_1||BC|$. Da nun das Parallelstrahlenbüschel $BE_{\infty}|BD_{01} \propto d_2'|$ mit der Axe der Parabel parallel ist, welche die Strahlen $|AE, C_0D_{01}, \infty, d_1'D_1|$ umhüllen, beide Büschel unter sich projectivisch sind und in (D_{01}) entsprechende Punkte zusammenfallen, so wird $|ED_{01} \propto D_1|$, ihr perspectivischer Schnitt, ebenfalls eine Tangente jener Parabel sein.

Man kann $|D_{01}E_1|$ auch als Ort der Theilpunkte von gleichwinkligen Bogenabschnitten erkennen, auf einer Kreisreihe, welche dem Büschel der Umkreise congruent ist und die (D_i) enthält, die gleichen Winkeln $A\hat{C}_iB$ entsprechen.

 (D_{01}, E_1) bezeichnen Grenzlagen für $|D_i|$, indem sie den rechtwinkligen Dreiecken AC_0B , ACB entsprechen.

Die Parallele zu $|BC_1|$ durch (D_{01}) ergiebt auf |AB| den Brennpunkt (F) der von den Ortsgeraden $|D_{01}E_i|$ umhüllten Hyperbel, da $|BD_{01}\perp AB, BE_1||x_1h_1\perp D_{01}F||BC_1|$, folglich: $|Fh_1C\perp D_{01}x_1|$. Die Brennweite der Hyperbel beträgt demnach $\frac{3}{4}AB$.

Während (C_i) die |BC| durchläuft, bewegen sich die Spitzen (D_1) in der Lothebene $[D_{01}E_1]$. Da das rechtwinklige Dreieck, wie gezeigt worden, die Grenze für die Möglichkeit gleichseitiger Tetraeder bildet, so finden sich reelle Spitzen nur zwischen (D_{01}, E_1) orthogonal-symmetrisch zu dieser Spur. Aus der Congruenz der rechtwinkligen Dreiecke AE_1B , $C_0 \perp D_{01}$ ergiebt sich, dass der Schnitt (m_1) von $|BC, D_{01}E_1|$ die Mitte von $|D_{01}E_1|$ bezeichnet. Da zugleich der (m_1) entsprechende (d'_{2m}) in die Mitte der Strecke $|D_{01}B|$ fällt und die Höhen der Basisdreiecke AC_1B in Bezug auf den festen Strahl BC stets dieselben bleiben, so stellt der Ort der Spitzen (D) den Schnitt der Lothebene $[D_{01}E_1]$ mit einem Rotationswer der Axe |BC| und vom Radius $|BE_1|$ dar, welcher stets eine

Die Ortsfläche der Spitzen gleichseitiger Tetraeder, welche die Bildebene zur gemeinsamen Grundfläche und |AB| zur Kante haben, wird also durch lothrechte Ellipsen erzeugt, deren Spuren eine Hyperbel umhüllen.

Die symmetrische Anlage der Zeichnung (Taf. VII Fig. 3) weist darauf **hin**, dass in den Lothebenen $[D_{01}D_{01}^*, D_{02}D_{02}^*]$ jedesmal noch eine zweite Ortsellipse liege $[C'D_{01}^*, CD_{02}^*]$, welche den Strahlen $|AE_1, AE_2|$ entsprechen und mit $[D_{01}E_1, D_{02}E_2]$ sich in den Lothen $|x_1, x_2|$ der [AB] schneiden; denn jene congruenten Ellipsen stehen sich wechselweise in Kegeln der Spitze (O) symmetrisch gegenüber und die Lothebene [AB] ist eine Symmetrieebene der beiden Kegel zugleich.

Die Symmetrie zeigt ferner, dass die Endpunkte der Lothe |x| eine Ellipse bilden, welche durch den Schnitt der involutorischen Büschel (A, B) in [AB] erzeugt wird; deren eine Axe |AB|, während die andere durch den Schnitt der Lothebenen zu den Asymptoten der Grundhyperbel bezeichnet ist. Diese Schnittcurve begrenzt mit dem Hauptkreise über |AB| einen mittlern Raum, welcher von den beiderseits zum Kreise sich senkenden Ellipsenbogen eingeschlossen ist.

Von der Gestalt des röhrenförmigen Restes erhält man eine genauere Vorstellung durch den Ort der Mittelpunkte der erzeugenden Ellipsen. Derselbe geht aus dem Schnitte der Büschel $(B,A)(C,C',\ldots)$ mit dem Tangentenbüschel $\|D_{01}E_1,\ D_{02}E_2,\ldots\|$ hervor und verläuft symmetrisch zu den Axen |AB,y|, von welchen die erstere Rückkehrtangente, die letztere Asymptote ist. Diese Mittelpunktscurve bezeichnet die Culminationen der erzeugenden Ellipsen, während die Radien vectoren deren Brennweiten darstellen.

Unsere Zeichnung gewährt somit einen Ueberblick über das Bereich der Spitzen gleichseitiger Tetraeder, deren Grundfläche in der Zeichenebene liegt und in welchen zwei Gegenkanten von gegebener Länge sind.

Hottingen-Zürich.

F. GRABERG.

XXII. Notiz über Ungleichungen.

In den Lehrbüchern und Beispielsammlungen für Elementarmathematik begegnet man sehr selten Aufgaben über Ungleichungen, obschon diese besonders instructiv sind, weil sie mehr Ueberlegung verlangen, als das ziemlich mechanische Auflösen von Gleichungen. Im Interesse des Unterichts mögen hier ein paar derartige Aufgaben folgen, deren beigefügte Libeungen nicht schwer zu finden sind.

Für das Dreieck sollen die Bedingungen ermittelt werden, unter de

- a) aus den Abständen des Umkreismittelpunktes von den Seiten.
- b) aus den Abschnitten, welche die Berührungspunkte des Inkreises auf den Seiten bilden,

ein neues Dreieck zu construiren.

a) Sind $\alpha < \beta < \gamma$ die Dreieckswinkel, so ist im Falle $\gamma < 90^{\circ}$ das neue Dreieck nur unter der Bedingung $\alpha > 42^{\circ}56'29''$ möglich; liegt a zwischen $42^{\circ}56'29''$ und 45° , so muss

$$\beta > ang \sin \frac{\cos \alpha}{2 \sin \frac{1}{2} \alpha} - \frac{1}{2} \alpha$$

genommen werden; für $\alpha \ge 45^{\circ}$ genügt $\beta > \alpha$.

Soll das ursprüngliche Dreieck stumpfwinklig sein, so müssen die Bedingungen

$$\alpha < 45^{\circ}$$
, $\beta < ang \cos \frac{\cos \alpha}{2 \cos \frac{1}{2} \alpha} - \frac{1}{2} \alpha$

eingehalten werden.

b) Im Falle $\alpha \geq 38^{\circ}56'33''$, ist

$$\alpha < \beta < ang sin (3 sin \frac{1}{4} \alpha) - \frac{1}{4} \alpha$$

zu nehmen; für $\alpha > 38^{\circ} 56' 33''$ genügt $\beta > \alpha$.

Auf die Seiten bezogen, lassen sich diese Bedingungen einfacher ausdrücken durch $b > \frac{1}{4}c$, $a > \frac{1}{4}(b+c)$.

Die Höhen und die Schwerlinien des Dreiecks geben Gelegenheit zur Bildung analoger Aufgaben.

SCHLÖMILCH.

Berichtigung.

Auf Seite 211 im 4. Hefte (Jahrg. XXX) ist zwischen den Zeilen 15 und 16 der Passus: "Es sei m-n=k" einzuschalten.

Historisch-literarische Abtheilung

der

Zeitschrift für Mathematik und Physik

herausgegeben

unter der verantwortlichen Redaction

TOD

Dr. O. Schlömilch, Dr. E. Kahl

und

Dr. M. Cantor.



XXX. Jahrgang.


Leipzig, Verlag von B. G. Teubner. 1885.



Inhalt.

I. Abhandlungen.	ite
Die mathematischen Instrumente des Brescianer Grafen Giambattista Suardi.	
Von Prof. E. Gelcich Die Ferrari-Cardani'sche Auflösung der reducirten Gleichung vierten Grades.	1
Von K. Hunrath Die von Diophant überlieferten Methoden der Berechnung irrationaler Quadrat-	41
wurzeln. Von W. Schönborn	81
Ueber das quadratische Reciprocitätsgesetz. Von 0. Baumgart 169, 2 Programm für den V. Bressa'schen Preis der Kgl Akad. d. Wissensch. zu Turin	41 52
II. Recensionen.	
Geschichte der Mathematik.	
	21
H. Hankel, Die Entwickelung der Mathematik in den letzten Jahrh. Von M. Cantor Marie, Histoire des sciences mathématiques et physiques IV et V. Von M. Cantor 1	22 15
	32
Gow, A short history of Greek mathematics. Von M. Cantor	21
Dupuis, Le nombre géométrique de Platon. Von M. Cantor.	21 28
Wittstein, Klaproth's Schreiben an A. v. Humboldt über die Erfindung des Com-	
passes. Von M. Cantor	29 90
Wohlwill, Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes. Von M. Cantor	31
Hunrath, Algebr. Untersuchungen nach Tachirnhausens Methode. Von M. Cantor 1	33
Krimmel, Nekrolog von Christ. Heinr. v. Nagel. Von M. Cantor	34
Schubring, Der christliche Kalender alten und neuen Stils. Von M. Cantor. 1	80 96
Müller, Kalender-Tabellen. Von M. Cantor	80 80
Eneström, Bibliotheca Mathematica. Von M. Cantor Wie studirt man Mathematik und Physik? Von M. Cantor 1	45
Arithmetik, Algebra, Analysis.	
Bausenberger, Theorie der periodischen Functionen einer Variabeln. Von M. Nöther	7
	23
	28
Reuschle, Graphisch-mechanische Methode zur Auflösung der numerischen Gleichungen. Von W. Cantor	29
	30
Hellwig, Ueber die quadratischen und cubischen Gleichungen. Von M. Cantor	31
Galopin-Schaub, Theorie des approximations numériques. Von M. Cantor	32
	33 62
	64
Klein, Vorlesungen über das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen	
	91
Steinhauser, Die Elemente des graphischen Rechnens. Von F. Kraft	υδ
4)	11
Schubert, System der Arithmetik und Algebra. Von M. Cantor	12
Kaiser, Die Determinanten. Von M. Cantor	18
Giesing, Neuer Unterricht in der Schnellrechen-Kunst. Von M. Canter 1 Neumann, Vorlesungen üb Riemann's Theorie d. Abel'schen Integrale, Von W. Killing 1	18 98
Bobek, Einleitung in die Theorie der ellipt. Functionen. Von O. Rausenberger	
Renoist. Tables de logarithmes à six décimales. Von W. Cantor	88
Greve, Fünfstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln. Von M. Canter Prampere, Saggio di Tavole dei logaritmi quadratici. Von M. Canter.	
rrampero, Daggio di Tavole dei logaritmi quadratici. Von E. Cantor	

	Seite
Zöppritz, Leitfaden der Kartenentwurfslehre. Von L. Neumann	8
Killing, Ueb. die nichteuklidischen Raumformen v. n Dimensionen. Von V. Schlegel	13
Milinewski, Elementar - synthetische Geometrie der gleichseitigen Hyperbel. Von	1 2
K. Schwering	15 18
Dörholt, Ueber einem Dreieck um- und eingeschriebene Kegelschnitte. Von	
K. Schwering	21
Czuber, Geometrische Wahrscheinlichkeiten. Von M. Cantor	24
jection. Von P. Zech	55
Vogler, Grundzüge der Ausgleichungsrechnung. Von B. Nebel	56
Hoch, Lehrbuch der ebenen Geometrie I. Von K. Schwering	66
Glinzer, Lehrbuch der Elementar-Geometrie I, II, III. Von K. Schwering	67
Peschka, Darstellende und projective Geometrie. Von C. Rodenberg	68
Tilier, Kritische Bemerkungen zur Einführung in die Anfangsgründe der Géo-	
métrie descriptive. Von C. Bodenberg	77
der Lage I. Von C. Rodenberg	103
Weyr, Elemente der projectivischen Geometrie I. Von C. Rodenberg	106
Hammer, Lehrbuch der ebenen und sphärischen Trigonometrie. Von M. Cantor	110
Krimphoff, Zur analytischen Behandlung der Umhullungscurven. Von M. Cantor	114
Franke, Die Coordinatenausgleichung. Von E Hammer.	141
Krimphoff, Zur analytischen Behandlung der Umhüllungscurven. Von M. Cantor Franke, Die Coordinatenausgleichung Von E Hammer. Börsch, Anleitung zur Berechnung geodätischer Coordinaten. Von E. Hammer	142
matck, mein perspectivischer Apparat. von m. cantor	143
, Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik und die Gesetze des Reliefs. Von M. Cantor	144
YOU M. COMMIT	1.4.4
Mechanik und Physik.	
Erwiderung von J. Epping	91
Wüllner, Lehrbuch der Experimentalphysik II. Von P. Zech	34
Hellmann, Repertorium der deutschen Meteorologie. Von P. Zech	35
Finger, Elemente der reinen Mechanik. Von P. Zech	36
Baer, Die Function des parabolischen Cylinders. Von P. Zech	36
Sperber, Versuch eines allgem. Gesetzes über die specifische Wärme. Von P. Zech Tumlirs, Die elektromagnetische Theorie des Lichts. Von P. Zech	37
	37
Dippel, Das Mikroskop und seine Anwendung. Von P. Zech	38
Hullmann, Der Raum und seine Erfüllung. Von P. Zech.	53
Blasendorff, Ueber die Beziehungen zwischen zwei allgemeinen Strahlensystemen. Von P. Zech	
Puschl, Latente Wärme der Dämpfe, Von P. Zech	53 54
Helm, Die Elemente der Mechanik und mathematischen Physik. Von P. Zech.	54
Fourier (Weinstein), Analytische Theorie der Wärme. Von P. Zech	55
Jansen, Physikalische Aufgaben. Von B. Nebel	56
Kohlrausch, Leitfaden der praktischen Physik. Von B. Nebel	56
Stein, Sonnenhicht und künstliche Lichtquellen für wissenschaftliche Untersuch-	•••
ungen zum Zwecke photographischer Darstellung. Von B. Nebel	57
Streintz. Die physikalischen Grundlagen der Mechanik. Von B. Nebel	58
Abendroth, Leitfaden der Physik I. Von B. Nebel	59
Krebs, Die Physik im Dienste der Wissenschaft, der Kunst und des praktischen Lebens. Von B. Nebel	60
Tumlirs. Das Potential und seine Anwendung zu der Erklärung der elektrischen	-
Erscheinungen. Von B. Nebel	62
	121
	142
	278
	
Bibliographie Seite 38, 78, 117, 146, 237,	281
Mathematisches Abhandlungsregister: 1. Januar bis 30. Juni 1884	149
" 1. Juli bis 31. December 1884	284



		ı	
·:			
		·	

Historisch-literarische Abtheilung.

Die mathematischen Instrumente des Brescianer Grafen Giambattista Suardi.

Eine bibliographisch-historische Notiz

von

Prof. EUGEN GELCICH,
Director der nautischen Schule in Lussinpiccolo.

Hierzu Taf. II Fig. 2-7.

Gelegentlich der Pflege gewisser nautisch-historischer Studien gelangt uns ein Werk zu Händen, welches unsere Aufmerksamkeit in besonderen Anspruch nahm und betitelt ist: Nuovi istromenti per la descrizione di diverse curve antiche e moderne, e di molte altre che servir possono alla speculazione de' Geometri ed all'uso de' Pratici. Col progetto di due nuove macchine per la nautica ed una per la meccanica, e con alcune osservazioni sopra de' poligoni rettilinei regolari. Del Conte Giambattista Suardi. In Brescia MDCCLII. Obwohl dieses Werk noch durchaus nicht so alt ist, um zu vermuthen, dass selbes so äusserst selten sei, so überzeugten wir uns doch, dass Suardi in der Geschichte der Mathematik nur zu wenig bekannt ist. Seine Versuche, verschiedene Curvengattungen, und zwar sowohl Curven höherer Ordnung, als auch solche, welche in das transcendente Gebiet fallen, durch mechanische Instrumente zu construiren, erscheinen aber um so beachtenswerther, als gerade auch in neuester Zeit die Lösung ähnlicher Aufgaben mehrere Mathematiker beschäftigte. Wir finden in der Geschichte mehrfache Erwähnung von den Instrumenten, die zur Verzeichnung der Kegelschnittlinien bestimmt sind, und etwas Weniges über Werkzeuge, durch welche alle oder mehrere Fälle einer gewissen Problem-Sattung erledigt werden können. Der Schöpfer der letzteren Methode war, wie Schanz* und mit Bezug auf Letzteren auch Günther* berichten,

^{*} Schanz, Der Cardinal Nicolaus von Cusa als Mathematiker. Rottweil 1872. 8, 22.

Dr. S. Günther, Studien zur Geschichte der mathematischen Geographie.

Nicolaus von Cues. In letzterer Zeit sind von Emsmann Transporteure mit fest aufgetragenen Curven dritter und höherer Ordnung zur Lösung des Problemes der Winkeltheilung anempfohlen worden;* aber von Versuchen, die sich denjenigen des Grafen Suardi nähern spricht die Geschichte der Mathematik fast gar nicht. Was schliesslich die Person des Verfassers anbelangt, so denken wir, dass ihm schon aus dem Grunde eine verdienstvolle Stelle unter den Erfindern zugedacht werden muss, als wenigstens einer seiner Apparate bei verschiedenen Maschinen eine schöne praktische Anwendung fand. Unseres Wissens hat es doch einen Autor gegeben, der sich bei Verfassung eines grösseren Werkes bemüssigt fand, dem Brescianer besonderes Lob zu spenden. Es war dies der auf dem Gebiete der Instrumentenkunde sowohl in theoretischer, als in technischer Hinsicht verdienstvolle Engländer George Adams,** dessen Urtheil wir später anzuführen haben werden.

Zu den voranstehenden Zeilen, welche den nachfolgenden Blättern so zu sagen eine gewisse Existenzberechtigung zu verschaffen haben, möge noch die Bemerkung dazu gesellt werden, dass das Werk Suardi's zwei Briefe des Jesuiten Boscovich über die mathematischen Eigenschaften der Cartesischen Ovalen und eine Reihe von Untersuchungen über die regelmässigen Vielecke enthält, die manches Interessante enthalten.

Indem wir zur Beschreibung einiger der wichtigsten Instrumente von Suardi übergehen, bemerken wir, dass die durch einfache Linien skizzirten Apparate aller technischen Details entblösst erscheinen, da es sich hier nur um die Erklärung der Principien — der Theorie der Functionsweise — handeln kann. Der Techniker und Mechaniker, der nähere Kenntnisse über constructive Details verlangt, muss sich wohl das Originalwerk verschaffen, welches 283 Gross-Quartseiten mit 23 Tafeln enthält und in jeder Hinsicht erschöpfende Auseinandersetzungen liefert.

Zweifelsohne ist die geometrische Feder das wichtigste der Instrumente. Adams äussert sich über dieselbe folgendermassen: "Obschon verschiedene Schriftsteller der Krümmungen erwähnt haben, welche vermöge einer zusammengesetzten Bewegung zweier Zirkel entstehen, deren einer sich um den andern rund herum bewegt, so scheint doch keiner diesen Grundsatz angewendet und in Ausführung gebracht zu haben, als J. B. Suardi. Seit einiger Zeit ist er sehr vortheilhaft bei der Dampfmaschine von den Herren Watt und Bolton angewendet worden: ein Beweis unter vielen anderen, nicht blos in Rück-

^{*} a. a. O.

Geometrische und graphische Versuche oder Beschreibung der mathematischen Instrumente, deren man sich in der Geometrie, der Civil- und Militär-Vermessung etc. bedient. Von George Adams. Mathematischer Instrumentenmacher Sr. Majestät und Opticus Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wales: Deutsch von J. G. Geissler. Leipzig 1795.

sicht der Anwendbarkeit dieser Speculationen, sondern auch in Rücksicht der Vortheile. welche die höbere Mathematik in den Händen eines sinnreichen Mechanikers gewährt. Vielleicht hat es noch nie ein Instrument gegeben, welches so verschiedene Krümmungen zeichnet, als eben die geometrische Feder; der Verfasser erwähnt deren 1273, welche dadurch in einfacherer Form, und vermöge der wenigen Räder, die dazu gehören, beschrieben werden können."

Die geometrische Feder hat also jene Curven zu verzeichnen, welche durch die zusammengesetzte Bewegung zweier Zirkel entstehen, deren einer sich um den andern rund herum bewegt. Unsere Fig. 2 hat die Bestimmung, dieses Instrument durch einfache Linien erklärlich zu machen.*

Man denke sich eine um Q drehbare Alhidade MN, und über dem Mittelpunkte Q derselben einen fixen Cylinder TZ. Die verticale Axe des Cylinders liegt genau über dem Drehungspunkt der Alhidade. dm sei ein zweiter beweglicher Cylinder, welcher bei einer eventuellen Drehung den Stift S mitnimmt. Der Cylinder r mit dem Stifte S sind durch den Schieber un mit einander verbunden, der längs des Ausschnittes zu der Alhidade hin und her verschoben und durch die Druckschraube C in jeder beliebigen Lage fixirt werden kann. Von einem Punkte des grösseren Sylinders T führt eine Schnur Tm zum kleineren Cylinder, die mehrere Male um letzteren gewickelt und endlich an denselben befestigt ist. Dreht an nun die Alhidade MN im Kreise herum, so beschreibt der Punkt r den Weg 2, 3, 4, 5, 6 etc. Gleichzeitig wickelt sich aber der Faden auf die Mantelfläche des Cylinders TZ auf und von der Mantelfläche des Splinders r ab. In dem Maasse also als r um Q herumgeführt wird, beschreibt anch der Stift S eine Curve, deren Form und Eigenschaften durch folgende Pactoren bestimmt werden. Erstens durch das beliebig einzustellende Ver-La liniss der beiden Halbmesser Rr: SS; zweitens durch den Halbmesser Cylinderbasis; drittens durch die Lage des Fadens, je nachdem dieser T über m oder über d um den kleineren Cylinder gewickelt wird. Man sieht ohne Weiteres, dass die Curven, welche damit zu verzeichnen sind, bis ins Unendliche wachsen können. Die durch Adams angegebeen Zahl bezieht sich somit auf ein ganz bestimmtes Exemplar. Bei der wirk-Lichen Ausführung des Apparates werden Schnur und Cylinder besser durch Zahnrader ersetzt. Man hat drei der letzteren, indem das dritte Zahnrad die Verbindung zwischen Q und r herstellt. Jeder Leser erkennt sofort, dass dieses Princip bei zahlreichen Instrumenten jeder Gattung Verwendung findet, so bei den Dampfmaschinen. bei den Planetarien, bei den Dromoskopen von Paugger und Garbich etc. etc.

Einige dieser Curven wurden durch den P. Castel mathematisch untermeht. Traité 50 me de Mathematique. Des Especes des Courbes de 2º Ordres Liv I.

Einfach wie möglich im Princip ist ein Apparat, welcher die Konchoide des Nicomedes verzeichnet.

AB in Fig. 3 ist ein Reissbrett, worauf sich ein Gestell CDE'F senkrecht darüber aufgeschraubt befindet. DE', GH stellen zwei zum Brett parallele Etagen vor, welche mit einer Furche versehen sind. $NT \perp DE$, der bei N einen Stift $NO \perp NM$ trägt, kann längs der DEverschoben und in jeder beliebigen Lage durch die Druckschraube M fixirt werden. Ein zweiter Arm QS, dessen Armlängen innerhalb der durch die Dimensionen des ganzen Apparates gestatteten Grenzen beliebig eingestellt werden können, greift mit einem Stift P in die Furche GH. Die Seite QP des Armes enthält ihrerseits eine zweite Furche, durch welche der fixe Stift NO An den Enden Q und S befinden sich zwei senkrechte hindurchgeht. Stifte QR und SE. Die Function des Apparates ist einfach. durch die Schraube M senkrecht auf DE unverrückbar eingestellt, so bildet O den Pol der Curve. Ist O'm die Projection der NM, n die Projection von P, O'E die Projection von QS, so bildet mO'n den veränderlichen Polarwinkel, nE die constante Länge des Radiusvectors von der Leitlinie bis zur Curve. Verschiebt man somit den Arm QS längs der HG, so beschreiben die Stifte E und R zwei Konchoiden. Mit diesem Instrument können auch verschiedene andere Konchoiden, so jene mit kreisförmiger Basis, entworfen werden.

Dieser Maschine ist eine andere sehr ähnlich, welche die Logarithmica von Neper und die Trajectorie von Claudius Perralto zu verzeichnen hat. Die Leitlinie ist, wie früher, ein Parallelopipedon mit eingeschnittener Furche. Auf diesem bewegen sich zwei Schieberlineale, eines senkrecht auf die Leitlinie und durch eine Druckschraube feststellbar. Das andere hat eine Furche und gleitet längs eines am Parallelopipedon verschiebbaren Pivots. Diese Maschine wurde jedoch früher schon durch den Marchese Poleni erfunden und Suardi giebt an, nur eine Modification derselben eingeführt zu haben.

Die Fig. 4 veranschaulicht ein Instrument, womit die Cissoide von Diocles und auch die Curven von Carrè gezogen werden. Um den Mittelpunkt C eines gedachten Kreises LNPR ist eine Kurbel CR drehbar. An einen Punkt P desselben Kreises ist die Tangente PD angelegt, welche aus einer Schiene besteht. Ein aus durchbrochenen Linealen gebildeter rechter Winkel ist mit dem Scheitel und um diesen drehbar in P befestigt; ein zweiter, ebenso gebildeter rechter Winkel gleitet mit einem Pivot oder Schieber D längs der Schiene Px. In die Furchen der PF und LD greift der Zapfen R, welcher sich am beweglichen Ende der Kurbel CR befindet. Das Lineal LD erhält eine zweite Führung durch das Pivot L noch, welches in die Furche des ersteren eingreift. Endlich kreuzen sich die Arme Py, DB mit ihren Furchen in einem (beweglichen) Punkte M, der den Träger eines Stiftes bildet. Wird nun die Kurbel derart gedreht, dass RC über CP falle, so hat man folgende Stellung des Instrumentes.

R und D vereinigen sich in P, DB ist senkrecht auf LP, somit bildet DB die Verlängerung der Tangente Px. Die PF deckt sich mit der Px und die Py mit der PZ. Der Stift M liegt über P. Dreht man die Kurbel von P über R bis L, so öffnen sich die Arme PD und DR, der Schieber M gleitet längs der Py (oder DR) und der an demselben befestigte Stift beschreibt die Cissoide. Es ist in der That immer PM = RD, somit die Curve PaM eine Cissoide; denn da für jede Stellung $LP = LD = 90^\circ$ ist und der Winkel im Halbkreis LLRP auch 90° beträgt, hat man auch $LPRD = 90^\circ$ und daher $LPMD = 360 - 270 = 90^\circ$. RPMD ist somit ein Parallelogramm, ergo immer PM = RD, quod erat demonstrandum. Nimmt man vom Instrument LDR und RL hinweg, versetzt man den Vertex RL und RL eine Führung in RL und RL bringt man endlich auf den Arm RL einen Stift an in einer Entfernung von RL so würde letzterer Stift bei der Drehung der Kurbel die Curve von Carrè* beschreiben.

Schon der P. Milliet** hatte gemeint, dass die mechanische Construction der Quadratrix von Dinostratus leicht ausfallen müsse; wie man eine solche vornehmen könnte, hat er aber nie gezeigt. Der Lösung dieser, bei den alten Bestimmungen des Kreisumfanges wichtigen Curve widmet Suardi das folgende Instrument.

KAEN ist ein Rahmen, CD eine um C drehbare, wieder mit einer Furche versehene Alhidade, die bei C einen Quadranten xCa trägt. PT ist eine ebenfalls mit einer Furche versehene, parallel zu KN oder zu AE bewegliche Querleiste, deren Bewegung durch die Hülse TQ eine Führung lings der EN erhält. (Fig. 5.) An dem Punkte x ist eine Schnur bestigt, welche bei y um eine Rolle geführt wird und an dem Ohr b der lulse TQ das zweite sin-Ende hat. Die Dimensionen sind derart gehalten, lass wenn CD mit KA übereinfällt, PT in M den Quadranten CMV tangirt. Erfasst man die Alhidade bei D und dreht man sie von M bis V herunter, so zieht die Schnur die Querleiste von M bis C herab. Dann beschreibt in Stift S, der sich im Kreuzungspunkte der Furchen CD und PT befindet, die Quadratrix. Selbstverständlich liegt S in M, wenn die CD mit der CM bereinfallen.

Interessant sind die Curven, welche durch den folgenden Apparat gezeichnet werden, da sie zu Formen führen, nach welchen in der Natur die Blätter der Pflanzen gezeichnet zu sein scheinen. Da diese Curven keinen besonderen Namen erhielten, so wollen wir kurz angeben, wie sie entstehen. Man nehme in Zirkelöffnung einen beliebigen Bogen V_1 (Fig. 6) und trage denselben von V gegen A und von M gegen A einige Male auf. Man erhült die Punkte 1, 2, 3 und beziehungsweise II, I, G. Führt man

^{*} Mémoires de l'Academie. 1705. S. 56.

^{**} Lib. II. De indivisib, prop. 1. Descriptio lineae Quadratricis.

die Radien 01, 02, 03 und die Sehnen Vg, VI VII, so sind die Duschnittspunkte V, a, b, O Punkte der fraglichen Curven. Nennt man Halbmesser des Kreises a, und legt man ein senkrechtes Coordinatensystem mit dem Ursprung im Mittelpunkte des Kreises und zwar derart an, die OV die Abseissenaxe werde, so ist die Gleichung dieser Curve:

$$g = \pm \frac{\sqrt{x^3 - 2ax^2 + a^2x}}{2a - x}.$$

In Fig. 7 hahen wir ein Instrument zu ihrer Erzeugung. Ring, welcher auf die Papierebene gelegt und unveränderlich darauf festge. halten wird. Die innere Peripherie desselben enthält einen zweiten beweg. lichen Ring Vndm, der mit einem Halbmesser mn versehen ist. Halbmesser und Ring tragen eine Furche und diejenige des letzteren (xyz) ist der Träger eines in jeder Lage durch eine Stellschraube fixirbaren Schiebers d. Eine Alhidade VD kann durch einen Haken nach Belieben in V a.n. festen Ring eingehakt oder wieder von demselben entfernt werden. Alhidade hat eine Längenfurche; im Kreuzungspunkte S befindet sich, wie fast bei allen diesen Instrumenten, der gewöhnliche Stift. Der Schieber d und ein an demselben angebrachtes Pivot dienen der Alhidade als Führung. Stellt man den beweglichen Ring und die Alhidade (letztere vermöge der Führung d) derart ein, dass, wenn VM einen Halbmesser des fixen Ringes AB vorstellt, Centriwinkel Vz = Centriwinkel MD gleich sei, und fährt um den beweglichen Ring im Kreise herum, so beschreibt der Stift S die fragliche Curve.

Wir unterlassen die Beschreibung eines weiteren Apparates zur Beschreibung der Cykloiden, da die vorangeführten Instrumente im Allgern einen die Charakteristik der Erfindungen Suardi's zur Genüge bezeichnen. Origineller ist erst sein Compasso loxodromico, ein Apparat, wom it die Loxodrome auf der Kugel und ihre stereographische Polarprojection, die logarithmische Spirale, erzeugt werden können. Da aber dasselbe zu den nautischen Diagramm Instrumenten oder zu den nautischen Rechenmaschinen gezählt werden kann, die wir in der Central-Zeitung für Optik und Mechanik Nr. 21, Jahrg. 1884 beschrieben haben, so unterlassen wir, das dort Gesagte hier noch zu wiederholen.

Recensionen.

Lehrbuch der Theorie der periodischen Functionen einer Variabeln mit einer endlichen Anzahl wesentlicher Discontinuitätspunkte, nebst einer Einleitung in die allgemeine Functionentheorie. Von Dr. Otto Rausenberger. Mit in den Text gedruckten Figuren. 8°. VIII u. 476 S. Leipzig, B. G. Teubner. 1884.

Ein gutes Buch zur richtigen Zeit! Gerade jetzt, wo die Theorie der transcendenten eindeutigen Functionen durch Weierstrass neu gegründet ist und insbesondere die Functionen mit linearen Transformationen in sich, von verschiedenen Seiten her behandelt, zu einem der wichtigsten Capitel der neueren Analysis sich gestalten, ist eine geschlossene, von den Elementen ausgehende erste Einleitung in dieses ganze Begriffssystem für den Studirenden nothwendig geworden, und eine solche bietet das vorliegende Werk.

Der Verfasser versteht unter "periodischer" Function eine Function, welche bei eindeutiger, insbesondere linearer Substitution für das Argument sich nicht ändert, und behandelt hauptsächlich die Exponentialfunction und die einfach multiplicativ-periodischen Functionen, aus welch' letzteren die doppelt additiv-periodischen Functionen mit einem wesentlich singulären Punkt, die elliptischen Functionen, durch einfache Umgestaltung des Arguments hervorgehen.

Der Ausgangspunkt ist die Weierstrass'sche Definition der analytischen Function durch die Potenzreihe; und die Darlegungen gehen einfach und systematisch durch die Haupttheile der Analysis hindurch bis zu den eben genannten Functionen hin, während alle weiteren Betrachtungen der Functionentheorie, insbesondere die Integration im complexen Gebiete, bei Seite gelassen werden.

In der Behandlung der elliptischen Functionen selbst schliesst sich der Verfasser mehrfach ziemlich eng an die Königsberger'schen "Vorlesungen" an. Deren Auffassung als Function des Moduls, die Theorie der elliptischen "Modulfunctionen" und überhaupt der Functionen mit mehreren nicht vertauschbaren Transformationen in sich und mit unendlich vielen wesentlich singulären Stellen, worüber in diesem Buche nur erst kurze Andeutungen gemacht werden, scheint der Verfasser sich auf eine Fortsetzung des Werkes vorbehalten zu wollen. Dann werden hoffentlich auch die interessantesten Theile dieser Theorien, der Zussanmenhaus.

der Transcendenten mit der Theorie der linearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung — zu dessen völliger Klarlegung freilich die Integration im complexen Gebiete unerlässlich wird —, die zugehörigen geometrischen Gebietseintheilungen etc., zur Geltung kommen.

Zu dem Vorzuge des Buches, bei begrenztem Thema eine geschlossene Einleitung in wichtige Capitel der neueren Analysis zu liefern, kommt der weitere, dass die Darstellung überall klar und correct gehalten ist. Nur mit der Einleitung über den Zahlenbegriff und die Rechnungsoperationen ist Referent nicht einverstanden; denn auch die algebraische Grundlegung erfordert es nicht, dass die Einführung der irrationalen Zahlen vor Einführung ins Unendliche fortgesetzter Operationen vorgenommen und auf die Umkehrung-algebraischer Gleichungen, diese aber auf die Anschauung gegründet wird.

Erlangen, im September 1884.

M. NOETHER.

Leitfaden der Kartenentwurfslehre für Studirende der Erdkunde und deren Lehrer, bearbeitet von Dr. Karl Zöppritz, ord. Professor der Erdkunde an der Universität zu Königsberg i. Pr. Mit Figuren im Text und einer lithographischen Tafel. (VIII u. 162 S.) gr. 8°. geh. n. Mk. 4. 40. Leipzig 1884, B. G. Teubner.

Das vorliegende Buch ist laut seinem Vorworte dem Bedürfniss des Universitätsunterrichts entsprungen. Es will die Kenntniss der geometrischen Methoden, auf denen der Kartenentwurf beruht, und einen gewissen Grad von Uebung in der Handhabung derselben vermitteln, soweit er für jeden unerlässlich ist, der Karten mit Nutzen gebrauchen und Geographie nicht blos dilettantisch betreiben will. Es stellt unter Verzichtleistung auf. eingehendere Rechnung die elementar-geometrische Construction durchaus in den Vordergrund.

Der erste Abschnitt über Ortsbestimmung beschränkt sich auf das für die Zwecke der Karthographie Nöthige und Unentbehrliche, zeichnet sich durch grosse Klarheit und Präcision aus und behandelt auf nur 20 Seiten der Reihe nach die Hauptmomente der geometrischen, astronomischen und graphischen Ortsbestimmung. Der folgende grössere Abschnitt "Netzentwurfslehre" giebt zunächst den Begriff der Abbildung im Allgemeinen und geht dann sofort auf die Abbildung der Erde auf die Ebene ein, wobei es sich etwas befremdend ansieht, die Erde so gut wie immer als Kugel in Betracht gezogen zu finden, nachdem kurz zuvor wörtlich gesagt worden ist, es solle im vorliegenden Werk mit der bisher fast ausnahmslos beobachteten und im Elementarunterricht auch nicht wohl zu umgehenden Praxis, dass man anfangs die Meridiane zwischen Aequator und Pol in

dass diese Theile ungleich sind, gründlich gebrochen, d. h. von vornherein darauf verzichtet werden, die Erde als Kugel zu betrachten.

Vielfach wird auf Tissot's epochemachendes Werk: Mémoire sur la représentation des surfaces et les projections des cartes géographiques, Paris, Gauthier-Villars, 1881, hingewiesen, die Tissot'sche Terminologie wird neben der sonst gebräuchlichen eingeführt, und nach den drei wichtigsten Anforderungen, die man an eine Abbildung stellen kann, werden die Gruppen der winkeltreuen, flächentreuen und mittelabstandstreuen (conformen, Equivalenten und äquidistanten) Abbildungen unterschieden.

Diesen Hauptprincipien der Projectionslehre gegenüber charakterisirt sich die ganze Stellung des Buches durch die Worte (S. 26): "Vom mathematischen Gesichtspunkte aus betrachtet, liefert die Winkeltreue die interessantesten Abbildungsprobleme. Für die praktische Kartographie ist aber die Flächentreue weit wichtiger, weil geographische Vergleiche zunächst an Erscheinungen anknüpfen, die über flächenhaft ausgedehnte Gebiete ihre Gleichartigkeit oder Verschiedenheit offenbaren, und weil das Planimeter in der Hand der Geographen ein Instrument von zunehmender Wichtigkeit ist." Von diesem leitenden Gedanken ausgehend sind nun auf S. 31-102 die wichtigsten Abbildungsarten behandelt, erst die azimutalen oder zenitalen, nämlich von den perspectivischen die gnomonische, orthographische, sterographische und externe; von nicht perspectivischen Postel's mittelabstands- und Lambert's flächentreue Azimutalprojection, sowie die gewöhnliche und Nell's modificirte Globularprojection. Hieran reihen sich die Abbildungen auf abwickelbaren Flächen und zwar zunächst auf einen Cylinder. Wir finden behandelt die Plattkarten, die Cassini-Soldner'sche, die flüchentreue, die Mercator'sche und die Centralprojection auf den Cylinder, die Sanson-Flamsteed'sche und Mollweide's homalogra-Phische Projection. An echten Kegelprojectionen finden sich die gewöhnliche "quidistante, diejenige von De l'Isle, die flächen- und winkeltreue; an unechten die Bonne'sche, die gewöhnliche und die orthogonale polykonische, andlich die preussische Polyederprojection.

Bei allen zur Besprechung kommenden Abbildungsarten ist auf ihre Vorzüge und Mängel hingewiesen, und es wird ihre Verwendbarkeit oder Nichtverwendbarkeit für bestimmte Zwecke hervorgehoben. Getreu dem Programm des Buches tritt die geometrische Construction durchaus in den Vordergrund und es ist auf Entfaltung des mathematischen Apparates soviel als irgend möglich verzichtet. Dieses Fehlen mathematischer Entwickelungen macht sich aber da und dort recht empfindlich wahrnehmbar, z.B., um nur eines hervorzuheben, bei der Mercator-Projection. Von ihr wird infach gesagt, sie sei winkeltreu, und man finde den Abstand y des Parallelkreises vom Aequator nach der Formel:

$$y = \frac{r}{M} lg \, lg \left(45^{\circ} + \frac{\beta}{2}\right).$$

Die Bedeutung dieser vielgebrauchten Abbildungsart wird sodann für die Darstellung physikalischer Verhältnisse auf der (fast) ganzen Erdoberfläche und für die Schifffahrt charakterisirt, wobei auch kurz der Loxodrome Erwähnung geschieht. Hier hätte nun ganz entschieden mehr gesagt werden müssen. Eine elementare Ableitung der obigen Gleichung, ausgehend von der Definition der Loxodrome, wie sie z. B. in Gretschel's vorzüglichem Lehrbuch der Kartenprojection S. 114—120 gegeben wird, nebst einem Hinweis auf Mercator's eigene Erklärung seines Abbildungsprincips (Gradus latitudinum versus utrumque polum auximus pro incremento parallelorum supra rationem, quam habent ad aequinoctialem) wäre für einen Universitätsstudenten, bei dem man Gymnasial- oder Realschulreife voraussetzt, nicht zu hoch und gewiss anregender gewesen, als eine Gleichung, die ohne Ableitung ganz absolut hingestellt wird. Auch das Maass der Flächenvergrösserung und die Eigenschaft der Winkeltreue der vorliegenden Abbildung hätte sich leicht entwickeln lassen.

Dieses Beispiel statt mehrerer. Wenn auch Gretschel's treffliches Buch mit seiner reichen Entfaltung mathematischer Hilfsmittel manchem Studirenden vielleicht etwas zu schwer erscheinen dürfte, so ist es eben für den mathematisch einigermassen Vorgebildeten bezüglich der eigentlichen Projectionslehre doch ganz anders als das Zöppritz'sche geeignet, zum Studium der theoretischen Kartenentwurfslehre anzuregen und dasselbe zu vertiefen. Ja. selbst Steinhauser's "Grundzüge der mathematischen Geographie und Landkartenprojection" scheinen, wenn denn doch einmal wahrhaft elementar vorgegangen werden soll, den Zweck, die geometrischen Methoden der Kartenentwurfslehre zu entwickeln und dem Studirenden einen gewissen Grad von Uebung in ihrer Handhabung zu verschaffen, ebenso gut zu erreichen, als das Zöppritz'sche Buch, bei dessen Literaturverzeichniss nebenbei bemerkt auch das verdienstvolle "Lehrbuch der wichtigsten Kartenprojectionen von O. Möllinger, Zürich 1882" Erwähnung verdient hätte, besonders wegen seiner eingehenden Vergleichung zwischen der stereographischen und Bonne'schen Abbildungsweise und seiner ausführlichen Behandlung der Mercator-Projection und der auf dieselbe bezüglichen Constructionsaufgaben aus der Schifffahrtskunde.

Bedeutend werthvoller, als die Darstellung der einzelnen Abbildungsarten, erscheint der Abschnitt mit dem Titel: "Die Projectionen geringster Verzerrung", der eine Reihe von allgemeinen Sätzen über Deformation überhaupt und eine Auswahl von Projectionen geringster Verzerrung für bestimmte Zwecke enthält. Dieser Abschnitt schliesst sich an das schon erwähnte Tissot'sche Werk an, in welchem, ausgehend von dem Satze, dass einem System orthogonaler Curvenschaaren der einen Fläche im Allgemeinen nur ein einziges ebensolches System auf der andern Fläche entspricht, als Maass der Verzerrung an jedem Punkt der Karte eine Indicatrix genannte Ellipse eingeführt wird, deren Axenverhältniss sowohl in Beaug

auf die Länge als die Winkel den Maassstab für die Grösse der Verzerrung abgiebt. Einige kleine Tabellen stellen je nach den an die Karte gestellten Anforderungen die Fehler derselben für einzelne verglichene Projectionsarten zusammen, bei welcher Vergleichung mit vollem Recht wiederholt auf die bedeutenden Mängel der von den Kartographen so oft angewandten Bonne'schen Projection hingewiesen wird, die endlich einmal aus unseren Kartenwerken verschwinden sollte.

Befremdend bei diesem an sich werthvollen Theil des Buches ist zweierlei. Einmal die auffallende Bevorzugung der flächentreuen Abbildung vor der winkeltreuen, die, wie schon erwähnt, gleich zu Anfang des Buches gewissermassen als eine Art von Programm desselben hingestellt wird. Nun hat aber die Winkeltreue nicht nur deshalb Bedeutung, weil sie dem Mathematiker die interessantesten Abbildungsprobleme bietet; vielmehr ist sie genau betrachtet diejenige Forderung, die einer kartographischen Darstellung gar nie erlassen werden darf. Es sollten, wenn anders die Kartenzeichner ihre Aufgabe richtig erfassen wollen, nur noch winkeltreue Abbildungen geschaffen werden, und das aus dem einfachen Grunde, weil die erste und Hauptforderung an jede Karte die ist, dass sie ein möglichst treues Bild des dargestellten Erdraumes gebe. Dem wird aber nur gentigt durch die Winkeltreue im Einzelnen, wobei man sich durch etwaige Verzerrungen der Contouren im Grossen und zu starke Krümmung der kürzesten Linien nicht abschrecken zu lassen braucht, da diesen beiden Mängeln, wie sofort gezeigt werden soll, abgeholfen werden kann. Die Flächentreue hat dem gegenüber in den Hintergrund zu treten; denn was nützt es, den Verbreitungsbezirk irgend einer physikalischen Erscheinung auf der Erde flächentreu abgebildet zu sehen, wenn dabei jeder einzelne Winkel verzerrt, also das ganze Bild durchaus entstellt ist? Dass ferner die flächentreue Abbildung wegen ihrer Verwendbarkeit zur Flächenberechnung mittels des Planimeters unentbehrlich sei, scheint durchaus unstichhaltig. Beim Kartenmaassstab derjenigen Länder, bei denen der Flächeninhalt nur mit dem Planimeter bestimmbar erscheint, kann das Resultat doch nur höchst ungenau ausfallen; bei den Ländern aber, über die wir Karten in grossem Maassstabe besitzen, liegen auch directe Inhaltsmessungen vor, so dass in beiden Fällen das Planimeter entbehrt werden kann.

Was weiter an dem genannten Abschnitt tadelnswerth erscheint, ist das vollständige Ignoriren zweier schon seit längerer Zeit veröffentlichten hierher gehörigen Arbeiten von Fr. Eisenlohr.* Die erste derselben leitet mathematisch ab, dass, wenn man bei conformer Abbildung alle Kartenpunkte gleichen Maassstabes durch sogenannte isometrische Linien

^{* 1.} Ueber Flächenabbildung. Jouwas Bd. 72 S. 143 flgg. 2. Ueber Karss Erdkunde su Berlin, Bd. 10 S. M.

rein geometrische Ableitung des Winkelbegriffs, welche den Vorzug besitzt, unmittelbar als Verallgemeinerung des gewöhlichen Winkelbegriffs erkennbar zu sein. Sehr einfach gestaltet sich die Untersuchung der m-dimensionalen Kugelgebilde. Dieselben stellen höhere Riemann'sche Raumformen dar, deren Krümmungsmaasse ein Minimum besitzen, welches gleich ist dem Krümmungsmaasse desjenigen n-dimensionalen Gebietes, in welchem die Kugelgebilde betrachtet werden. Hervorzuheben ist die Bemerkung, dass in jeder n-dimensionalen Lobatschewsky'schen Raumform Riemann'sche, euklidische und Lobatschewsky'sche Raumformen von geringerer Dimensionenzahl enthalten sind, dagegen in jeder Riemann'schen wieder nur Riemann'sche, ein Resultat, welches man sich übrigens durch die auf dem einschaligen Hyperboloid einerseits, auf der Kugel andererseits möglichen Linien verdeutlichen kann. Weiter wird gezeigt, wie die von Dandelin und Quetelet gegebene Ableitung der Kegelschnitte aus dem geraden Kegel (mittels zweier die Schnittebene und den Kegelmantel berührenden Kugeln) sich unmittelbar aus der euklidischen in eine nichteuklidische Raumform übertragen und daselbst zur Grundlage einer elementaren Theorie der Kegelschnitte machen lässt. Unter quadratischen Gebilden von n-1 Dimensionen versteht der Verfasser solche, welche durch eine homogene quadratische Gleichung zwischen Weierstrass'schen Coordinaten dargestellt werden. An diese Gebilde schliesst sich naturgemäss die Polarentheorie nebst der Darstellung der Gleichung durch Quadrate linearer Functionen der Coordinaten. Von der Zahl der hierbei auftretenden negativen Quadrate hängt die Anzahl der auf dem Gebilde liegenden Geraden. Ebenen und ebenen Gebilde ab. Der Verfasser wendet sich dann zu den metrischen Eigenschaften dieser quadratischen Gebilde, zunächst im endlichen Raume. Diese Eigenschaften hängen mit der von Weierstrass gelösten Aufgabe zusammen, die beiden quadratischen Formen

 φ (x_0 x_1 ... x_n) und $\omega = k^2 x_0^2 + x_1^2 + ... + x_n^2$ durch die Summen derselben Quadrate darzustellen (Berlin. Monatsber. 1868, S. 310 figg.). Der Verfasser zeigt im Einzelnen, welche Eigenschaften des quadratischen Gebildes mit den verschiedenen Fällen von Gleichheit und Ungleichheit der (von Weierstrass bei der Behandlung jener Aufgabe eingeführten) "Elementartheiler" zusammenhängen. Diese geometrische Deutung analytischer Thatsachen ist eine der interessantesten Partien der Killing'schen Arbeit und beweist gleichzeitig, wie wenig es ohne die Resultate der transcendentalen Geometrie möglich sein würde, für gewisse analytische Thatsachen das geometrische Aequivalent aufzufinden. Es werden weiter ähnliche und confocale quadratische Gebilde betrachtet und die Veränderungen dargelegt, welche die Theorie der quadratischen Gebilde erleidet, wenn man von den endlichen zu den Lobatsche wsky'schen Raumformen übergeht. Specielle Beispiele werden hier wie in der sonstigen Theorie der quadratischen Gebilde aus dem dreidimensionalen Gebiet her-

genommen. Zum Schluss wird bemerkt, dass u. A. auch die von Jordan für euklidische Raumformen gegebene Theorie der Krümmungen einer Raumcurve durch den Uebergang in nichteuklidische Raumformen sich nur unwesentlich ändert.

Es sei schliesslich noch erwähnt, dass Herr Killing in einer neueren Abhandlung (Programm des Lyceum Hosianum in Braunsberg, Michaeli 1884) eine weitere, auf dem Begriff der Bewegung beruhende Verallgemeinerung des Raumbegriffes gegeben hat, die ihn zu nichtprojectivischen Raumformen führt, Formen, von denen bisher nur eine einzige (in einer Abhandlung des Verfassers in Borchardt's J., Bd.89 S.284) betrachtet zu sein scheint.

Waren.

V. Schlegel.

A. MILINOWSKY (Weissenburg i. E.). Leipzig, Teubner. 1883.

"Unter allen Kegelschnitten ist keiner der elementaren Behandlung so zugänglich, wie die gleichseitige Hyperbel, und trotzdem besitzt unsere mathematische Literatur kein Buch, welches die Eigenschaften derselben im elementarer und einheitlicher Weise im Zusammenhange darstellt. Dieses Ziel hat sich der Verfasser in vorliegendem Werkchen gesteckt und hofft dadurch Allen, welche Beruf oder Neigung zur elementaren Betrachtung der Kegelschnitte führen, keine unwillkommene Gabe darzubringen. Namentlich aber hofft er dadurch auch dem Gedanken, dass das harmonische Gebilde ein durchaus elementares ist, weitere Geltung und der Anwendung desselben in der elementaren Geometrie grössere Ausbreitung zu verbaffen."

Mit diesen Worten schliesst die Vorrede des vorbezeichneten 135 Seiten starken Schriftchens. Unter allen Kegelschnitten ist zweifellos der Kreis die einfachste und der elementaren Behandlung zugäng ichste Curve. Dann zeichnet sich die Parabel durch viele höchst einfache Eigenschaften aus und hat zudem den (nicht ganz zu ignorirenden) Vortheil, dass einfache Physikalische Betrachtungen auf diese Curve führen. Manche Eigenthümlichkeiten derselben jedoch, insbesondere die durch die Lage ihres Mittelpunktes bedingten, liegen dem von der Kreisgeometrie kommenden Anfanger weiter ab, und somit ist es doch mindestens zweifelhaft, ob nicht der gleichseitigen Hyperbel. diesem Zerrbilde des Kreises, wirklich die Siegespalme grösserer Einfachheit und leichteren Zuganges gebührt.

Der Inhalt unseres Buches gliedert sich in sieben Paragraphen, von de nen der erste die Ueberschrift: "Punkte und Tangenten" führt. Be Tundamentalen Bedeutung dieses ersten Abschnittes mag es gestatigemaselben eine eingehendere Besprechung zu widmen. Ist so. derfassers deutlich geworden, so dürfen wir uns im Uebrig

da die vorgetragenen Materien im Ganzen nicht neu sind und dies ja auch keineswegs sein wollen.

Den Ausgangspunkt bildet der Sache nach die Gleichung der auf die Asymptoten bezogenen Curve, nämlich $xy = q^2$. Dann werden in sehr einfacher Weise die Begriffe Potenz (= q2), inneres und ausseres Gebiet, Asymptoten, Mittelpunkt, Durchmesser, Axen gewonnen. Es folgt der einfache und in den Anwendungen fruchtbare Satz: "Jede Secante der gleichseitigen Hyperbel wird von dieser und den Asymptoten in aquidistanten Punkten geschnitten. Zu den Tangenten ist ebenfalls der Zugang ein natürlicher: Jede Tangente der gleichseitigen Hyperbel begrenzt mit den Asymptoten ein Dreieck von constantem Inhalte. Man erkennt nun durch einfache Ueberlegungen, dass die Tangenten in den Endpunkten eines Diameters parallel sind, und den wichtigen Satz, dass eine beliebige Sehne der gleichseitigen Hyperbel den Endpunkten eines Diameters unter gleichen bez. supplementären Winkeln erscheint. Die Umkehrung dieses Satzes, welche als selbstverständlich nicht bewiesen, ja nicht einmal als besonderer Satz erwähnt ist, gewährt nun die Einsicht, dass der Höhenpunkt eines jeden der gleichseitigen Hyperbel eingeschriebenen Dreiecks auch auf derselben liegt. Aus den Folgerungen heben wir besonders zwei hervor. Erstens den theoretisch wichtigen Satz, dass eine gleichseitige Hyperbel von einem Kreise höchstens in vier Punkten geschnitten wird; zweitens den für Aufgaben fruchtbaren Satz: Wenn ein Kreis eine gleichseitige Hyperbel berührt, so schneidet er sie noch in zwei Punkten, deren Verbindungslinie auf dem Durchmesser des Berührungspunktes senkrecht steht. Bei dem Herrn Verfasser erscheint dieser Satz als Umkehrung eines andern, wie uns scheinen will, weniger anschaulichen. Hiermit gelangt man nun zum Krummungskreise und zu dem Feuerbach'schen Kreise, der durch den Mittelpunkt der Hyperbel geht. — Die Beziehungen der Hyperbel zum Kreise sind hiermit dargelegt. Analytisch gewinnen dieselben eine besonders merkwürdige Form, wenn man von der Darstellung der Coordinaten durch hyperbolische Functionen Gebrauch macht. Setzt man nämlich $x = a \operatorname{Col} u$, $y = a \operatorname{Sin} u$, so ist jedem Punkte der Hyperbel ein Argument u zugeordnet. Schneidet nun ein Kreis die Hyperbel, so ist die Summe der hyperbolischen Argumente der vier Schnittpunkte Null (oder $2\pi i$).

Insbesondere schneidet der Krümmungskreis mit dem Berührungspunkte, dessen Argument u ist, die Hyperbel in einem ferneren Punkte, dessen Argument — 3u sein muss. Daher kommt die Aufgabe, welche Herr Milinowsky Seite 55 Nr. 83 löst, auf die Dreitheilung eines gegebenen hyperbolischen Sectors hinaus. (Vergl. hierzu Salmon-Fiedler, Kegelschnitte, Art. 252, wo der entsprechende Satz für die Kreisfunctionen ausgesprochen ist, und bezüglich der Verwendung hyperbolischen

Argumente u. A. die interessante Schrift von S. Günther, "Parabolische Trigonometrie". Teubner.)

Der Verfasser wendet sich nunmehr den gegenseitigen Beziehungen gleichseitiger Hyperbeln zu. Die früher gewonnenen Sätze lassen hier bei cht erkennen, dass durch vier Punkte eine gleichseitige Hyperbel bestimmt ist und dass zwei gleichseitige Hyperbeln, welche sich in drei Pakten schneiden, den Höhenpunkt des eingeschriebenen Dreiecks zum rten Schnittpunkte haben. Die Gesammtheit aller gleichseitigen Hyperbeln, welche einem Dreiecke umschrieben sind und durch dessen Höhenpunkt gehen, bilden ein Büschel. Die Mittelpunkte dieses Büschels liegen feinem Kreise. Es folgen einige harmonische (projectivische) Eigensaften, von denen wir den Satz, dass eine Asymptote und zwei Tangenzwei gleichseitige Hyperbeln bestimmen, erwähnen.

Die jetzt folgenden Sätze ziehen die bekannten Eigenschaften des seisbüschels heran und so gelangen wir zu der Einsicht. dass der ter Mittelpunkte aller einem Dreiecke eingeschriebenen gleich. Titigen Hyperbeln ein Kreis um den Höhenpunkt dieses Dreiecks ist, elcher den Umkreis desselben rechtwinklig schneidet. Als leichte legerungen erhält man dann die wichtigen Sätze, dass durch vier Tansenten zwei gleichseitige Hyperbeln bestimmt sind und zwei gleichseitige Typerbeln sich mindestens in zwei reellen Punkten schneiden. Der tetzere Satz ist um so interessanter, als wir hier offenbar den Specialfall = 2 des bekannten Gauss'schen Beweises von der Anzahl der Wurzeln einer Gleichung nten Grades vor uns haben. Diese Bemerkung hätte auch der Verfasser machen und erhärten dürfen.

Mögen einige Randbemerkungen hier beigefügt werden. S. 7, in 9c, ebenso S. 21 in Nr. 26, S. 24 in Nr. 30 und S. 56 in Nr. 84 giebt Verfasser die Buchstaben ähnlicher Dreiecke nicht in richtiger, ähnlicher Reihenfolge. Ferner muss es wohl S. 5 in Nr. 7a statt $2q^2$ heissen $4q^2$, wie auf S. 24, wo sogar auf diese Stelle verwiesen wird, richtig zu lesen ist. In Fig. 4 fehlen die im Text vorkommenden F, F_1 . Durch 14a wird 12 eingeschränkt, was nicht ausdrücklich bemerkt wird; bei 12 hätte also der Zusatz "im Allsemeinen" nicht fehlen sollen. Der Beweis des Satzes in Nr. 19 geht wohl noch einfacher aus der Aufgabe hervor, einen (zwei) Punkt zu bestimmen, der von drei gegebenen Punkten Abstände hat, die sich verhalten wie m:n:p. Ebenso oder noch mehr macht der Beweis des Satzes in 21a einen etwas "mühsamen" Eindruck.

Hiermit glauben wir den ersten Abschnitt des Buches hinreichend Churakterisirt zu haben und werden uns von jetzt ab aus oben angegebenen Grunden grösster Kürze befleissen.

Der zweite Abschnitt behandelt die conjugirten Diameter, die Gleichung der Hyperbel und in etwas langweiliger Darstellung den Sehnensutz Nr. 27d.

Der dritte führt die Ueberschrift: Die Brennpunkte. Die einschlägige Theorie ist interessant und originell.

Gleiches Lob spenden wir gern dem folgenden, welcher die Polareigenschaften zum Gegenstande hat.

Der fünfte Abschnitt sucht die gleichseitige Hyperbel auf dem geraden Kreiskegel auf.

Der sechste liefert Ergänzungen und Aufgaben. Dabei ist der Krümmungskreis sorgfältig behandelt, auch wird die Dreitheilung des Winkels und das Delische Problem mit Hilfe der gleichseitigen Hyperbel gelöst. Ferner heben wir die Erzeugung dieser Curve aus der Geraden und eine physikalische Eigenschaft (Benetzung zweier Glasplatten) anerkennend hervor.

Der letzte Abschnitt behandelt die übrigen Kegelschnitte, insbesondere zunächst die allgemeine Hyperbel.

Fassen wir zusammen, so haben wir eine Arbeit vor uns, welche dem wissenschaftlichen Sinne des Verfassers Ehre macht. Das Streben desselben nach möglichst elementarer Darstellung ist oft von glücklichem. vielfach von befriedigendem Erfolge begleitet, und so wird das Büchlein in den Kreisen, auf welche es berechnet ist, gewiss als eine willkommene Gabe erscheinen.

Coesfeld, im August 1884.

K. Schwering.

Lehrbuch der ebenen Geometrie mit Uebungsaufgaben für höhere Lehranstalten. Von Dr. Th. Spieker, Professor am Realgymnasium in Potsdam. Verlag von A. Stein in Potsdam. Sechzehnte verbesserte Auf lage.

Sechzehn Auflagen zu erleben, ist nicht jedem Buche beschieden. Selbstverständlich tritt man daher an die Beurtheilung einer Schrift. welcher dies Glück zu Theil geworden ist, so oft aufgelegt worden zu sein, mit nicht niedrig gespannten Erwartungen heran. Insbesondere scheint die Aussicht gerechtfertigt, dass ein solches Schulbuch den Anforderungen der Lehrpraxis in hervorragender Weise entsprechen müsse. Allein auch für die wissenschaftliche Seite der Stoffbehandlung darf man Gutes hoffen; denn bei dem erfolgreichen Streben und Ringen, welches die Mehrzahl der neueren Schulbücher vortheilhaft auszeichnet, kann ein unwissenschaftliches Machwerk die Concurrenz nicht mehr bestehen.

Das vorliegende 326 Seiten starke Lehrbuch gliedert seinen Inhalt in vier Cursus.

Der erste geht nach einer Einleitung zur Besprechung der Lage gerader Linien über, handelt von den ebenen Figuren im Allgemeinen, von der Congruenz der Dreiecke und von den ParalleloWir heben aus dem ersten Cursus das Folgende hervor.

Es werden die Begriffe Gerade, Strahl, Strecke definirt und dann der Winkel im § 10 erklärt. "Der Theil der Ebene, welcher zwischen zwei von einem Punkte ausgehenden Strahlen liegt, heisst ein Winkel oder Winkelraum." In § 19 wird der Grundsatz aufgestellt: "Durch einen Punkt ausserhalb einer Geraden lässt sich in der Ebene stets eine aber auch nur eine gerade Linie ziehen, welche beliebig weit verlängert, die erstere nicht schneidet." Hierdurch ist die Definition der Parallelen zugleich gegeben. Denn es heisst sofort weiter: "Zwei gerade Linien in einer Ebene, welche beliebig weit verlängert sich nicht schneiden, heissen parallel." Den Schluss bilden 27 Uebungsaufgaben.

Die Darstellung hält sich von trockener Kürze ebenso fern, wie von ermüdender Ausführung selbstverständlicher Kleinigkeiten. Durch den Druck ist das Wichtige vom Unwichtigen passend für den Anfänger geschieden. In den Uebungsaufgaben kehrt derselbe Gedanke in verschiedener Fassung wieder und fordert so zur präcisen, logisch scharfen Behandlung gebieterisch auf.

Dieselben glücklichen Eigenschaften kann man den übrigen Abschnitten des ersten Cursus im Allgemeinen nachrühmen. Insbesondere liefern die Go Uebungsaufgaben des dritten Abschnittes ein treffliches Mittel, den Inhalt des Lehrvortrages zu wiederholen und lebendig zu machen.

Im zweiten Cursus handelt der erste Abschnitt von der geometrischen Aufgabe im Allgemeinen. Der Verfasser legt die vier gewöhnlichen Requisite, als Analysis, Construction, Beweis, Determination dar und Riebt als Hilfsmittel der erstgenannten, insbesondere Lehrsätze, geometrische Oerter und Reduction durch Data und Zerlegung an. Hiermit ist für den Anfänger das Nöthige gesagt, und Beispiele sorgen für Verdeutlichung. Selbstverständlich gelingt dem Schüler darum nicht die Lösung einer ihm bis dahin unbekannten Aufgabe von selbst. Dazu kann nur das Studium der Methoden, wie dies Petersen in seinem trefflichen Buche dankenswerth gefördert hat, in Verbindung mit zahlreichen Uebungsbeispielen führen. Auch ist es keineswegs Absicht unseres Verfassers, besonders an dieser Stelle das lebendige Wort des Lehrers überflüssig zu machen. Zum ersten Abschnitte 101 Aufgaben.

Der zweite Abschnitt behandelt den Kreis. Wir finden die gewöhnlichen elementaren Sätze über Sehne, Tangente, Peripheriewinkel u. s. w. Der Stoff ist, wie überhaupt in unserem Buche, nicht in trockener Brachyologie, sondern mit einer gewissen angenehmen Behaglichkeit vorgetragen und insbesondere den Sätzen, welche zu Aufgaben führen, Aufmerksamkeit zu gewandt. Dazu 130 Beispiele.

Die folgenden Abschnitte behandeln der Reihe nach die regulären Polygone, die Gleichheit der Figuren, Proportionalität und Achnlichkeit der Figuren, Proportionen am Kreise, Ausmessung

geradliniger Figuren und des Kreises. Jeder dieser Abschnitte enthält zahlreiche Uebungsbeispiele. Wir heben besonders die interessante Behandlung des Pythagoreischen Satzes, die höchst einfache und lehrreiche Einführung des Coordinatenbegriffes in § 193 hervor und, um zu zeigen, wie sehr der Verfasser bemüht ist, auch die historisch interessanten Gegenstände dem Schüler deutlich zu machen, die Erörterungen über den Arbelus und das Salinum des Archimedes. Der Tangenten-, Sehnen-, Secantensatz erscheint in doppelter Fassung, einmal als Proportion S. 165 flg., dann auch als Rechteck S. 179. Bei dem Streben nach Vollständigkeit, welches der Verfasser so glücklich bethätigt, wollen wir hierüber nicht mit ihm rechten.

Der dritte Cursus handelt in vier Abschnitten von den Transversalen, der harmonischen Theilung, den Aehnlichkeitspunkten, Chordalen (Tactionsproblem) und den Kreispolaren.

Die Lehre von den Transversalen geht selbstverständlich von den Sätzen des Ceva und des Menelaus aus. Die Darstellung zeigt insofern didaktisches Geschick, als die Einführung der Vorzeichen bei den abgemessenen Strecken vermieden ist. Leider hat der Verfasser aber nicht den Muth gehabt, trotzdem an dem Begriffe der Theilverhältnisse fest-Vielmehr ist nun auch die Gleichheit der Producte der nicht anstossenden Seitenabschnitte behauptet. Im Gegensatze (?) zu dem geehrten Herrn Verfasser halten wir es erstens für durchaus wissenschaftlich richtig, zu sagen, eine Strecke werde im Verhältnisse m:n durch zwei Punkte getheilt, von denen der eine innerhalb, der andere ausserhalb der Endpunkte liegt. Zweitens behaupten wir vom Standpunkte der Schulpraxis aus, dass die Einführung der Theilverhältnisse beim Umlaufen des Dreiecks dem Lernenden die Sache leichter macht. Wir würden an einen Gegensatz zum Verfasser nicht recht glauben, wenn nur § 232 und nicht auch die Bemerkungen S. 201 und 212 vorhanden wären. Referent würde also, und damit sei dieser Gegenstand erledigt, die Thesis S. 212, unbekümmert um Streckenvorzeichen, schreiben wie folgt:

$$\frac{YA}{YC} \cdot \frac{XC}{XB} \cdot \frac{ZB}{ZA} = 1.$$

Wer als Primaner mit den Materien in dieser Form bekannt geworden ist, dem wird die Einführung der Streckenvorzeichen keine Schwierigkeiten machen. Vielleicht aber wohl umgekehrt.

Die früher gerühmten Vorzüge des Lehrvortrages können wir im Uebrigen in besonders leblafter Betonung an dieser Stelle wiederholen. Namentlich angesprochen haben uns die schönen Uebungen zum vierzehnten Abschnitt und die Behandlung des fünften merkwürdigen Punktes am Dreieck. Der Verfasser versteht darunter den Schnittpunkt der Ercktransversalen nach den Berührungspunkten der angeschrie-

benen Kreise. Das Tactionsproblem erscheint in älterer und neuerer Lösung.

Der vierte Cursus trägt einen mehr rechnerischen Charakter. Er zerfällt in vier Abschnitte, welche die Anwendung der Algebra auf geometrische Probleme, metrische Relationen am Dreiecke, die Kreisberechnung und vermischte Uebungen enthalten.

Die algebraische Analysis geometrischer Probleme ist ein ebenso imteressanter wie nützlicher Gegenstand des Gymnasialpensums. Der Verfasser behandelt ihn ebenso gründlich wie klar. Die Discussion der Formeln ist durchweg musterhaft.

Fassen wir unser Urtheil zusammen, so sind die eingangs ausgesprochenen Erwartungen des Referenten durch dasselbe erfüllt, ja überboten worden. Nach unserer besten Ueberzeugung wird es sich dem Unterrichte an höheren Lehranstalten mit Erfolg zu Grunde legen lassen, wobei selbstverständlich der vorsichtige Lehrer sich nicht darauf steifen wird, Alles durchzunehmen. Insbesondere empfehlen wir es den Herren Collegen zum Selbstgebrauche und als Aufgabensammlung.

Coesfeld, den 8. Mai 1884.

K. SCHWERING.

Ueber einem Dreieck um- und eingeschriebene Kegelschnitte. Inauguraldoctordissertation von K. Dörholt. Münster, 1884.

Verfasser beabsichtigt, einen Theil der von Steiner in Crelle's Journal Bd. 55 S. 356 gemachten Mittheilungen zu beweisen. Auf andere Arbeiten des berühmten Geometers, insbesondere die Abhandlung: "Teoremi relativi alle coniche inscritte e circoscritte", Crelle Bd. 30, ist ebenfalls Rucksicht genommen.

Die Dissertation zählt 88 Seiten Octav mit recht hübschen beigegebenen Figuren. Der Inhalt ist im Allgemeinen ansprechend, das Material wohl Seordnet und im Ganzen übersichtlich. Die Darstellung vermeidet trotz vorwiegend synthetischer Richtung nicht ängstlich die Rechnung. Darf man aus der Schrift auf den Studiengang des Verfassers schliessen, so hat die Vorlesungen von Professor Sturm in Münster mit Fleiss und Nutzen gehört.

K. Schwering.

Cettre de Charles-Frédéric Gauss au Dr. Henri-Guillaume-Mathias Olbers en date de "Braunschweig den 3. September 1805" publiée par B. Boncompagni d'après l'original possédé par la société royale des sciences de Göttingen. Berlin, Institut de Photo-lithographie des Frères Burchard, Imprimerie de Gustave Schade (Otto Francke), 1883.

Der in der Ueberschrift genannte, vier gro-

Brief

hat Herr Schering Theile desselben der Oeffentlichkeit übergeben. Man wird sich nichtsdestoweniger freuen dürfen, in dem meisterhaft gelungenen Abdruck des ganzen Briefes eine Erinnerung an die zierliche, deutliche Handschrift des grossen Mathematikers zu besitzen, welche bis in seine letzten Lebensjahre sich nur sehr unwesentlich veränderte. Ausser dem photolitographischen Abdrucke hat Fürst Boncompagni auch einen Abdruck des Briefes, im Urtexte, sowie in einer von Herrn Sparagna besorgten italienischen Uebersetzung, im Aprilhefte 1883 seines Bulletino di Bibliografia u. s. w. anfertigen lassen und hat endlich am 20. Mai 1883 der Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei in Rom eine Abhandlung vorgelegt, welche in den Atti dieser Gesellschaft (Tomo XXXVI) erschien und in besonderem Abdrucke unter dem Titel: "Intorno ad una lettera di Carlo Federico Gauss al Dr. Enrico Guglielmo Mattia Olbers. Memoria di B. Boncompagni" (95 S.) in unseren Händen ist. Mit gewohnter peinlicher Sorgfalt sind in dieser Abhandlung die Worte des Briefschreibers einzeln mit Belegstellen Unter Anderem macht der Verfasser darauf aufmerksam, dass versehen. die Ehe zwischen Minna Gauss, der Tochter Gauss' aus erster Ehe, und dem Orientalisten Ewald am 15. September 1830 geschlossen wurde, und dass der Todestag der zweiten Frau von Gauss, Minna Waldeck, auf den 12. September 1830 fiel, zwei Daten, welche, wie es scheint, noch in keinem Buche abgedruckt waren. CANTOR.

Die Entwickelung der Mathematik in den letzten Jahrhunderten. Von Dr. Hermann Hankel, vorm. ord. Professor der Mathematik in Tübingen. II. Auflage mit einem Vorwort von Dr. P. Du Bois-Reymond, ord. Professor der Mathematik an der Universität Tübingen. Tübingen, Verlag und Druck von Franz Fues (L. Fr. Fues'sche Sortiments-Buchhandlung), 1885. 27 S.

Die Antrittsvorlesung Hankel's, mit welcher er am 29. April 1869 für seine Aufnahme in den akademischen Senat der Universität Tübingen dankte, ist seit einer Reihe von Jahren vergriffen, so dass die Buchhandlung, welche dieselbe verlegt hatte, wiederholt in der Lage war, Bestellungen ablehnen zu müssen. Lohnte es einen neuen Abdruck zu veranstalten? Herr P. du Bois-Reymond hat die an ihn gerichtete Frage bejaht, und Referent schliesst sich dieser seiner Beantwortung gern an. Schon Herr Du Bois-Reymond hat allerdings in seinem Vorworte betont, dass neue seit Hankel's Tod gemachte Fortschritte, die natürlich 1869 noch nicht berücksichtigt werden konnten, einer Rede des Charakters, wie Hankel sie damals beabsichtigte, heute ein anders auszusprechendes Ende geben müssten. Man kann getrost hinzufügen, dass nicht minder

frühere Zeiten sich beziehen, vorzunehmen wären, da die heutigen Auffassungen der Geschichte der Mathematik beträchtlich von denen abweichen, welche Hankel sich gebildet hatte. Aber immerhin handelt es sich doch nur um nöthige Aenderungen, oder sprechen wir es mit dem härtesten Worte aus: um kleine Unrichtigkeiten im Einzelnen. Die geschichts - philosophische Idee der Rede bleibt davon unberührt, unberührt also auch der Werth, den diese für den Leser behält und so lange behalten wird, als antike und moderne Mathematik als nicht blos dem Grade, sondern auch der Natur nach verschieden dasteben und eine Darlegung ihres inneren Gegensatzes verlangen. In diesem Sinne ähnelt die Rede manchen Einleitungscapiteln Lagrange'scher Schriften und wird gleich diesen ihre Entstehungszeit weit überdauern.

Einleitung in die Analysis des Unendlichen. Von Leonhard Euler. I. Theil. Ins Deutsche übertragen von H. Maser. Berlin 1885, Julius Springer. X, 319 S.

Der Band, über dessen Erscheinen wir berichten, ist nur der erste einer Sammlung von klassischen Werken, die, im Original längst vergriffen und auch in Uebersetzungen schwer erhältlich, überdies durch die veraltete Form der Uebersetzung fast ungeniessbar, gleichwohl verdienen, auch von Mathematikern der Jetztzeit gelesen und studirt zu werden. Glaube doch ja Niemand, der die Vorlesungen auch unserer berühmtesten Universitätslehrer gehört und ausgearbeitet hat, er sei jetzt so erhaben über dem Standpunkt jener Männer, auf deren Schultern seine Lehrer selbst stehen, dass er von ihnen unmittelbar Nichts mehr lernen könne! Selbst die Mängel, welche er in den Musterschriften vergangener Zeiten zu erkennen im Stande ist, werden ihn belehren, und sei es auch nur über die nothwendige Mangelhaftigkeit der Gegenwart. Wenn so Vieles nicht mehr wahr ist, was die bedeutendsten Schriftsteller der Vergangenheit in unserer 'Wissenschaft lehrten, wer möchte da so zuversichtlich sein, an die für alle Zeiten gesicherte Wahrheit dessen zu glauben, was manche Eintagsfliege unter den mit uns Lebenden laut ausposaunt? Doch auch die Kehrseite fehlt nicht. Wenn jene Klassiker, trotzdem sie Hilfsmittel und Prüfsteine nicht kannten, die heute jedem Anfänger zu Gebote stehen, so Vieles schufen, was seinen Werth behielt, so wird auch der Zweifelsüchtigste des Trostes nicht entbehren, dass neben dem Wechselnden das Bleibende in unserer Wissenschaft doch weit überwiegt, und dass der Fortschritt, dessen Verdienst wir damit wahrlich nicht zu schmälern beabsichtigen, vielfach nur darin besteht, einen lückenlosen Weg nach Gipfelpunkten zu führen, wohin das Genie über Abgründe und unwegsam steile Wände voranageflogen 1

Die Schriften, welche in neuer deutscher Uebersetzung zunächst der Oeffentlichkeit übergeben werden sollen, sind der I. Band der Euler'schen Introductio in analysin infinitorum, Cauchy's Analyse algebrique, Diophant's Arithmetik mit den Fermat'schen Anmerkungen, die Abhandlungen von Vandermonde. Vor einer Uebereilung der Diophant-Ausgabe möchten wir warnen. Von diesem Schriftsteller thut zuerst eine gereinigte Textausgabe Noth, und bevor diese erschienen ist, was, wie wir anzunehmen Grund haben, nicht gar lange mehr anstehen dürfte, ist es sehr gewagt, eine neue Uebersetzung herauszugeben.

Heute haben wir den Euler'schen Band vor uns. Von ihm gilt in ganz hervorragendem Maasse, was wir oben allgemein sagten. Das lateinische Original von 1748 ist ziemlich selten und durch zahlreiche Druckfehler entstellt. Michelsen's Uebersetzung von 1788 ist in einem Deutsch gehalten, dem man Lessing's Einwirkung auf unsere Sprache noch nicht anmerkt. Es gehörte ein Entschluss dazu, das Werk in dieser Gestalt zu Und doch ist es der Keim, aus welchem die ganze moderne algebraische Analysis hervorgegangen ist und aus welchem noch weitere Folgerungen zu ziehen einem heutigen fachkundigen Leser vielleicht nicht unmöglich, ja nicht einmal allzu schwierig sein dürfte. Die neue Uebersetzung ist, soviel wir sie ansehen konnten, recht geschmackvoll und keineswegs so modernisirt, dass sie eine blosse Bearbeitung darstellte. Auch eine solche hätte ja beabsichtigt werden können, aber wir stimmen dem Uebersetzer und dem Verleger bei, dass es zweckmässiger war, die Treue an das Original vollständig zu wahren. Gestattete man sich einmal Aenderungen, so war es schwer, denselben Grenzen zu ziehen, und der Leser hätte alsdann nicht vor sich gehabt, was er vor sich haben soll: ein Euler'sches Werk.

Warum nur der erste Band übersetzt wurde, der zweite dagegen ausgeschlossen bleibt? Wir können diese Frage nicht genügend beantworten. Uns scheint auch die analytische Geometrie Euler's, und diese bietet der II. Band der Introductio, keineswegs des heutigen Studiums unwürdig, und insbesondere diejenigen Capitel, welche Curven höherer Ordnung gewidmet sind, möchten als vergleichende Nebenstudien dem Lesen der Schriften von Möbius und Plücker vortheilhaft an die Seite gestellt werden.

Geometrische Wahrscheinlichkeiten und Mittelwerthe. Von EMANUEL CZUBER. Mit 115 in den Text gedruckten Figuren. Leipzig, Verlag von B. G. Teubner. 1884. VII, 244 S.

Vor fünf Jahren hat der Verfasser eine deutsche Bearbeitung der Vorlesungen über Wahrscheinlichkeitsrechnung veranstaltet, welche A. Me yer in den Jahren 1849—1857 an der Universität Lüttich gehalten und welche nach dessen Tode Herr F. Folie ebendaselbst herausgegeben hatte. So reichhaltig der Inhalt jener Vorlesungen war, eine Lücke zeigten sie doch beim ersten Anblick. Es fehlten jene geometrischen Betrachtungen zur Lösung gewisser Aufgaben der Wahrscheinlichkeitsrechnung, welche, von einigen vorzugsweise französischen und englischen Schriftstellern benutzt, eine Brauchbarkeit enthüllten, die ganz geeignet war, das theoretische Interesse an dem geistigen Zusammenhang scheinbar so verschiedener Gebiete zu erhöhen. Das heute in unseren Händen befindliche Buch hat den Zweck, jene Lücke auszufüllen, indem es gerade mit den geometrischen Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen sich ausführlicher beschäftigt, als es möglich und gestattet gewesen wäre, wenn es nur um eine Abtheilung eines grösseren Werkes sich handelt.

Die erste Vorfrage, welche sich aufdrängt, ist die, ob jener Zusammenhang zwischen den geometrischen Gebilden und den Wahrscheinlichkeitsgrössen, die sie zu versinnlichen bestimmt sind, ein nothwendiger oder ein nur hypothetischer ist, und der Verfasser selbst ist ihr nicht aus dem Wege Segangen. Er gesteht S. 7: "Es ist wiederholt vorgekommen, dass Probleme über geometrische Wahrscheinlichkeiten und Mittelwerthe abweichende Lösungen gefunden haben. Der Grund hierfür lag immer in der verschiedenen Auffassung des Begriffes willkürlich, dessen Bedeutung thatsächlich nicht immer so klar zu Tage liegt, um Meinungsverschiedenheiten auszuschliessen." Ein willkürlicher Punkt auf einer Curve z. B., erläutert Herr Czuber, kann heissen: entweder ein Punkt, der von dem nächstgelegenen ebenso willkürlichen Punkte eine curvenmässige Entfernung ds besitzt, oder ein Punkt, dessen Abscisse um dx von der des nächstgelegenen willkürlichen Punktes sich unterscheidet, oder ein Punkt, dessen Verschiedenheit Von dem nächstgelegenen willkürlichen Punkte durch den Winkel der gemessen wird, welchen die beiden vom Coordinatenanfangspunkt dorthin Serichteten Leitstrahlen mit einander bilden u. s. w. Jede dieser Annahmen setzt eine verschiedene Dichtigkeit von gewissen unendlich kleinen Raum-Srössen, eine gleiche Dichtigkeit von anderen als nothwendig voraus, aber es sind nicht immer die gleichen Raumbestandtheile, welche die gleiche Rolle Dielen. So muss, je nach der getroffenen Wahl, bald dieser, bald jener Werth sich ergeben. Welcher aber ist der richtige? Wir fürchten, es durfte eine Entscheidung darüber meistens unmöglich und die geometrische Betrachtung dadurch vielfach mehr geistreich als zweckmässig sein. Schon der Satz (S. 6), dass der Inhalt eines Gebietes von n Variabeln als ein Maass für die Anzahl der Werthverbindungen anzusehen sei, welche dieses Gebiet ausmachen, also die Grundlage aller Betrachtungen ist nur dann wahr, Wenn die Punkte des Gebietes in einer ganz bestimmten Weise als gleich dicht verbreitet gedacht werden. Freilich hat dieses Bedenken M tiker allerersten Ranges nicht abgehalten, den erwähnten Satverstandlich wahr anzuwenden, und wir benutzen die

Veröffentlichung einer ähnlichen, so weit uns bekannt, noch nicht gedruckten Notiz, welche aus einer Vorlesung von Gauss über die Methode der kleinsten Quadrate aus dem Jahre 1850 stammt. Der Gegenstand ist zwar in der Recension von Gauss: Einige Bemerkungen zu Vega's Thesaurus Logarithmorum (Astronomische Nachrichten Nr. 756 vom 2. Mai 1851 und Werke, Bd. III S. 257—264) kurz berührt, der Wahrscheinlichkeitsbetrachtung aber dort nicht gedacht.

Gauss verglich die Endziffern von je 900 aufeinander folgenden Logarithmen von Sinus, Cosinus und Tangente der gleichen Winkel auf ihr Zunächst betrachtete er jede Columne für Geradsein oder Ungeradsein. sich und fand, wenn g, u gerade und ungerade, I, II, III der Reihe nach die drei Columnen bedeuten, in I: 449g + 451u, in II: 459g + 441u, in III: 437q + 463u, also durchschnittlich ebenso oft q als u. Betrachtete er I und II gemeinschaftlich, so fand er, wenn die Stellung der Buchstaben den Columnen entspricht, welchen die jedesmaligen Endziffern angehören: 230gg + 219gu + 229ug + 222uu, also wieder jede der vier Möglichkeiten annähernd gleich oft; dasselbe traf zu, wenn I und III, sowie wenn II und III gemeinschaftlich betrachtet wurden. Nun untersuchte er die drei Columnen gleichzeitig und fand 173ggg + 167guu + 176ugu+159uug+57ggu+52gug+53ugg+63uuu, also eine so bedeutende Verschiedenheit, dass die vier ersteren Combinationen zusammen 675 mal, die vier letzteren zusammen 225 mal im Häufigkeitsverhältnisse 3:1 vor-Diese im ersten Augenblick auffallende Abweichung von dem Gleichmaasse der Möglichkeiten beruht auf der Abhängigkeit der in den drei Columnen stehenden Zahlen von einander (log sin = log cos + log lng), von welcher auch bei der wirklichen Berechnung Gebrauch gemacht wird. Man müsste sogar infolge dieser Abhängigkeit erwarten, dass nur die Combinationen ggg, guu, ugu, uug vorkommen, und zwar annähernd gleich oft. Dass auch die vier anderen Combinationen vertreten sind, hat seinen Grund darin, dass in allen drei Columnen nicht genaue, sondern abgekürzte Zahlen stehen, mithin die Endziffern a, b, c dreier nebeneinander befindlicher Zahlen eigentlich $a + \alpha$. $b + \beta$, $c + \gamma$ bedeuten. wo α , β γ das zwischen - 1 und + 1 liegende bei der Abkürzung Vernachlässigte bedeutet, und nicht a = b + c, sondern $a + \alpha = b + \beta + c + \gamma$ die genaue Beziehung zwischen den Columnen darstellt. Ist β mit γ verschiedenen Zeichens, so ist sicherlich $|\beta+\gamma| < \frac{1}{4}$, mithin a=b+c. Dasselbe $|\beta+\gamma| < \frac{1}{4}$ kann auch eintreten, wenn β und γ gleichen Zeichens sind, und hat alsdann wieder die Folge u = b + c. Aber im Falle gleichgezeichneter β und y kann auch $|\beta + \gamma| > \frac{1}{4}$ sein, worauf a = b + c + 1 entsteht. Diese wohl zu unterscheidenden Fälle zeichnete Gauss in einer Figur. Auf einem rechtwinkligen in O sich schneidenden Coordinatenkreuz ist $OB = \frac{1}{2}$ auf der positiven Seite der Abscissenaxe aufgetragen. Die Stücke gleicher Länge OR' OC. OC' sind auf der negativen Seite der Abscissenaxe, auf der posi-

tiven und negativen Seite der Ordinatenaxe abgemessen. Parallel zu den Coordinatenaxen sind durch B die ED, durch C die DD', durch B' die D'E', durch C' die E'E gezogen, die das aus vier kleinen Quadraten bestehende grössere Quadrat DD'E'E bilden. Endlich sind die beiden kleinen Diagonalen BC, B'C' gezogen. Auf der Abscissenaxe sind die Werthe von β, auf der Ordinatenaxe die von γ aufgetragen. Nun ist sofort klar, dass **ung**leichgezeichnete β und γ in den kleinen Quadraten OBE'C' und OCD'B', gleichgezeichnete β und γ mit der $\frac{1}{2}$ nicht überschreitenden Summe in den **Dreiecken** OBC und OB'C' stattfinden. Gleichgezeichnete β und γ mit der zwischen 🖁 und 1 wechselnden absoluten Summe finden sich in den Dreiecken **B** C D und B'C'E'. Die beiderlei Gebiete haben daher Flächenräume, die sich wie 3:1 verhalten, und ebenso verhält sich demnach das Eintreffen von a = b + c zu dem von a = b + c + 1, d. h. von den vier ursprünglichen Combinationen zu den vier nachträglich hinzugekommenen. Es liegt auf der Hand. dass dabei die nicht ausgesprochene Hypothese mit unterläuft, alle irgend möglichen Werthepaare β , γ seien in genau gleichem Maasse möglich.

Solcherlei Methoden sind es auch, die begreiflicherweise in verschiedenen Abarten, bald durchaus elementargeometrisch, bald Lehren der analytischen Geometrie der Ebene und des Raumes voraussetzend, die erste Hauptabtheilung des Czuber'schen Buches füllen. Ein zweiter kürzerer Theil (S. 184—244) handelt von den geometrischen Mittelwerthen. Die Berechtigung dieser Aufgaben, an dem gedachten Orte behandelt zu werden, beruht darauf, dass ähnlich wie bei Wahrscheinlichkeiten es sich um einen Quotienten handelt, dessen Zähler die Summe der Einzelwerthe, dessen Nenner deren Anzahl bedeutet. So ist der Mittelwerth einer Function $\mathbf{v} = \mathbf{x}(x)$ im Intervalle $a \le x \le b$ sofort

$$\frac{\mathfrak{F}(a)+\mathfrak{F}(a+\Delta x)+\mathfrak{F}(a+2\Delta x)+\ldots+\mathfrak{F}(b-\Delta x)}{\frac{b-a}{\Delta x}}=\frac{1}{b-a}\sum_{a}^{b}\mathfrak{F}(a)\cdot\Delta x,$$

und bei stetig aufeinander folgenden x wird der Mittelwerth

$$M = \frac{1}{b-a} \int_{a}^{b} \mathfrak{F}(x) dx.$$

Analytisch betrachtet, handelt es sich also in diesem Theile um die Auswerthung bestimmter Integrale, und wirklich ist der gleiche Gegenstand von anderen Schriftstellern (z. B. Schlömilch, Uebungsbuch zum Studium der höheren Analysis, II. Theil: Aufgaben aus der Integralrechnung §§ 33 und 34) zur Uebung auf diesem Gebiete benutzt worden. Freilich geht Herr Czuber weiter als diese seine Vorgänger, inder icheres Material an Beispielen zusammenzustellen wusst.

Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung. Von J. A. SERRET, membre de l'institut et du bureau des longitudes. Mit Genehmigung des Verfassers deutsch bearbeitet von Dr. Axel Harnack, Professor am Polytechnikum zu Dresden. Erster Band. Differentialrechnung. Mit in den Text gedruckten Figuren. Leipzig, B. G. Teubner. 1884. X, 567 S.

Nicht leicht wird ein Lehrer an einer Hochschule sich in seinen Vorlesungen an ein im Drucke vorhandenes Werk genau anschliessen, wobei wir nicht einmal den Fall ausnehmen, dass er selbst ein solches verfasste; aber nicht leicht wird er auch darauf verzichten, seinen Schülern ein Druckwerk zu empfehlen, welches ihnen zum Nachlesen und Nachschlagen In kaum irgend einem Gebiete der Mathematik wird dabei die Qual der Wahl eine so grosse sein, als in der Differential- und Integral-Sollen wir die Wahrheit dieser Behauptung durch Namensnennung empfehlenswerther und vielfach empfohlener Schriften bestätigen? Wohl kein Leser dieser Zeitschrift wird solcher Bestätigung bedürfen. Heute haben wir nun ein Werk anzuzeigen, welches sicherlich bald zu den meistempfohlenen gehören wird. Herrn Serret's Lehrbuch geniesst in Frankreich eines wohlverdienten glänzenden Rufes. In Russland wird es, wenn wir recht berichtet sind, officiell dem Unterrichte in der Differentialund Integralrechnung zu Grunde gelegt. In Deutschland war es, so lange nur der französische Text zugänglich war, vielleicht etwas weniger verbreitet als der gleichfalls nur französisch vorhandene Cours d'analyse von Sturm. Wir glauben, dass ihm damit Unrecht geschah. Gewiss war das Buch von Sturm einmal vortrefflich. Wir bereuen kein Wort, welches wir 1864 im IX. Bande dieser Zeitschrift zu dessen Lob gesagt haben. Gewiss würde Sturm, wenn er nicht im Alter von erst 52 Jahren 1855 durch den Tod aus seiner Schaffenslust gerissen worden wäre, sein Werk in neuen Auflagen auf der Höhe der Wissenschaft erhalten haben. den Herausgebern des nachgelassenen Werkes verbot die Pietät selbst jede wesentliche Aenderung, und so können wir heute nur noch sagen: Sturm's Buch war vortrefflich. Der Lehrer wird stets ein nachahmungswürdiges Muster in demselben erkennen, dem Gebrauche des Schülers aber ist es in einzelnen Capiteln nicht mehr zu genügen im Stande. Herr Serret dagegen hat erst 1879-1880 die II. Auflage seines Werkes neuesten Anforderungen angepasst, und dass die Zusätze, durch welche der deutsche Bearbeiter seine Uebersetzung bereichert hat, die Strenge der Beweisführungen nur zu verstärken dienten, wird Niemand zweifelhaft sein, der Herrn Harnack's Richtung aus seinen Originalarbeiten kennt. Sollen wir aus dem I. Bande, der heute allein fertig vorliegt, besonders gelungene Capitel hervorheben, so bieten sich die Einleitung und die geometrischen Anwendungen der Differentialrechnung von selbst dar. Dort wird namentlich das Unendlichkleine und seine verschiedenen Ordnungen so gentigend behandelt,

dass die weitere Rechnung mit Differentialen eigentlichem Bedenken nicht mehr unterliegt, wenn auch Referent nicht verschweigen will, dass er persönlich es vorzieht, Anfänger nur mit Differentialquotienten rechnen zu lassen, und also darin Herrn Serret nicht beipflichten kann. Die geometrischen Anwendungen sind weitaus vollständiger als in irgend anderen Differentialrechnungen und können vorzugsweise empfohlen werden. Der I Band heisst der der Differentialrechnung und enthält noch kein Integralzeichen; dagegen kommen Integrirungen in grosser Menge ohne jenes Zeichen vor, statthaft gemacht durch den frühe geführten Beweis des Satzes, dass Functionen, welche gleiche Ableitungen besitzen, sich nur um eine constante Differenz unterscheiden können. Die letzten vier Druckbogen enthalten bereits eine Einleitung in die Lehre von den Functionen complexer Veränderlichen.

Graphisch-mechanische Methode zur Auflösung der numerischen Gleichungen. Von Dr. C. REUSCHLE, Professor an der technischen Hochschule in Stuttgart. Stuttgart, J. B. Metzler. 1884. IV, 64 S.

Herr Matthiessen hat in seinem bekannten, ungemein reichhaltigen Werke "Grundzüge der antiken und modernen Algebra der litteralen Gleichungen" (S. 921—963) eine Anzahl graphischer Methoden zur Construction der Wurzeln von Gleichungen zweiten, dritten und vierten Grades zusammengestellt Sie alle, so bemerkt Herr Reuschle mit Recht, verlangen für jede besonders gegebene Gleichung eine besondere Construction. Graphisch-mechanisch könnte man dagegen eine Methode nennen, welche gewisse Zeichnungen auf Pauspapier ein für alle Mal herstellen würde, die alsdam über anderen gleichfalls, zum Voraus gezeichneten Figuren verschoben, durch dieses mechanische Verfahren die Gleichungswurzeln kennen lehrte. Eine derartige Methode ist die von Herrn Reuschle erfundene.

Sei die quadratische Gleichung $x^2 + b \ x + c = 0$ zu lösen. Ihre Wurzeln stimmen überein mit den x-Werthen des Gleichungspaares $y - \left(c - \frac{b^2}{4}\right)$ $= \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$ und y = 0 Die zweite Curve ist die Abscissenaxe des rechtwinkligen Coordinatensystems, die erste ist eine Parabel $\eta^2 = \xi$, deren Axe der früheren Ordinatenrichtung parallel läuft und deren Scheitelpunkt in $x_0 = -\frac{b}{2}$, $y_0 = c - \frac{b^2}{4}$ liegt. Zeichnet man also jene Parabel $\eta^2 = \xi$ auf Pauspapier, sowie ein rechtwinkliges Coordinatensystem auf Millimeterpapier und legt jene vorgeschriebenermassen auf dieses, so schneidet die Parabel die Abscissenaxe in den beiden die reellen Wurzeln darstellenden Punkten.

Sei die cubische Gleichung $x^3 + bx^2 + cx = d$ zu lösen. Das Giper $y - \left(c - \frac{b^2}{4}\right) = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$ und xy = d stellt die gleichung gleichun

in der gleichen Lage, wie sie eben besprochen wurde, und eine Hyperbel dar, deren Asymptoten unsere Coordinatenaxen sind. Letztere wird auf Millimeterpapier gezeichnet, erstere darauf gelegt. Vier Durchschnittspunkte erscheinen allerdings, von denen aber nur drei die reellen Wurzelwerthe der gegebenen Gleichung als Abscissen besitzen, während der vierte Punkt (der ∞ -ferne Punkt der Ordinatenaxe) ausser Betracht bleibt.

Sei eine biquadratische, auf die Form $x^4 + b \, x^3 + c \, x^3 = e$ gebrachte Gleichung zu lösen. Sie wird wieder durch zwei Curven ersetzt, durch die auf Pauspapier gezeichnete Parabel $y - \left(c - \frac{b^2}{4}\right) = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$ und durch die auf Millimeterpapier construirten Curven dritten Grades $x^2y = e$. Von den sechs Durchschnittspunkten kommen zwei nicht in Betracht, nämlich der doppelt auftretende ∞ -ferne Punkt der Ordinatenaxe, welcher Rückkehrpunkt der Unicursalcurven $x^2y = e$ ist. Der algebraische Ursprung dieser beiden und des im vorigen Beispiel erwähnten einen unendlich entfernten Punktes ruht augenscheinlich darin, dass die Gleichungen dritten und vierten Grades hier als Sonderfälle von Gleichungen vierten und sechsten Grades mit Nullcoefficienten des höchsten, beziehungsweise der beiden höchsten Glieder auftreten.

Herr Reuschle begnügt sich selbstverständlich nicht mit den hier gegebenen Andeutungen. Er erörtert genau die verschiedenen Schwierigkeiten, welche sich darbieten können. Er dehnt seine Methode auf Gleichungen fünften, sechsten, siebenten Grades aus, bei denen weniger einfache Curven zum Schnitte gelangen. Er zeigt, wie auch noch anders als hier besprochen, eine Gleichung als Eliminationsresultante zweier Gleichungen aufgefasst werden kann, so dass die Pauspapiercurve anders gestaltet nicht mehr jene einfache Parabel ist. Der Grundgedanke bleibt aber stets unverändert und dürfte in seiner Einfachheit dem anspruchslosen, hübsch ausgestatteten Büchlein Leser und Freunde zu erwerben im Stande sein.

Ueber Beta- und Gammafunctionen. Von Dr. J. Anton Schobloch. Halle, Louis Nebert. 1884. 4°. 11 S.

Ausgehend von den bekannten Gleichungen und Formeln für die Euler'schen Integrale leitet der Verfasser unter Zuhilfeziehung von $\int_0^\infty \left(e^{-ax}-e^{-bx}\right)\frac{dx}{x}=\log\frac{b}{a} \text{ einige neue Integralformeln ab , z. B. die}$

für ganzzahlige a, b und k giltige Gleichung:

$$\frac{B\left(a,b+\frac{1}{k}\right)\cdot B\left(a,b+\frac{2}{k}\right)\cdots B\left(a,b+\frac{k-1}{k}\right)}{B\left(b,a+\frac{1}{k}\right)\cdot B\left(b,a+\frac{2}{k}\right)\cdots B\left(b,a+\frac{k-1}{k}\right)} = k^{(a-b)\,k} \left[\frac{(a-1)!}{(b-1)!}\right] \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(ak)}.$$

Das Hauptgewicht legt der Verfasser auf eine Function $\psi(m,n) = \int_{0}^{\infty} x^{m-1} e^{-x^{n}} dx$, welche, wie sie eine Verallgemeinerung der Gammafunction ist, in die sie bei n=1 übergeht, auch auf Gammafunctionen sich zurückführt. Die Substitution $x^{n} = y$ führt nämlich jenes Integral in die Form $\frac{1}{n} \int_{0}^{\infty} \frac{m}{n} e^{-y} dy$ über, mithin ist $\psi(m,n) = \frac{1}{n} \Gamma \frac{m}{n}$. Für die ψ -Func-

tionen wird das Productentheorem bewiesen:

$$\frac{\psi(m,n).\psi(m+k,n).\psi(m+2k,n)...\psi(m+(p-1)k,n)}{\psi(m,k).\psi(m+n,k).\psi(m+2n,k)...\psi(m+(q-1)n,k)} = (2\pi)^{\frac{n-k}{2}} \frac{k^q}{n^p} \left(\frac{k}{n}\right)^{p \cdot \frac{m}{n} + \frac{p \cdot q}{2} - \frac{p+q}{2}}.$$

Daraus folgt dann wieder durch Umsetzung in Gammafunctionen

$$\frac{\Gamma\left(\frac{m}{n}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{m+k}{n}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{m+(p-1)k}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{k}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{m+n}{k}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{m+(q-1)n}{k}\right)} = 2 \pi^{\frac{n-k}{2}} \left(\frac{k}{n}\right)^{\frac{m}{n} + \frac{pq}{2} - \frac{p+q}{2}},$$

eine Erweiterung des Gauss'schen Productentheorems, aus welcher letzteres durch q=1, k=1, p=n, m=an hervorgeht. Canton.

Ueber die quadratischen und cubischen Gleichungen mit besonderer Berücksichtigung des irreducibeln Falles bei den letzteren. Von Professor C. Hellwig, Oberlehrer am Realgymnasium zu Erfurt. Erfurt, Verlag von Carl Villaret. 1884. 41 S.

Wer diese Schrift zu beurtheilen wünscht, ist durch den Mangel jeglicher Vorrede in eine missliche Lage versetzt. Er kann nämlich nicht die Absichten des Verfassers aus dessen eigenen Erklärungen entnehmen, und ebenso wenig gehen dieselben aus dem Schriftchen selbst hervor. Einem Gymnasialschüler wird man nicht leicht ein besonderes Büchelchen als Leitfaden für den Unterricht in einem einzelnen Capitel in die Hand geben. Einem Gymnasiallehrer sagt das Büchelchen zu wenig Neues; soll es ihm aber ein didaktisches Muster geben, wie er vorschlagsweise den behandelten Gegenstand unterrichten solle, so mässten wir ihn doch mahnen, dem Beispiele nur vorsichtig und nicht unter strenger Nachahmung zu folgen. Was braucht es S. 13 eine Reihenentwickelung, um die eine unendlich grosse Wurzel der Gleichung $ax^2 = bx + c$ bei c

 $x_2 = \frac{-2c}{\sqrt{b^2 + 4ac + b}}$ vollkommen ausreicht? Wem soll S. 16 die Ableitung des Moivre'schen Theorems genügen? Beachtenswerth dagegen dürfte die S. 33 gelehrte Herleitung der Ferro'schen Formel sein. Die aufzulösende cubische Gleichung ist in der Gestalt $x^3 + 3ax = 2b$ gegeben, aus welcher auch $x^3 + 3ax - v^3 = 2b - v^3$ folgt. Nun ist $(x-v)^3 = x^3 + 3v(v-x)x - v^3$, folglich liefert die Voraussetzung v(v-x)=a die neue Gleichung $(x-v)^3$ $=2b-v^3$ und diese $x=v+\sqrt[3]{2b-v^3}$. Der eben gefundene Werth von x giebt aber jener Voraussetzung die Gestalt $-v^{2}/2b-v^{3}=a$, woraus $v^6 - 2bv^3 = a^3$, $v^3 = b + \sqrt{b^2 + a^3}$, $2b - v^3 = b + \sqrt{b^1 2 + a^3}$ folgt, und diese Werthe wieder in $x=v+\sqrt[3]{2b-v^3}$ eingesetzt, liefert endlich eben die Ferro'sche Formel. Die Auflösung der cubischen Gleichungen mit Hilfe trigonometrischer Functionen S. 38-41 hätte wohl in etwas mannichfaltigerer Weise behandelt werden dürfen, wozu es an Stoff sicherlich nicht fehlt, wie Matthiessen's Grundzüge der antiken und modernen Algebra der litteralen Gleichungen S. 888 — 912 beweisen. CANTOR.

Théorie des approximations numériques. Notions de calcul approximatif par Ch. Galopin-Schaub, Docteur ès sciences mathématiques (de la Faculté de Paris). Genève, H. Georg. 1884. 50 S.

Wir haben Bd. XXVI, hist.-lit. Abthlg. S. 149 - 150, über Ruchonnet, Élements de calcul approximatif, berichtet. Ohne mit jenem sehr empfehlenswerthen Büchlein sich zu decken, ist die uns heute vorliegende Abhandlung doch nicht als ganz unabhängig von demselben zu bezeichnen. Galopin verweist sogar wiederholt und mit Recht auf seinen Vorgänger. Wir wollen die Veröffentlichung des Herrn Galopin nicht gerade als überflüssig bezeichnen, allein wir ziehen die ältere Schrift von etwa doppeltem Umfange der jüngeren vor. Letztere ist naturgemäss etwas dürftigeren Inhaltes und empfiehlt sich auch nicht durch die für unseren Geschmack sehr schwerfällige Bezeichnung. Man denke n.e als genauen Werth einer Zahl, n.a als angenäherten Werth derselben, e.a als den absoluten, e.r als den relativen Fehler. Nun kommen Formeln vor wie $e \cdot r < \frac{1}{10P_{n,a}}$ und wie $n \cdot e - n \cdot a < \frac{n \cdot e}{m}$. Es wird wohl jedem Leser schwer fallen, dabei die erwähnten stenographischen Zeichen von den gewöhnlichen Operationszeichen, mit denen vermischt sie auftreten, zu unterscheiden. CANTOR.

Saggio di aritmetica non decimale con applicazioni del calcolo duodecimale e trigesimale a problemi sui numeri complessi. Monografia di Vittorio Grünwald. Verona 1884, H. F. Münster. 69 pag.

Wir haben im XXVII. Bande dieser Zeitschrift, hist.-lit. Abthlg. S. 192, ein Programm von Herrn Hunrath: "Aufgaben zum Rechnen mit Systemzahlen", angezeigt, mit dessen Inhalt die in italienischer Sprache verfasste Abhandlung des Herrn Grünwald nahezu übereinstimmt, gleichzeitig auch die Fragen behandelnd, welche bei Herrn Haas "Theilbarkeitsregeln" (angezeigt Bd. XXIX hist.-lit. Abthlg. S. 146) zur Sprache kommen. Von dieser Abhandlung gilt in gleichem Maasse, dass sie ganz interessante Sätze in sich schliesst, die der Lehrer an der Mittelschule als Beispiele beim Rechenunterricht zu verwenden in die Lage kommen kann, Auch in einer Vorlesung über Zahlentheorie mögen, falls die Zeit dazu reicht, ein bis zwei Stunden füglich damit auszufüllen sein. Die numeri complessi, von welchen der Titel spricht, sind sogenannte benannte Zahlen und haben mit unseren complexen Zahlen Nichts zu schaffen. geschichtlichen Bemerkungen wird man, als einer längst überholten Zeit geschichtlicher Forschung angehörend, am besten überschlagen CANTOR.

Tables de logarithmes à six décimales construites sur un plan nouveau par Adolphe Benoist, docteur en droit, membre de la société mathématique de France. Paris, Librairie Ch. Delagrave. XXXIV, 391 S.

Die zweisprachig, französisch und deutsch, je einen Druckbogen füllende Vorrede erläutert die drei neuen Gesichtspunkte, auf welche der Verfasser sein Augenmerk richtete, und welche ihm wichtig genug schienen, sie im Titel als einer neuen Einrichtung entsprechend ausdrücklich zu er-Withnen. Erstlich sind die sogenannten Proportionaltheile im Drucke so angeordnet, dass auch beim Aufsuchen der Zahlen zu gegebenen Logarithmen ihre Benutzung erleichtert erscheint; zweitens sind die Logarithmen der Sinus und Tangenten kleiner Winkel in der den Zahlenlogarithmen ge-Widmeten ersteren Abtheilung des Bandes abgedruckt, wo ihnen der jeweil Sechste Theil jeder Seite unten eingeräumt ist; drittens sind die Logarithmen der trigonometrischen Functionen in Winkelzwischenräumen von 10" derart Sedruckt, dass für jede Function eine Seite doppelten Eingangs vorhanden ist, die Winkelminuten jedes Grades unter einander, die 10 Secunden-Unterabtheilungen in parallelen Columnen neben einander. Natürlich ist die Seite eines Sinus zugleich die eines entsprechenden Cosinus, z. B. dem Ropfe der Seite sin 83º entspricht am Fussende cos 6º mit rechts aufsteigenden Minuten und von rechts nach links sich erhöhenden Columnen. Wir können nicht sagen, dass diese Neuerungen uns sehr entzücken, wenn Wir damit auch nur, wie bei allen Geschmackssachen, ein persönliches Ur theil, keinen Tadel aussprechen wollen. Proportionaltheile schlagen wir überhaupt niemals auf, sondern rechnen sie in jedem einzelnen Falle selbst aus. Die Logarithmen kleiner Bögen, beziehungsweise deren trigonometrischer Functionen scheinen uns in die zweite, nicht in die erste Abtheilung des Bandes zu gehören. Endlich die erwähnte Anordnung dieser zweiten Abtheilung hat allerdings die nicht unbedeutende Bequemlichkeit, dass man proportionelle Zwischenrechnungen fast vollständig zu umgehen im Stande ist, wenn die Winkel, wie dies die Praxis mit sich bringt, höchstens auf Secunden genau bekannt sind; dafür tritt aber die unseres Dafürhaltens grössere Unbequemlichkeit ein, dass, wenn der Cosinus eines Winkels zu suchen ist, der durch seine Tangente etwa gegeben ist, was bei Hilfswinkeln gar nicht so selten vorkommt, regelmässig umgeblättert werden muss. Der Preis der neuen Tabelle beträgt 10 Francs, die Ausstattung ist gut. CANTOR.

Fünfstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln nebst einer grösseren Anzahl von Hilfstafeln. Herausgegeben von Dr. Adolf Greve, Oberlehrer am Karls-Gymnasium zu Bernburg. Bielefeld und Leipzig 1884, bei Velhagen & Klasing. IV, 171 S.

Wenn diese Tafeln an Correctheit ebenso den anderen Tabellenwerken, deren der Schulgebrauch sich zu bedienen pflegt, gleich kommen, wie sie dieselben an vollendeter Ausstattung, zu der wir insbesondere die grossen, fetten, das Auge nicht ermüdenden Typen rechnen, übertrifft, so werden die Greve'schen Logarithmen sich bald verbreiten, um so mehr, als die Verlagshandlung den gebundenen Exemplaren den Preis von nur 2 Mark aufgedruckt hat. Ob die nöthige Correctheit aber vorhanden ist, dass muss die Uebung oder eine mühsame und zeitraubende Vergleichung zeigen, zu der Referent sich nicht eignet. Nur in den ziemlich zahlreichen Hilfstafeln ist uns bei flüchtigem Durchblättern auf S. 36 ein garstiger Druckfehler in der Reihe für log_a (1-x) aufgefallen. Hoffen wir, die Correctur der eigentlichen Logarithmen möge sorgfältiger ausgeführt sein.

Lehrbuch der Experimentalphysik. Von Dr. Wüllner. 2. Band: Lehre vom Licht. 4. Aufl. Leipzig 1883. 704 S.

Die Lehre vom Licht wird in zwei Abschnitten dargestellt: der erste behandelt die Ausbreitung und Wahrnehmung des Lichts, der zweite die theoretische Optik. Zuerst kommt die geradlinige Fortpflanzung des Lichts und seine Geschwindigkeit; wie man sich in der Undulationstheorie die geradlinige Bewegung zu denken hat, wird erst später bei der Beugung auseinandergesetzt. Die Zurückwerfung und Brechung des Lichts wird in

der gewöhnlichen Weise behandelt, ohne Rücksicht auf die geometrische Aenderung der Lichtbüschel, für welche nur in Anmerkungen ein Theil der Literatur angegeben wird. Auch das Bild eines leuchtenden Punktes in einem dichteren Mittel wird immer noch behandelt, als ob nur Strahlen in der Einfallsebene von demselben ins Auge gelangten. Bei der Dispersion werden die neueren Theorien von Sellmeier und Helmholtz auseinandergesetzt und an beobachteten Brechungsexponenten und an den anomalen Spectren geprüft. Die Brechung in einem System centrirter Kugelflächen und die Lehre von den Cardinalpunkten wird analytisch behandelt; doch kommen bei den Linsen auch einige Constructionen vor, wobei nur die Fälle, wo Knotenpunkte und Hauptpunkte zusammenfallen und wo nicht, zu wenig scharf getrennt sind. In den Figuren 84 - 87 ist bald angenommen, dass beide Punktepaare zusammenfallen, bald nicht; daher ist auch der letzte Absatz S. 249 schwer zu verstehen: soll er eine Correctur oder eine Erweiterung enthalten? In Wirklichkeit hat ja das System der Fig. 87 besondere Knotenpunkte.

Ein folgendes Capitel ist der Absorption und Emission des Lichts gewidmet und der Spectralanalyse, einem Gebiete, auf dem der Verfasser vor Allem zu Hause ist. Daran schliesst sich die Fluorescenz und Phosphorescenz, sowie die chemische Wirkung des Lichts. Es folgt die Wahrnehmung des Lichtes und die Beschreibung des Auges, das Stereoskop wird kurz berührt, auch Einiges über Mikroskop und Fernrohr mitgetheilt (auf 9 Seiten von den 700 des ganzen Bandes). Wir vermissen hier namentlich die Anwendung der Cardinalpunkte, um den optischen Unterschied von beiden klarzulegen.

Der zweite Abschnitt enthält die theoretische Optik. Der Fresnel'sche Spiegelversuch wird gegenüber den Einwendungen von H. F. Weber als reine Interferenzerscheinung festgehalten. Bei den Beugungserscheinungen werden die Beobachtungsarten von Fresnel und Fraunhofer aufgeführt und die Wirkung der durchsichtigen Schirme nach Quincke dargelegt, auch die Grösse der Wellenlängen angegeben. Bei der Polarisation werden die bei der Zurückwerfung und Brechung auftretenden Erscheinungen an durchsichtigen Körpern und an Metallen und stark absorbirenden Mitteln ausführlich besprochen. Dann folgt die Doppelbrechung des Lichts, die Sätze von Huyghens, die Theorie Fresnel's. Das letzte Capitel ist der Interferenz des polarisirten Lichts gewidmet, wozu auch die Circularpolarisation und die Saccharimetrie gezogen wird.

Repertorium der deutschen Meteorologie. Von G. Hellmann. Leipzig 1883. 992 Halbseiten.

Diese verdienstliche Arbeit ist aus einem Plane des internationale Meteorologencongresses in Rom 1879 hervorgegangen, eine allgem teorologische Bibliographie herauszugeben. Dr. Hellmann war mit den Vorarbeiten für Deutschland beauftragt und giebt nun seine Arbeit, da der ganze Plan nicht zu Stande kam, als selbstständiges Werk ins Publicum. Der erste Theil enthält den Katalog der Schriften und Erfindungen, und zwar zuerst die Autoren mit kurzen biographischen Angaben, ihre Schriften und Erfindungen; dann ein Sachregister zu den Schriften und Erfindungen. Im zweiten Theile folgt ein Katalog der Beobachtungen, zuerst die Stationen und ihre Beobachtungsreihen, dann ein Sach- und Personenregister, die Beobachtungsstationen und die Beobachter. Der dritte Theil endlich enthält den Umriss einer Geschichte der meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.

Bei diesem Umriss wird die Geschichte in drei Perioden getheilt, die Periode der Aufzeichnungen der Witterungserscheinungen ohne Instrumente zu verwenden, bis zur Erfindung von Thermometer und Barometer, also bis gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts; die zweite Periode instrumenteller Beobachtungsreihen Einzelner (als erste wird die vom Tübinger Professor Camerarius herrührende seit 1691 angeführt) und die dritte Periode der Organisation des meteorologischen Dienstes durch den Staat, beginnend mit der Societas meteorologica Palatina 1780—1792.

Zum Schlusse sind noch statistische Resultate angehängt über Zahl und Berufsart der Beobachter, die Dauer ihrer Beobachtungsreihen u. s. w.

Das Werk in seiner praktischen Anlage erleichtert jedem Meteorologen seine Aufgabe und giebt ihm häufig Aufschluss, wo alle anderen Mittel fehlgehen. Die meteorologischen Beobachtungen namentlich früherer Zeit sind so zerstreut, dass dem Meteorologen selbst für die ihm nächstliegenden Gebiete ein Quellennachweis hocherwünscht ist.

P. Zech.

Elemente der reinen Mechanik. Von Dr. FINGER. Wien 1884.

Bis jetzt ist erst eine Lieferung ausgegeben von dem Werke, das als Vorstudium für analytische Mechanik und mathematische Physik dienen soll und aus Vorträgen des Verfassers entstanden ist. Der Verfasser betrachtet die Mechanik als physikalische Wissenschaft, die auf den drei empirischen Grundsätzen Newton's fusst, auf dem Princip der Trägheit, dem der unveränderlichen relativen Wirkung und dem der Wechselwirkung. Die erste Lieferung behandelt die Statik und Dynamik des materiellen Punktes.

P. ZECH.

Die Function des parabolischen Cylinders. Von Dr. Baer. Cüstrin 1883. 32 Seiten.

Die Abhandlung enthält die Integration der Potentialgleichung ($\Delta^2 V = 0$) für einen wulstförmigen Körper, der eine Cardioide zur Directrix und ihren

Rückkehrpunkt zum Pol hat, d. h. einen Körper, der durch Kreise, senkrecht zur Ebene der Curve über der Verbindungslinie des Pols mit den Punkten der Curve als Durchmessern beschrieben, gebildet wird. Die bei der Integration verwendeten Functionen werden als Functionen des parabolischen Cylinders bezeichnet.

P. Zech.

Versuch eines allgemeinen Gesetzes über die specifische Wärme. Von Joachim Sperber. Zürich 1884. 32 S.

Der Verfasser sucht das Gesetz von Dulong und Petit über Atomwärme und specifische Wärme durch ein allgemeineres und allgemeiner geltendes zu ersetzen. Er setzt voraus: jedes Molekel ist eine Kugel, deren Durchmesser ist die Molekelgrösse, d. h. die Anzahl Atome im Molekel. Jedes Molekel ist von einer Aetherhülle von gleichem Durchmesser, wie das Molekel, umgeben (wie das zu verstehen ist, ist nicht gesagt). Einen Körper erwärmen heisst die Aetheratmosphären verdünnen: die dazu nöthige Arbeit ist um so grösser, je grösser die Aetherhülle, um so kleiner, je dichter der Aether ist; denn "dichterer Aether lässt sich leichter verdünnen". Somit ist die specifische Wärme umgekehrt proportional dem Molekulargewicht, und direct proportional dem Quadrat der Molekulargrösse, oder dem Atomgewicht umgekehrt, der Molekulargrösse direct proportional. Dieser Satz wird nun nach verschiedenen Richtungen, insbesondere auf dem Verdampfungsgebiet auszuführen gesucht. Das Schriftchen gehört zu denjenigen, in welchen die Phantasie überwiegt (vergl. auch die Figur am Schlusse).

P. Zech.

Die elektromagnetische Theorie des Lichts. Von Tumlinz. Leipzig 1883. 158 Seiten.

Das Buch soll dem Studirenden ein möglichst vollständiges Bild von dem gegenwärtigen Stande der elektromagnetischen Theorie des Lichts geben.

Dasselbe behandelt die Haupteigenschaften der Dielektrica, die Potentialfunction der elektromagnetischen Kräfte und das elektrodynamische Potential im ersten Theile nach den Arbeiten von Maxwell und Helmholtz.

Der zweite, grössere Theil ist dem Lichte gewidmet. Es werden die im ersten Theile gewonnenen Ausdrücke für Strömungen auf die Ausbreitung des Lichts angewendet und die Gleichheit der in Weber's elektrodynamischer Formel enthaltenen Geschwindigkeit mit der des Lichts nachgewiesen, ferner dass das Quadrat des Brechungscoefficienten gleich der Dielektricitstsconstante ist. Es wird die Reflexion und Brechung des Lichts als identisch mit dem Verhalten elektrischer Strömungen an der Grenze zweier littel nachgewiesen, es werden die Fresnel'schen Formeln für die Intentitet des Lichts aus den elektrischen Formeln abgeleitet, die Continuität

bedingungen und die Erhaltung der Energie untersucht. Den Schluss bildet die Reflexion und Brechung an der Grenze einer senkrecht zur Axe geschnittenen einaxigen Krystallplatte. Bei den noch so weit auseinandergehenden Anschauungen über die Lichtbewegung in krystallinischen Mitteln ist eine Bearbeitung von anderer Seite her zur Aufklärung von grosser Bedeutung. Der Verfasser hat sich das Verdienst erworben, eine solche Aufklärung den Studirenden zugänglicher gemacht zu haben. P. Zech.

Das Mikroskop und seine Anwendung. Von Dr. Dippel. 2. Auflage, dritte Abtheilung des ersten Theils. Braunschweig 1883. 289 S.

Die zwei ersten Abtheilungen sind früher besprochen worden. Die vorliegende dritte Abtheilung beschäftigt sich mit der Praxis des Mikroskops, mit der Herrichtung der Präparate, Methode der Beobachtung, Messung, Anwendung des polarisirten Lichts und des Spectroskops, endlich der Zeichnung und Aufbewahrung der Präparate, und giebt eine Fülle von Anweisungen für den eigentlichen Praktiker.

P. Zech.

Bibliographie

vom 1. November bis 15. December 1884.

Periodische Schriften.

Sitzungsberichte der mathem.-phys. Classe der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften zu München. Jahrg. 1884, Heft 3. München, Franz. 1 Mk. 20 Pf.

Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, mathem.naturwissenschaftl. Cl. 48. Bd. Wien, Gerold. 45 Mk.

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, mathem. naturwissenschaftl. Cl. 2. Abth. 90. Bd., 1. u. 2. Heft. Ebendas.

5 Mk. 60 Pf.

Verhandlungen der vom 15. bis 24. October 1883 in Rom abgehaltenen 7. allgemeinen Conferenz der europäischen Gradmessung, redigirt von A. Hirsch und Th. v. Oppolzer. Berlin, G. Reimer. 30 Mk.

Annalen der Münchener Sternwarte. 14. Supplementband. München, Franz.

4 Mk. 60 Pf.

Beobachtungen, angestellt am astrophysikal. Observatorium in O-Gyalla, herausg. von N. v. Konkoly. 6. Bd. (Beob. v. 1883.) Halle, Schmidt.

Astronomische Nachrichten, herausgeg. v. A. Krüger. 110. Bd. (24 Nrn.), Nr. 2617. Hamburg, Mauke Söhne. compl. 15 Mk. Vierteljahrsschrift der astronomischen Gesellschaft, herausgeg. v. E. Schön-

FELD u. H. SEELIGER. 19. Jahrg., 3. Heft. Leipzig, Engelmann. 2 Mk.

Repertorium der Physik, herausgeg. v. F. Exner. 20. Bd. (12 Hefte), 1. Heft. München, Oldenbourg. compl. 24 Mk.

Mémoires de l'académie de St. Petersbourg. 7. série, t. 32, livr. 6-12. Leipzig, Voss. 11 Mk. 50 Pf.

Mélanges mathématiques et astronomiques, tirés du bulletin de l'académie de St. Petersbourg. T. 6, livr. 2. Leipzig, Voss. 1 Mk. 20 Pf. Mélanges physiques et chimiques etc. T. 12, livr. 1 et 2. Ebendas.

1 Mk. 60 Pf.

Geschichte der Mathematik.

CARTOR, M., Ueber den sogenannten Seqt der ägyptischen Mathematiker. (Akad.) Wien, Gerold. 20 Pf.

Reine Mathematik.

EULER, L., Einleitung in die Analysis des Unendlichen; deutsch von H. MASER. 1. Thl. Berlin, Springer.

BOBER, K., Einleitung in die Theorie der elliptischen Functionen. Leipzig, Teubner. 4 Mk. 80 Pf.

KRÜGER, L., Die Verwendung des Kettenbruchs zu einer bequemen Berechnung der Quadratwurzelfunction. Wolfenbüttel, Zwissler.

GEGENBAUER, L., Ueber Determinanten höheren Ranges. (Akad.) Wien, Gerold. 50 Pf.

MERAY, C., Exposition nouvelle de la théorie des formes linéaires et des déterminans. Paris, Gauthier-Villars. 3 Frs.

Korrer, E., Beiträge zur Theorie der Osculationen an ebenen Curven dritter Ordnung. Berlin, Mayer & Müller. 1 Mk. 80 Pf.

David, M., Ueber eine geometrische Verwandtschaft zweiten Grades und deren Anwendung auf Curven vierter Ordnung mit drei Doppelpunkten. (Dissert.) Breslau, Preuss & Jünger. 2 Mk.

D'Ovidio, E., Geometria analytica. Parte 1. Turin, Löscher. 10 L. PISCHEE-BENZON, R. v., Die geometrische Constructionsaufgabe.

v. Maack. 1 Mk. 60 Pf. DENER, CHR., Lehrbuch der darstellenden Geometrie. 1. Bd. Leipzig,

Teubner. 12 Mk.

Angewandte Mathematik.

Börsch, O., Anleitung zur Berechnung geodätischer Coordinaten Kassel, Freyschmidt.

RIMSTEDT, A., Ueber Lissajous'sche Curven. (Dissert.) GS denhoeck & Raprecht.

KRAFT, F., Sammlung von Problemen der analytischen Mechanik. 4. und 5. Lief. Stuttgart, Metzler. 4 Mk. Oppolzer, Th. v., Bahnbestimmung des Planeten Cölestina (237). (Akad.) Wien, Gerold. 20 Pf. Gylden, H., Theoretische Untersuchungen über die intermediären Bahnen der Kometen in der Nähe eines störenden Körpers. (Akad.) Petersburg und Leipzig, Voss. 80 Pf. Stechert, C., Definitive Bestimmung der Bahn des Kometen 1881, IV. Kiel, v. Maack. 1 Mk. 20 Pf.

Physik und Meteorologie.

- CLAUSIUS, R., Ueber den Zusammenhang zwischen den grossen Agentien der Natur. Bonn, Cohen & S.

 1 Mk.
- Secchi, A., Die Einheit der Naturkräfte; ein Beitrag zur Naturphilosophie. Uebers. v. R. L. Schulze. 2. Aufl. 5. Lief. Leipzig, Frohberg. 2 Mk.
- FLEISCHEL, E. v., Die doppelte Brechung des Lichts in Flüssigkeiten. (Akad.)
 Wien, Gerold.

 35 Pf.
- LINDEMANN, E., Helligkeitsmessungen der Bessel'schen Plejadensterne. (Akad.)
 Petersburg und Leipzig, Voss.

 80 Pf.
- Abendroth, W., Leitfaden der Physik mit Einschluss d. einfachsten Lehren d. Chemie u. d. mathem. Geographie. 2. Bd. (Cursus d. Prima). Leipzig, Hirzel. 4 Mk.

Historisch-literarische Abtheilung.

Die Ferrari-Cardanische Auflösung der reducirten Gleichung vierten Grades.

Von

K. HUNRATH.

Die "Ars magna" hat mir in zwei Ausgaben vorgelegen:

- 1. H. Cardani, ... opus novum de proportionibus numérorum ... praeterea artis magnae sive de regulis algebraicis liber unus ... item de aliza regula liber ..., Basileae, 1570, und
- 2. H. Cardani, ... operum tomus quartus, quo continentur arithmetica, geometrica, musica, ... Lugduni, 1663.

Wenn letztere Ausgabe sich auf dem Titel "editio et caeteris elegantior ita et accuratior" nennt, für die "Ars magna" kann sie das Lob grösserer Genauigkeit nicht beanspruchen: hier bringt sie dieselben Druckfehler und Redactionsversehen, wie die ältere Ausgabe, und noch einige mehr.*

Da die Baseler Ausgabe nicht die älteste ist, so ist es denkbar, dass auch sie die gedankenlose Wiedergabe eines früheren Druckes ist. Es ist ferner nicht ausgeschlossen, dass die Leydener Ausgabe unabhängig von der Baseler !! Line ist, dass beide auf derselben früheren Ausgabe beruhen.

Die Darstellung von Ferrari's Methode giebt Cardan im 39. Capitel, das im Index die Ueberschrift: "De regula duplici, qua per iterată positionem inuenimus ignotam quantitatem, ubi habentur 20 capitula, alia generalia qd qd. & qd. & rerum & numeri", im Text die verkürzte Ueberschrift: "De regula qua pluribus positionibus inuenimus ignotam quantitatem" trägt.** Die dort gegebene Regula I kommt ihrem Inhalt nach für meinen Zweck nicht in Betracht. Die Regula II beginnt mit den einleitenden Worten:

^{*} Ausser den bei der Anführung von Textstellen angebracht rungen siehe das Verzeichniss am Schlusse des Aufsatzes.

^{**} In der Baseler Ausgabe; in der Leydener enthal' Inhaltsangabe, wie der Text.

2 "Alia est regula nobilior precedente, & est Ludouici de Ferrarijs, qui eam me rogante inuenit, & per eam habemus omnes aestimationes fermè capitulorum qd' quadrati & quadrati, rerum & numeri, uel qd' quadrati cubi, quadrati & numeri, & ego ponam ea per ordinem, hoc modo ut uides."

Es folgt dann die Aufzählung der Capitula, die in beiden Ausgaben das Capitulum

qd' quad. aequale rebus & numero

doppelt bringt, unter 4 und unter 5. Dafür fehlt das Capitulum

yd' quad. cum cubis aequalia quad. & numero.

Wo das erstere Capitulum an seiner Stelle steht, ergiebt sich ausser aus der ganzen Anordnung aus den Schlussworten:

"In his igitur omnibus capitulis, quae quidem sunt generalissima, ut reliqua omnia sexaginta septem* superiora, oportet reducere capitula, in quibus ingreditur cubus, ad capitula, in quibus ingreditur res ut septimum ad quartum, & secundum ad primum, deinde quaeremus demonstrationem hoc modo."

Die hier geforderte Umwandlung lehrt C. im 7. Capitel (De capitulorum transmutatione); sie kommt darauf hinaus, den mit einem passenden Factor versehenen reciproken Werth der Unbekannten als neue Unbekannte einzuführen, $\frac{m}{x} = y$ zu setzen; an Stelle des Gliedes mit x^3 tritt dann ein solches mit y. Nun ist das siebente Capitulum

 $\overline{q}d'$ $\overline{q}d$. cum cubis aequalia numero, d. h. $x^4+ax^3=d$; setzt man $x=\frac{m}{y}$, so erhält man

$$y^4 = \frac{a m^3}{d} \cdot y + \frac{m^4}{d}$$
, also $\overline{q}d'$ quad. aequale rebus et numero.

Diesem Capitulum ist mithin die Ordnungszahl 4, dem ausgefallenen die Zahl 5 zu geben. Die so verbesserte Uebersicht der Capitula hat folgende Gestalt:

- 1. qd' quad. aequale quad. rebus & numero;
- 2. $\overline{q}d'$ quad aequale $\overline{q}d$. cubis & numero;
- 3. qd' quad. aequale cubis & numero;
- 4. qd' quad. aequale rebus & numero;
- 5. $\bar{q}d'$ quad. cum cubis aequalia quad. & numero;
- 6. qd' quad. cum rebus aequalia quad. & numero;
- 7. $\overline{q}d'$ $\overline{q}d$. cum cubis aequalia numero;
- 8. qd' qd. cum rebus aequalia numero;

^{*} In beiden Ausgaben statt sexaginta sex. Gemeint sind die im 2. Capitel aufgeführten 22 capitula primitiua und 44 capitula deriuatiua; erstere enthalten die Formen der Gleichung zweiten und dritten Grades, letztere entstehen aus ersteren, wenn man für die Unbekannte das Quadrat, bezw. den Cubus einer — Unbekannten einführt.

annoce come are an appendant parameter a parameter and a series

```
9. qd' qd. cum qd aequalia cubis & numero;
```

ľ

12.
$$\bar{q}d'$$
 $\bar{q}d$. cum $\bar{q}d$ & cubis aequalia numero;

15.
$$\overline{q}d'$$
 quad. cum numero aequalia cubis & quad.;

16.
$$\overline{q}d'$$
 quad. cum numero aequalia cubis;

18.
$$\overline{q}d'$$
 quad. cum numero aequalia rebus;

19.
$$\overline{q}d'$$
 quad. cum cubis & numero aequalia quad.;

Diese 20 Formen führen wir auf folgende vier zurück:

I.
$$x^4 + bx^2 + cx + d = 0$$
 [1, 6, 10, 11, 14, 17, 20],

II.
$$x^4 + ax^3 + bx^2 + d = 0$$
 [2, 5, 9, 12, 13, 15, 19],


III.
$$x^4 + cx + d = 0$$
 [4, 8, 18],

IV.
$$x^1 + ax^3 + d = 0$$
 [3, 7, 16],

von denen durch die Substitution $x = \frac{m}{y}$ II auf I, IV auf III zurückgeführt wird. Bemerkenswerth ist, dass C. offenbar nicht das Verfahren kennt, die allgemeine Gleichung vierten Grades $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ durch die Einführung von $y = x + \frac{a}{4}$ auf die Form I zurückzuführen, während er (17. Capitel) die allgemeine Gleichung dritten Grades zu reduciren versteht.

Die an die oben wiedergegebenen Schlussworte sich unmittelbar anschliessende Demonstratio zerfällt in drei Regeln, die am Rande mit 3, 4, 5 bezeichnet sind. Die erste lautet:

"Sit quadratum af, divisum in duo Gradrata, ad & df, & duo supplementa, dc & de, & uelim addere gnomonem kfg circuncirca, ut remaneat quadratum totum a h, dico, quòd talis gnomo constabit ex duplo Bc additae lineae, in ca, cum quadrato gc, nam fg constat ex gc in cf, ex diffinitione data in initio secundi Elementorum, & cf est aequalis ca, ex diffinitione quadrati, et quia per 44 primi Elementorum, kf est aequalis fg, igitur duae superficies gf & fk,



^{*} Diese Zahl fehlt in beiden Ausgaben, in der jüngeren Ausgabe auch die Zahl 4: unter 5 nimmt C. Bezug auf 3.

Steht in beiden Ausgaben verkehrt, am Durchschnitt von ca und lieb such bei Matthiessen, Grundzüge der antiken u. modernen Algeb

constant ex gc, in duplum ca, & quadratum gc est fb, per cor 4 secundi Elementorum, igitur patet propositum, si igitur ad sit $1\ \bar{y}d'$ quadratum & cd ac de 3 quadrata, & df 9, erunt ba 1 quadratum & bc 3 necessario. cum igitur volverimus addere quadrata aliqua, ad dc & de, et fuerint cl & km erit ad complendum quadratum totum necessaria superficies $\ln m$, quae ut demonstratum est, constat ex quadrato gc numeri quxdratorum dimidiati, nam cl est superficies ex gc in ab, ut ostensum est, & ab est 1 quadratum, quia ponimus, ad $1\ \bar{q}d'$ quadratum, fl vero & mn, fiunt ex gc in cb, ex 42^{a*} primi Elementorum, quare superficies $\ln m$, & est numerus addendus, fit ex gc in duplum cb, id est in numerum quadratorum, qui fuit 6, & gc in se ipsum, id est numero quadratorum addito, & haec demonstratio nostra est."

In diesem geometrischen Beweise, dessen Urheberschaft C. für sich in Anspruch nimmt, sagt er:

Die Maasszahl für die Fläche des Quadrats ad sei eine vierte Potenz, x^4 , also die für die Seite ab eine zweite Potenz, x^2 , die Flächen cd und de seien jede $3x^2$, also die Fläche df=9, die Strecke bc=3. Dann ist die Fläche des Quadrats $af=x^4+6x^2+9$, oder, wenn man statt der willkürlich gesetzten 6 das allgemeine Zahlzeichen m einführt, $=x^4+mx^2+\frac{m^2}{4}=\left(x^2+\frac{m}{2}\right)^2$. Darauf werde an das Rechteck dc das Rechteck cl, an de das cl gleiche km angesetzt, also Rechtecke mit der einen Seite $=x^2$ (die Summe der Flächen der beiden angesetzten Rechtecke bezeichne ich mit yx^2). Die neue Figur wird zu einem Quadrat vervollständigt durch den Gnomon lnm, der aus dem Quadrat der Strecke $gc=\frac{y}{2}$ [ex quadrato gc numeri quadratorum dimidiati] und den Rechtecken mn und fl zusammengesetzt ist, deren Fläche zusammen $6.gc=6.\frac{y}{2}=3y$, allgemein $\frac{m}{2}y$ beträgt.

Die Worte "id est numero quadratorum addito", die auf "§ (ex) gc in se ipsum" sich beziehen, enthalten eine Ungenauigkeit; es ist, wie oben, der numerus quadratorum dimidiatus zu verstehen.

Bis jetzt hat C. bewiesen, dass man, wenn man zu

$$x^4 + mx^2 + \frac{m^2}{4}$$
 oder $\left(x^2 + \frac{m}{2}\right)^2$ $yx^2 + \frac{m}{2}y + \frac{y^2}{4}$

addirt, ein vollständiges Quadrat

$$\left(x^2 + \frac{m}{2} + \frac{y}{2}\right)^2$$

erhält. Er fährt fort mit der Anweisung:

4 ,, Hoc opere peracto, semper reduces partem \(\bar{q} d'\) quadrati ad \(\bar{R}_{\bar{q}}, \) id est addendo tantum utrique parti, ut 1 \(\bar{q} d'\) quadratum cum quadrato et numero

^{*} Gemeint ist, wie oben, 44.

habeant radicem, hoc facile est, cum posueris dimidium numeri quadratorum, radicem numeri, item facias, ut denominationes extremae sint plus, in ambabus aequationibus, nam secus, trinomium seu Binomium reductum ad trinomium, necessariò careret radice."

Ich fasse diese Anweisung so auf: Die Gleichung

$$x^4 + bx^2 \pm cx \pm d = 0$$
 forme um in $\left(x^2 + \frac{m}{2}\right)^2 = (m - b)x^2 \mp cx \mp d$ and

$$x^4 - bx^2 + cx + d = 0$$
 in $\left(x^2 - \frac{m}{2}\right)^2 = (b - m)x^2 + cx + d$,

wobei darauf zu sehen ist, dass der Coefficient des x^2 auf der rechten Seite positiv werde. Meine Auffassung stützt sich hauptsächlich auf die Behandlung der Aufgabe

$$x^4 + 8 = 10x^2 - 4x^*$$
 (Quaestio IX des 39. Capitels).

Dort sagt C.: "quia videmus numerum quadratorum esse magnum, f rerum paruum, ideo conabimur minuere numerum quadratorum potius, quam augere, f faciemus ut diminutio sit ex utraque parte 2 quad. nam à minori imò a 2 quadratis semper fermè est incipiendum, quia non oportet ut venias ad f0 ex parte rerum, quia sic non haberent radice, subductis igitur 2 quadratis ex utraque parte...".

Der Coefficient des Gliedes mit x^2 , 10, ist C. zu gross; er ist daher darauf bedacht, ihn zu verkleinern, dadurch dass er beiderseits eine Anzahl Quadrate subtrahirt, z. B. $2x^2$, also umformt in

$$x^4 - 2x^2 + 1 = 8x^2 - 4x - 7$$

oder durch beiderseitige Subtraction von 6x2 umformt in

$$x^4 - 6x^2 + 9 = 4x^2 - 4x + 1$$
 (a. a. O. im "Notandum").

Dabei soll man darauf achten, dass man nicht auf der rechten Seite einen negativen Coefficienten am x^2 bekomme.

Sehen wir uns nun die übrigen von C. im 39. Capitel behandelten Beispiele an.

1)
$$x^4 + 6x^2 + 36 = 60x$$
 (Quaestio ∇^{**}).

Hier addirt C., um links ein vollständiges Quadrat zu erhalten, beiderseits $6x^2$: $x^4 + 12x^2 + 36 = 6x^2 + 60x^{***},$

wohl bestimmt durch den Umstand, dass das absolute Glied 36 ein vollständiges Quadrat, 62, ist.

2)
$$x^4 = x + 2$$
 (Quaestio VI),

hier nicht zu besprechen, da das Glied mit x2 fehlt.

^{*} Beide Ausgaben haben im Text 1 qd' quadratum p: 8, acquale 20 quadratie m: 4 positionibus, im Rechnungsschema richtig 10 qd m: 4 pos.

^{**} Die vier ersten Quaestiones des Capitels sind Beispiels sur P

^{***} In beiden Ausgaben steht p: 90 positionibus statt p: 60

tive Wurzeln als "fictae" ausschliesst*; das hindert [s. unten 5 b)] freilich C. nicht, für dasselbe Beispiel sowohl px-q, als auch q-px zuzulassen, obwohl nur Eines positiv sein kann.

In der Ausführung macht sich bei Cardan die Sache so:

- 1) In $x^4 + 12x^2 + 36 = 6x^3 + 60x$ addirt er auf beiden Seiten $2zx^2 + 12z + z^2$ und erhält $(x^2 + 6 + z)^2 = (2z + 6)x^2 + 60x + z^2 + 12z$, also die Resolvente $(2z + 6)(z^2 + 12z) = 30^2$ oder $z^3 + 15z^2 + 36z = 450$.
- 2) $x^4 = x + 2$; hier, wo c = 0 ist, addirt C. beiderseits $2sx^2 + s^2$ unerhalt $(x^2 + s)^2 = 2sx^2 + x + s^2 + 2$, dann aus $2s(s^2 + 2) = \frac{1}{4}$ die Resolvente $s^2 + 2s = \frac{1}{8}$.
- NB. C. giebt auch noch die Lösung $x^4-1=x+1$, $\frac{x^4-1}{x+1}=x^3-x^2+x-1=1$, $x^3+x=x^2+2$.
- 3) $y^4 = 6y + 4$; wird von C. nicht nach Ferrari's Regel gelöst, man siehe NB. zu 2) $y^4 16 = 6(y 2)$, $\frac{y^4 16}{y 2} = 6$ u. s. transformiren kann.
- 4) $x^4 + 32x^3 + 256 = 48x + 240$; C. addirt zu beiden Seiten $2 = 32x + 32x + z^2$ und erhält $(x^2 + 16 + z)^2 = 2xx^2 + 48x + z^2 + 32x + 240$; solvente: $z^3 + 32z^2 + 240z = 288$.
- 5a) $x^4 2x^2 + 1 = 8x^2 4x 7$; durch beiderseitige Addition $-2zx^2 + 2z + z^2$ erhält C. $(x^2 1 z)^2 = (8 2z)x^2 4x + z^2 + 2z 7$; Resolvente: $z^3 + 30 = 2z^2 + 15z$.
- 5b) $x^4 6x^2 + 9 = 4x^2 4x + 1$; auch die rechte Seite ist ein vorständiges Quadrat, daher ist $x^2 3 = 2x 1$ und auch = 1 2x.

Für 5a) liefert z=2 dasselbe Quadrat $4x^2-4x+1$ auf der rech seite (beides nach C.).

- 6) ist oben erledigt, desgleichen 9).
- 8) $x^4 + 3 = 12x$; C. addirt beiderseits $2sx^2 + s^2$ und leitet die Ressolvente $s^3 = 3s + 18$ ab.
- 7) $x^4-3x^3=64$ verdient ganz besondere Beachtung, weil das Methode zu Grunde liegende Princip ganz frei angewandt wird. Es ist eine Quadratzahl. C. fügt auf der rechten Seite, "ubi sunt res", wie er sagen würde, eine beliebige Anzahl x^2 hinzu, $2xx^2$, und, wobei ihm

^{*} So sagt C. im 1. Capitel unter 3 von der Gleichung $x^4 + 12 = 6x^2$: " wind non potest aequationem ueram habere, carebit etiam ficta, sic em uocamus quae debiti est seu minoris", d. h. eine Gleichung von der Form $x^4 + a = x^2 + x^4 + a = x^$

Wie oben, unterscheide ich wieder folgende Formen der reducirten Gleichung vierten Grades:

$$x^4 + bx^2 \pm cx + d = 0$$
 und $x^4 - bx^2 \pm cx + d = 0$,

Die erstere nur umgeformt in

$$\left(x^2 + \frac{m}{2}\right)^2 = (m-b) x^2 + cx + d,$$

die letztere in

$$\left(x^2 - \frac{m}{2}\right)^2 = (b - m)x^2 + cx + d,$$

wo bei für jene die Bedingung $m \ge b$, für diese die Bedingung $m \le b$ gilt. Es soll nun im ersteren Falle gebildet werden

$$\left(x^{2} + \frac{m}{2}\right)^{2} + 2sx^{2} + ms + s^{2} = (2s + m - b)x^{2} + cx + s^{2} + ms + d - \frac{m^{2}}{4},$$
introductions

$$\left(x^{2} - \frac{m}{2}\right)^{2} - 2zx^{2} + mz + z^{2} = (b - m - 2z)x^{2} + cx + z^{2} + mz + d - \frac{m^{2}}{4}$$
[s. unten Beispiel 5a)].

Hier habe ich im Anschluss an Cardan* 2z statt des oben gebrauchten y eingeführt. Wir haben dann links

$$\left(x^2 + \frac{m}{2} + s\right)^2$$
, bezw. $\left(x^2 - \frac{m}{2} - s\right)^2$,

ein vollständiges Quadrat, und rechts einen Ausdruck, für den die Forderung gestellt wird, dass er ein vollständiges Quadrat sei (...,ut idem additum alteri parti, in qua erunt res, faciat trinomium habens Ry quadratam Per positionem"...). Die nothwendige Folge dieser Forderung giebt C. in Quaestio V an: "secunda quantitas (habet radicem) ex supposito, igitur Ciecta prima parte trinomii in tertiam fit quadratum dimidiae secundae partis". Es wird also im einen Falle

$$(2z+m-b)\left(z^2+mz+d-\frac{m^2}{4}\right),$$

inn andern

$$(b-m-2z)\left(z^2+mz+d-\frac{m^2}{4}\right)$$

 $\left(\frac{c}{2}\right)^2$ gesetzt. In beiden Fällen ergiebt sich für s eine Gleichung dritten Grades, nach deren Auflösung die Quadratwurzel aus der rechten Seite sich angeben lässt. Dieselbe sei, sagt C., von der Form px+q oder px-q oder q-px ("1 positio uel plures p: numero, uel momentus m: positionibus"). Dies hängt selbstverständliel amultiplicirten Gliedes, des c, ab. Zu bemeri entsprechende Wurzel -px-q nicht auffül

^{*} In Quaestio V: "ponam numer

tive Wurzeln als "fictae" ausschliesst*; das hindert [s. unten 5b)] freilich C. nicht, für dasselbe Beispiel sowohl px-q, als auch q-px zuzulassen, obwohl nur Eines positiv sein kann.

In der Ausführung macht sich bei Cardan die Sache so:

- 1) In $x^4 + 12x^2 + 36 = 6x^3 + 60x$ addirt er auf beiden Seiten $2zx^{2z} + 12z + z^2$ und erhält $(x^2 + 6 + z)^2 = (2z + 6)x^2 + 60x + z^2 + 12z$, also die Resolvente $(2z + 6)(z^2 + 12z) = 30^2$ oder $z^3 + 15z^2 + 36z = 450$.
- 2) $x^4 = x + 2$; hier, wo c = 0 ist, addirt C. beiderseits $2sx^2 + s^2$ unerhalt $(x^2 + s)^2 = 2sx^2 + x + s^2 + 2$, dann aus $2s(s^2 + 2) = \frac{1}{4}$ die Resovente $s^2 + 2s = \frac{1}{8}$.
- NB. C. giebt auch noch die Lösung $x^4-1=x+1$. $\frac{x^4-1}{x+1}=\frac{1}{x+1}$. $x^3-x^2+x-1=1$. $x^3+x=x^2+2$.
- 3) $y^4 = 6y + 4$; wird von C. nicht nach Ferrari's Regel gelöst, dan man siehe NB. zu 2) $y^4 16 = 6(y 2)$, $\frac{y^4 16}{y 2} = 6$ u. s. transformiren kann.
- 4) $x^4 + 32x^3 + 256 = 48x + 240$; C. addirt zu beiden Seiten 2 $= +32z + z^2$ und erhält $(x^2 + 16 + z)^2 = 2zx^2 + 48x + z^2 + 32z + 240$; solvente: $z^3 + 32z^2 + 240z = 288$.
- 5a) $x^4 2x^2 + 1 = 8x^2 4x 7$; durch beiderseitige Addition $-2zx^2 + 2z + z^2$ erhält C. $(x^2 1 z)^3 = (8 2z)x^2 4x + z^2 + 2z 7$; Resolvente: $z^3 + 30 = 2z^2 + 15z$.
- 5b) $x^4 6x^3 + 9 = 4x^3 4x + 1$; auch die rechte Seite ist ein $\sqrt{}$ ständiges Quadrat, daher ist $x^2 3 = 2x 1$ und auch = 1 2x.
- Für 5a) liefert z=2 dasselbe Quadrat $4x^2-4x+1$ auf der rechancen Seite (beides nach C.).
 - 6) ist oben erledigt, desgleichen 9).
- 8) $x^4+3=12x$; C. addirt beiderseits $2sx^2+s^2$ und leitet die Res ∞ 0-vente $s^3=3s+18$ ab.
- 7) $x^4-3x^3=64$ verdient ganz besondere Beachtung, weil das Methode zu Grunde liegende Princip ganz frei angewandt wird. Es ist eine Quadratzahl. C. fügt auf der rechten Seite, "ubi sunt res", wie er sagen würde, eine beliebige Anzahl x^2 hinzu, $2sx^2$, und, wobei ihm zu

^{*} So sagt C. im 1. Capitel unter 3 von der Gleichung $x^4 + 12 = 6x^2$: " q wind non potest aequationem veram habere, carebit etiam ficta, sic em vocamus et am, quae debiti est seu minoris", d. h. eine Gleichung von der Form $x^4 + a = x^4$ müsse eine positive Wurzel (vera aequatio) haben, um eine negative Wurzel (vera aequatio) haben, um eine negative Wurzel (vera aequatio) haben zu können; von der Gleichung $x^4 = 2x^2 + 8$ (in beiden Ausgaben 80 statt 8) sagt er, sie habe eine "vera" und eine dieser gleiche "ficta aequation", +2 und -2; die Gleichung $x^4 + 12 = 7x^2$ habe zwei "verae" und zwei diesen gleiche "fictae aequationes", +2, $+\sqrt{3}$ und -2, $-\sqrt{3}$.

statten kommt, dass 64 eine Quadratzahl ist, vervollständigt die rechte Seite $64 + 2sx^2$ durch Hinzufügung von $\frac{1}{64}z^2x^4$ zu einem Quadrat. Auf der linken Seite erhält er so $(\frac{1}{64}z^2+1)x^4-3x^3+2sx^2$, stellt die Forderung, dass auch dieser Ausdruck ein vollständiges Quadrat sei, und findet aus $(\frac{1}{64}z^2+1).2z=(1\frac{1}{6})^2$ die Resolvente $z^3+64z=72$.

Soviel dürfte die vorstehende Darstellung gezeigt haben, dass Cardan weit entfernt ist, eine Methode zu befolgen, die sich für die reducirte Gleichung vierten Grades $x^4 + bx^3 + cx + d = 0$ in das Schema

$$\left(x^{2} + \frac{b}{2} + z\right)^{2} = 2zx^{2} - cx + z^{2} + bz + \frac{b^{2}}{4} - c$$
 [Beispiel 4)]

oder das Schema

$$(x^2+b+s)^2 = (b+2z)x^2-cx+s^2+2bz+b^2-c$$
 [Beispiel 1)]

zwingen liesse. Sehe ich von dem ganz frei behandelten Beispiel 7) ab, so glaube ich, dass der Gedankengang C.'s in unserer Formelsprache ambesten so wiedergegeben wird:

., Für

$$x^4 + bx^3 + cx + d = 0$$
 $(b \ge 0, c \text{ und } d \ge 0)$

setze

ľ

$$\left(x^{2} + \frac{m}{2} + \frac{y}{2}\right)^{2} = (y + m - b)x^{2} - cx + \frac{y^{2}}{4} + \frac{m}{2}y + \frac{m^{2}}{4} - d,$$

mache die Wahl von m von den Umständen abhängig und lass die rechte Seite ein vollständiges Quadrat werden oder setze

$$(y+m-b)(y^2+2my+m^2-4d)=c^2$$
."

Zu der sich so ergebenden Resolvente

 $y^3 + (3m-b)y^2 + (3m^2 - 2bm - 4d)y + m^3 - bm^2 - 4dm + 4bd - c^2 = 0$ betnerke ich noch, dass, wenn man das absolute (flied als eine Function von m ansieht, als f(m), so ist der Coefficient des $y = f^1(m)$, der von $y^3 = \frac{f^3(m)}{1.2.3}$. Bemerkenswerther ist, dass für $m = \frac{b}{3}$ die Resolvente in die reducirte Gleichung

$$y^3 - \left(\frac{b^2}{3} + 4d\right)y - \frac{2}{27}b^3 + \frac{8}{3}bd - c^2 = 0$$

Dergeht.

Beide Bemerkungen gelten für die Resolvente, die man auf gleichem Wege für die allgemeine Gleichung vierten Grades

1.
$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

ableitet; denn aus

$$\left(x^{2} + \frac{a}{2}x + \frac{m}{2} + \frac{y}{2}\right)^{2}$$

$$= \left(y + m + \frac{a^{2}}{4} - \psi\right)x^{2} + \left(\frac{a}{2}y + \frac{a}{2}m - c\right)x + \frac{y^{2}}{4} + \frac{y^{2}}{4}$$

er Biebt sich die Resolvente

Königl. Akademie der Wissenschaften zu Turin.

Programm

für den

fünften Bressa'schen Preis.

Die königl. Akademie der Wissenschaften zu Turin macht hiermit, detestamentarischen Willensbestimmungen des Dr. Cäsar Alexander Bresse und dem am 7. December 1876 veröffentlichten diesbezüglichen Programme gemäss, bekannt, dass mit dem 31. December 1884 der Concurs für die im Laufe des Quadrienniums 1881—84 abgefassten wissenschaftlichen Weste und in diesem Zeitraum geleisteten Erfindungen, zu welchem nur italienische Gelehrte und Erfinder berufen waren, geschlossen worden ist.

Zugleich erinnert die genannte Akademie, dass vom 1. Januar 1883 an der Concurs für den fünften Bressa'schen Preis eröffnet worden ist, zu welchem, dem Willen des Stifters entsprechend, die Gelehrten und Erfirader aller Nationen zugelassen sein werden.

Dieser Concurs wird bestimmt sein, den Gelehrten oder Erfinder beliebiger Nationalität zu belohnen, der im Laufe des Quadrienniums 1883—86, "nach dem Urtheil der Akademie der Wissenschaften in Turin, die wichtigste und nützlichste Erfindung gethan oder das gediegenste Werk veröffentlicht haben wird auf dem Gebiete der physikalischen und experimentalen Wissenschaften, der Naturgeschichte, der reinen und angewandten Mathematik, der Chemie, der Physiologie und der Pathologie, ohne die Geologie, die Geschichte, die Geographie und die Statistik auszuschliessem".

Der Concurs wird mit dem 31. December 1886 geschlossen sein.

Die zum Preise bestimmte Summe wird 12000 (zwölftausend) Lire betragen.

Keinem der, sei es in Turin oder ausserhalb dieser Stadt ansässigen, inländischen Mitglieder der Turiner Akademie wird der Preis zuerkammen.

Turin, 1. Januar 1885.

Der Präsident

A. Fabretti.

Der Secretär der Classe für physikalische und mathematische Wissenschaften

A. Sobrero.

Der Secretär
der Classe für ethische, historische und
philologische Wissenschaften
Gaspar Gorresio.

Recensionen.

Der Raum und seine Erfüllung. Von Hullmann. Berlin 1884. (60 S.)

Das Weltall ist von zwei gleichberechtigten, beziehentlich entgegengesetzten Materien ausgefüllt, von Körperpunkten und Aetherpunkten; jene tiehen sich gegenseitig an, diese stossen sich ab; Körperpunkte ziehen Aetherpunkte an, Aetherpunkte stossen Körperpunkte ab. Wie sich die wei letzten Annahmen vereinigen lassen, ist nicht gesagt; jedenfalls wider-*Prechen sie den Axiomen der Mechanik. Es wird dann der Druck des Aethers suf einen Punkt im Raume unter der Voraussetzung, dass er dem Quadrat der Entfernung umgekehrt proportional sei, bestimmt und gefunden, dass er Null sei, wenn der ganze Raum mit gleich dichtem Aether gefüllt ist, wie Dagegen werde das Aethertheilchen, auf welches der gesammte Acther wirkt, gepresst. Die Einwirkung einer Schicht Aether zwischen zwei Parallelen Ebenen auf einen Punkt ausserhalb ergiebt sich zu $2\pi mh\delta_0 \int dy$, 🕶 o n die Masse des Punktes sein wird (es ist darüber nichts gesagt), h der Abstossungscoefficient, δ_0 die Dichte des Aethers ist; $\int dy$ ist also der Abstand der Grenzebenen. Damit soll nun bewiesen werden, dass der Prock eines begrenzten Theiles des Aethers gleich dem des unbegrenzten bei gleicher Dichte sei, was offenbar dem vorigen Ausdruck direct wider-Spricht. Der Beweis wird in unverständlicher Weise mit Anspielung auf hydrostatische Gesetz gegeben. Ebenso unklar ist die Ableitung Beschleunigung eines Aethertheilchens, die aus demselben Ausdruck \geq $pprox mh \delta_0 \int dy$ sich ergeben soll. Dann wird von der Aetherhülle der Atome Seprochen, die sich bis ins Unendliche erstrecke, und von rotirenden Pynamiden, die in § 18 plötzlich ohne jede Erklärung auftreten und deren Terschiedene Rotation die Ursache der Aggregatzustände und der chemischelektrischen Erscheinungen sein soll. Es ist eine peinliche Arbeit, durch sonderbar zusammengestapelte Material sich durchzuarbeiten.

P. ZECH.

von welchen das eine durch beliebige Reflexionen und aus dem andern hervorgegangen ist. Dissertation v Berlin 1883. (34 S.)

Der erste Theil beschäftigt sich mit dem Nachweis des Satzes von Kummer, dass ein unendlich dünnes Strahlenbündel mit seinen beiden Focalebenen aus der Wellenfläche, deren Mittelpunkt in der Axe liegendangenommen wird, zwei conjugirte Curven ausschneidet. Der zweite Theisbehandelt die Frage, ob es Strahlensysteme mit "nicht kugelförmiger Wellenfläche giebt, deren Strahlen Normalen einer Fläche sind. Es findesich als entsprechende Flächen eine Anzahl von Monge in seiner "Applestichen de l'analyse à la géometrie" behandelter Flächen.

Latente Warme der Dämpfe. Von Puscht. 3. Aufl. Wien 1883. (76

Die erste Auflage wurde im 25. Jahrgang dieser Zeitschrift besprochten wesentliche Aenderung ist nicht eingetreten, nur eine Erweiterten der Darstellung.

P. Zeonen.

Die Elemente der Mechanik und mathematischen Physik. Von HELLE. Leipzig 1884. (221 S.)

Das Buch ist für Mittelschulen bestimmt, es benützt nur elementarmathematische Hilfsmittel. Gleich anfungs wird auf die Bezeichnung der Dimension physikalischer Grössen hingewiesen, was sehr zu billigen ist, da der Schüler von Anfang an damit sich vertraut machen muss, wenn er sich ganz an diese Anschauung gewöhnen soll. Die gleichförmige und die gleichförmig beschleunigte Bewegung werden zuerst erklärt, es folgt dann das Parallelogramm der Kräfte und Bewegungen, die Erklärung der freien unfreien Bewegung, die Arbeit und Energie. Nach dieser Einleitung in die allgemeinen Begriffe wird in den folgenden drei Abschnitten die Lachanik des starren, des elastischen und des flüssigen Körpers behandelt.

Die Darstellung ist vielfach nur eine andeutende, durch den Lehrer zu vervollständigen. Um so schärfer sollte der Ausdruck sein. Es 18 st sich das zuweilen vermissen, z. B. S. 108, wo von den Axen gleicher Schwingungsdauer die Rede ist. Es fehlt hier das Beiwort parallel und nachdem von zwei Axen gesprochen ist, heisst es weiter: "der eine die er Punkte heisst Schwingungspunkt". Es handelt sich ja nur um Axendrehung, nicht um Drehung um einen Punkt. Warum nicht "Schwingungsaxe "? Auf derselben Seite steht zweimal "nur in Paris", während es natürlisch für jede gleiche Breite und Höhe gilt.

In der Mechanik der starren Körper wird der Schwerkraft und drehden Bewegung die Magnetnadel, in der der elastischen Körper bei der honischen Bewegung die Akustik in kurzen Zügen angereiht und dann Grundlagen der Optik.

Die Mechanik des vollkommen flüssigen Körpers behandelt den Dru ck, den Auftrieb und die Druckvertheilung in der atmosphärischen Luft,

1

endlich die Erscheinungen der Strömung, den elektrischen Strom mit eingeschlossen.

Das Werk giebt dem Lehrer Anweisung, wie er den Schüler in den Zusammenhang der Naturerscheinungen, soweit sie in der Physik behandelt werden, einzuführen hat.

P. Zech.

Analytische Theorie der Wärme. Von M. Fourier, deutsch von Weinstein. Berlin 1884. (476 S.)

Die "Théorie analytique de la chaleur" war in der letzten Zeit nur schwer zu bekommen. Da ein grosser Theil des Werkes mit Reihen zu thun hat, die auch sonst in der mathematischen Physik vielfach verwendet werden — die Fourier'schen Reihen —, und da deren Theorie ausführlich auseinandergesetzt wird, so war es erfreulich, dass ein neuer Abdruck des Werkes im vorigen Jahre erschien. Allein es war dies nur ein Abdruck ohne Durchsicht, mit den vielen Druckfehlern des Originals, die häufig das Studium erschwerten. Es hat nun Herr Weinstein, dessen Debersetzungen uns von früher bekannt sind, die verdienstliche Aufgabe Ernommen, das Werk ins Deutsche zu übersetzen und die Formeln correct darzustellen. Die Ausstattung des Buches ist sehr zu loben. P. Zech.

Die mathematische Geographie in Verbindung mit der Landkartenprojection. Von Gustav Wenz. München 1883. (297 S.)

Das Werk enthält eine mathematische Einleitung (ein Viertel des Gan-Zen), eine mathematische Geographie mit Projectionslehre, eine Art popu-1Ere Astronomie und eine Anzahl Tafeln trigonometrischer Functionen. Welcher Art die mathematische Einleitung ist, zeigen Formeln wie: sin 30° = 1g 9,69897, oder Ausdrücke wie: "Kreis und Ellipse sind zwei cur-Vische Linien", "die Ellipse ist eine ebene Curve, bei welcher die Abstände 🕶 den beiden Brennpunkten für einen Peripheriepunkt gleich der grossen Are sind", und ähnliche S. 125 wird von der Integralrechnung Gebrauch Semacht, so dass es scheint, diese sei vorausgesetzt, aber die Elementarmathematik nicht. Ein wunderbarer Satz findet sich S. 181: "Das Fou-Cault'sche Pendel deutet an, dass für die Darstellung von Ländern der Semässigten Zone die Kegelprojection, für Polarkarten das kreisförmige Netz and für aequatoreale Gegenden die Cylinderprojection am geeignetsten ist; were man nicht schon mit diesen Projectionsweisen bekannt gewesen. lich, das Foucault'sche Pendel hätte auf sie führen müssen." In auch die Beschreibung des Antipassats auf der folgenden Seit Darstellung der elliptischen Bahn der Planeten S. 187. P behaptet: "Am 21. März erblickt man die Sonne im Ste

Lesenswerth ist die Berechnung der Dämmerung aus einer trigonometrischen Formel mit den nöthigen Anweisungen zur Umrechnung in Anmerkungen. In einer dieser Anmerkungen wird bewiesen, dass (-m) = (0-m) ist, in einer andern, dass $(-\cos d) = \cos d$, weil gleiche entgegengesetzte Winkel gleiche positive Cosinus haben. Man sieht aus diesen Beispielen, welcher Art dieses Buch ist, und es wäre nur zu wünschen, dass der Beisatz auf dem Titel: "Expedition des königl. Central-Schulbücherverlags" wenigstens im vorliegenden Falle nicht zur Wahrheit werde.

P. Zech.

Jansen, Physikalische Aufgaben. Freiburg 1883.

Vorliegende Aufgabensammlung schliesst sich in ihrem Gange an das Lehrbuch der Physik von Münch an. Der erste Theil enthält 276 Aufgaben aus der Mechanik, der zweite 282 Aufgaben aus der Lehre von der Molecularbewegung der Körper; dabei ist den schwierigeren Aufgaben eine kurze Anleitung beigefügt. Gerade die Kleinheit des Werkchens dürfte bei seiner Reichhaltigkeit manchen Lehrer bestimmen, es in seiner Schule einzuführen.

B. Nebel.

F. Kohlrausch, Leitfaden der praktischen Physik. 5. Aufl. Leipzig, Teubner. 1884.

Die innerhalb kurzer Zeit erschienene neue Auflage lässt deutlich erkennen, wie sehr sich dieses Buch in den physikalischen Laboratorien eingebürgert hat. Demselben wurden wieder mehrere neue Artikel, namentlich aus dem Gebiete des Galvanismus, hinzugefügt, sodann wurden die Tabellen mit den inzwischen von Landolt und Börnstein herausgegebenen in Uebereinstimmung gebracht. Weshalb der Verfasser die vom Pariser Elektrikercongress festgesetzten Bezeichnungen "Ampère" und "Coulomb" nun "Amper" und "Culom" schreibt. ist mit Rücksicht auf die angestrebte Einheit der Bezeichnung nicht recht erklärlich.

B. Nebell.

CH. Aug. Vogler, Grundzüge der Ausgleichungsrechnung. Braunschweig. Vieweg & Sohn. 1883.

Dieses Buch dürfte wohl das erste sein, das die Formeln der Ausgleichungsrechnung durchaus elementar entwickelt, ohne dabei weitschweifig zu werden. Es muss deshalb besonders von den Geometern, welche der höheren Mathematik ferner stehen, mit grossem Interesse begrüsst werden.

— In dem ersten Capitel, das über vermittelnde Beobachtungen mit gleicher Genzuigkeit handelt, findet die Methode der kleinsten Quadratsummen ihre und Anwendung auf einige Beispiele; das zweite Capitel be-

schäftigt sich mit der Auffindung des mittleren Fehlers von Beobachtungen und Functionen derselben, und bildet denselben bei zahlreichen Beispielen, worunter sich auch das Pothenot'sche Problem als Ausgleichungsaufgabe befindet. Das dritte Capitel zeigt, wie man vermittelnde Beobachtungen ungleicher Genauigkeit, d. h. solche von verschiedenem Gewicht, zurückführt auf solche mit gleichem Gewicht, deren weitere Ausführung schon im ersten Capitel ihre Erledigung fand. Schliesslich wird im vierten Capitel die verschiedenartige Behandlung bedingter Beobachtungen dargethan und an Ausgleichungen von Polygonen zur Anwendung gebracht.

Dem Ganzen ist als Anhang eine Copie der Jordan'schen Quadrattafeln hinzugefügt. — Da das Buch für Solche berechnet ist, die nur der Elementarmathematik mächtig sind, so dürfte auf S. 9 wohl gesagt sein, dass man unter Δx etc. eine sehr kleine Grössenänderung von x verstehen wolle; sodann gewährt S. 63 die Anwendung der Bézout'schen Methode diesem ebenerwähnten Leserkreise nicht den vollen Einblick in das Wesen derselben. In dem zweiten Gliede der Formel 7^* S. 74 fehlt die Unbekannte y.

Der Hauptvorzug dieses Buches besteht wohl darin, dass das Lesen desselben durch die zahlreich durchgeführten Beispiele wesentlich erleichtert wird.

B. Nebel.

Dr. Stein, Sonnenlicht und künstliche Lichtquellen für wissenschaftliche Untersuchungen zum Zwecke photographischer Darstellung. Halle 1884, Verlag von W. Knapp.

Vorliegendes Buch bildet das erste Heft des in sechs Heften erscheinenden Handbuches: "Das Licht im Dienste wissenschaftlicher Forschung", welches 1876 in erster Auflage erschienen und nunmehr völlig umgearbeitet und erweitert worden ist. - Dieses Heft, welches die allgemeine Vorbereitung für die fünf folgenden Hefte sein soll, bringt nach einer etwas grossen Einleitung zuerst einen geschichtlichen Theil der Photographie, an welchen sich die Entwickelung der Ansichten über die Natur des Lichtes anschliesst. Sodann wird die Brechung des Lichtes an Prismen erläutert und bei den Linsen darauf hingewiesen, dass diese gleichsam als Combinationen von Prismen und einem planparallelen Glase aufzufassen seien. Nach Anführung der verschiedenen Linsensysteme, speciell der bei der Photographie verwendeten Objective, bespricht der Verfasser die übrigen Theile des photographischen Apparates, die Camera und die Kasette, und macht auf den wissenschaftlichen Nutzen des Stereoskops aufmerksam. — Im letzten, zugleich grössten Theile dieses Heftes werden die chemischen Wirkungen des Lieb namentlich der in den verschiedenen Regionen des Spectrums erer näher auf die Spectralanalyse und die sonstigen Eigenschaft eingegangen wird. Daran reiht sich die Photometrie.

Hist.-lit. Abthlg. d Zeitschr. f Math. u. Phys. XXX, 2.

liche Besprechung der künstlichen Lichtquellen, die z. B. bei dem elektrischen Lichte nicht nur die verschiedenen Lampensysteme, sondern auch die elektrischen Maschinen hereinzieht. — Im Texte. sowie in den Figuren haben sich leider einige störende Fehler eingeschlichen, z. B. S. 97 zweimal $AgONO_5$ statt $AgNO_3$; S. 138 Fig. 148 Verwechselung von + und -; S. 151 Fig. 167 Indicesfehler bei den Leitungsdrähten.

Da die Kunst zu photographiren infolge des Trockenplattenprocesses weit einfacher geworden und daher leichter zu erlernen ist, ferner die Photographie bei wissenschaftlichen Untersuchungen immer unentbehrlicher wird, so werden die Meisten, die sich mit Photographie beschäftigen, in diesem Werke die dazu nöthigen Fingerzeige finden, indem hauptsächlich die Photographie für wissenschaftliche Zwecke eingehend behandelt wird.

B. NEBEL.

Die physikalischen Grundlagen der Mechanik. Von Prof. STREINTZ. Leipzig, Verlag von Teubner. 1883.

Im ersten Capitel wird das Galilei'sche Princip einer geschichtlichen und zugleich kritischen Betrachtung unterzogen, insbesondere wird die Unbestimmtheit der Newton'schen Fassung hervorgehoben, wobei der Verfasser die Vorschläge für die Ergänzung dieses Textes von Seiten mehrerer Autoren einer näheren Kritik unterwirft. Das zweite Capitel behandelt die Ermittelung des den Gleichungen der Physik zu Grunde liegenden Coordinatensystems und zeigt, dass die Lösung dieser Aufgabe sich auf die Newtonsche Auseinandersetzung über die Absolutheit der Drehbewegungen zurückführen lässt. An dieses reiht sich die Aufzählung der Merkmale, die der Bezugskörper haben muss; letzterer wird in der Folge Fundamentalkörper und das mit ihm fest verbundene Coordinatensystem Fundamentalcoordinatensystem genannt. Nach diesen Erörterungen erfolgt die Aufstellung der endgiltigen, vervollständigten Fassung des Galilei'schen Princips. dritte Capitel bietet eine historisch-kritische Umschau, deren Zweck ist, einmal auf die bis jetzt gemachten Bestrebungen zur Auffindung eines physikalischen Bezugsystems aufmerksam zu machen, sodann zu zeigen, wie sich auf Grund einer mangelnden Basis Unklarheiten in die Mechanik eingeschlichen haben. — Im vierten Capitel wird die Frage der Zeitmessung an der Hand von Poisson's Mechanik besprochen, deren Ideengang schon bei d'Alembert zu finden ist, die aber in den neueren Werken keine Aufnahme gefunden hat. - Nach den im Früheren dargelegten Bewegungsarten werden im fünften Capitel die Begriffe von Kraft und Masse aufgestellt und auf verschiedene Weisen definirt, wobei auch der Inhaltslosigkeit der Definition: "Masse ist die Quantität der Bewegung" Erwähnung geschieht. Nachdem im sechsten Capitel das Unabhängigkeitsprincip ist, wird gezeigt, dass dasselbe einer Erfahrungsthatsache er

spricht und nicht eines Beweises fühig ist; dabei wird auf die Ansicht Poisson's in der ersten Auflage seiner Mechanik hingewiesen, die aber in der zweiten Auflage ganz entgegengesetzter Natur ist. Bei der Besprechung des Princips der Wechselwirkung in dem siebenten Capitel zeigt der Verfasser, wie dasselbe mit dem Trägheitsprincip zusammengezogen werden kann, erwähnt auch, dass manche Autoren es als Princip anzuführen nicht nöthig erachteten. — In den ergänzenden Bemerkungen, die das achte Capitel enthält, wird auf eine in manchen Fällen zweckmässige Voraussetzung über den Fundamentalkörper hingewiesen, sodann gezeigt, dass die Zahl der aufgestellten Principien wohl vermehrt, aber nur auf Kosten der Klarheit vermindert werden könne. Schliesslich wird noch der Gedankengang für die Entwickelung der Grundlagen der Mechanik skizzirt.

B. NEBEL.

Dr. W. ABENDROTH, Leitfaden der Physik. I. Band. Cursus der Unterund Obersecunda. Leipzig 1884, Verlag von Hirzel.

Veranlasst zur Herausgabe eines Leitfadens der Physik wurde der Verfasser durch den neuen Lehrplan, wie er für den physikalischen Unterricht in den norddeutschen Gymnasien vorgeschrieben ist. — In Untersecunda wird zuerst eine allgemeine Einleitung in die Physik gegeben, an welche sich dann die einfachsten Lehren der Chemie anreihen; den zweiten Theil bilden Magnetismus und Reibungselektricität. Die Obersecunda beginnt mit Galvanismus und behandelt ausführlich die Wärmelehre.

Dass der neue Lehrplan, welcher von dem bisherigen durchaus verschieden ist, wohl nicht ganz der richtige sein dürfte, lässt vorliegender Leitfaden am deutlichsten erkennen. Ueberall vermisst man die Mechanik, so dass der Schüler stets auf später vertröstet werden muss; infolge dessen bauen sich seine Kenntnisse in der Physik dermassen lückenhaft auf, dass er davon keineswegs befriedigt sein kann. — Von diesem Hauptfehler absesehen, zeichnet sich aber dieses Buch vor vielen gleichartigen durch seinen wissenschaftlichen Charakter aus, insbesondere durch die Erwähnung der Gesetze in der Lehre vom Galvanismus. Wegen dieses Vorzugs erlaube ich mir, noch einige Aenderungen für die Zukunft vorzuschlagen.

§ 2 der Einleitung scheint mir mehr für eine populäre Physik, als für den Unterricht in Untersecunda zu passen. S. 123 Z. 20 v. u. ist "und sich" gemäss des § 5 S. 113 unrichtig und deshalb zu entfernen. S. 196 muss der mittlere Punkt des Tasters nicht mit der oberirdischen Leitung, sondern mit der Erde verbunden werden; dadurch wird an der zeichengebenden Station der Receptor ausgeschaltet, was einfacher ist und der Praxis entspricht.

Zum Selbststudium ist dieses Buch an manchen Stellen, namentlich in der mechanischen Wärmetheorie, für den Schüler zu schwierig, ist aber für

den Unterricht, in welchem der Lehrer die einzelnen Theile bespricht und erläutert, von grossem Nutzen und deshalb sehr zu empfehlen.

B. NEBEL.

G. Krebs, Die Physik im Dienste der Wissenschaft, der Kunst und des praktischen Lebens. Stuttgart, Enke. 1884.

Vorliegendes Buch umfasst in 13 Abhandlungen, die ihre eigenen Verfasser haben und von dem Herausgeber zusammengestellt sind, die gesammte Physik, wie sie fruchtbringend in das menschliche Leben und Treiben eingreift. Der Zweck dieses Buches ist, das grosse Publicum, welches der Physik als Studium nicht nachkommen kann, sich wohl aber für deren Erfolge interessirt, in thunlichster Kürze mit den Hauptanwendungen vertraut zu machen, und damit dieses Werk seinen Zweck möglichst erfülle, ist jeder Zweig von einem speciellen Fachmanne ausgearbeitet worden.

Der erste Aufsatz: "Im photographischen Atelier". macht uns zuerst mit dem Entwickelungsgange der Photographie bekannt, sodann erhalten wir einen tiefen Einblick in das Wesen des Negativ- und Positivprocesses, dem sich schliesslich die Erläuterung des immer mehr sich verbreitenden Trockenplattenprocesses anschliesst, durch welchen die Photographie auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht wird.

Der zweite Aufsatz: "Spectrum und Spectralanalyse", geht von der zuerst von Newton hervorgebrachten Zerlegung des Lichtes aus, bespricht sodann die verschiedenen Theile des Sonnenspectrums und deren Eigenthümlichkeiten. Eingehende Auseinandersetzung findet bei der Spectralanalyse und deren Anwendungen statt, so dass hierdurch der Leser ein vollkommenes Bild von dieser grossen Entdeckung der Neuzeit erhält.

Der dritte Aufsatz: "Eine meteorologische Station", bildet gleichsam einen Abschnitt des folgenden Aufsatzes. was vielleicht für den Umfang des Buches auch besser gewesen wäre; denn das Ganze enthält nur eine etwas ausführliche Beschreibung der Messinstrumente einer meteorologischen Station.

Grosses Interesse verdient der vierte Aufsatz: "Auf der deutschen Seewarte"; denn gerade in dem Binnenlande findet man meistens unklare Vorstellungen über die Wirksamkeit dieses Instituts. Nach Erklärung der im Gebäude der Seewarte selbst untergebrachten Abtheilungen und deren Thätigkeit wird noch der Verkehr der Seewarte mit den ihr unterstellten Küstenstationen. sowie auch der mit anderen meteorologischen Stationen geschildert.

Der fünste Aufsatz beschäftigt sich mit der nie oft genug zu besprechenden Frage der "Heizung und Ventilation". Zuerst bespricht der Verfasser die Wärmeverhältnisse des Menschen, an die sich die Wärmeerzeugung durch Verbrennung anreiht. Dabei werden die dazu nöthigen Einzichtungen, wie sie in den einzelnen Ländern und wie sie für besondere ingerichtet sind, einer näheren Kritik unterzogen. Auch die versche

schiedenen Centralheizungssysteme werden auf ihre Güte hin geprüft, und dabei aufmerksam gemacht, wie zugleich für Ventilation gesorgt ist. Den Schluss bilden die Verbrennungsproducte und deren schädlicher Einfluss bei ungenügender Beseitigung.

Der sechste Aufsatz trägt den Titel: "Die Akustik in ihren Hauptbeziehungen zu den musikalischen Instrumenten." Zunächst wird auf die Entstehung der Töne im Allgemeinen und sodann auf die bei den einzelnen Instrumenten hingewiesen; darauf wird das Wesen der Töne erläutert, nach welchem die musikalischen Instrumente in drei Hauptgruppen zerfallen. Nach der Angabe, wie Töne verstärkt, und überhaupt wie grössere Effecte in der Musik erzielt werden können, kommt der Verfasser auf den Bau und die Einrichtung der Violine zu sprechen, welche er die Königin der Instrumente nent.

Der siebente Aufsatz behandelt "die Motoren des Kleingewerbes". Der Verf. spricht zuerst über die Bedeutung der Dampfmaschine und geht sodann über zur erklärenden Beschreibung von Feder-, Wasser- und Gasmotoren, ferner der Heissluft- und kleineren Dampfmaschinen. Bei der Besprechung der Dynamomaschine scheint dem Verf. fremd zu sein, dass auch bei gleichbleibender Stromrichtung die Maschine als Motor die entgegengesetzte Drehbewegung von der annimmt, welche sie als Stromerzeuger hatte; denn sonst hätte er nicht gesagt: "wenn man den elektrischen Strom in der "umgekehrten Richtung" durch die Maschine sendet etc.". Fig. 131 ist dem Aufsatz nicht einverleibt.

Bei den "elektrischen Maschinen", welchen der achte Aufsatz gewidmet ist, sind leider mehrere störende Fehler vorhanden. Gleich zu Anfang ist die Induction in Fig. 150 unrichtig angegeben. so dass der Laie die Vorstage in den nachstehenden Maschinen nicht mehr verstehen kann; in Fig. 157 ist ein Fehler in der Pfeilrichtung, u. s. w.; überhaupt findet man an diesem Aufsatze. dass auf Verbesserung der Druckfehler nur geringe Sorgfalt verwendet ist.

Der neunte Aufsatz: "Kerzen und Lampen", geht zuerst auf die chemische Zusammensetzung der Beleuchtungsstoffe ein sodann behandelt er die Natur der Flamme und den Verbrennungsprocess. dem sich unmittelbar die Photometrie anschliesst. Hierauf macht uns der Verfasser mit der Constitution der Fette und deren Verwendung bei der Bereitung der Kerzen bekannt und geht dann zu der Beschreibung der Oellampen über. Den Schluss bildet die Leuchtgasfabrikation und die Theorie der Gassparbrenner.

Der zehnte Aufsatz: "Der Kampf des elektrischen Lichtes mit dem Gaslichte". enthält zuerst die Fortschritte der Leuchtgasbrenner, nämlich die Regenerativlampen; diesen werden sodann die verschiedenen Bogenlampenund Glühlampensysteme gegenübergestellt.

Der elfte Aufsatz: "In der galvanoplastischen Werkstätte", geht zunichet von der Elektrolyse aus, welche gestattet, zusammengesetzte Körp

zu zerlegen. Diese Eigenschaft des elektrischen Stromes bildet die Grundlage der Galvanoplastik, deren verschiedene Verfahren und Anwendungen für das praktische Leben ausführlich erörtert werden.

Der zwölfte Aufsatz: "Die Telephonie und ihre Verwendung im Verkehrsleben der Gegenwart", führt zuerst die verschiedenen Telephone und Mikrophone an, wie sie für die nachher beschriebene Einrichtung von Sprechstellen nothwendig sind.

Der dreizehnte Aufsatz: "Auf der Sternwarte", giebt zunächst einen geschichtlichen Ueberblick der Sternwarten und ihrer Instrumente und geht dann zur Betrachtung der Strassburger Sternwarte, einer der neuesten und grössten, über.

B. Nebel.

Dr. O. Tumlikz. Das Potential und seine Anwendung zu der Erklärung der elektrischen Erscheinungen. Wien, Verlag von A. Hartleben.

Um vorliegendes Buch auch dem Laien zugänglich zu machen, setzt der Verfasser nur Elementarmathematik voraus, weshalb er einige Hilfssätze aus der Mechanik an die Spitze stellt. Sodann zerfällt das Ganze in vier Abschnitte, wovon der erste das Potential der Schwere. der zweite das Potential mit Bezug auf Elektrostatik. der dritte das Potential mit Bezug auf Elektrodynamik und der vierte Magnetismus, Elektrodynamik. Elektromagnetismus und Induction behandelt. Dem Ganzen ist noch ein kleiner Theil über elektrische Einheiten beigegeben. Der Verfasser giebt die Definitionen der Quantität, des Potentials etc. nach elektrostatischem Maasse und fügt unmittelbar daran die in der Praxis üblichen Maasseinheiten. so dass es den Anschein hat, als ob diese Einheiten dem elektrostatischen Maasseysteme angehören würden. Die Tabelle der Stromeinheiten ist der Fehler wegen mit Vorsicht zu gebrauchen.

Lehrbuch der Arithmetik zum Gebrauch an niederen und höheren Lehranstalten und beim Selbststudium. Von B. E. RICHARD SCHURIG. In drei Theilen. Erster Theil: Specielle Zahlenlehre. (Zugleich ein Handbuch für Volksschullehrer.) Leipzig, Friedrich Brandstetter. 1883. Preis 3 Mk. 60 Pf.

Es ist eine nicht ganz seltene Sache. dass ein Schriftsteller für die schwachen und starken Seiten seines Buches ein unrichtiges Urtheil zeigt. Oft bedarf es gerade eines vorurtheilsfreien fremden Blickes, um dem Schriftsteller zu zeigen, dass die Eigenschaften seines geistigen Eigenthums welche er für ganz besondere Tugenden hält, wenig werth sind und andere Dinge, welchen er keine besondere Aufmerksamkeit schenkt, gerade die Hauptstärke seines Werkes ausmachen.

Mit diesem Eindrucke, den wir eben wiedergegeben haben, legen wir das oben angezeigte, 18 Bogen starke Buch aus der Hand. Der Verfasser glaubt sich früheren Erscheinungen gegenüber besonders durch logische Schärfe im Vortheil. Er betont dies — zwar nicht in unbescheidener Weise — im Vorworte mit einigem Nachdruck und kommt auch an anderen Stellen seines Buches auf diesen Punkt zurück. Ja, auf S. 235 lasen wir mit starkem Befremden in einer Fussnote den Ausdruck "bisberige unlogische Mathematik". Nichtsdestoweniger können wir in den Schritten, die der Verfasser in dieser Richtung gethan hat, keine Fortschritte sehen. Vielleicht wird er selbst in dieser Ueberzeugung von der Ueberlegenheit seines Buches erschüttert, wenn er sich die Mühe geben will, dasselbe mit anderen, z. B. mit den Lehrbüchern von Heilermann-Diekmann oder V. Schlegel, die uns gerade zur Hand sind, vorurtheilsfrei zu vergleichen.

Dennoch haben wir von dem Buche einen im Ganzen recht angenehmen Eindruck empfangen und empfehlen es insbesondere den Lehrern, welche an höheren Lehranstalten den Rechenunterricht in den unteren Classen zu ertheilen haben; denn der Verfasser versteht praktisch zu rechnen. Diese Kunst ist aber für den Mathematiker von Fach, der auf den untersten Stufen die vier Species einexerziert oder auf höheren Classen über frühere Versäumnisse zu seufzen Gelegenheit hat. eine sehr wichtige, aber darum noch lange nicht selbstverständliche Sache.

Bei dem vorwiegend wissenschaftlichen Charakter dieser Zeitschrift müssen wir uns bei diesem rein didaktischen Punkte der grössten Kürze befleissen. Allein wir würden nicht im Stande sein, dem Leser von der trefflichen Methode des Herrn Verfassers ein klares Bild zu entwerfen, wenn wir nicht wenigstens ein Beispiel in einiger Vollständigkeit wiedergäben. Wir wählen S. 105 die Regeln für die Addition. Dort lesen wir:

- 1. Setze die gleichen Ordnungen, z. B. die Einer, genau senkrecht unter einander.
- 2. Zeige in gleichmässigem Takte nach und nach auf 9, 2, 7, 4, dabei die Summen 15, 17, 24, 28 denkend. (6 steht über 9.) Also nicht 6+9=15. 15+2=17 u. s. w.
- 3. Bei gleichen Summanden wende die Multiplication an, also statt einer dreimal vorkommenden 6 sprich 18.
- 4. Suche diejenigen Ziffern heraus, welche sich zu 10 ergänzen. Statt 7+3 denke 10 u. s. w.

In dieser Weise giebt der Verfasser elf wahrhaft goldene Regeln.

Doch auch der Mathematiker, besonders der Zahlentheoretiker, findet des Ansprechenden in dem Buche recht viel. So die allerliebsten Sätzchen die Theilbarkeit der Zahlen durch 7. 13. 17, 101 u. s. w., und es ist nicht der kleinste Vorzug des Buches. dass die Beweise dieser Sätze trotz. ihrer Strenge gleichsam wie Inductionen aus Beispielen sich darbieter

Selbstverständlich fehlt die Neuner- und Elferprobe nicht. Als Ausnahme wollen wir hervorheben, dass das Beweisverfahren S. 206 der Strenge gänz lich entbehrt. Ein gleiches Urtheil würden wir über den Vortrag der regul falsi S 268 fällen müssen, wenn nicht mit Recht angenommen werde könnte, dass hier nur ein interessantes Rechnungsverfahren mit gethei ein werden soll.

Die Lehre von den "entgegengesetzten Grössen" S. 271 hat uns nicht besonders gefallen wollen, insbesondere nicht die Herleitungen S. 281. Enter Vergleich mit Hesse. "Die vier Species. Teubner 1872" fällt nicht glessen zum den für unsern Verfasser aus.

Fassen wir unser Urtheil zusammen, so haben wir ein Buch vor unser dessen Fehler den Mathematiker von Fach nicht zu Irrthümern verleisten werden. Der Zahlentheoretiker wird in dem Werke viel Ansprechen stinden, wenn es auch einfach und vielleicht nicht ganz neu ist. Dem Fachlehrer des Rechnens auf den unteren und mittleren Classen höherer Lederanstalten hat der Verfasser eine sehr dankenswerthe Gabe dargebot.

Coesfeld, im October 1884.

K. Schwering -

Leitfaden zum Unterricht in der Arithmetik und Algebra an Gymnasi en und verwandten Anstalten. Von Dr. Joh. Chr. Walberer. Professor am königl. Gymnasium in Amberg. Zweite, durchgesehene und Leitenit Uebungsaufgaben versehene Auflage. München, Theodor Ackermann. 1884. Preis 1 Mk. 60 Pf.

Es kann nicht oft und eindringlich genug betont werden, dass jedem für Lernende bestimmten Buche zwei Dinge wesentlich ins Auge fasst werden müssen. Erstlich soll von wissenschaftlichem Standpunkte aus der Verfasser insoweit mindestens tadellos erscheinen. dass er nicht längst erkannte und verworfene Irrthümer seinen harmlosen Lesten wiederum neu auftischt. Zweitens soll der Stoff in didaktischer Rücksicht gut gewählt, geordnet und klar vorgetragen werden. Gern fügten wir noch einen dritten Wunsch hinzu; doch findet ihn der Leser erst Schlusse dieser Anzeige.

In den Anfangsgründen der Arithmetik und Algebra findet sich für Lehrer und Lernende eine Klippe, die wir zunächst kennzeichnen wollen. Die Definitionen des Productes und der Potenz gelten — wie sie gewohnlich gegeben werden — nur für positive ganze Zahlen als Multiplicator bez. Exponent. Demnach gelten die aus denselben geschöpften Beweise auch nur, wenn die eben genannten Zahlen ganz und positiv sind. Wenn nun die gewonnenen Sätze über diesen Geltungsbereich hinaus angewandt werden, so darf das sicher nicht stillschweigend geschehen. Man hat dem Lernenden beispielsweise zu ragen, dass (-b).a nach der bisherigen Definition

keinen Sinn hat, dass man es also verwerfen oder ihm einen bestimmten Sinn beilegen kann. Diesen Weg hat Hesse eingeschlagen. Andere Mathematiker haben dagegen die Definitionen z.B. der Multiplication so gefasst, dass sie auch negative und gebrochene Multiplicatoren zulässig finden.

Der Verfasser unseres Buches kennt zwar, wie die S. 100 stehende Bemerkung: "Geben wir umgekehrt davon aus, dass die complexen Zahlen den formalen Zahlengesetzen ebenso unterworfen sind wie die reellen, so u. s. w." zu beweisen scheint, sehr wohl die oben von uns erwähnte Begriffserweiterung. Dennoch übergeht er S. 17 die Sache mit lautlosem Schweigen. Dasselbe Verfahren beobachtet er S. 32, wo er ohne irgendwelche Ausführung behauptet, dass $a^m:a^n=a^{m-n}$, der für positive ganze n auf S. 31 bewiesen ist, unbeschränkt giltig sei.

Falsch und irreführend ist es, wenn der Herr W. S. 41 behauptet, dass die Cubikwurzel aus einer positiven wie negativen Zahl stets möglich und eindeutig sei. Den Ausdruck "möglich" wollen wir uns merken. Denn auf S. 52 lesen wir: "Da sowohl b^x als auch b^{-x} für ein positives b stets positiv ausfällt, so kann eine negative Zahl — a überhaupt nicht durch b^x ausgedrückt werden; folglich ist log(-a) unmöglich. d. h. der Logarithmus einer negativen Zahl ist imaginär." Hiernach scheint dem Verfasser der Vorwurf, dass er imaginär und unmöglich für gleiche oder synonyme Begriffe hält, leider nicht erspart werden zu können. Unter diesem unangenehmen Eindrucke blieben wir, als wir auf der folgenden 53. Seite lasen: "jede endliche Zahl hat nur einen Logarithmus und umgekehrt jedem reellen Logarithmus entspricht nur eine Zahl a^x . Die Unterstreichung in diesem Sätzchen rührt vom Referenten her. Wir können ferner die Begriffe "unbestimmte" und "diophantische" Gleichung, wie es der Verfasser S 72 thut, nicht durch ein tonloses "oder" verbinden.

Es scheint nicht ganz verständlich, wenn der Verfasser S. 98 schreibt: .. Da jede gerade Wurzel sich auf eine Quadratwurzel reduciren lässt, so kann auch überhaupt jede imaginäre Wurzel auf $\sqrt{-1}$ zurückgeführt werden." Aber einen gewissen und zwar sehr traurigen Sinn kann man ohne Mühe hineinlegen. Als Kleinigkeit mag erwähnt werden, dass die imaginäre Einheit i auch in der Druckschrift durch ein besonderes Zeichen hervortreten sollte. Endlich findet sich ein Versehen in Formel 2 S. 102, welche die Quadratwurzel aus a+bi liefern soll

Glücklicherweise sind wir nun mit unseren Ausstellungen zu Ende und wollen nicht verfehlen zu bemerken, dass im Uebrigen das Buch in manchen Dingen ebenso gut ist wie andere Schulbücher. Ja, gewisse Abschnitte, wie z. B. der die Reihen behandelnde, sind recht gut vorgetragen. Auch die Aufgabensammlung scheint ziemlich reichhaltig und zweckmässig zu sein.

Der erste Satz der Vorrede lautet: "Nicht um einem längst gefühlten Bedürfnisse abzuhelfen, sondern um der Schule zu dienen, über dieses Büchlein der Oeffentlichkeit."

Möge diese Bescheidenheit nicht ohne Nachfolge bleiben und sich sogar bei manchen Herren Verfassern zu dem Schlusssatze verdichten, den man erhält, wenn man den sechs letzten Worten des Verfassers das Wörtlein "nicht" beifügt.

Coesfeld, im October 1884.

K. SCHWERING.

Lehrbuch der ebenen Geometrie. Von Julius Hoch, Lehrer der Mathematik an der v. Grossheim'schen Realschule in Lübeck. Erster Theil: Linien, Winkel, Congruenz und Gleichheit der Figuren. Mit 126 in den Text gedruckten Holzschnitten. Halle, H. W. Schmidt. 1884.

Das vorliegende, 164 Seiten starke Buch ist besonders für berechtigte höhere Bürgerschulen bestimmt, obwohl es auch für andere höhere Lehranstalten sich eignen wird.

Als besonderen Vorzug dieser Schrift kann man die sorgfältige und anschauliche Zeichnung der Figuren hervorheben.

Der Vortrag ist im Ganzen klar, die Beweisführung sehr ausführlich. Beispielsweise zählten wir in der Darstellung des Satzes vom Paralleltrapez 26 Zeilen, die als Gleichungen ohne verbindenden Text erscheinen. Das Letztere wird nicht als Mangel empfunden, da kurze, in Parenthese stehende Hinweise für leichtes Verständniss sorgen. Diese Methode des Verfassers hat für die Betonung des logischen Beweisganges in seinen einzelnen Schritten einen unleugbaren Vorzug. Aber der Hauptschritt, der eigentliche Nerv des Beweises dürfte doch in Etwas verhüllt werden.

Die Eintheilung der Dreiecke (S. 26), der Vierecke (S. 49) ist recht hübsch tabellarisch vorgeführt.

Fehler sind uns nicht aufgefallen. Nur würden wir nicht, wie es der Verfasser S 21 thut, eine Ebene durch eine einzige krumme Linie begrenzen lassen. Auch dürfte es nicht mehr richtig sein, Pythagoras als Autor des Satzes von der Winkelsumme des Dreiecks zu citiren. In der "Geschichte der Mathematik" von Cantor, S. 119 flgg., hat diese Frage eine, wie es scheint, abschliessende Entscheidung gefunden. Auch sollte man die Jahreszahlen der griechischen Mathematiker nicht genauer angeben, als man sie, leider, mit Gewissheit kennt.

Die Parallelentheorie gründet der Verfasser im Wesentlichen auf den Begriff des Richtungsunterschiedes. Referent hat gelegentlich seiner Promotion eine dahin lautende These in gleichem Sinne "vertheidigt" und benutzt die Gelegenheit, um Widerruf zu leisten. Diese Darstellung ist nämlich schon deshalb zu tadeln, weil sie die wirkliche, vorliegende Schwierigkeit dem Lernenden gar nicht zum Bewusstsein kommen lässt.

Coesfeld, im October 1884.

K. Schwering.

Lehrbuch der Elementar-Geometrie. Von Dr. M. GLINZER, Lehrer der allgemeinen Gewerbeschule und der Schule für Bauhandwerker in Hamburg. Erster Theil: Planimetrie. Mit 185 Figuren und einer Sammlung von 25() Aufgaben. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Hamburg, F. H. Nestler & Melle's Verlag. 1884.

Es darf dem vorbezeichneten Büchlein von vornherein zur Empfehlung gereichen, dass es aus dem Unterricht an den im Titel erwähnten Anstalten hervorgewachsen ist. Diesen Ursprung erfährt der kundige Leser nicht aus der Vorrede allein. Vielmehr ist es der Geist einer gesunden Praxis, der aus den Erklärungen in die Theorie hinein und aus der Theorie zu zweckmässigen Anwendungen hinaus wie ein frischer Hauch belebend em**pfunden** wird. So finden wir S. 10 beim ersten eigentlichen Beweise, der im Lehrgange auftritt, nicht sofort das bekannte Schema: "Voraussetzung, Behauptung, Beweis", sondern der Verfasser hat es mit Grund für dienlich erachtet, die Nothwendigkeit dieser Gedankenstufen dem Schüler kurz und bundig zu erklären. Demselben richtigen Lehrgrundsatze verdanken wir die Anmerkung S. 16: "Die bei der Parcellirung ausgetauschten Stücke Land sollen bei gleich gutem Boden nur gleich, der genaue Grundriss eines Grundstückes demselben nur ähnlich, dagegen bei der fabrikmässigen Herstellung von Maschinen die Theile gleicher Bestimmung womöglich gleich und shnlich, d. i. congruent sein." Ebenso angenehm sind uns die Bei-Spiele zu den Aehnlichkeitssätzen aufgefallen, denen eine recht bündige Darstellung der Proportionssätze vorausgeht. Interessant sind ferner S. 85 und im Anhang einige Aufgaben, welche ohne Zuhilfenahme des Lineals gelöst werden. Die eine derselben, die Auffindung des Mittel-Punktes eines gegebenen Kreises, wird, was dem Reserenten neu war, Napoleon I. zugeschrieben. Auswahl, Anordnung und Behandlung des Stoffes zeichnen sich im Uebrigen mehr durch den bereits lobend erwähnten Geist einer gesunden, nüchternen Praxis, als durch Originalität aus.

Die Parallelentheorie verschmäht die von Neueren zur Ueberbrückung der bekannten Schwierigkeit angewandten Mittel sämmtlich, obschon S. 33 von der Umschreitung des Polygons Gebrauch gemacht wird. Wenn der Verfasser aber den Satz: "Werden zwei Geraden von einer dritten Geraden so geschnitten, dass ein Paar Gegenwinkel zusammen weniger als zwei Rechte beträgt, so müssen sich die Geraden auf dieser Seite schneiden" mit der Anmerkung begleitet: "Wenn auch bisher für diesen Satz kein bundiger Beweis gefunden ist u. s. w.", so erweckt er durch dies "bisher" Hoffnungen, die er als Mathematiker sicherlich nicht theilt. Ebenso fanden wir den Satz S. 85: "Man muss hierzu den Umfang des Kreises in die Seebene Anzahl gleicher Theile theilen können. Diese noch nicht allgemein Selöste Aufgabe u. s. w." Das "noch nicht" ist ebenso volksverführerische das obige "bisher". Ebenda ist der Ausdruck "Apotheme" (?)

entbehrlich. Auch sollte in der Definition des Kreises S. 46 jedes Zuviewermieden und S. 94 die harmonische Theilung anders definirt sein.

Im Uebrigen sei das handliche Büchlein mit seinem schönen Papieseinen hübschen Figuren und seinem saubern Druck bestens empfohlen.

Coesfeld, im October 1884.

K. Schwering.

Lehrbuch der Elementar-Geometrie. Von Dr. E. GLINZER, Lehrer u. s.

Zweiter Theil: Stereometrie. Hamburg, F. H. Nestler & Me Ile.

Dieser zweite Theil ist ebenso angelegt wie der erste. Wir wollen daher auf unser früheres Referat verweisen und nur hervorheben, dass die kurze Darstellung der Kegelschnittslehre gewiss manchem Lehrer Stereometrie, welcher das Büchlein seinem Unterricht zu Grunde legt, eine willkommene Gabe sen wird. Bemerkenswerthe Unrichtigkeiten sind und met

Coesfeld, im October 1884.

nicht aufgefallen.

K. Schwering.

Lehrbuch der Elementar-Geometrie. Von Dr. E. GLINZER. Dritter Theil: Trigonometrie. Hamburg, Verlag von F. H. Nestler & Melle.

Von den drei Theilen des Werkes scheint dieser letzte der bedeutend. ste zu sein. Die Darstellung ist klar, der Stoff in reicher Fülle ohne ermüder de Weitläufigkeit vorgetragen. Dabei ist jedes trockene Theoretisiren sorgfättig vermieden und eine innige Beziehung zwischen Sätzen und Aufgaben dur chweg angestrebt und erreicht. Zum Schlusse erhalten wir eine recht wohlgelungene Darstellung der Grundlehren der sphärischen Trigonometrie. Dem Buche ist eine Sammlung von Aufgaben beigegeben, die zum Theil ein nicht geringes sachliches Interesse darbieten. So finden sich Aufgaben, die gelegentlich der Landesvermessung wirklich vorgekommen sind.

Möge dieser Geist gesunder Praxis sich recht weite Gebiete im Schalleben erobern. Unser Buch bietet dazu eine treffliche Hilfe.

Coesfeld, im October 1884.

K. Schwering -.

Darstellende und projective Geometrie nach dem gegenwärtigen Stande dieser Wissenschaft, mit besonderer Rücksicht auf die Redürftenisse höherer Lehranstalten und das Selbststudium. Von Dr. Gustav Ad. V. Peschka. II. Band. XVIII und 576 S. gr. 8°. Mit einem Atlas von 11 Tafeln. — III. Band. VIII und 792 S. gr. 8°. Mit einem Atlas von 42 Tafeln. — Wien 1884, Druck und Verlag von Gerold's Sohn. (Vergl. die Recension zu Bd.I d. Jahrg. XXVIII 8.

Wir werden jeden Band für sich behandeln und zur Gewinnung einer Uebersicht jedesmal die Capitelüberschriften unter Angabe des Inhalts besonders wichtiger und charakteristischer Paragraphen vorausschicken.

Band II: Theorie der Curven und Flächen.

Erster Abschnitt: Curvenlehre. I. Capitel: Fundamentaleigen schaften algebraischer Curven. Einleitung. Hilfsmittel der Analysis, Princip der Anzahl und dessen Anwendungen. Singularitäten ebener Curven. Princip der Dualität. — II. Capitel: Allgemeine Eigenschaften ebener algebraischer Curven. Sätze über die Anzahl der gemeinschaftlichen Punkte und Tangenten zweier Curven. Curvenbüschel. Erzeugung von Curven. Die Plücker'schen Formeln. — III. Capitel: Theorie der polaren algebraischen Curven. - IV. Capitel: Der Correspondenzsatz. Anwendung desselben und der Polarentheorie auf die Untersuchung der Eigenschaften algebraischer Curvensysteme. Steiner'sche, Hesse'sche und Jacobi'sche Curve. Plücker'sche Geschlecht der algebraischen Curven. Ein- und mehrdeutige **Transformationen.** — V. Capitel: Eigenschaften der Raumeurven und derer Projectionen. Definitionen. Developpable Flächen. Singuläre Elemente. Plücker-Cayley'sche Gleichungen über die Charaktere der Raumcurven.

Zweiter Abschnitt: Allgemeine Theorie der krummen Flächen und Flächensysteme. VI. Capitel: Allgemeine Eigenschaften algebraischer Flächen. Definitionen und Erzeugungsarten. Ordnung einer Fläche. Tangentenebenen. Haupttangenten, Punkte verschiedener Krümmung. Sin-Suläre Punkte und Curven. Durchschnitt zweier und dreier Flächen. An-**Zah**l der eine F_n bestimmenden Bedingungen. — VII., VIII. und IX. Ca-Pitel: Lineare Flächensysteme erster, zweiter und dritter Stufe und deren Eigenschaften. Erzeugnisse derselben. — X. Capitel: Sätze über die gemeinschaftlichen Curven zweier und über die gemeinschaftlichen Punkte dreier * Flächen. — XI. Capitel: Projectivische Erzeugung algebraischer Flächen und ihrer Schnittcurven; durch projectivische Flächen und Raumcurvenbüschel und reciproke Netze. — XII. und XIII. Capitel: Theoriz der Polaren algebraischer Flächen und deren Anwendung auf die Entwickelung projectivischer Eigenschaften von Flächen und Systemen derselben. — XIV. Capitel: Prejectivische lineare Flächensysteme uter Stufe und symmetrische Flüchencomplexe. — XV. Capitel: Eigenschaften der Hessiana und Steineriana oder der conjugirten Kernslächen einer Fn. — XVI. Capitel: Bestimmung der Charaktere und Singularitäten einiger Flächen, welche sich aus gegebenen ableiten lassen. Die Fläche der Haupttangenten in den Punkten eines ebenen Schnittes. Die zwei Flächen gemeinschaftlich umschriebene Developpabele.

Dritter Abschnitt: Theorie der Flächen zweiten Grades. XVII. Capitel: Definitionen und Fundamentaleigenschaften. Regelflächen und Nichtregelflächen. Polarentheorie. Hauptaxen. Schnittcurve zweier Flächen und gemeinschaftlich umschriebene Developpable.

Vierter Abschnitt: Constructive Theorie der krummen Linien und Flächen. XVIII. Capitel: Graphische Darstellung der ebenen und der Raumcurven. — XIX. Capitel: Constructive Theorie der Kegel- und Cylinderflächen im Allgemeinen. Darstellung dieser Flächen in den verschiedenen Projectionsarten. Ebene Schnitte und Tangentialebenen. Abwickelung und geodätische Linien. — XX. Capitel: Kegel- und Cylinderflächen zweiten Grades. — XXII. und XXIII. Capitel: Developpable Flächen, welche zwei Curven oder Flächen umschrieben sind.

Als wesentlichste Eigenthümlichkeit der Behandlungsweise algebraischer Curven im vorliegenden Werke ist wohl die Benutzung des Princips von der Erhaltung der Anzahl und des Correspondenzprincips als synthetische Hilfsmittel anzusehen. Zugestanden, dass die Anwendung statthaft sei, so hätte jedenfalls die geometrische Existenz der imaginären Elemente in der Weise nachgewiesen werden müssen, wie es v. Staudt in seinen Beiträgen zur Geometrie der Lage und später Lüroth im VIII. Bande der Math. Ann. gethan haben. Aber von alledem ist nichts zu bemerken. Obgleich bei der gewählten Behandlungsweise ohne Frage die imaginären Elemente stets mitgezählt werden, fügt der Verfasser zuweilen (z. B. Seite 112 Satz 114) das Wort "höchstens" hinzu, was den Lernenden verwirren muss. Der Verfasser zeigt übrigens, dass ihm sehr wohl der grosse Unterschied zwischen synthetischem Aufbau und analytischer Entwickelung bewusst ist, indem er § 8 sagt: "Selbstverständlich (sic!) giebt es auch Curven von unendlich hoher Ordnungszahl. Auf dieselben sind unsere diesfallsigen Entwickelungen nicht anwendbar. (Warum? wird nicht gesagt.) Wir werden uns daher veranlasst sehen, diese seinerzeit in einem selbstständigen Capitel einer näheren Betrachtung zu unterziehen." Auf dieses Capitel hätte man gespannt sein dürfen, aber - leider existirt es im Buche nicht.

Gehen wir nun zur Besprechung der einzelnen Capitel über.

In der Einleitung wird auf die verschiedenen Mannichfaltigkeiten oder geometrischen Oerter hingewiesen, welche sich aus den Elementen: Punkt, Gerade, Ebene aufbauen lassen, und werden jene erstens nach ihren erzengenden Elementen, zweitens nach ihrer Dimension oder Stufe eingetheilt. Hierbei wird die Curve irrthümlich (§§ 4 und 5) zu den Ebenenörtern erster Stufe gerechnet. Linienörter zweiter Stufe werden als "Congruenzen", Linienörter dritter Stufe, "Complexe", aber gar nicht aufgeführt, sie scheinen nicht untersucht werden zu sollen.

Nun wird an der Hand analytischer Betrachtungen das "Erhaltungsprincip" entwickelt, an einfachen Beispielen erläutert und dann zur Bestimmung der Anzahl der Schnittpunkte zweier Curven, der Anzahl ihrer gemeinschaftlichen Tangenten etc. benutzt.

Ein falscher Schluss, der zu bedenklichen Fehlern führen würde, bei sich auf S. 10 § 11: Hat eine Curve C_m mit einer Ebene mehr als

Punkte gemein, so hat sie mit dieser Ebene unendlich viele, d. h. alle Punkte gemein etc. Die Curve braucht aber nicht alle Punkte mit der Ebene gemein zu haben, sondern nur in eine ebene Curve und eine andere Raumcurve zu zerfallen, und dies tritt in der Regel gerade bei darstellend geometrischen Untersuchungen ein.

Der Fehler findet sich dann auch in den dualen Betrachtungen. (Vergl. ferner § 197.)

Die §§ 24 figg. haben als Gegenstand die Singularitäten der ebenen Ordnungscurven Doppel-, Rückkehr- und mehrfache Punkte. Die Bestimmung der Anzahl von Schnittpunkten der Curventangente, welche in die Singularitäten rücken, ist eine sehr oberflächliche und auch fehlerhafte. Erstens wirft nämlich der Verfasser die beiden Arten des Rückkehrpunktes zusammen und nennt dann diesen beiden gegenüber den Selbstberührungspunkt eine Singularität höheren Ranges, während die Schnabelspitze die höchste von den dreien ist. Das vom isolirten Punkte Gesagte ist uns in der gebotenen Form unverständlich. Eine gleichzeitige Behandlung der Ordnungs- und Classencurven wäre wohl zweckmässig gewesen. Die Art und Weise, wie die reellen Berührungspunkte einer Doppeltangente sich beim Uebergang zum Wendepunkt vereinigen und dann imaginär werden, scheint dem Verfasser nicht klar zu sein, wenigstens berechtigen die zur Erklärung dieses Uebergangs ganz ungeeigneten Figuren Taf. I: 9, 10, 11 zu dieser Vermuthung.

In Capitel II finden wir auf S. 34 im Satz 27 Folgendes: "Ist ein **Punkt A ein r-facher Punkt einer** C_n und ein s-facher Punkt einer C_n , und besitzen beide in A t'' gemeinschaftliche Tangenten, so ist die Anzahl der in A vereinigten Schnittpunkte der Curven rs+t''." Man sieht, dass es "mindestens" so viele Punkte heissen muss. Tiefer wird auf die Frage nicht eingegangen. Eine ähnliche Correctur bedürfen die Sätze 92 und 93, 8. 100, welche sich auf die Classenerniedrigung durch einen r-fachen Punkt mit einer Reihe vereinigter Zweige bezieht. Diese Fragen sind in Wahrheit viel verwickelter, als es nach der vorliegenden Darstellung erscheint, in der die neueren Arbeiten von Cayley, Smith, Halphen, Brill etc. Sar nicht berücksichtigt sind. Es würde zu weit führen, wollten wir die folgenden Capitel mit ähnlicher Ausführlichkeit wie die bisherigen behandeln. Mit gewisser Vorsicht wird man auch die weiteren derartigen Anzahlbestimmungen aufzunehmen haben. (Vergl. die Betrachtung § 199 am Anfange.) Die Darstellung im Allgemeinen, namentlich die Behandlung der Verschiedenen Erzeugungsarten einer Curve ist recht ansprechend.

Eine willkommene Neuerung ist die Bestimmung der Classe einer C_n nach der Methode von Beck (Math. Ann., Bd. 14 S. 217): Die Curve C_n wird unendlich wenig nach einer Richtung verschoben und erhält die Lage C_n . Dadurch bleiben die n unendlich fernen Punkte derselben ungesindert die übrigen n(n-1) Schnittpunkte beider Curven sind ersichtlich die

Berührungspunkte der Tangenten in der Richtung der Verschiebung, d. h. ihre Anzahl ist die Classe. Die Erniedrigung der Classe, welche durch das Auftreten von Singularitäten herbeigeführt wird, lässt eine ähnliche Bestimmung zu. —

Die Polarentheorie wird im III. Capitel nach der Methode Schur's vorgetragen, nämlich durch Induction mit Hilfe des Schlusses von n auf n+1 aus der Kegelschnittlehre gewonnen, "wodurch diese Theorie mehr an Anschaulichkeit gewinnt, als es bei Anwendung der im r^{ten} Grade harmonisch getheilten Radien vectoren, deren Cremona sich bedient, erreichbar ist." (Vorrede VIII.)

In Capitel IV, S. 125, nennt der Verfasser die Tangenten, welche von einem Punkte an seine konische Polare gezogen werden können, "Indicatricen" des Punktes, um dann später S. 26 sagen zu können: Die Fundamentaleurve bildet mit der Hesse'schen Curve zusammen den Ort der Punkte, deren Indicatricen sich auf eine einzige Gerade reduciren.

In Capitel V § 139 heisst es: "Unter "Rang" einer Raumcurve verstehen wir die Anzahl der Tangentialebenen derselben, welche durch eine beliebige Gerade gehen, oder, was dasselbe ist, die Anzahl ihrer Tangenten, welche eine beliebige Gerade im Raume schneiden. Die Anzahl der Schmiegungsebenen einer Raumcurve, welche durch einen beliebigen Punkt gehen, nennen wir "Classe" der Raumcurve. Nebenbei sei bemerkt, dass viele Autoren, namentlich die englischen, mit "Classe einer Raumcurve" dasjenige bezeichnen, was wir als Rang definirt haben, und umgekehrt." Was sagt der Verfasser dazu, dass sich unter den "vielen Autoren" auch Herr Peschka befindet, wie aus Bd. II § 6 von dessen "Darst. u. project. Geometrie" zu ersehen ist? Eine angefügte Note 24 weist auf Note 1 (zu § 6) zurück und hier heisst es: Die Definition der "Classe" einer Curve, als Zahl ihrer geradlinigen Erzeugenden, welche eine feste Gerade schneiden, ist aus der Definition der Ordnung (der Anzahl der Schnittpunkte mit einer Ebene) reciprok abgeleitet. Sind solche Fehler schliesslich noch als Flüchtigkeitsfehler zu betrachten?

Capitel VI. In § 166 wird definirt: "Eine krumme Fläche ist der geometrische Ort der Lagen einer Curve, welche nach einem bestimmten Gesetze entweder ihre Lage allein oder gleichzeitig ihre Form stetig ändert." "Die am häufigsten (?) vorkommenden Flächen sind folgende: A. Krumme Flächen, welche durch eine Curve erzeugt werden können, deren Gestalt unveränderlich bleibt; B. Flächen, welche durch Lagenveränderung einer der Grösse und Form nach veränderlichen Curve entstehen." Welche Flächen giebt es denn ausser diesen beiden Arten noch, und wie soll man den Ausspruch: "Die Mannichfaltigkeit, welche bei dieser Erzeugungsart (B) auftritt, ist so unendlich gross, dass man keine besonderen Typen für derartig erzeugte Flächen aufgestellt hat" deuten? In den Flächen unter B sind alle denkbaren enthalten.

Man findet im Weitern sehr viele Sätze über Schnitte von Flächen unter einander und mit Curven, von denen manche wenig interessant und überdies äusserst evident sind; auf manche andere sehr wichtige Dinge geht der Verfasser nicht ein, z. B. ist nirgends dargethan, dass ein Berührungspunkt dreier Flächen im Allgemeinen für vier Schnittpunkte zählt.

Die folgenden Capitel VII—XVI sind den allgemeinen Flächen gewidmet. Der Verfasser verweist auf Cremona's "Theorie der Oberflächen", Reye's Arbeit "Die algebraischen Flächen, ihre Durchdringungscurven, Schnittpunkte und projective Erzeugung" in Math. Ann. Bd. III, und Salmon-Fiedler, "Analytische Geometrie des Raumes". Diese Capitel haben uns von allen am besten gefallen. Da die Behandlungsweise sich an diejenige der citirten Schriften anlehnt, so haben wir nichts weiter zu bemerken.

Die Theorie der Flächen zweiten Grades -- der Inhalt des dritten Abschnittes — soll der Vorrede nach zum Vorstudium der Theorie der allgemeinen Flächen, im vorliegenden Bande in den Grundzügen gegeben werden. Es wäre aber dann entschieden besser gewesen, die F_2 an die Spitze des zweiten Abschnittes zu stellen; denn es macht einen merkwürdigen Eindruck, wenn nach der Entwickelung von complicirtesten Schnittpunktsätzen so einfache wie 448 S. 423 mit grosser Breite bewiesen werden, namentlich da S. 242 in 226 ein viel allgemeinerer als bekannt vorausgesetzt wird. Die Umkehrung von 448, nämlich 449: "Berühren sich zwei Flächen zweiten Grades in zwei Punkten, so besitzt die Durchschnittscurve vierter Ordnung dieser beiden Flächen zwei Doppelpunkte, d. h. dieselbe zerfällt in zwei Kegelschnitte, deren jeder durch die beiden Berührungspunkte geht", ist zudem nicht correct, denn die Flächen können sich auch in einer Geraden und einer Raumcurve dritter Ordnung durchsetzen. In den Elementen sind auch hier Ungenauigkeiten. Wenn einmal gesagt wird, dass eine Fläche von jeder Ebene in einem Kegelschnitte, der auch imaginär sein kann, getroffen wird, so darf nicht gleich darauf der andere Satz stehen, dass eine Nichtregelfläche keine einzige Gerade enthalte, denn imaginäre Gerade enthält sie auch. Die Polarentheorie ist ähnlich wie bei Fiedler, nur viel breiter entwickelt. Auf S. 409 ist der sonderbare Schluss gemacht: "Da es nur eine unendlich ferne Ebene giebt, so besitzt eine Fläche zweiten Grades nur einen einzigen Mittelpunkt." Der Verfasser wende nicht ein, dass es sich hier nur um allgemeine Flächen handle, denn die Argumentation hat damit nichts zu thun und überdies wird hin und wieder gesagt, dass die Sätze "selbstverständlich" für Cylinder- und Kegelflächen gelten. In § 408 wird das Hauptaxenproblem in der üblichen Weise gelöst. Die Hauptaxen ergeben sich als Schnitte zweier Kegel zweiter Ordnung. Jeder derselben wird erzeugt von allen Durch zeitig senkrecht zu allen Durchmessern einer Elejugirt sind. Mit Ausnahme einer einzig

Hist,-lit, Abthlg. d. Zeitschr. f. Math. u. Phys. XX

Erzeugenden beider Kegel, nämlich derjenigen, welche der Schnittlinie der beiden benutzten Durchmesserebenen zugeordnet ist, müssen jene Erzeugenden Hauptaxen sein, da sie auf zwei Durchmessern senkrecht stehen und ihnen conjugirt sind. Wir finden nun in keinem Lehrbuche bestimmt ausgesprochen, selbst bei Fiedler (vergl. Darst. Geometrie S. 358) und Reye (vergl. Geometrie d. Lage II, 45) nicht, dass die Schnittlinien der Kegel stets alle reell sind. Immer schliesst die Beweisführung ähnlich, wie in dem vorliegenden Werke S. 422: Diese Kegel müssen demnach mindestens noch eine reelle Erzeugende δa gemein haben, können aber auch noch drei reelle Erzeugende δ_a , δ_b , δ_c gemeinschaftlich besitzen." Im erstern Falle ergeben sich dann die beiden anderen Axen als Hauptaxen des Kegelschnittes in der zu da conjugirten Durchmesserebene. Und nun sollte gesagt sein, dass die Unterscheidung der beiden Fälle überflüssig sei, da jetzt ersichtlich die Hauptaxen als Kegelseiten den Schnittlinien der zugehörigen Durchmesserebene mit den drei Hauptebenen entsprechen: Dem ganzen Bündel der Durchmesserebenen entspricht ein Kegelnetz mit drei stets reellen Basisstrahlen, den Hauptaxen.

Bedauerlich ist es, da doch einmal metrische Beziehungen (entgegen dem im Vorworte VIII Gesagten) besprochen werden, dass die Specialisirung für Paraboloide mit keinem Worte erwähnt ist.

Capitel XVIII—XX bewegen sich mehr auf dem Gebiete der darstellenden Geometrie im engern Sinne, auf sie bezieht sich der grösste Theil der Figurentafeln. Wenn manche so sehr einfache weggeblieben wären, so hätte es nichts geschadet; wäre jedoch andererseits ein etwas schwierigeres Beispiel, wie etwa die Untersuchung der Durchdringungscurve zweier Kegel zweiter Ordnung, in Bezug auf ihre unendlich fernen Elemente vollständig constructiv durchgeführt worden, so hätte der Verfasser etwas geboten, was nicht überall zu finden ist.

Viele der folgenden Capitel sind wahre Muster von Weitschweifigkeit. Man lese z. B. die §§ 458 — 463 (acht Seiten), die wahrlich nichts enthalten, als was sich direct für Kegelflächen aus den Sätzen von Pascal und Brianchon der Ebene ablesen lässt. § 485: Zwei Seiten über die Aufgabe, einen Kegel so zu schneiden, dass die Projection der Schnittcurve ein Kreis wird. § 514: Die zweien Kreisen auf der Kugelfläche doppelt umschriebene Developpable soll bestimmt werden. Nach zwei Seiten langen Entwickelungen gelangt man zu dem Resultat, dass besagte Kreise centrisch collinear sind. Wenn im I. Bande nicht angeführt ist, dass zwei sich in zwei Punkten schneidende Kegelschnitte immer centrisch collinear sind, so ist das schlimm.

Die letzten Untersuchungen beziehen sich auf die Developpable, welche zweien Kegelschnitten mit gemeinschaftlicher Tangente doppelt umschrieben zweien kann, — und die Flächen derselben Erzeugungsart für zwei alle

gemein liegende Kegelschnitte. Die Charaktere werden mit Hilfe früher entwickelter Formeln bestimmt.

Band III: Die Flächen zweiten Grades.

Erster Abschnitt: Windschiefe Flächen. I. Capitel: Erzeugung und Fundamentaleigenschaften windschiefer Flächen im Allgemeinen. — III. Capitel: Das windschiefe Hyperboloid. Projectivische Eigenschaften, werschiedene Erzeugungsarten, Mittelpunkt, Asymptotenkegel etc. dere Erzeugungsarten. Kreisschnitte. - III. Capitel: Das orthogonale Hyper**bol**oid. — IV. und V. Capitel: Der gleichseitige Kegel und das gleichseitige Hyperboloid. Behandlung nach Schröter's Oberflächen zweiter Ordnung. Die Statze über das Tetraeder sind reproducirt. — VI. und VII. Capitel: Das hyperbolische Paraboloid und das gleichseitig-hyperbolische Paraboloid. - VIII. Capitel: Das windschiefe Rotationshyperboloid. — IX. Capitel: Darstellung des windschiefen Hyperboloids in verschiedenen Projectionsarten und Lösung einiger dasselbe betreffenden Aufgaben. Darstellung in orthogonaler Projection durch zwei Hauptschnitte. Kegelschnittconstructionen vermittelst windschiefer Hyperboloide. — X. Capitel: Aufgaben und Constructionen, das hyperbolische Paraboloid betreffend. — XI, Capitel: Die Strictionslinien der Regelflüchen zweiten Grades.

Zweiter Abschnitt: Die Nichtregelflächen zweiten Grades. XII. — XVI. Capitel: Die Kugelflüche, das Kugelgebüsch, das Princip der reciproken Radien, das Kugelbündel und das Kugelbüschel, Theorie der Kugelberührung und der Achnlichkeitspunkte. — XVII. Capitel: Die Dupin'sche Cyclide.

Dritter Abschnitt: Die Rotationsflächen zweiten Grades. XVIII.—XXI. Capitel: Collineare Verwandtschaft der Flächen mit der Kugel. Vierter Abschnitt: Die dreiaxigen Flächen zweiten Grades. XXII.—XXIX. Capitel: Constructive Behandlung der Kugeln, Rotationsflächen und allgemeinen Flächen. — XXX. und XXXI. Capitel: Der gegenseitige Schnitt zweier Flächen und die ihnen gemeinschaftlich umschriebene Developpable. Schaaren von Flächen zweiten Grades. Confocale Flächen. — XXXII. Capitel: Die stereographische Projection, ihre Verallgemeinerung für Flächen zweiten Grades und ihre specielle Anwendung als Kartenprojection.

Bei der aus vorstehender Uebersicht zu entnehmenden Vertheilung des Stoffes ist es von vornherein zu erwarten, dass dieselben, oder wenigstens eng verwandten Dinge doppelt und mehrfach entwickelt werden, was denn auch in der That der Fall ist. Kommt nun noch hinzu, dass die Breite der Darstellung, die uns schon im ersten Bande nicht angenehm berührte, aber damals sich mit dem Bestreben des Verfassers, für den Anfänger deutlich zu sein, rechtfertigen liess, eher zu- als abgenommen hat, so wird für's Erste erklärlich, wie mit den "Flächen zweiten Grades" sich die

ungeheure Zahl von fast 800 Seiten ausfüllen liess. Man denke sich nur, dass alle Aufgaben über Schnitte der Flächen mit Ebenen und Geraden, über Tangentenebenen, Tangentenkegel etc. der Reihe nach an den verschiedenen Gattungen der F_2 durchgeführt werden, Aufgaben, bei denen Jeder sofort nach Lösung von ein paar instructiven Beispielen sieht, worauf es ankommt, und die in keiner Weise weiter führen können! — So wichtig und unerlässlich die graphische Durchführung in einzelnen Fällen ist, so zwecklos erscheint es uns, ganze Serien ähnlichster Aufgaben in der Weise zu lösen.

Wir haben redlich nach Dingen gesucht, die zu einer besondern Hervorhebung geeignet sein möchten; unsere Ausbeute war gering. Neu und schön sind die Constructionen doppelt berührender Kegelschnitte mit Hilfe der Methode der darstellenden Geometrie. Um z. B. den Kegelschnitt zu finden, der durch drei Punkte geht und einen andern doppelt berührt, betrachte man den letztern als Contour einer Rotationsfläche, die drei gegebenen Punkte als eine Projection dreier Punkte dieser Fläche, dann lässt sich die zweite Projection Die Ebene der drei Punkte schneidet die Fläche in einer Curve, deren Projection die Contour doppelt berührt, womit die Aufgabe gelöst ist. Die Erklärung des Zusammenhangs zwischen dieser Lösung und der Steiner'schen* wäre am Platze gewesen. Man sieht sehr leicht, dass die Kegelschnitte nur dann reell sind, wenn die Punkte entweder sämmtlich innerhalb oder sämmtlich ausserhalb des Kegelschnittes liegen, da in jedem andern Falle die zu ermittelnden räumlichen Punkte theilweise und damit die schneidenden Ebenen immer imaginär sind. Der Verfasser macht ohne Angabe des Grundes, weshalb andere Annahmen auszuchliessen sind, stets solche, welche reelle Kegelschnitte liefern.

Einen guten Maassstab für die Unvollständigkeit des vorliegenden Werkes werden wir durch Anführung derjenigen Dinge finden, die nicht darin behandelt sind. Wir nennen die folgenden: Kegelschnittbüschel und Netze, d. h. die wichtigen Constructionen, welche sie liefern; — ebene und räumliche Polarsysteme, namentlich auch als reelle Repräsentanten imaginärer Gebilde zweiter Ordnung; — Flächen zweiter Ordnung als Erzeugnisse reciproker Bündel; — reciproke Systeme, insbesondere das Nullsystem und der lineare Complex mit den Beziehungen zur Raumcurve dritter Ordnung, — lauter Dinge von fundamentaler Wichtigkeit.

Diese Lücken machen sich denn auch zuweilen recht fühlbar, so z. B. sieht sich der Verfasser gelegentlich der Kugeltheorie veranlasst, den imaginären Kugelkreis einzuführen (obgleich die imaginären Kreispunkte nirgendwo erwähnt sind). Zu dem Endzwecke werden sämmtliche Poldreiecke der unendlich fernen Ebene in Bezug auf ihre Schnittcurve mit der Kugel als "Polarsystem" bezeichnet und es wird bewiesen, dass eine zweite Kugel

^{*} Crelle Bd. XLV 8. 222, oder Steiner-Schröter, Synth. Geom., 8. 34.

einen unendlich fernen Kreis mit demselben Polarsystem besitzt. Endlich heisst es: "Aus der Theorie der Kegelschnitte ist aber bekannt, dass zu einem Polarsystem nur ein einziger Kegelschnitt gehört etc." Es klingt dies einfach unglaublich, wenn man weiss, dass die Theorie der Polarsysteme sich im Buche gur nicht findet. Nur schwer können wir uns versagen, den ganzen Inhalt des § 183 wiederzugeben; derselbe schliesst mit der hier gänzlich unmotivirten Eintheilung der geometrischen Sätze in projectivische und metrische, je nachdem dieselben Beziehungen zum Kugelkreise haben oder nicht. Der Verfasser kann "diese Eigenthümlichkeit (des Kugelkreises) an dieser Stelle noch nicht beweisen". Man fragt sich mit Recht, wo und bei welcher Gelegenheit das später geschehen wird, da der Verfasser im vorliegenden Bande nicht wieder auf den Gegenstand zurückkommt,

Man traut seinen Augen nicht, wenn man auf S. 748 liest: Eine Raumcurve dritten Grades kann nie als Schnitt zweier Cylinder zweiten Grades erhalten werden.

Bei der Bestimmung des gemeinschaftlichen Polartetraeders zweier F_2 , S. 760, ist nirgends bewiesen, dass die auftretenden Raumcurven dritter Ordnung sich wirklich in vier Punkten, den Ecken des gesuchten Tetraeders schneiden. Die "früheren Erörterungen", aus denen das folgen soll, können wir wenigstens nicht finden.

In Bezug auf die beigegebenen sehr schön gezeichneten Tafeln ist zu bemerken, dass trotz deren Menge keine Figur vorkommt, aus welcher man eine Vorstellung von der Gestalt der verschiedenen Flächen zweiter Ordnung gewinnen könnte. Ausstattung vorzüglich.*

Hannover.

Dr. CARL RODENBERG.

Kritische Bemerkungen zur Kinführung in die Anfangsgründe der "Géometrie descriptive". Von Franz Tilser, Professor an der k. k.
böhmischen technischen Hochschule in Prag. Erstes Heft. Mit einer
lithographirten Tafel. XLIV u. 96 S. Wien 1883, Alfred Hölder.

In dem vorliegenden Hefte ist so ziemlich von allen Naturwissenschaften die Rede, nur nicht von dem, was man erwartet, nämlich einer Verbesserung der Lehrmethode der darstellenden Geometrie. Diese Wissenschaft ist nach des Verfassers Ansicht nicht identisch mit der "Géometrie descriptive" Monge's. Worin der Unterschied eigentlich bestehe, ist nirgends klar gesagt; wenigstens war es uns nicht möglich, aus den bunten

Im Referat zu Band I ist ein von Schwarz herrührender Beweis des Pohlke'schen Satzes (vergl. Crelle LXIII. Bd.) irrthümlich Pohlke selbst mehrieben, was wir hierdurch richtigstellen.

Reihen von Citaten und Deductionen heterogenster Natur den Kern herauszuschälen. Hoffentlich sagt der Verfasser in den folgenden Heften irgendwokurz und bündig, wie seiner Ansicht nach die qu. Doctrin gelehrt werden muss und was er mit dem vorliegenden Buche bezwecken will.

Hannover:

Dr. CARL RODENBERG.

Bibliographie

vom 16. December 1884 bis 15. Februar 1885.

Periodische Schriften.

```
Sitzungsberichte der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften. Jahrg.
     1885, Nr. 1-3. Berlin, Dümmler.
                                                         compl. 12 Mk.
 Abhandlungen der königl. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen. 31. Bd.
     v. J. 1884. Göttingen, Dieterich.
                                                                 48 Mk.
 Annalen der Münchener Sternwarte. 10. Supplementbd. München, Franz. 3 Mk.
 Journal für reine und angewandte Mathematik (begr. v. CRELLE), heraus-
     geg. v. L. Kronecker und A. Weierstrass. 98. Bd. 1. Heft. Berlin.
     G. Reimer.
                                                          compl. 12 Mk.
 Mathematische Annalen, herausgeg. v. F. Klein und A. Mayer. 25. Bd.
     (4 Hefte). 1. Heft. Leipzig, Teubner.
                                                          compl. 20 Mk.
 Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftl. Unterricht, heraus-
     geg. v. V. Hoffmann. 16. Jahrg. (1885). 1. Heft. Ebendas.
                                                          compl. 12 Mk.
 Annalen der Physik und Chemie (begr. v. Poggendorff), herausgeg. von
     G. WIEDEMANN.
                      Jahrg. 1885 (12 Hefte). 1. Heft. Leipzig, Barth.
                                                          compl. 31 Mk.
 Beiblätter zu den Annalen der Physik und Chemie, herausgeg. von G. und
     E. Wiedemann. 9. Bd. (12 Hefte). 1. Heft. Ebendas. compl. 16 Mk.
 Zeitschrift zur Förderung des physikal. Unterrichts. 1. Jahrg. (12 Hefte).
      1. und 2. Heft. Berlin, Lisser & Benecke.
                                                          compl. 12 Mk.
 Die Fortschritte der Physik, dargestellt von der physikal. Gesellschaft in
     Berlin. 34. Jahrg. (Jahr 1878), 3. Abth.: Physik der Erde; redigirt
     von NEESEN. Berlin, G. Reimer.
                                                                 12 Mk.
 Zeitschrift für Vermessungswesen, herausgeg. von W. Jordan. 14. Jahrg.
     1. Heft. Stuttgart, Wittwer.
                                                           compl. 9 Mk.
Zeitschrift für Instrumentenkunde, redigirt v. A. Leman und A. Westphal.
   5. Jahrg. (12 Hefte). 1. Heft. Berlin, Springer.
                                                           compl. 18 ML
```

Bibliotheca historico-naturalis, physico-chemica et mathematica, ed. R. v. Hanstein. 34. Jahrg. 1. Heft, Januar—Juni 1884. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1 Mk. 40 Pf. Connaissance des temps ou des mouvements célestes pour l'an 1886. Paris, Gauthier-Villars. 4 Frs.

Reine Mathematik.

Weierstrass, K., Formeln und Lehrsätze zum Gebrauch der elliptischen

Weierstrass, K., Formeln und Lehrsätze zum Gebrauch der elliptischen Functionen. Nach Vorlesungen bearbeitet von H. Schwarz. Bogen 1-10. Berlin, Friedländer & S. 6 Mk.

Hamilton, W., Elemente der Quaternionen; deutsch von P. Glan. 2. Bd. 2. Hälfte (Schluss). Leipzig, Barth. 7 Mk. 30 Pf.

Spitzer, S., Untersuchungen im Gebiete linearer Differentialgleichungen.
2. Bd. Wien, Gerold.
3 Mk.

WINCKLER, A., Ermittelung der Grenzen für die Werthe bestimmter Integrale. (Akad.) Ebendas. 20 Pf.

Simon, M., Die Elemente der Arithmetik als Vorbereitung auf die Functionentheorie. Strassburg, Schultz & Co. 1 Mk. 20 Pf.

Kaiser, H., Die Determinanten für den ersten Unterricht in der Algebra. Wiesbaden, Bergmann.

QUENSEN, C., Analytische Betrachtungen über die Raumformen, für welche das Congruenzaxiom gilt. Braunschweig, Göritz & Putlitz. 1 Mk. 20 Pf.

Weingarten, J., Ueber die Theorie der auf einander abwickelbaren Oberflächen. Berlin, Mayer & Müller. 2 Mk. 80 Pf.

Gusserow, C., Leitfaden für den Unterricht in der Stereometrie und den Elementen der Projectionslehre. Berlin, Springer. 1 Mk. 20 Pf.

Spieker, Th., Lehrbuch der ebenen und sphärischen Trigonometrie. Potsdam, Stein.

1 Mk. 40 Pf.

Angewandte Mathematik.

CZUBER, E., Zur Theorie der geometrischen Wahrscheinlichkeiten. (Akad.)
Wien, Gerold. 50 Pf.

Kraft, F., Sammlung von Problemen der analytischen Mechanik. 6. Lief. Stuttgart, Metzler. 2 Mk.

Κισκ, F., Das Gesetz der proportionalen Widerstände und seine Anwendungen. Leipzig, Felix.
6 Mk.

HERRMANN, G., Die graphische Behandlung der mechanischen Wärmetheorie.

Berlin, Springer.

1 Mk. 20 Pf.

SIEMENS, W., Ueber die Erhaltung der Sonnenenergie. Uebers. v. E. Worms. Ebendas. 4 Mk.

Israel-Holzwart, K., Elemente der the Theorie der elliptischen Bev-baden, Bergmann.

OPPOLZER, TH. v., Ueber die Länge des Siriusjahres und der Sothisperiode.

(Akad.) Wien, Gerold.

50 Pf.


ZEHDEN, F., Methode der directen Rechnung einer wahren Monddistanz aus beobachteten. (Akad.) Ebendas. 20 Pf.

Physik und Meteorologie.

- DECHANT, E., Ueber den Gang der Lichtstrahlen durch Flüssigkeiten in Glasröhren und die Bestimmung der Brechungsexponenten condensirter Gase. (Akad.) Wien, Gerold. 30 Pf.
- HÄBLER, Th., Zur Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus. (Dissert.)

 Jena, Deistung.

 60 Pf.
- MASCART, E., Handbuch der statischen Elektricität; der tsch von G. Wallentin. 1. Bd. 2. Abth. Wien, Pichler. 9 Mk.



Historisch-literarische Abtheilung.

Die von Diophant überlieferten Methoden der Berechnung irrationaler Quadratwurzeln.

Von

W. SCHOENBORN in Krotoschin.

Hierzu Taf. V Fig. 3.

Die Verfasser der in den letzten Jahren über quadratische Irrationalitäten der Alten und deren Entwickelungsmethoden erschienenen Abhandlungen sind sämmtlich der Ansicht, dass in den uns erhaltenen Werken zwar einzelne Näherungswerthe irrationaler Quadratwurzeln erwähnt werden, dass aber in keinem derselben, wenn von dem auf den sechzigtheiligen Calcul gegründeten Verfahren abgesehen wird, Methoden zu ihrer Berechnung mitgetheilt sind. Auch der unterzeichnete Verfasser war derselben Ansicht, wie sich aus seiner in Bd. XXVIII dieser Zeitschrift enthaltenen Mittheilung über diesen Gegenstand ergiebt. Erst nach dem Erscheinen derselben begann er einzelne Schriften der griechischen Mathematiker genauer zu durchlesen und stiess daßei auf Stellen, aus denen sich bestimmte Methoden der Berechnung der Quadratwurzeln ergeben, so dass die vorher erwähnte Ansicht doch nicht als recht begründet erscheint. Die Stellen finden sich in der Schrift des Diophantos αριθμητικά.

Diophant behandelt in derselben V, 12 eine Aufgabe, bei der es darauf ankommt, 13 in zwei Quadrate zu theilen, deren jedes grösser als 6 ist. Er nimmt die Hälfte von 13, also $6\frac{1}{2}$, und sucht einen Bruch, der zu $6\frac{1}{2}$ addirt die Summe zu einem Quadrate macht, multiplicirt $6\frac{1}{2}$ mit 4 und sucht einen quadratischen Bruch, der zu 26 addirt ein Quadrat giebt; ist $26 + \frac{1}{x^2}$ ein Quadrat, so ist es auch $26x^2 + 1$, die Grösse wird gleich gesetzt $(5x + i)^2$; er erhält x = 10. Mithin ist $26 + \frac{1}{100} = \frac{2601}{100}$ das gesuchte Quadrat, somit ist auch $6\frac{1}{2} + \frac{1}{400}$ ein Quadrat, dessen Seite $\frac{1}{20}$ ist. Dass hierdurch $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{20}$ als Näherungswerthe von $\sqrt{26}$, $\sqrt{6\frac{1}{2}}$ gefunden sind, ist wohl nicht zu bestreiten. Allerdings sagt Diophant nicht, dass $\sqrt{6\frac{1}{4}} \approx \frac{1}{400}$ sei, aber die von ihm behandelte Aufgabe verlangt das auch nicht.

Hist.-Ht. Abthlg. d. Zeitschr. f Math. u. Phys. XXX, 3.

Es dürste zu beachten sein, dass Diophant bei $6\frac{1}{4}$ den Bruch durch Multiplication mit 4 beseitigt, dass er $\sqrt{26}$ berechnet und das Resultat durch 2 dividirt, um $\sqrt{6\frac{1}{4}}$ zu erhalten.

Wendet man das angegebene Verfahren an, um $\sqrt{A^2 \pm B}$ zu bestimmen, setzt also $(A^2 \pm B)x^2 + 1 = (Ax \pm 1)^3$, so ergiebt sich $x = \frac{2A}{B}$, mithin erhält man $\sqrt{A^2 \pm B} \sim A \pm \frac{B}{2A}$, d. h. eine Formel, nach der sich ein Theil der überlieferten Wurzelwerthe sehr gut herleiten lässt. — Dass die Methode nur anwendbar ist, wenn x > 1 wird, ist wohl kaum nöthig zu erwähnen. Die nach ihr berechneten Wurzelwerthe sind stets grösser als der wahre Werth; die nun folgende Methode giebt zwei oder mehr Werthe, zwischen denen der wirkliche Werth liegt.

Diophant behandelt V, 14 die Aufgabe: die Eins so in drei Theile zu theilen, dass, wenn man zu jedem 3 addirt, die drei Summen Quadrate werden. Er bemerkt, man habe somit 10 in drei Quadrate zu theilen, deren jedes > 3 sei; die Aufgabe sei also zu lösen nach $\tau \tilde{\eta} \tau \tilde{\eta} \varepsilon \pi a \varrho \iota \sigma \varepsilon \tau \eta \tau \sigma \varepsilon$ draw $\tilde{\eta}$. Was unter dieser Führung, Anweisung zu verstehen sei, zeigt die weitere Rechnung.

Da der dritte Theil von $10 = 3\frac{1}{4}$ ist, so ist x so zu bestimmen, dass $3\frac{1}{8} + \frac{1}{x^2}$, oder indem man $3\frac{1}{8}$ mit 9 multiplicirt, dass $30 + \frac{1}{x^2}$ ein Quadrat sei. Aus $30x^2 + 1 = (5x + 1)^2$ wird x = 2, also $30 + \frac{1}{4} = (\frac{11}{2})^2$ und $3\frac{1}{8} + \frac{1}{36}$ $=(\frac{11}{8})^2$ gefunden. Jetzt zerlegt Diophant 10 in die Summe dreier Quadrate; da er weiss, dass $(\frac{4}{5})^2 + (\frac{3}{5})^2 = 1$ ist, so ergiebt sich $10 = 3^2 + (\frac{4}{5})^2$ $+(\frac{3}{4})^2$; es bleibt übrig, die Seite jedes dieser Quadrate nahe gleich zu machen (πάρισον παρασκευάσαι) mit 11. Um einen Theil der Brüche fortzuschaffen, werden 3, 4, 3, 11 mit 30 multiplicirt, man erhält 90, 24, 18, 55; jede Seite ist nun nahe gleich zu machen mit 55; die Seiten sind 3-35x, $\frac{4}{5}+31x$, $\frac{3}{5}+37x$, (35=90-55, 31=55-24, 37=55-18)addirt man die Quadrate der Seiten, so ist die Summe = 10 zu setzen; aus $(3-35x)^2+(\frac{4}{5}+31x)^2+(\frac{3}{5}+37x)^2=10$ ergiebt sich $x=\frac{116}{3555}$. Werth ist in jede Seite einzusetzen. Hier bricht Diophant ab. Führt man seine Vorschrift aus, so erhält man $\frac{1321}{711}$, $\frac{1288}{711}$, $\frac{1285}{711}$ als die Zablen, die nahe gleich $\frac{11}{6}$ sind. Da die Summe der Quadrate derselben = 10 ist, die Zahlen selbst einander nahe gleich sind, so ist jede ein Näherungswerth von $\sqrt[4]{3\frac{1}{3}}$, $\frac{1821}{711}$ zu gross, die beiden anderen zu klein; das haben die Alten wohl auch erkannt und das Mittel, einen der Wurzel noch näher kommenden Werth zu finden, lag zu nahe, als dass sie es nicht sollten benutzt haben. Diophant freilich, der alle drei Werthe brau ht, hat keine Veranlassung zu erwähnen, dass sich ein solcher Werth ergeben würde, wenn man die Summe der drei Zahlen durch 3 dividirt. (Es ist $\frac{1298}{711} = 1,82559...$ der genauere Werth von $\sqrt{3\frac{1}{4}}$ ist = 1,8257....)

Dieselbe Methode hat Diophant, ohne sie benennen, auch V, 12 angewendet. Nachdem er $\frac{51}{20}$ als Näherungswerth von $\sqrt{61}$ gefunden, muss er, um die gestellte Aufgabe zu lösen, noch 13 in zwei Quadrate theilen, deren Seiten so nahe als möglich $(\omega_s \tilde{\epsilon}\gamma\gamma_s\sigma_s\alpha)$ mit $\frac{51}{20}$ übereinstimmen. Da $13 = 3^2 + 2^2$ ist, so bildet er die Seiten 11x + 2, 3 - 9x; (es ist 3, 2, $\frac{51}{20}$ mit 20 multiplicirt, aus 60, 40, 51 erhält man 11 = 51 - 40, 9 = 60 - 51); aus $(11x + 2)^2 + (3 - 9x)^2 = 13$ findet er $x = \frac{5}{101}$, mithin wird $11x + 2 = \frac{251}{101}$, $3 - 9x = \frac{258}{101}$; es sind also $\frac{257}{101}$ und $\frac{258}{101}$ die Zahlen, welche $\frac{51}{20}$ ganz nahe kommen; auch ist die Differenz ihrer Quadrate < 1, wie es Diophant im Anfange seiner Auseinandersetzung verlangt hat. Dass jede von ihnen ein Näherungswerth von $\sqrt{6\frac{1}{2}}$ ist, dass ihr arithmetisches Mittel einen noch genaueren Näherungswerth giebt, erwähnt Diophant allerdings nicht; er braucht eben beide Werthe und hat von den Quadraten derselben 6 abzuziehen, um die der Aufgabe entsprechenden Zahlen zu erhalten. (Das arithmetische Mittel $\frac{5}{20}$ ist = 2,549504..., $\sqrt{6\frac{1}{2}}$ = 2,549509....)

Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich eine zweite Methode für Berechnung von \sqrt{a} . Zunächst hat man nach der ersten einen Näherungswerth zu suchen; derselbe sei $=\frac{m}{n}$. Kann man 2a in die Summe zweier Quadrate $=b^2+c^2$ zerlegen, so ist aus der Gleichung $[b+(m-b.n).x]^2+[c+(m-c.n).x]^2=2a$ der Werth von x zu bestimmen; setzt man denselben in b+(m-b.n).x, c+(m-c.n).x ein, nimmt von der Summe der beiden so erhaltenen Zahlen die Hälfte, so erhält man einen neuen, genaueren Näherungswerth von \sqrt{a} .— Ist $3a=b^2+c^2+d^2$, so ist $[b+(m-b.n).x]^2+[c+(m-c.n).x]^2+[d+(m-d.n).x]^2=3a$ die Gleichung, aus welcher der Werth von x bestimmt wird; der dritte Theil der Summe der drei gefundenen Zahlen ist der Näherungswerth der Wurzel.— Die Methode lässt sich auch anwenden, wenn 4a, wie das in $\sqrt{17}$ der Fall ist, gleich der Summe von vier Quadraten ist. Angenommen ist hierbei, dass a, b, c, d ganze Zahlen sind; was zu thun ist, wenn Brüche vorkommen, zeigt das Beispiel in $\sqrt{14}$.

Das angegebene Verfahren verlangt eine Vorschrift, aus der zu ersehen, wenn man 2a in eine Summe zweier, wenn 3a in eine Summe dreier Quadrate zerlegen könne, wenn nicht. Auch diese Vorschrift lässt sich wenigstens zum Theil aus Diophant herstellen. Herr Cantor bemerkt in der Geschichte der Mathematik, Bd. I S. 441, dass aus der zu V, 12 gestellten Bedingung der Satz folge: Keine Zahl von der Form 4.n+3 lässt sich als Summe zweier Quadrate darstellen. — In V, 14 soll 3m+1 in die Summe dreier Quadrate zerlegt werden. Diophant bemerkt, es dürfe m weder 2 sein (d. h. also: 7 lässt sich nicht in drei Quadrate zerlegen), μήτε τινά τῶν δυάδος ὀπτάπις παραυξαμένων. Hat Bachet mit der Behauptung heht, Diophant meine damit, es dürfe m nicht = 2+8n sein, so ergielen, dass sich in der Vorschrift wohl der Satz fand: Ist eine Zahl rum 4.n+3, so kann sie nicht als Summe zweier Quadrate

 $\begin{array}{c} \sqrt{6300} = 10.\sqrt{63}. \quad -\text{Es ist } \sqrt{63} \sim 8 - \frac{1}{16} = \frac{127}{16}. \quad \text{Ds. } 189 = 11^3 \\ +8^3 + 2^3 \text{ ist, so erhält man die Gleichung } (11 - 49x)^3 + (8 - x)^2 + (2 + 95x)^3 \\ = 189, \quad \text{also } x = \frac{7}{14}\frac{1}{27}, \quad 11 - 49x = \frac{9}{10}\frac{7}{14}\frac{1}{27}, \quad 8 - x = \frac{9}{10}\frac{7}{14}\frac{2}{27}, \quad 2 + 95x = \\ = \frac{90584}{1427}, \quad \text{folglich } \sqrt{63} \sim \frac{9}{11}\frac{699}{427}, \quad \sqrt{6300} \sim \frac{90699}{11427}, \quad = 79\frac{1}{1427} \sim 79\frac{1256}{11427} \\ = 79\frac{1}{5} = 79\frac{1}{5} + \frac{2}{51}. \quad -\text{Mithin wird } \sqrt{1575} = \frac{1}{2}\sqrt{6300} \sim \frac{39\frac{2}{5} + \frac{1}{51}}{102}. \quad -\sqrt{615 + \frac{1}{64}} = \frac{1}{2} \\ \times \sqrt{2460 + \frac{1}{16}} \approx 24\frac{1}{2} + \frac{1}{104}. \end{array}$

 $\sqrt{216} = 3.\sqrt{24}$. Aus $24x^2 + 1 = (5x - 1)^2$ folgt x = 10, $\sqrt{24} \sim \frac{48}{16}$. Es ist $72 = 8^2 + 2^2 + 2^2$, man erhält also die Gleichung $(8 - 31x)^2 + 2.(2 + 29x)^2 = 72$, mithin wird $x = \frac{264}{2643}$, $8 - 31x = \frac{12060}{2643}$, $2 + 29x = \frac{12042}{2643}$, also $\sqrt{24} \sim \frac{12948}{2643}$ and $\sqrt{216} \sim \frac{38844}{2643} = 14\frac{1464}{2643} \sim 14\frac{184}{264} = 14\frac{23}{33}$.

 $\sqrt{356} = 2.\sqrt{89}$. Aus $89x^2 + 1 = (9x + 1)^2$ folgt $x = \frac{9}{4}$, $\sqrt{89} \propto \frac{9}{8}$. Es ist $178 = 13^2 + 3^2$, mithin erhält man die Gleichung $(13 - 32.x)^2 + (3 + 58.x)^2 = 178$; aus ihr folgt $x = \frac{129}{1097}$, $13 - 32.x = \frac{10389}{1097}$, $3 + 58.x = \frac{10309}{1097}$, mithin $\sqrt{89} \propto \frac{10349}{1097}$, $\sqrt{356} \sim \frac{20698}{1097} = 18\frac{952}{1097} \sim 18\frac{952}{1088} = 18\frac{7}{8}$.

 $\sqrt{720} = 6.\sqrt{20}$. Aus $20.x^2 + 1 = (4x + 1)^2$ folgt x = 2, $\sqrt{20} \sim \frac{9}{4}$. Da $40 = 6^2 + 2^2$ ist, so erhält man die Gleichung $(6 - 3x)^2 + (2 + 5x)^2 = 40$; hieraus ergiebt sich $x = \frac{8}{17}$, $6 - 3x = 4\frac{19}{17}$, $2 + 5x = 4\frac{6}{17}$, $\sqrt{20} \sim 4\frac{9}{17}$, mithin $\sqrt{720} \sim 26\frac{14}{17} \sim 26\frac{15}{15} = 26\frac{5}{15}$.

 $\begin{array}{lll} \sqrt[3]{208} = 4.\sqrt[3]{13}. & \text{Aus } 13x^2 + 1 = (4x - 1)^2 \text{ folgt } x = \frac{8}{3}, \ \sqrt{13} \sim 3\frac{8}{8}. \\ \text{Es ist } 26 = 5^2 + 1, \text{ somit ergiebt sich die Gleichung } (5 - 11.x)^2 + (1 + 21.x)^3 \\ = 26. & \text{Aus ihr erhält man } x = \frac{68}{562}, \ 5 - 11.x = \frac{2062}{562}, \ 1 + 21.x = \frac{1990}{562}, \\ \text{folglich } \sqrt[3]{13} \sim \frac{2026}{562}, \ \sqrt[3]{208} \sim \frac{8104}{562} = 14\frac{236}{562} \sim 14\frac{2}{564} = 14\frac{5}{12}. \end{array}$

Die Wurzelwerthe des Heron wären somit gefunden; dass sie Heron gerade in der vom Verfasser angegebenen Weise berechnet habe, wird nicht behauptet. Unter Beibehaltung der Methode lassen sie sich auch auf andere Art finden. Um z. B. 1/216 zu erhalten, konnte man ausgehen von $216x^2+1=(14x+1)^2$ und erhielt $x=\frac{7}{5}$, $\sqrt{216}=\frac{103}{7}$; da $648=16^2$ $+14^{2}+14^{3}$ ist, so ergab sich die Gleichung $(16-9.x)^{2}+2.(14+5.x)^{3}$ = 648, folglich $x = \frac{8}{131}$, $16 - 9 \cdot x = \frac{2024}{131}$, $14 + 5 \cdot x = \frac{1874}{131}$ und $\sqrt{216}$ $\sim \frac{1924}{121} = 14\frac{90}{131} \sim 14\frac{92}{132} = 14\frac{23}{33}$. — Wird bei $\sqrt{135} = 3.\sqrt{15}$ von $\sqrt{15}$ $\sim \frac{313}{2}$ und $60 = 7^2 + 3^2 + 1 + 1$ ausgegangen, so entsteht die Gleichung $(7 - {}^{8}25 \cdot x)^{2} + (3 + 7 \cdot x)^{2} + 2(1 + 23 \cdot x)^{2} = 60$, mithin wird $x = \frac{54}{433}$, $7 - 25 \cdot x$ $= \frac{1681}{483}, \ 3 + 7.x = \frac{1677}{433}, \ 1 + 23.x = \frac{1675}{433}, \ \sqrt{15} \sim \frac{1677}{433}, \ \sqrt{135} \sim \frac{5031}{433}$ $=11\frac{268}{12} \sim 11\frac{273}{12} = 11\frac{3}{12}$. — Wird bei $\sqrt{208} = 4.\sqrt{13}$ ausgegangen von $13x^2+1=(3x+1)^2$, so erhält man $x=\frac{3}{4}$, also $\sqrt{13} \sim \frac{11}{2}$; da $52=7^2$ +1+1+1 ist, so ergiebt sich die Gleichung $(7-10.x)^2+3(1+8.x)^2=52$; mithin wird $x = \frac{28}{18}$, $7 - 10 \cdot x = \frac{281}{73}$, $1 + 8 \cdot x = \frac{257}{73}$, $\sqrt{13} \sim \frac{263}{73}$, $\sqrt{208}$ $\sim \frac{1052}{72} = 1439 \sim 1439 = 1452.$

Dass sich die uns überlieferten Quadratwurzeln der Alten durch die aus Diophant entnommenen Methoden berechnen lassen, ist somit wohl

Herri Günther in der Abhandlung: Die quadratischen Irrationalitäten der Alten, 8. 51 erwähnte Cubikwurzel $\sqrt[3]{\frac{10}{18}} \sim \frac{10}{9}$ gefunden sein dürfte. Es ist $\sqrt[3]{\frac{25}{18}} = \frac{\sqrt[3]{300}}{6}$. Machte Pheidon — er soll ja die Wurzel berechnet haben — den Versuch. $\sqrt[3]{300}$ durch ein Verfahren zu finden, das der ersten Methode der Berechnung der Quadratwurzeln entspricht, so hatte er $300.x^3 + 1 = (6x+1)^3$ zu setzen, und erhielt zur Bestimmung von x die Gleichung $14x^2 - 18x = 3$; somit wird $x = \frac{9+\sqrt{123}}{14}$, es liegt also zwischen $\frac{20}{14}$ und $\frac{21}{14}$; wurde der letztere Grenzwerth als der einfachere in der weiteren Rechnung benutzt, so ergab sich $300 \sim (6+\frac{2}{3})^3$, mithin $\sqrt[3]{300} \sim \frac{20}{3}$ und $\sqrt[3]{\frac{25}{18}} \sim \frac{10}{9}$.

Treten wir der Frage näher: wie sind die Alten zu diesen Methoden

gekommen? so ist die Sache in Betreff der ersten Methode einfach. - Aus der Gleichung $ax^2+1=(\alpha.x\pm1)^2$, in der a gegeben, α eigentlich beliebig ist, ergiebt sich die Gleichung $a + \frac{1}{x^2} = \left(\alpha \pm \frac{1}{x}\right)^2$; ist nun aus der ersten Gleichung ein Werth von x gefunden, welcher > 1 ist, so ist $\alpha \pm \frac{1}{x}$ ein so genauerer Näherungswerth von 1/a, je grösser x war. - Die zweite Methode weist auf Entstehung aus geometrischen Betrachtungen hin und bestätigt Herrn Cantor's Ansicht (Geschichte der Mathematik Bd. I S. 412), Class die Alten bei dergleichen Untersuchungen rechtwinklige Dreiecke zu Hilfe genommen haben. Sollte 1/61 gefunden werden, so ging man von einem bei A rechtwinkligen Dreiecke ABC aus, in welchem AB=3, A C = 2 war; die Hypotenuse BC ist also $= \sqrt{13}$. Construirte man über B C das Quadrat BCDF, zog in demselben die sich in G schneidenden Diagonalen BD, CF, so ist $BG = CG = \sqrt{61}$. Auf BD schneide man BV = BA, auf CF aber CO = CA ab (Fig. 3). War nach der ersten Methode 1/61 ~ 11 gefunden, so lässt sich allerdings der 60. Theil von AB micht genau 51 mal auf BG abtragen, denn AB und BG sind incommensurabel, aber es wird ein Mass x geben, das annähernd 60 mal in AB and 51 mal in BG enthalten ist, so dass annähernd GV = 9.x, GO = 11.xWird; dann ist BG = 3 - 9.x, CG = 2 + 11.x. Die Summe der Quadrate dieser Grössen muss = 13 sein, mithin ist durch die Gleichung $(3-9.x)^2$ $+(2+11.x)^2=13$ die Möglichkeit gegeben, das Mass x, also auch BG and CG zu bestimmen, und da BG = CG sein soll, so erhält man, wenn man die Summe beider Grössen durch 2 dividirt, einen gemeinsamen Werth Für BG und CG, also auch für $\sqrt{61}$. — War die Methode für Zahlen a, bei denen 2a gleich der Summe zweier Quadrate ist, erprobt, so war der Fortschritt zu Fällen, in denen 3a (4a) gleich der Summe von 3 (4) Quadraten ist, nicht mehr schwer.

Sehen wir zu, worauf es bei der zweiten Methode eigentlich ankom. so handelt es sich doch darum, eine Zahl, die gleich der Summe zw (dreier) Quadrate ist, nochmals in eine solche Summe zu zerlegen, sollen die Seiten der neuen Quadrate einander nahe gleich sein. Diophant behandelt II, 10 die Aufgabe, $13 = 3^{9} + 2^{9}$ in zwei an den Quadrate zu zerlegen. Er schlägt folgenden Weg ein. Es sei $2p = a^x$ $+b^{2}$ (a>b) die zu zerlegende Zahl; man bestimme durch m.x - ab+x zwei Zahlen, die der Gleichung $(mx-a)^2+(b+x)^2=2p$ nügen; aus ihr erhält man $x = \frac{2(a \cdot m - b)}{m^2 + 1}$, und sind $\frac{a(m^2 - 1) - 2 \cdot b \cdot m}{m^2 + 1}$ und $\frac{b(m^2-1)+2.a.m}{m^2+1}$ die gesuchten Zahlen. Im Allgemeinen ist *** liebig; hat man es aber so gewählt, dass die Seiten der neuen Quad rate einander nahe gleich werden, so sind dieselben Näherungswerthe von \(\mathbb{T}\)/p; aus ihnen lässt sich dann, wie bei der zweiten Methode, ein genaux erer Wurzelwerth finden. — Dasselbe Verfahren lässt sich einschlagen, 🕶 enn 3.p gleich der Summe dreier Quadrate ist. — Damit wäre eine dritte thode nachgewiesen, die vielleicht von den Alten zur Berechnung der Quadratwurzeln benutzt worden ist. Sie hat vor der zweiten den Vorzug, man bei ihr nicht nöthig hat, auch nach der ersten Methode einen Naherungswerth der Wurzel zu suchen. — Wendet man diese Methode ann zur Berechnung von $\sqrt{41}$, so ist a=9, b=1 zu setzen. Für m=3 er zieht sich $\sqrt{41} \sim \frac{32}{5}$, die Wurzel liegt zwischen $\frac{31}{5}$ und $\frac{33}{5}$; würde jetzt $a = \frac{33}{5}$, $b=\frac{31}{5}$, m=64 gesetzt, so ergäbe sich $\sqrt{41}\sim\frac{131169}{20485}$, da die Wurzel zwischen $^{131167}_{20485}$ und $^{131169}_{20485}$ liegt; der gefundene Werth wäre sehr ge mau, es ist $^{131168}_{20465} = 6,4031242372...$, der genauere Werth der Wurzell ist =6,4031242374... — Um $1/\overline{29}$ zu erhalten, ist a=7, b=3 zu se tzen, für m=5 erhält man $1/\overline{29} \sim 1$, die Wurzel liegt zwischen $\frac{11}{3}$ unc $\frac{11}{3}$. — Bei $\sqrt{\frac{29}{2}}$ ist a=5, b=2 zu nehmen, für m=5 erhält man $\sqrt{\frac{29}{2}} \sim \frac{99}{16}$ die Wurzel liegt zwischen $\frac{19}{8}$ und $\frac{50}{8}$. — Hat Heron, um $\sqrt{356} = 2 \cdot \sqrt{89}$ zu finden, die dritte Methode benutzt und bildete er die Gleichung 267= $2.(11-x)^2+(5+mx)^2$, so wurde $x=\frac{44-10.m}{m^2+2}$ für m=3 also $x=\frac{1}{1}$ $11-x=\frac{107}{11}$, $5+mx=\frac{97}{11}$, demnach $\sqrt{89} \sim \frac{311}{33}=9\frac{1}{33}$ und $\sqrt{356} \sim 18\frac{3}{3}$ $\sim 18\frac{7}{8}$. — Wird dieselbe Methode bei $\sqrt{135} = 3.\sqrt{15}$ in Anwendung gebracht, so erhält man $(5-m.x)^2+(4-x)^2+(2+n.x)^2=45$, mithin wird $x = \frac{10m - 4n + 8}{m^2 + n^2 + 1}$; für m = 5, n = 9 also $x = \frac{22}{107}$, $5 - m \cdot x = \frac{125}{107}$, 4 - x= $\frac{406}{107}$, $2 + nx = \frac{413}{107}$, mithin $\sqrt{15} \sim \frac{1243}{321}$ und $\sqrt{135} \sim \frac{1243}{107} = 11\frac{66}{107}$ $\sim 11_{\frac{1}{100}} = 11_{\frac{1}{2}}$ Diophant zeigt II, 8.9, wie man ein Quadrat in eine Summe zweier

Quadrate zerlegen könne; er stellt die Gleichung $a^{z} = x^{2} + (m \cdot x - a)^{2}$ and

und erhält $x = \frac{2 \cdot a \cdot m}{m^2 + 1}$, $mx - a = \frac{a(m^2 - 1)}{m^2 + 1}$; die Zerlegung beruht also darauf, dass $\left(\frac{2 \cdot m}{m^2 + 1}\right)^2 + \left(\frac{m^2 - 1}{m^2 + 1}\right)^2 = 1$ ist. Bei Diophant ist a = 4, m = 2 und er erhält $\frac{12}{5}$ und $\frac{16}{5}$ als Seiten der Quadrate, deren Summe = 16 sei; aber es ergiebt sich daraus auch $\sqrt{8} \sim \frac{28}{16}$, $\sqrt{2} \sim \frac{7}{6}$. — Wird a = 2, $m = \frac{5}{2}$ genommen, so erhält man $(\frac{49}{29})^2 + (\frac{42}{29})^2 = 4$, also auch $\sqrt{2} \sim \frac{4}{16}$.

Herr Günther bemerkt in der obenerwähnten Abhandlung S. 66, 88-90, dass de Lagny, Tannery, Zeuthen die Ansicht vertheidigen, es hätten die Alten, um $\sqrt{3}$ zu finden, Lösungen der Gleichungen $y^2 = 3.x^2 - 2$, $y^2 = 3.x^2 + 1$ zu Hilfe genommen. Dieser Ansicht gegenüber macht der Verfasser Garauf aufmerksam, dass die drei Methoden, die zur Berechnung von \sqrt{p} führen, auch in vielen Fällen brauchbare Werthe liefern für die Lösung der Gleichungen $y^2 = p.x^2 + 1$ und $y^2 = p.x^2 - 2$.

Gleich die erste Methode giebt oft ein Paar zusammengehöriger Wurzeln der Gleichung $y^2 = p \cdot x^2 + 1$. — Wird $p \cdot x^2 + 1 = (\alpha \cdot x \pm 1)^2$ gesetzt und x wird eine ganze Zahl, $p - \alpha^2$ geht also ohne Rest auf in 2α , so ist eine Lösung gefunden. Aus dem Vorhergehenden ergeben sich die Beispiele: $51^2 = 26 \cdot 10^2 + 1$, $11^2 = 30 \cdot 2^2 + 1$, $7^2 = 3 \cdot 4^2 + 1$, $26^2 = 3 \cdot 15^2 + 1$, $97^2 = 3 \cdot 56^2 + 1$, $1351^2 = 3 \cdot 780^2 + 1$, $35^2 = 34 \cdot 36^2 + 1$, $2024^2 = 14175 \cdot 17^2 + 1$, $19^2 = 10 \cdot 6^2 + 1$, $31^2 = 15 \cdot 8^2 + 1$, $49^2 = 24 \cdot 10^3 + 1$.

Ist 2p gleich der Summe zweier Quadrate, so erhält man durch die zweite wie dritte Methode zwei Werthe, etwa $\frac{\beta}{\alpha}$ und $\frac{\beta+m}{\alpha}$, zwischen denen \sqrt{p} liegt; zugleich genügen dieselben der Gleichung $\frac{\beta^2+(\beta+m)^2}{\alpha^2}=2p$. Ist m eine gerade Zahl, setzt man also 2m an die Stelle von m, so geht die Gleichung über in $\frac{\beta^2+2\beta m+2m^2}{\alpha^2}=p$, d. h. man erhält $(\beta+m)^2=p.\alpha^2-m^2$, für m=1 also $(\beta+1)^2=p.\alpha^2-1$. Ist m ungerade, so können $\frac{2\beta}{2\alpha}$, $\frac{2(\beta+m)}{2\alpha}$ als die Grenzen betrachtet werden, zwischen denen \sqrt{p} liegt; man erhält also $(2\beta+m)^2=p.(2\alpha)^2-m^2$, und für m=1 somit $(2\beta+1)^2=p.(2\alpha)^2-1$. Als Beispiele ergeben sich: $515^2=\frac{13}{2}.202^2-1$, $117^2=10.37^2-1$, $76^2=20.17^2-4$ oder $38^2=5.17^2-1$, $32^2=41.5^2-1$, $131168^2=41.20485^2-1$, $70^2=29.13^2-1$, $99^2=\frac{29}{2}.26^2-1$, $41^2=2.2J^2-1$.

Ist \sqrt{p} dadurch gefunden, dass man 3p in die Summe dreier Quadrate zerlegte, deren Seiten $\frac{\beta+m}{\alpha}$, $\frac{\beta}{\alpha}$, $\frac{\beta-n}{\alpha}$ sein mögen, so musss die Gleichung $\frac{3\beta^2+2\beta(m-n)+m^2+n^2}{\alpha^2}=3p$ erfüllt sein. Ist nun m-n=3.

 $m^2+n^2=3.k$, so erhält man $(\beta+h)^2=p.\alpha^2+(h^2-k)$. — Sind m-n, m^2+n^2 keine Vielfachen von 3, so sind $\frac{3(\beta+m)}{3\alpha}, \frac{3\beta}{3\alpha}, \frac{3(\beta-n)}{3\alpha}$ als die Seiten der drei Quadrate zu betrachten, und ergiebt sich die Gleichung $[3\beta+(m-n)]^2=p.(3\alpha)^2-2(m^2+mn+n^2)$. — Sind zwei der Seiten einander gleich, es seien dieselben $\frac{\beta+3m}{\alpha}, \frac{\beta}{\alpha}, \frac{\beta}{\alpha}$, so erhält man $(\beta\pm m)^2=p.\alpha^2-2m^2$; sind $\frac{\beta+m}{\alpha}, \frac{\beta}{\alpha}, \frac{\beta}{\alpha}$ die Seiten, so ergiebt eich $(3\beta\pm m)^2=p.(3\alpha)^2-2.m^2$. — Demnach ist $265^2=3.153^2-2$, $22^2=6.9^2-2$, $1189^2=15.307^2-2.7$, $6474^2=6.2643^2-2.3^2$ oder $2158^2=6.881^2-2$, $311^2=89.33^2-2.10^2$.

Ob den Alten bekannt gewesen, dass sich aus den Werthen $y = \beta$, $x = \alpha$ der Gleichung $y^2 = px^2 + b$ die Werthe $y = 2\beta^2 + b$, $x = 2\alpha \cdot \beta$ in der Gleichung $y^2 = p \cdot x^2 + b^2$, desgleichen aus $y = \beta$, $x = \alpha$ der Gleichung $y^2 = p \cdot x^2 + 2b$ die Werthe $y = \beta^2 + b$, $x = \alpha \cdot \beta$ der Gleichung $y^2 = p \cdot x^2 + b^2$ ergeben, mag dahingestellt bleiben.

Krotoschin, im März 1885.

Recensionen.

Erwiderung.

Im 6. Hefte des 29. Bandes hat Herr P. Zech ein Referat über meine Schrift "Der Kreislauf im Kosmos" gegeben. Gegen das Ende fühlt er sich veranlasst zu bemerken, die Abhandlung sei "eine Streitschrift der katholischen Theologie gegen die Naturwissenschaft". Diesen Satz muss ich als eine offenbare Unwahrheit bezeichnen, und man wird mir wohl erlauben, dies kurz zu begründen.

Die betreffende Abhandlung ist weiter nichts, als eine Abwehr gegen die moderne Naturphilosophie; es wird S. 15 ausdrücklich hervorgehoben: "Man erinnere sich wohl, dass wir es nicht mit der eigentlichen Naturwissenschaft, sondern mit dem naturwissenschaftlich ausstaffirten Materialismus zu thun haben." Dem Herrn Referenten würde es auch wohl schwer fallen, eine Stelle zu bezeichnen, wo ich mich mit der Naturwissenschaft im Widerspruch befände.

Dann soll der Kampf von Seiten der katholischen Theologie geführt werden. Sonderbar, da die Schrift voll und ganz auf physikalischem Boden steht und von Theologie, geschweige denn katholischer, gar keine Rede ist. Allerdings wird auf S. 11 der philosophische Standpunkt des christlichen oder theistischen Teleologen kurz skizzirt; aber Teleologie ist doch nicht Theologie!

Blyenbeck (Holland), den 10. Februar 1885. J. Epping, S. J.

Vorlesungen über das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade. Von Felix Klein. Leipzig 1884. 260 S. 8°.

artikeln zerstreut war, ist einheitlich zusammengefasst und gleichmässig durchgearbeitet; die zahlreichen Citate, auf welche Verf. grosse Sorgfalt verwendet hat, geben dabei genauen Aufschluss über den Ursprung und die Entwickelung jeder einzelnen Untersuchung, wodurch zugleich die in dem Buche enthaltenen Fortschritte als solche zu Tage treten. Die Art der Darstellung, welcher das Princip zu Grunde liegt, zunächst am gegebenen speciellen Problem zu operiren und von da nach und nach zu allgemeineren Gesichtspunkten aufzusteigen, macht die Lecture verhältnissmässig so leicht und mühelos, dass es sehr zu bedauern wäre, wenn dieser oder jener Leser sich durch einige Schwierigkeiten, die gerade auf den ersten Blättern gefunden werden können, nach Herstellung geeigneter Modelle aber von selbst verschwinden, von der Lecture des Buches abschrecken liesse. Freilich darf der Anfänger andererseits die Bemerkung der Vorrede, dass specielle Kenntnisse nicht vorausgesetzt werden, nicht allzu sanguinisch aufnehmen; denn wenn auch der Verf. jedesmal die Elemente der verschiedenen von ihm in die Darstellung eingeflochtenen Disciplinen kurz auseinandersetzt resp. auf geeignete Lehrbücher verweist, so ist doch die Operation mit den Begriffen eines Gedankenkreises, in welchem man sich eben erst orientirt hat und daher noch nicht zwanglos bewegen kann, unter allen Umständen schwierig, zumal wenn - wie es hier der Fall ist - kurz nacheinander ganz verschiedenartige Gedankenkreise auftauchen und in Beziehung zu einander gesetzt werden. Immerhin sind wir der Meinung, dass besonders das Studium des ersten Abschnittes, in welchem die Theorie des Ikosaeders im engeren Sinne entwickelt wird, auch Demjenigen, welcher sich in die Gebiete der Functionentheorie, Algebra und Invariantentheorie erst einarbeiten muss, zur Freude gereichen wird, da er als Belohnung seiner Mühe eine Erweiterung des Gesichtskreises gewinnt, wie sie ihm nicht viele mathematische Werke der Neuzeit bereiten dürften. Der zweite Abschnitt, welcher der Theorie der Gleichungen fünften Grades gewidmet ist, bewegt sich zwar auf einem weniger abwechselungsreichen Gebiete, ist aber darum in seiner Art nicht minder interessant und wichtig; ist doch die Auflösung der Gleichung fünften Grades ein historisches Problem, welches die Mathematiker seit Jahrhunderten wieder und wieder beschäftigt hat und mit Abel's Beweis der Unmöglichkeit einer Lösung durch Wurzelgrössen nicht etwa erledigt, sondern vielmehr erst für die richtige Fragestellung vorbereitet wurde.

Wir geben eine Uebersicht über den Gesammtinhalt des Buches.

Der erste Abschnitt zerfällt in fünf Capitel. Gegenstand des Cap. I ist das Studium der regulären Körper, des Tetraeders, Würfels, Oktaeders, Dodekaeders und Ikosaeders, oder genauer der Projectionen jener Körper (d. h. ihrer Ecken und Kanten) auf die Oberfläche einer durch die Ecken gelegten Kugel aus dem Mittelpunkte derselben, also der regulären Kugelmetse. An die genannten Körper schliesst sich noch das Dieder, welches

aus dem regulären n-Eck hervorgeht und dem auf der Kugelfläche ein aus 2 n Dreiecken bestehendes Netz entspricht. Für das volle Verständniss des Folgenden sind Modelle der definirten Netze unentbehrlich; doch reichen zwei Kugeln aus, auf deren eine man Tetraeder, Oktaeder und Würfel, auf die andere Ikosaeder und Dodekaeder projicirt. Verf. studirt nun diejenigen Drehungen der Kugelfläche, durch welche eines jener Netze zur Deckung mit sich selbst gelangt. Die Gesammtheit dieser Drehungen bildet eine "Gruppe" im Sinne Galois', nämlich eine geschlossene Mannigfaltigkeit von Operationen. Es folgen gruppentheoretische Vorbegriffe in abstrakter Definition, die Begriffe der innerhalb einer Gruppe gleichberechtigten Operationen, der Untergruppe, der gleichberechtigten und der ausgezeichneten Untergruppen, der Einfachheit einer Gruppe, sowie des (holoedrischen oder meriedrischen) Isomorphismus zweier Gruppen. Diese abstrakten Definitionen werden dann durch die Anwendung auf die regulären Körper veranschaulicht. Es zeigt sich, dass die Gruppen des Oktaeders und Würfels, sowie des Dodekaeders und Ikosaeders identisch sind. Die definirten Begriffe gewinnen fast sämmtlich sehr einfache geometrische Bedeutungen. So besteht eine Untergruppe immer in der Gesammtheit derjenigen Drehungen, welche irgend ein in dem betrachteten Körper enthaltenes geometrisches Gebilde, etwa eine Diagonale, in sich überführen. Dem Oktaeder lassen sich zwei Tetraeder zuordnen, deren Ecken mit den Projectionen der Seitenmittelpunkte des Oktaeders auf die Kugelfläche zusammenfallen; bei allen 24 Oktaederdrehungen wird jedes jener beiden Tetraeder entweder in sich oder in das andere übergeführt; die Gesammtheit derjenigen (zwölf) Drehungen, welche jedes der Tetraeder in sich selbst überführen, bildet dann eine "ausgezeichnete" Untergruppe. Allgemein: Nennen wir zu einem geometrischen Gebilde A alle diejenigen "gleichberechtigt", in welche A durch die Drehungen des betrachteten Polyeders überhaupt übergehen kann (A', A'', ...), so bilden alle diejenigen Drehungen, bei denen jedes der sämmtlichen Bleichberechtigten Gebilde A, A', A", ... mit sich selbst zur Deckung kommt, eine "ausgezeichnete" Untergruppe. - Bei der Zusammensetzung solcher geometrischer Hilfsgebilde, durch welche überhaupt Untergruppen (und speciell ausgezeichnete Untergruppen) definirt werden, spielen die Eck-Punkte, die Seitenmittelpunkte und die Kantenmittelpunkte des Polyeders die wesentlichste Rolle. - Unter den Resultaten des Cap. I sind besonders die folgenden, auf das Ikosaeder bezüglichen hervorzuheben. Die im Ganzen aus 60 Drehungen bestehende Ikosaedergruppe ist "einfach" (d. h. enthalt keine ausgezeichnete Untergruppe) und holoedrisch isomorph mit der Gruppe der 60 geraden Vertauschungen von fünf Dingen. Von Untergrup-Den kommen später bei der Theorie der Gleichungen fünften Grades in Betracht: sechs gleichberechtigte Untergruppen von je zehn Drehungen Diederdrehungen, d. h. solche, bei denen jedesmal eine Verbindungslinie weier gegenüberliegenden Ecken in sich übergeht), und fünf gleichberen

tigte Untergruppen von je zwölf Drehungen (Tetraederdrehungen, d. h. solche, bei denen ein zum Ikosaeder in Beziehung stehendes Tetraeder mit sich Alle 60 Ikosaederdrehungen können durch selbst zur Deckung kommt). Wiederholung und Combination dreier (S, T, U), unter denen sich sogar nur zwei von einander unabhängige (S und T) befinden, erzeugt werden. - Durch Projection der Ikosaederkanten auf die Kugelfläche entstehen 20 gleichseitige sphärische Dreiecke, deren jedes durch seine drei Höhen in sechs Theile zu theilen ist, so dass die Kugelfläche im Ganzen von 120 rechtwinkligen Dreiecken bedeckt wird. Dieselben zerfallen in zwei Schaaren von je 60 unter einander congruenten, während je zwei verschiedenen Schaaren angehörige nur symmetrisch sind. Aus einem beliebigen Punkte P der Kugelfische entstehen durch die 60 Drehungen im Allgemeinen 60 verschiedene Punkte, derer jeder in einem andern von den 60 congruenten Dreiecken einer Schaar liegt. Die Gesammtheit von 60 solchen Punkten wird kurz ein "Punktsystem" genannt. In besonderen Fällen, nämlich wenn P mit einer Ecke der genannten Dreiecke zusammenfällt, enthält ein Punktsystem nur resp. 12, 20 oder 30 Punkte.

Der Grundgedanke des Cap. II ist der, dass dieselbe Kugel, auf welche die Polyeder projicirt sind, gleichzeitig als Träger einer complexen Variabeln z im Sinne Riemann's betrachtet wird. Die Beziehung zwischen der Kugelfläche und der mit der Aequatorialebene zusammenfallend gedachten complexen Ebene von z wird dabei durch stereographische Projection aus einem der beiden Kugelpole, der zugleich ein Eckpunkt des betreffenden Polyeders sein soll, hergestellt. Es entspricht dann jeder Drehung der Kugel um den Mittelpunkt eine lineare Substitution, indem jeder Punkt z übergeht in

$$z' = \frac{(d+ic)z - (b-ia)}{(b+ia)z + (d-ic)}$$

Setzt man $z = \frac{z_1}{z_2}$, so ist eine solche Substitution äquivalent mit $z'_1 = (d+ic)z_1 - (b-ia)z_2$, $z'_2 = (b+ia)z_1 + (d-ic)z_2$.

(Wir heben gleich hier hervor, dass die Einführung der homogenen Veränderlichen z_1 und z_2 für die Folge von fundamentaler Bedeutung ist.)

Verlangt man noch, dass die Determinante der Substitution 1 sei, so sind für jede Drehung die zugehörigen Constanten a, b, c, d bis auf das Vorzeichen bestimmt. Der Ikosaedergruppe entsprechen daher 120 Substitutionen in z_1 , z_2 , von denen immer zwei dieselbe Substitution in z liefern. Es wird bewiesen, dass eine Gruppe von nur 60 binären Substitutionen in z_1 , z_2 , welche mit den 60 Substitutionen in z äquivalent wären, nicht existiren kann. Bei Berechnung der 120 Werthe von a, b, c, d wird der Umstand benutzt, dass nach Cap. I alle Substitutionen sich aus dreien (S, T, U) susammensetzen lassen. — Ein "Punktsystem" ist definirt durch eine algebraische Gleichung 60. Grades F(z) = 0, die bei den 60 Ikosaedersubstitutionen

è

ungeändert bleibt und auch durch eine homogene Gleichung $F(z_1, z_2) = 0$ ersetzt werden kann. Diejenigen speciellen Functionen F(z) resp. $F(z_1, z_2)$ durch welche die in Cap. I erwähnten Systeme von nur 12, 20 und 30 Punkten definirt werden, sind Potenzen gewisser Functionen der Grade 12, 20 und 30, welche selbst durch die 60 (resp. 120) Ikosaedersubstitutionen bis auf einen Factor ungeändert bleiben. Diese speciellen Functionen können direct berechnet werden; doch lassen sich aus einer derselben, etwa der Function zwölften Grades $f(z_1, z_2)$, welche den Ikosaederecken entspricht, die übrigen mit den Hilfsmitteln der Invariantentheorie ableiten, wodurch zugleich der Anschluss an diese Disciplin erreicht ist. Jede Covariante der binären Form $f(z_1, z_2)$ wird nämlich offenbar ihrer Definition nach bei denjenigen linearen Substitutionen, welche $f(z_1, z_2)$ unverändert lassen, d. h. also bei den Ikosaedersubstitutionen, ebenfalls unverändert bleiben (abgesehen von einem Factor). Nun sind die Hesse'sche Form von f (H) und die Functional determinante von H und f(T) solche Covarianten, die erste vom Grade 20, die letztere vom Grade 30; dieselben müssen also, gleich Null gesetzt, eben jene vorhergenannten 20 Seitenmittelpunkte und 30 Kantenmittelpunkte liefern, da anschauungsmässig keine anderen "Punktsysteme" von nur 20 resp. 30 Punkten existiren. - Zwischen den drei Formen f, T, H besteht eine identische Relation $T^2 = -H^3 + 1728 f^5$. — Die Formen 60. Grades: f5, T2 und H3 multipliciren sich nun, wie der Versuch zeigt, bei den Ikosaedersubstitutionen immer alle drei mit demselben Factor (der hier sogar gleich 1, bei den analogen Formen der anderen regulären Körper jedoch im Allgemeinen von 1 verschieden ist); daher wird jede Form $\lambda_1 f^5 + \lambda_2 H^3 + \lambda_3 T^2$ für beliebige Werthe der Constanten 1, 1, 1, and nur um einen Factor geändert werden und demnach, gleich Null gesetzt, ein Punktsystem liefern. Dieses Punktsystem ist zugleich das allgemeine, da jene Form, auch wenn der Werth von T² in H³ und f⁵ aus der angegebenen Identität entnommen wird, immer noch einen wesentlichen (complexen) Parameter $\frac{\lambda_1}{1}$ enthält. In anderer Weise ergiebt sich die Gleichung des allgemeinen Punktsystems Offenbar auch dadurch, dass man den Quotienten von irgend zwei homo-Senen linearen Functionen der Ausdrücke f5, H3, T2 einem (im Allgemeinen complexen) Parameter Z gleichsetzt. Jener Quotient ist dann zugleich eine rationale Function von $\frac{z_1}{z_2}$ oder z, so dass eine Gleichung 60. Grades für z entsteht, deren Wurzeln zu jedem Werthe von Z direct das zugehörige Punktsystem liefern. Um die an sich willkürlichen Constanten, welche als Coefficienten von f5, H3, T2 in dem genannten Quotienten auftreten, für die weitere Behandlung des Problems zu fixiren, wird die Forderung ge-*tellt, dass den drei Gruppen der 12, 20 und 30 singulären Punkte resp die Werthe co, 0 und 1 des Parameters Z entsprechen sollen. Die

Probr vollständig bestimmte Gleichung 60. Grades in z., deren

sechs gleichberechtigten ist, liefert in derselben Weise eine rational vente sechsten Grades der Ikosaedergleichung. — Es wird schlieselich hingewiesen, dass die Auflösung der nur von einem Parameter Z gen Ikosaedergleichung betrachtet werden kann als eine Veraligening der elementaren Aufgabe. die nie Wurzel aus einer Grösse Z auszage Die Gleichungen ersten bis vierten Grades lassen sich auf die Autre-Wurzelziehung reduciren; es fragt sich, ob durch Adjunction der irrationalität, d. h. dadurch, dass man die Berechnung der V. Ikosaedergleichung aus dem gegebenen Werthe von Z als einbare Operation betrachtet, auch die Auflösung der Gleichung Grades möglich wird. Für die Gleichung fünften Grades is: durch Aufstellung der Resolventen desselben Grades besonder: Die Beantwortung der Frage, welche bejahend ausfällt, sowiund ausführliche Discussion aller Verbindungen zwischen Gleichung fünften Grades und der Theorie des Ikosaeders 141 Inhalt des zweiten Abschnittes.

In Cap. V werden einige allgemeine Theoreme, welchsuchungen der vorhergehenden Capitel folgen, sowie gewipunkte angegeben, aus denen wesentliche Erweiterungen Aufgaben sichtbar werden. Zunächst wird als charaktere der bisher discutirten Probleme diejenige anerkannt, die Lösung alle anderen durch a priori bekannte lineare gehen. Daraus ergiebt sich sogleich die Frage, ob me liche Gruppen lineare Substitutionen einer Veränder. homogener Veränderlichen z, und z, und entsprechen... Gleichungssysteme) existiren. Es zeigt sich, dass die dass vielmehr die vorher aufgestellten Gruppen (cycliscus Oktaeder- und Ikosaedergruppe) und die aus densemmen einer neuen, linear von z abhängigen Veränderlichen einzig möglichen sind. Mit Hilfe dieses Satzes alle algebraisch integrirbaren linearen Differentiali nung anzugeben; denn zwei Partikularlösungen o gleichung, sowie der Quotient derselben könnung sollen, nur eine endliche Gruppe linearer Substitut dieser folgt direct die Form der Lösungen, welle Form der Differentialgleichungen bestimmt. — II lassen nun eine Verallgemeinerung nach zwei Richt einander verträglich sind: es kann erstens die mehrt und es können zweitens unendliche Grui gezogen werden. In beiden Richtungen wird di Unter den unendlichen Gruppen wird besonders Modulfunctionen bestimmt, welche als Endglied

tracder-, Octaeder-, Ikosaederfunctionen beginne

unsere Functionen z_1 und z_2 , deren Quotient z der Differentialgleichung dritter Ordnung genügt, selbst geradezu Lösungen jener Differentialgleichung zweiter Ordnung. Letztere stellt sich dann als ein specieller Fall einer allgemeinen Differentialgleichung zweiter Ordnung dar, durch welche Riemann's P-Functionen definirt sind; womit das letzte Ziel dieses Capitels erreicht ist.

Das Cap. IV beschäftigt sich mit der Untersuchung des algebraischen Charakters der Ikosaedergleichung und der Aufstellung ihrer einfachsten Resolventen. Jeder in der Ikosaedergruppe enthaltenen Untergruppe entsprechen gewisse rationale Functionen von z, welche bei den zu jener Untergruppe gehörigen linearen Transformationen unverändert bleiben. Dieselben stehen zu demjenigen geometrischen Gebilde, welches (nach Cap. I) bei den Drehungen der betreffenden Untergruppe in sich übergeht, in einer analogen Beziehung, wie die linke Seite der Ikosaedergleichung zum Ikosaeder. Ist z. B. jenes Gebilde ein Tetraeder, so erhält man nach Cap. I eine zugehörige Untergruppe von zwölf Drehungen, und dementsprechend dreifach unendlich viel rationale Functionen zwölften Grades von z, welche sich linear durch jede einzelne derselben ausdrücken lassen. Jede dieser Functionen nimmt im Ganzen, d. h. bei sämmtlichen 60 Ikosaederdrehungen, funf verschiedene Werthe an (weil die Untergruppe von zwölf Drehungen eine von fünf gleichberechtigten ist) und genügt daher einer Gleichung funften Grades, deren Coefficienten rational von Zabhängen - Untersucht man statt der Gleichungen die zugehörigen Formenprobleme, so findet man jeder Untergruppe entsprechend gewisse Formen, die gleich allen rational und ganz aus ihnen zusammengesetzten die Eigenschaft besitzen, bei sämmtlichen Substitutionen der Untergruppe unverändert zu bleiben. Dieselben stehen zu dem geometrischen Gebilde, welches die Untergruppe definirt, in analoger Beziehung, wie die früher mit f, H, T bezeichneten absoluten Invarianten zum Ikosaeder. Speciell für die bereits betrachtete Untergruppe Von zwölf Substitutionen genügt jede solche Form wiederum einer Gleichung Funften Grades, deren Coefficienten rational aus f, H, T zusammengesetzt sind. Von den so gewonnenen Gleichungen gelangt man alsdann (durch eine Operation, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll) sehr schnell wiederum zu rationalen Resolventen fünften Grades der Ikosaeder-Bleichung selbst. Unter denselben heben wir eine besonders hervor, die sogenannte "Hauptresolvente", welche später im zweiten Abschnitte des Buches eine grosse Rolle spielt. Charakteristisch für dieselbe ist das Fehlen der vierten und dritten Potenz der Unbekannten; übrigens enthält sie noch 2 wei willkürliche Parameter m und n, und ihre Wurzeln haben die Form m.v+n.u.v, wo n and v gewisse rati "nuctionen von s sind, welche bei den Ikosaedersubstitutionen gleic Werthe annehmen. - Die zweite der in Cap

lich die aus zehn Drehung

von Hermite und für diejenige Jacobi'sche Gleichung mit einem wesentlichen Parameter, welche Kronecker als Resolvente der allgemeinen Gleichung fünften Grades aufgestellt hatte, von diesem selbst gelöst worden.

Inzwischen wurde (1861) der algebraische Theil des Problems, auf den sich von nun an das Hauptinteresse richtet, von Kronecker schärfer präcisirt. Abel hatte folgenden Satz bewiesen: "Wenn eine Gleichung algebraisch auflösbar ist, so kann man der Wurzel allezeit eine solche Form geben, dass sich alle algebraischen Functionen, aus welchen sie zusammengesetzt ist, durch rationale Functionen der Wurzeln der gegebenen Gleichung ausdrücken lassen." An dieser Forderung will Kronecker auch bei Behandlung der nicht algebraisch auflösbaren Gleichungen festhalten und verlangt demnach, dass nur rationale Functionen der gesuchten Wurzeln als neue Unbekannte eingeführt, mit anderen Worten, dass nur rationale Resolventen der gegebenen Gleichung aufgestellt werden sollen. Dies ist des Näheren so zu verstehen, dass die resolvirende Function, wenn sie allein durch die Wurzeln der ursprünglich gegebenen Gleichung ausgedrückt wird (indem die Coefficienten der letzteren, wo sie etwa noch vorkommen, tiberall durch die symmetrischen Functionen jener Wurzeln zu ersetzen sind) rational in jenen Wurzeln werden muss. Dieser Bedingung genügt z. B. die Quadratwurzel aus der Discriminante, obgleich dieselbe, durch die Coefficienten der vorgelegten Gleichung ausgedrückt, in irrationaler Form auftritt. Kronecker findet, dass von dem neuen Gesichtspunkte die 1858 von ihm selbst angegebene Reduction der drei Parameter, die in der Resolvente sechsten Grades auftreten, auf einen einzigen unzulässig ist, während eine Reduction auf zwei Parameter ohne Verlassen des vorgeschriebenen Rationalitätsbereichs noch ausführbar bleibt. Eine Reduction auf weniger als zwei Parameter ist nach Kronecker unter der angegebenen Bedingung überhaupt unmöglich. In der That treten auch bei der Reduction auf die Bring'sche Form mehrfach Irrationalitäten, welche nicht die genannte Bedingung erfüllen, sogenannte "accessorische" Quadrat- und Cubikwurzeln auf.

Die Frage, welche Verf. stellt und in den folgenden Capiteln untersucht, ist nun folgende: In welcher Weise steht die algebraische Theorie der Gleichungen fünften Grades in Verbindung mit der Theorie des Ikosaeders, und wie lässt sie sich auf Grund der letzteren im Zusammenhange entwickeln? Bei Untersuchung dieser Frage kann die Forderung Kronecker's nicht festgehalten werden; denn die Ikosaedergleichung enthält nur einen einzigen Parameter Z, eine Beziehung derselben zur allgemeinen Gleichung fünften Grades kann sich daher, infolge des genannten Kronecker'schen Satzes, nicht ohne Einführung accessorischer Irrationalitäten ergeben. Dagegen wird untersucht werden können (und diese Untersuchung führt schlieselich auf Begründung des Kronecker'schen Satzes), durch welche kleinste Anzahl accessorischer Irrationalitäten die Beziehung zur Ikosaedertheorie herstellbar ist und bis zu welcher Stelle die Anzahl

an diese Theorie ohne Benutzung einer accessorischen Irrationalität geführt werden kann. Es zeigt sich, dass eine accessorische Quadratwurzel unter allen Umständen ausreicht (so lange es sich nur um Bestimmung der Verhältnisse der fünf Wurzeln handelt, was in der Folge immer angenommen wird), und dass speciell bei den "Hauptgleichungen", d. h. solchen, welche die vierte und dritte Potenz der Unbekannten nicht enthalten, auch jene fortfällt. Die Stelle, an welcher die accessorische Quadratwurzel unvermeidlich wird, liegt also, wofern man an dem Gedankengange von Bring festhält, in der Reduction der allgemeinen Gleichung auf eine Hauptgleichung durch Tschirnhaus-Transformationen, während der Fortschritt gegen Bring darin besteht, dass Letzerer zur weiteren Transformation der Hauptgleichung in eine solche mit nur einem wesentlichen Parameter neue accessorische Irrationalitäten einführen zu müssen glaubte. Folgt man andererseits dem Gedankengange Kronecker's und leitet zunächst die Resolvente sechsten Grades mit drei Parametern, welche eine Jacobi'sche Gleichung ist, ab, so wird die Benutzung der accessorischen Quadratwurzel weiter hinausgeschoben, sie tritt nämlich alsdann erst bei der Reduction jener Resolvente auf die Ikosaedergleichung auf; es ist dies aber, wie Verf. zeigt, nur eine andere Anordnung derselben Schritte.

Im Einzelnen sind die Untersuchungen des zweiten Abschnittes folgendermassen gegliedert. Der historischen Uebersicht in Cap. I folgen in Cap. II geometrische Interpretationen der in der Gleichungstheorie auftretenden Berüffe, speciell der Tschirnhaus-Transformation und der Resolvente, nebst einem für das Spätere wichtigen Excurs über die Elemente der Liniengeometrie und die Flächen zweiten Grades. Auch die folgenden Capitel sind durchsetzt von geometrischen Deutungen, aus denen einige der folgenreichsten Ideen, welche sich in abstrakter Behandlung gewiss nur schwer dem Zusammenhange fügen würden, gleichsam von selbst und vollkommen fertig hervorgehen.

Cap. III behandelt die "Hauptgleichungen" fünften Grades, deren Zusammenhang mit der Ikosaedertheorie auf einen Schlag dadurch hergestellt wird, dass die fünf Wurzeln der gegebenen Gleichung $(y_0, y_1, \dots y_4)$ als Pentaedercoordinaten, welche durch die Relation $\Sigma y_i = 0$ verbunden sind, aufgefasst werden. Durch die Gleichung $\Sigma y_i^2 = 0$, welche neben der Relation $\Sigma y_i = 0$ für die Hauptgleichungen charakteristisch ist (indem sie das Pehlen der dritten Potenz der Unbekannten, wie jene das der vierten ausdrückt), ist alsdann eine Fläche zweiter Ordnung definirt; jedem Werthsystem der in der Hauptgleichung vorkommenden drei Coefficienten α, β, γ entsprechen 120, und wenn die Quadratwurzel aus der Discriminante (∇) ebenfalls noch gegeben ist, 60 Punkte der Fläche, welche aus einem derselben durch die geraden Vertauschungen seiner Coordinaten entstehen; je 60 zusammengehörige Punkte bestimmen immer zwei Gruppen von je 60 der geradlinigen Erzeugenden der Fläche. Denkt man sich nun die beiden

Schaaren geradliniger Erzeugender durch je einen variabeln Parameter λ definirt, welcher rational von den Coordinaten $y_0, \ldots y_4$ abhängt. so genügen bei geschickter Einführung des λ immer 60 zusammengehörige Werthe λ geradezu der Ikosaedergleichung, wenn in derselben für Z ein gewisser rationaler Ausdruck von α , β , γ , ∇ gesetzt wird. Die Wurzeln $y_0, \ldots y_4$ hängen schliesslich wiederum rational von α , β , γ , ∇ und λ ab (bis auf einen gemeinschaftlichen Factor, dessen Werth sich unmittelbar aus der Hauptgleichung selbst ergiebt). Hiermit ist die Reduction auf die Ikosaedergleichung bewerkstelligt.

Cap. IV enthält im Wesentlichen die Theorie der Jacobi'schen Gleichungen in ihrem Zusammenhange mit dem Ikosaeder. Als Ausgangspunkt wird indessen nicht jene Gleichung selbst gewählt, sondern ein Problem, welches sich aus den im V. Capitel 'des ersten Abschnittes angedeuteten allgemeinen Ideen ergiebt und vom Verfasser kurz das Problem der A genannt wird. Aus zwei Reihen binärer Variablen λ_1 , λ_2 und λ'_1 , λ'_2 , welche simultan den 60 Ikosaedersubstitutionen unterworfen gedacht werden, setzen sich die drei symmetrischen bilinearen Formen

 $A_0 = -\frac{1}{2}(\lambda_1 \lambda'_2 + \lambda_2 \lambda'_1), \quad A_1 = \lambda_2 \lambda'_2, \quad A_2 = -\lambda_1 \lambda'_1$

zusammen, welche entsprechend den Ikosaedersubstitutionen der A gewisse lineare Transformationen erleiden. Auf Grund der Entwickelungen des ersten Abschnittes wird das vollständige System invarianter Formen der A berechnet; dieselben entstehen, indem man aus den invarianten Ikosaederformen in λ_1 , λ_2 durch mehrfache Wiederholung des in der Invariantentheorie üblichen Polarisationsprocesses neue Formen bildet, welche nach den A und A' symmetrisch sind, und dann die A einführt. Man erhält so im Ganzen vier invariante Formen A, B, C, D, deren letzte jedoch der Quadratwurzel aus einem ganzen rationalen Ausdruck der ersten drei gleich ist. Es wird nun das Problem aufgestellt, aus den Grössen A, B, C, D die zugehörigen A, A, A zu berechnen. Dasselbe führt einerseits zur Bildung einer Resolvente sechsten Grades der A, welche die Form der Jacobi'schen Gleichung mit den drei unabhängigen Parametern A, B, C hat, und aus deren Wurzeln die A rational hervorgehen, sobald ausser A, B, C noch D gegeben ist. Andererseits lässt sich dasselbe Problem direct mit Hilfe der Theorie des Ikosaeders lösen, indem zunächst der Quotient 1 Wurzel der

Ikosaedergleichung ist, wenn in derselben Z durch eine gewisse rationale Function der Grössen A, B, C, D und der accessorischen Quadratwurzel \sqrt{A} ersetzt wird. Hiermit ist gleichzeitig auch die Reduction der allgemeinen Jacobi'schen Gleichung, welche als ein genaues Aequivalent des Problems

Cap. V enthält endlich die Auflösung der allgemeinen Gleichung fünften Grades nach zwei Methoden, nämlich durch Zurückführung erstens auf die in Cap. III behandelte Hauptgleichung, und zweitens auf des in Cap. IV

der A betrachtet werden kann, auf die Ikosaedergleichung geleistet.

discutirte Problem der A. Die erste Methode kann als eine Vereinfachung der von Bring, die andere als eine Modification der von Kronecker herrührenden angesehen werden. Auf beiden Wegen begegnen wir der accessorischen Quadratwurzel. Das Buch schliesst mit dem Beweise des von Kronecker 1861 ohne Beweis aufgestellten Satzes, dass ohne accessorische Irrationalität die Reduction auf einen einzigen Parameter unmöglich ist. Der Satz ergiebt sich hier als Folge einer im ersten Abschnitte (Cap. II) klargelegten Eigenschaft des Ikosaeders, wonach keine Gruppe von nur 60 binären Substitutionen existiren kann, welche mit der Gruppe der 60 nicht homogenen Ikosaedersubstitutionen isomorph wäre.

München, Januar 1885.

LUDW. SCHEEFFER.

Die darstellende Geometrie in organischer Verbindung mit der Geometrie der Lage. Von Dr. Wilhelm Fiedler. Dritte erweiterte Auflage. I. Theil: Die Methode der darstellenden und die Elemente der projectivischen Geometrie. Leipzig 1883, B. G. Teubner. gr. 8°. 376 S.

Bei der grossen Verbreitung des vorliegenden Werkes, welches unstreitig das inhaltsreichste seiner Art ist, aber auch, namentlich für das tiefere wissenschaftliche Studium, als bestes erscheint, dürfte es hier genügen, auf die Abänderungen und das neu Hinzugetretene hinzuweisen.

Der bis jetzt erschienene erste Theil behandelt die Methodenlehre und geht demgemäss bis S. 210 der zweiten Auflage; ihm sollen noch zwei andere Theile, "die darstellende Geometrie der krummen Linien und Flächen" und "die constructive und analytische Geometrie der Lage" folgen.

Die wesentlichste Bereicherung ist in der Aufnahme der cyclographischen Constructionen, anknüpfend an die Darstellung der cos Punkte des Rannes durch dieselbe Anzahl von Kreisen der Bildebene, zu erkennen, wie ie der Verfasser bereits in seiner Cyclographie (Leipzig 1882) gegeben hat. Wegen Weglassens dieser Theorie in der zweiten Auflage äussert sich der Verfasser in seiner Vorrede jetzt folgendermassen: "Damals (beim Erscheiven der zweiten Auflage. D. Ref.) glaubte ich noch an das baldige Erscheinen des im Jahre 1826 von J. Steiner als nahe druckbereit angekundigten Manuscripts (von 25 – 30 Bogen) "tiber das Schneiden (mit Einschluss der Berührung) der Kreise in der Ebene, das Schneiden der Kugeln im Raume und das Schneiden der Kreise auf der Kugelfläche", in welchem der auf die Kreis- und Kugelgeometrie bezügliche Theil der Consequenzen von der Einführung des Distanzkreises und der Benutzung der Centralprojection entwickelt gewesen sein müssten, und schloss alles dies von meinem Buche ans. Seitdem ist durch die von der K. Preussischen Akademie der Wissenschaften veranstaltete Ausgabe "Jacob Steiner's gesammelte Werke" (Berlin 1881, 2 Bde) ausser Zweifel gestellt worden, dass Manuscripte Steiner

aus jener Epoche nicht mehr vorhanden sind. Ich habe infolge dessen in meiner "Cyclographie" diesen Theil meiner Entwickelungen zunächst selbs ständig und elementar dargestellt, konnte und wollte ihn aber als ein wesentliches Stück der Ausgestaltung der Grundidee dieses Werkes nun auc in diesem selbst nicht unterdrücken. Die §§ 7, 36, (36a)—(36e) un eine Reihe von Bemerkungen des Ueberblicks zum Abschnitt B sind seine Einführung gewidmet und der zweite Band wird die Fortsetzung diese Anfänge bringen."

§ 7 bringt die Elemente. Jeder Punkt des Raumes wird, wie dange Centrum der Projection selbst, bestimmt durch seinen Distanzkreis, verweisehen mit dem Sinne der Uhrzeigerbewegung, oder dem entgegengesetztem zu je nachdem der Punkt auf derselben oder der dem Centrum abgewandte je nachdem der Bildebene sich befindet. Zwei Kreise bestimmen vier Gerade od zwei lineare Kreisreihen, je nachdem man ihnen einerlei oder entgegengesetzten Drehungssin beilegt. Die Spuren sind der Sussere oder inne gesetzten Drehungssin beilegt. Die Spuren sind der Sussere oder inne gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt. Die Geraden theilen sich in zwei Paa gesetzten Drehungssin beilegt.

Alle Kreise, welche einen gegebenen berühren, sind Bildkreise ei mes gleichseitigen Rotationskegels mit zur Tafel normaler Axe und dem gegebenen Kreise als Basis, oder, ohne Festsetzung des Sinnes vom Bildkreise, on den beiden möglichen Kegeln dieser Art. (Unter einem gleichseitigen Kegel ist hier der Rotationskegel von der Oeffnung 45° verstanden, im Gegensatz zu Herrn Schröter, welcher einen Kegel gleichseitig nennt, wenn ihm beliebig viele rechtwinklige Trieder eingeschrieben werden können.) Reducist sich der gegebene Kreis auf einen Punkt, so stellen alle Kreise durch des selben den gleichseitigen Rotationskegel mit jenem Punkte als Spitze

In den §§ (36) und (36a) werden die Brennpunktseigenschaften Kegelschnitte abgeleitet.* Die zu untersuchende Curve ist der Schnitt ther dem Distanzkreise stehenden gleichseitigen Rotationskegels, mit dem Centrum als Mittelpunkt und einer durch Spur und Fluchtlinie gegeben Ebene. Der Augpunkt ist ein Brennpunkt. Aus der Bemerkung, des durch einen solchen Kegelschnitt noch ein zweiter gleichseitiger Rotationskegel (für die Parabel wird dieser zur Ebene unter 45° gegen die Bil debene geneigt) geht, entspringt der Nachweis des zweiten Brennpunktes und die Entwickelung der hierher gehörigen Theile der Kegelschnittheorie e.

Die Untersuchung der Kreisbüschel und Kreisnetze führt in den §§ (36c), zu den gleichseitigen Hyperbeln und Hyperboloiden mit einer zur Tafel senkrechten Axe, deren Bilder sie sind. Der obenerwähnte Rotationskegel,

- 4

^{*} In den Quellen und Literaturnachweisungen sind die §§ (36)-(36e) istablich durch (35)-(35e) bezeichnet.

entsprechend den Kreisen durch einen Punkt, dem "konischen Netze", ist ein Specialfall; er bildet den Uebergang zwischen den beiden Arten von Hyperboloiden.

Aus zwei Kreisen eines Büschels in Verbindung mit dem Kreise eines Achnlichkeitspunktes als Mittelpunkt, dem "Potenzkreise", wird das Princip der reciproken Radien (Inversion) gewonnen, welches dann weiter zur Ableitung von Sätzen über Systeme von Kugeln, insbesondere über die stereographische Projection verwerthet wird. In § (36e) wird schliesslich noch einmal auf den Kegelschnitt im Raume zurückgegriffen und dargelegt, dass durch ihn ausser den zwei gleichseitigen Kegeln noch unendlich viele Rotationshyperboloide geben, wodurch dann der Zusammenhang der Theorie der Kegelschnitte mit jener der Kreisnetze herbeigeführt ist. Je zwei Hyperboloide mit parallelen Asymptotenkegeln schneiden sich ausser in einem unendlich fernen Kegelschnitte noch in einem zweiten Kegelschnitte, insbesondere also die in Betracht kommenden gleichseitigen. —

Eine Zugabe anderer Art enthalten die §§ 6* und 54*. Schon im Jahre 1879 hatte der Verfasser den Gegenstand derselben, die Centralprojection, in der IV. seiner "Geometrischen Mittheilungen" in Bd. 24 der Vierteljahrsschrift der Züricher naturforschenden Gesellschaft, dahin verallgemeinert, dass er an Stelle der unendlich fernen Ebene eine beliebige Fixebene U im Endlichen setzte, deren Punkte im Bilde dann die Rolle der Fluchtpunkte spielten. Daraus ergaben sich dann durch Annahme eines unendlich fernen Centrums ungezwungen die Parallelprojectionen mit einer Bildebene (vergl. ibid. S. 213 und § 43 vorliegenden Werkes).

Eine werthvolle neue Beigabe sind sechs lithographirte Tafeln. Auf Taf. I, II, III sind Büschel und Schaaren von Kegelschnitten dargestellt. Alle Hauptfälle sowohl hinsichtlich des Realität, als des Zusammenrückens der Fundamentalelemente sind zur Anschauung gebracht und zwar stets unter Angabe des Mittelpunktskegelschnittes bei jedem Büschel und der Linie der Mittelpunkte bei jeder Schaar. Taf. IV giebt in drei Figuren die Typen der dreiflächigen Abstumpfung der dreiseitigen körperlichen Ecke als Beleg des Satzes: Wenn drei Dreiecke für dasselbe Centrum centrisch collinear sind, so gehen die Collineationsaxen durch einen Punkt. Auf Taf. V ist die Construction der acht Kugeln, welche drei gegebene berühren, in Orthogonalprojection mit einer Fixebene U durchgeführt. Taf. VI giebt die Darstellung eines Krystalls in rechtwinkliger und allgemeiner Axonometrie und in Centralprojection, zur Vergleichung der Wirkung der nach diesen Methoden gewonnenen Bilder.

Die übrigen Erweiterungen haben ihren Grund zum Theil in einer größeren Ausführlichkeit des Textes und resumirenden Schlussbetrachtungen zu Ende verschiedener Capitel, zum Theil in der Vermehrung der Uebt beispiele; das Wachsen der Seitenzahl von 210 auf 376 mag eine stab für die Menge des Neugebotenen geben. Wir führen hi

- In § 4 ist die Theorie der Theilungspunkte und des Theilungskreises, ihrer Wichtigkeit für die praktische Perspective entsprechend, mehr hervorgehoben.
- § 15 soll dem Literaturverzeichnisse nach eine neue Construction für entsprechend gleiche Strecken in $\overline{\wedge}$ Reihen enthalten. Ref. findet nur der algebraischen Ausdruck für dieselben, wie in der zweiten Auflage.
- § 18 enthält Relationen, welche sich auf die zu den Doppelelementen in $\overline{\wedge}$ Strahlenbüscheln symmetrischen Elemente und die Rechtwinkelpaare beziehen. Eine besondere Figur mit sämmtlichen benutzten Buchstaben dürfte die Uebersicht wohl sehr erleichtern.
- § 20, 14 enthält eine zweckmässige Construction der Involution aus zwei einander entsprechenden Elementenpaaren mit Hilfe des vollständigen Vierecks, § 35, 8 eine solche des Krümmungshalbmessers eines Kegelschnittes im Genre der Pascal-Brianchon'schen.
- § 53 der orthogonalen Projection angehörig führt die Affinitätsaxen als Doppelstrahlen $\overline{\wedge}$ Strahlenbüschel auf* u. s. w.

Die folgenden Theile dürften, sofern der Schluss vom Bekannten auf zu Erwartendes gestattet ist, ebenfalls viel des Interessanten bringen.

Hannover.

Dr. CARL RODENBERG.

Die Elemente der projectivischen Geometrie. Von Dr. EMIL WEYR, o. ö Professor an der k. k. Universität Wien. Erstes Heft: Theorie der projectivischen Grundgebilde erster Stufe und die quadratischen Involutionen. Mit 58 Holzschnitten. Wien 1883, Wilhelm Braumtiller.

Das Werk ist in erster Linie für die Hörer der Vorträge des Verfassers bestimmt, wird sich aber voraussichtlich durch seine Klarheit und durchweg wissenschaftliche Strenge auch weitere Kreise erschliessen.

Folgende Uebersicht des Inhalts wird den Lehrgang charakterisiren.

Einleitung. Perspectivische Lage der geometrischen Grundelemente. Eintheilung der Grundelemente.

I. Capitel: Bestimmung der Elemente der Grundgebilde erster Stufe. Theilverhältnisse in den Punktreihen, im Strahlen- und Ebenenbüschel. Harmonische Elemente. — II. Capitel: Das Doppelverhältniss. — III. Capitel: Vollständige Figuren. Harmonische Eigenschaften des vollständigen Vierseits und des vollständigen Vierecks. — IV. Capitel:

^{*} Ich benutze diese Gelegenheit, um eine Ungenauigkeit in meiner Recension von Reuschle's "Deckelementen" zu berichtigen. Daselbst hatte ich nun die Affinitätsaxen, d. h. jene Geraden, deren Projectionen sich decken, als bekannt bezeichnet. In der That finden sich aber schon in der zweiten Auflage des vorliegenden Werkes die übrigen Deckelemente, wenn auch nicht in ihrer principiellen Bedeutung erwähnt. Vergl. §§ 46; 47, 10, 14; 49, 5; 50, 8, 8; 54, 4, 5.

Die Sätze von Carnot und Ceva für ebene und räumliche Polygone. — V. Capitel: Die perspectivische Raumansicht. Betrachtung der unendlich fernen Elemente. — VI. Capitel: Reciprocitätsgesetz und Elementenbestimmung in den Grundgebilden höherer Stufe. - VII. Capitel: Perspectivische Gebilde. — VIII. Capitel: Projectivische Gebilde. — IX. Capitel: Aehnliche und congruente Gebilde. — X. Capitel: Conlocale projectivische Gebilde. Doppelelemente. Die unendlich fernen Kreispunkte. Der imaginäre Kugelkreis. — XI. Capitel: Der Kreis. Doppelverhältniss von vier Punkten und Tangenten. Polareigenschaften. Kreisvierecke. Mittelpunkt und Durchmesser. - XII. Capitel: Die Involutionen. -- XIII. Capitel: Allgemeinere Auffassung der Projectivität. Das Doppelverhältniss, ausgedrückt durch Werthe eines eindeutigen Parameters. Zwei Projectivitäten auf einem Träger. — XIV. Capitel: Cyklische Projectivität. — XV. Capitel: Harmonische Mittelpunkte eines Tripels. Harmonische Mittelpunkte ersten und zweiten Grades und deren Verwandtschaft. Harmonische und äquianharmonische Quadrupel. -XVI Capitel: Rechnungsoperationen mit Theilverhältnissen.

Der Verfasser wird sicher im Vortrage nicht versäumen, die Studirenden auf die späteren Anwendungen der behandelten Beziehungen zwischen den Grundelementen aufmerksam zu machen, um damit zunächst eine ungefähre Vorstellung ihrer ausserordentlichen Wichtigkeit den Anfängern beizubringen. Einige diesbezügliche Worte im Buche würden sicher geeignet sein, das Interesse des Lesers an der Sache bedeutend zu erhöhen.

Ein paar Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind, wollen wir nicht unerwähnt lassen.

Auf S. 5 wird der Raum irrthümlich als dreidimensional, auch in Bezug auf die Gerade als Raumelement angeführt. Die dortigen Auseinandersetzungen über die Zahl der Elemente bedürfen einer Correctur.

Die Methode zur Herstellung der perspectivischen Lage eines Strahlenbüschels und eines ihm projectivischen Ebenenbüschels (S. 74) möchten wir nicht adoptiren. Es wird zu dem Endzweck ein Ebenenbüschel construirt, von dem drei (und dann alle) Ebenen dieselben Winkel miteinander bilden, wie die entsprechenden Strahlen des Strahlenbüschels. Hierbei ergiebt sich die Axe des gesuchten Ebenenbüschels als Schnittlinie zweier Kegelflächen zweiter Ordnung, welche eine Erzeugende gemein haben. Aber diese Flächen sind noch gar nicht behandelt, und es ist insbesondere nicht einzusehen, dass eine Axe existirt. Diese Beweise könnten allerdings nachgetragen werden, aber der Uebelstand einer unbequemen constructiven Verwendbarkeit der Methode würde bleiben. Das bekannte Verfahren mit Benutzung der entsprechenden rechten Winkel ist übrigens ja einfach genug.

Hannover.

Dr. CARL RODENBERG.

Die Elemente des graphischen Rechnens, mit besonderer Berücksichtigung der logarithmischen Spirale. Eine Anleitung zur Construction algebraischer und transcendenter Ausdrücke für Bau- und Maschinentechniker, sowie zum Gebrauche an höheren Gewerbeschulen. Von Anton Steinhauser, k. k. Professor an der Staatsgewerbeschule in Wien. Wien 1885, Alfred Hölder. 8 Bogen gr. 8°. Preis 2 Mk. 80 Pf.

Der Herr Verfasser behandelt in dem vorliegenden Werkehen unter der Voraussetzung elementarer mathematischer Kenntnisse die Grundoperationen des graphischen Rechnens in klarer, leicht verständlicher Sprache. Derselbe geht davon aus, dass eine Zahl durch das Verhältniss zweier Strecken darstellbar ist, führt die Multiplication, Division u. s. w. mit Hilfe eines rechtwinkligen Axenkreuzes durch, giebt eine recht praktische Construction für das Ausziehen dritter Wurzeln, verwendet zum Ausziehen beliebiger Wurzeln die Potenzcurven von Joseph Schlesinger. Hierauf entwickelt er die Operationen mittels der logarithmischen Spirale, was nicht, wie gewöhnlich, ungenügend, sondern sehr eingehend auf das Wesen der Curve geschieht, indem er, unter Ausschluss höherer analytischer Hilfsmittel,

seinen Auseinandersetzungen die Gleichung $\varrho = b^{\frac{1}{180}}$ zu Grunde legt, wobei b den nach einer Drehung um 180° auf eo folgenden Fahrstrahl bedeutet, abgesehen von der Krümmung, die hauptsächlichsten Eigenschaften dieser Curve zuerst durchsichtig erläutert. Die Spirale wird sodann in verschiedener Weise verzeichnet, ohne specielle Bedingung, bei gegebenem Längenverhältnisse zweier um den Polarwinkel m differirender Leitstrahlen, durch Berechnung der Fahrstrahllängen für gegebene Polarwinkel und Auftrag dieser Längen mittels des Transversalmaassstabes. Darauf wird das graphische Rechnen mit dieser Curve vorgeführt. Ein weiterer Abschnitt ist den arithmetischen und geometrischen Reihen erster Ordnung gewidmet, im letzteren Falle wieder auf die logarithmische Spirale zurückkommend, und der Zinseszinsenrechnung. Hieran schliesst sich die graphische Darstellung von Verhältnissen und Proportionen. Die Auflösung der Gleichungen ersten und zweiten Grades mit einer und mehreren Unbekannten fehlt nicht. Auch der Grundoperationen mit imaginären Zahlen wird gedacht. Der Abschnitt über die goniometrischen und cyclometrischen Functionen gegebener Winkel hat einen Anhang, welcher sich mit der Rectification des Kreises, der Messung und Construction eines gegebenen Winkels mittels der Sehnenlänge befasst. Das Letz-

tere geschieht auf Grund der Formel $a=2r\sin\frac{\alpha}{2}$, wo α den fraglichen

Winkel, a die zum Bogen vom Radius r gehörige Sehne zwischen den Winkelschenkeln bedeutet, und ist die erforderliche Sehnentabelle für einen Halbmesser von fünf Einheiten berechnet. Den Schluss des Ganzen bildet das Wichtigste fiber die Berechnung ebener Flächen. Die Anwendung des

Vorgetragenen auf Mechanik etc. ist unterblieben, was bisher bei solchen Abhandlungen immer geschah.

Der Herr Verfasser hat die Grundoperationen, indem er nur wenige Constructionsmethoden, dem Zwecke entsprechend, anführte, in möglichst gedrängter und dabei durchsichtiger Form gegeben. Dadurch ist der Lernende an der Hand seines Buches in den Stand gesetzt, sich (auch ohne Lehrer) mit den Elementen des graphischen Rechnens ohne unnützen Zeitaufwand vertraut zu machen.

Lediglich um für diesen Gegenstand ein höheres Interesse schon jetzt zu erwecken, gestatte ich mir unter der Mittheilung, dass ich gegenwärtig das geometrische Rechnen einer eingehenden Bearbeitung unterziebe, welche Arbeit ausschliesslich für Hochschulen bestimmt ist und in einiger Zeit veröffentlicht werden wird, einige weitergehende Bemerkungen.

Das graphische Rechnen ist nur ein Theil des geometrischen Rechnens, des Rechnens mit Strecken und Punkten, nämlich derjenige Theil, welcher sich mit den Operationen im einpoligen, lineären Strecken- oder Zahlensysteme zu befassen hat. Bisher legte man dem graphischen Rechnen nicht die Bedeutung bei, welche ihm in der That zukommt. Es handelt sich nicht mehr darum, nur den Inhalt einer gegebenen Fläche oder eines gegebenen einfachen Körpers graphisch zu bestimmen; vielmehr ist es unsere Aufgabe, nach Methoden zu suchen, durch welche auf einfachem Wege zusammengesetzte, gesetzmässige algebraische und transcendente Ausdrücke bequem graphisch berechnet werden können, indem dasselbe ein Hilfsmittel zur Construction von Curven ist, für welche sich durch ihre Gleichungen keine einfachen geometrischen Gesetze angeben lassen. Derartige Curven sind z. B. zu verzeichnen, wenn es sich um die Construction der Curven der Beschleunigungscentra sich bewegender Systeme handelt. Ein einfaches Beispiel hierfür findet der Leser in meiner Sammlung von Problemen für die analytische Mechanik. Bd. I S. 412 flgg.

Auch die Gleichungen höheren Grades bedürfen der graphischen Lösung. Herr Professor Reuschle hat bereits eine graphisch-mechanische Methode zur Auflösung der numerischen Gleichungen veröffentlicht. Derselbe benutzt parabolische und hyperbolische Curven, die auch bei dem graphischen Potenziren eine Rolle spielen, construirt aber diese Curven nach der gewöhnlichen Methode, was durch rein geometrisches Verfahren bequemer geschieht, und nimmt nur auf die reellen Wurzeln Rücksicht. Die goniometrischen Relationen spielen auch eine Rolle im graphischen Rechnen, welches an den Gleichungen $\sin\left(\alpha+\beta\right)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$ und $y=a\sqrt{1-b^2}+b\sqrt{1-a^2}$ sofort erkannt werden kann. Herr Josef M. Solin hat einen Beitrag zur graphischen Internation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphische Differentiiren un Internation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphische Differentiiren un Internation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphische Differentiiren un Beitrag zur graphischen Linternation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphische Differentiiren un Internation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphische Differentiiren un Beitrag zur graphischen Linternation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphischen Differentiiren un Beitrag zur graphischen Linternation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphischen Differentiiren un Beitrag zur graphischen Linternation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphischen Differentiiren und Linternation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphischen Differentiiren und Linternation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphischen Differentiiren und Linternation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphischen Differentiiren und Linternation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphischen Differentiiren und Linternation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphischen Differentiiren und Linternation schon im Jahre 1872 geliefert. Das graphischen Linternation der Linter

die gauze Curve durch weitere Curven darzustellen, Curven für ihre Tangentenlänge, Normalenlänge u. s. f. zu verzeichnen, wodurch namentlich der Anfänger ein klares Bild von dem Wesen der fraglichen Function erhält, was leicht auf arithmographischem Wege geschehen kann.

Heidelberg, im Februar 1885.

FERDINAND KRAFT.

Lehrbuch der ebenen und sphärischen Trigonometrie mit Anwendungen auf praktische Geometrie und sphärische Astronomie und zahlreichen Uebungsbeispielen Zum Gebrauch in höheren Lehranstalten und beim Selbstunterricht bearbeitet von E. Hammer, Professor am kgl. Polytechnikum in Stuttgart. Stuttgart 1885, Verlag der J. B. Metzler'schen Buchhandlung. X, 312 S.

Wenn wir das uns vorliegende Buch geradezu als ein Musterwerk bezeichnen, dem wir die weiteste Verbreitung wünschen und hoffen, so möchten wir diesen Ausspruch unserer innigsten Ueberzeugung nicht gern wieder einengen. Wir fürchten aber auch eine solche Auslegung nicht für den Zusatz, den wir beifügen, die höheren Lehranstalten, an deren Schüler und Lehrer Herr Hammer sich richtet, seien doch wohl solche, welche über den sogenannten Mittelschulen stehen. Studirende an Universitäten und Polytechniken, das sind nach unserem Dafürhalten die richtigen Leser für diese Trigonometrie, welche die darin herrschende Vollständigkeit, die Strenge der angewandten Beweisführungen, die Vortheile der gelehrten praktischen Rechnungsvorschriften zu würdigen im Stande sind. Wende man uns nicht ein, diese jungen Leute hätten Anderes zu thun, als Trigonometrie zu lesen. Einer gewöhnlichen Schultrigonometrie werden sie allerdings ihre Zeit nicht widmen, aber so gut Vorlesungen über Trigonometrie — wir sprechen aus eigener Erfahrung - Zuhörer finden können, ebenso gut wird es dem Buche des Herrn Hammer nicht an Lesern fehlen, wie wir sie bezeichneten. Sie werden sich nicht daran stossen, dass S. 28 dem directen

Nachweise des Satzes, dass $tg\frac{\alpha}{2}$ und $cotg\frac{\alpha}{2}$ stets dasselbe Vorzeichen wie

 $sin \alpha$ haben, eine indirecte Ableitung der Gleichung $tg \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - cos \alpha}{sin \alpha} = \frac{sin \alpha}{1 + cos \alpha}$ vorgezogen ist, bei welcher die Zweideutigkeit einer Quadratwurzel vernachlässigt ist, beiläufig der einzige Verstoss gegen die Strenge, der uns aufgefallen ist. Sie werden auch den Luxus des Accents bei dem Namen Legendre, so oft derselbe wiederkehrt, verzeihen. Sie werden dagegen mit Vergnügen S. 23 den auf der Umwandlung geradliniger Coordinaten in einander und in Polarcoordinaten beruhenden Beweis des allgemeinen Additionstheorems der Winkelfunctionen, sowie S. 211 die durchaus ähnlich geführte allgemeine Ableitung der Grundgleichung der sphärischen Trigese-

٠.

metrie kennen lernen. Verweilen werden sie bei dem ganzen 3. Capitel des I. Abschnittes, das den goniometrischen Gleichungen gewidmet ist, verweilen S. 97 flg. bei der Maskelyne'schen Regel, S. 215 bei dem nicht allgemein giltigen, aber sehr eleganten Beweis der schon erwähnten Grundgleichung der sphärischen Trigonometrie mittels eines aufgeklappten Dreikants, verweilen bei den im 3. und 4. Capitel des III. Abschnittes vereinigten Aufgaben aus der Geodäsie und Astronomie.

Wo der eine oder andere Leser noch ausserdem besonderes Vergnügen empfinden mag, das beruht ja auf persönlicher Geschmacksverschiedenbeit, aber Vergnügen dürfen wir Jedem versprechen, der mit diesem Buche sich näher bekannt macht.

CANTOR.

Die Elemente der Arithmetik als Vorbereitung auf die Functionentheorie. Von Dr. Max Simon, Oberlehrer am Lyceum zu Strassburg. Strassburg 1884, R. Schultz' & Comp. Verlag. VII, 77 S.

Ein dem Referenten geläufiger Satz, den er in verschiedenen geschichtlichen Untersuchungen bestätigt fand, ist der von der conservativen Kraft der Unwissenheit. Anders ausgedrückt besagt derselbe, dass es immer eine verhältnissmässig lange Zeit gebraucht hat, bis wissenschaftlich Erkanntes zum Volkseigenthum wurde. Der Schule im Allgemeinen ist die Aufgabe gestellt, diese Verbreitung des geistigen Vermögens Einzelner unter der Gesammtheit zu vermitteln, und je besser die Schule wird, um so rascher geht die Verbreitung vor sich. Ein treffendes Beispiel solcher Beschleunigung bieten, wie wir mit einigem berechtigten Stolze rühmen dürfen, die neuesten deutschen Lehrbücher der Geometrie wie der Arithmetik. Die Schulgeometrie nimmt bereits Dinge in sich auf, die vor einem halben Jahrhundert noch wenigen Synthetikern bekannt waren, wenn sie überhaupt schon entdeckt waren, und heute liegt uns eine Schularithmetik vor, welche sich nicht scheut, auf Untersuchungen von solcher Feinheit einzugehen, dass sie seither Universitätsvorlesungen vorbehalten blieben, und zwar solchen, deren Zuhörer die ersten Studiensemester schon hinter sich hatten. Herr Simon damit einen glücklichen Griff gethan? Giebt es Gymnasial-Primaner — denn nur an solche Schüler ist selbstverständlich zu denken —, welche fähig sind, bei dem mit ihnen vorzunehmenden Wiederholungsgange der Zahlenlehre die strengen Beweise neuester Forschung zu verstehen und denselben Interesse abzugewinnen? Wir sind zweifelhaft, wie die Erfahrung, die allein berechtigt ist, auf diese Fragen zu antworten, sich darüber aussprechen wird. Herr Simon selbst theilt wohl diese Zweisel. Darauf weist uns der Satz seines Vorwortes hin, das Heft sei bestimmt "hauptsächlich für Collegen und Studirende, dann aber auch für die Schüler der oberstess Classe Lassen wir aber diese Letzteren bei Seite, so können wir,

jede weitere Erfahrung abzuwarten, das kleine Schriftchen mit vollem Einverständniss auf's Wärmste empfehlen. Studirenden, welche Functionentheorie zu hören beabsichtigen, dürfte hier eine fesselnde und fruchtbare Einleitung in die ihnen neue Lehre sich bieten, welche sie zugleich zum Lesen der Abhandlungen von Herrn Georg Cantor vorbereitet und sie auf dieselben hinweist. Wenn Herr Simon in einigem Gegensatze zu unserem Namensverwandten den Begriff der Grenze als ererbt und in diesem Sinne als erfahrungsmässig gegeben und einer weiteren formalen Begründung nicht mehr bedürftig ansieht, so sind wir die Letzten, die ihm einen Vorwurf daraus machen möchten. Einen Auszug aus einem selbst schon so knapp gehaltenen Büchelchen zu geben ist kaum thunlich. Wir bemerken nur, dass die Entwickelung bis zu der Lehre von den Exponentialfunctionen, diese mit eingeschlossen, geführt ist, dass ein Fortschreiten bis zur Lehre von den Gleichungen höherer Grade nur als daran gescheitert bezeichnet wird, dass noch kein elementarer Beweis des Gauss'schen Fundamentalsatzes der Algebra bekannt sei. Wir möchten einige Stellen als solche hervorheben, die uns ganz besonders zusagten. Dazu gehört der Name Theileinheit Nr. n (S. 17), unter welchem die Ergänzung der Reihe der ganzen Zahlen zur Reihe der Brüche ergänzt wird; dazu die Betonung des verschiedenen Sinnes, welchen wir mit dem Gleichheitszeichen verbinden (S. 19, 24, 42); dazu den Beweis des Satzes, dass die nicht ganzzahlige positive nto Wurzel einer ganzen positiven Zahl als Reihenzahl existire (S. 37 flgg.); dazu das ganze Capitel XI von den quadratischen Gleichungen (S 45-50) und in ihm der Ausblick auf Umkehrungsprobleme (S. 48). Nicht einverstanden sind wir mit der Benennung der beiden Sätze (S. 10 und 30) als Grundsätze. Grundsätze sind solche, deren Wahrheit als einleuchtend angenommen werden muss, weil sie nicht bewiesen werden kann. In diesem Sinne ist es aber weder wahr, dass die neuen Zahlen jeweil den Gesetzen der alten unterworfen bleiben, noch dass zu gewissen Vorstellungsreihen, welche an sich keinen Abschluss haben, ein Abschluss zu denken sei. Beides sind Forderungen, wenn man sie nicht geradezu Definitionssätze nennen will. Leicht zu verbessernde Druckfehler sind uns nur S. 35 Z. 11 und S. 45 Z. 17 aufgefallen. CANTOR.

System der Arithmetik und Algebra als Leitfaden für den Unterricht in höheren Schulen. Von Dr. Hermann Schubert, Oberlehrer an der Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg. Potsdam 1885, Verlag von August Stein. VIII, 222 S.

Wir haben in dieser Zeitschrift, hist-lit. Abth. zu Bd. XXVIII S. 199 und zu Bd. XXIX S. 114, über eine in zwei Heften erschienene Sammlung von arithmetischen und algebraischen Fragen und Aufgaben des gleichen

Verfassers berichtet. Nicht minder lobend als wir, haben auch andere Stimmen über jene Schrift sich geäussert, so dass an Herrn Schubert die Aufforderung gelangte, der Einführbarkeit seines Buches an Lehranstalten, an welchen andere Aufgabensammlungen in Uebung sind, welche nicht verdrängt werden können oder wollen, dadurch Vorschub zu leisten, dass er den Text von den Uebungsbeispielen trenne. Der vor uns liegende Band erfüllt nun diesen Wunsch. Hat auch das Buch dadurch von der Eigenartigkeit eingebüsst, welche ihm unserem Dafürhalten nach zur Zierde gereichte, so ist doch Strenge und Fasslichkeit unverändert geblieben. Erstere dürfte noch einen Zuwachs zu rühmen haben, da der neue Abdruck als eine zweite Auflage zu betrachten ist, in welcher einzelne kleine Ausstellungen, welche gemacht worden waren, Berücksichtigung gefunden haben.

Die Determinanten, für den ersten Unterricht in der Algebra bearbeitet Dr. H. Kaiser in Dieburg. Wiesbaden 1885, Verlag von J. F. Bergmann. 23 S.

Wir haben Bd. XXVIII, hist-lit. Abth. S. 77, eine kleine Schrift über Determinanten des gleichen Verfassers angezeigt, welche in ihren Anforderungen an den Leser schon recht niedrig gehalten war. Heute überbietet sich Herr Kaiser. Auf annähernd halbem Raume giebt er einige Sätze über Determinanten, die kaum die Vorkenntnisse eines Gymnasialtertianers voraussetzen. Vielleicht steht uns noch ein Büchelchen "Die Determinanten zur Einübung des Einmaleins in der Volksschule" von zwölf Seiten bevor! Im Ernste meinen wir, so sehr wir der Einführung der Determinanten in den Gymnasialunterricht geneigt sind, der aber schon nicht mehr das Wort zu reden, da sie an den meisten Orten bereits erfolgt ist, man könne doch auch in der Popularisirung zu weit gehen. Den mathematischen Unterricht leicht machen ist recht, ihn allzuleicht und mechanisch machen widerspricht seinen pädagogischen Zwecken.

Meuer Unterricht in der Schnellrechen-Kunst für technische, kaufmännische und Schulpraxis in zwei Theilen. I. Theil: Methode der symmetrischen Multiplication, Division und Wurzelausziehung. II. Theil: Anweisung zum Gebrauch eines auf diese Methode gegründeten Rechenapparates. Von C. Jul. Giesing, Oberlehrer an der königl. Realschule Döbeln. Döbeln 1884, Verlag von Carl Schmidt. VI, 92 S. und in demselben Verlage: C. J. Giesing's Patent-Rechenapparat.

Symmetrische Multiplication nennt der Verfasser nach dem Vorgange Fon Herrn E. Gallati (1878) dasjenige Verfahren, welches apätestens im Mist-lit. Abthig. d. Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXX, 3.

VI. Säculum als Vajråbhyasa bei den Indern bekannt war und welches sich in Europa, besonders in Italien bis in das XVI. Säculum zu erhalten wusste. Von da an verlor sich allmälig die Uebung, und nur das Rechnen mit Reihen, die nach Potenzen einer allgemeinen Grundgrösse fortschreiten, wusste sich des alten Verfahrens zu erinnern, beziehungsweise erfand dasselbe wiederholt, wenn es, $(a_0 + a_1 x + \dots) \cdot (b_0 + b_1 x + \dots) = c_0 + c_1 x + \dots$ und $c_n = b_n a_0 + b_{n-1} a_1 + \ldots + b_0 a_n$ setzend, die Regel gab, man solle die Glieder des Multiplicators in umgekehrter Reihenfolge auf einen besondern Zettel schreiben und denselben unter dem Multiplicandus herschieben, dabei die jedesmalige Productenstelle durch Vervielfachung der senkrecht unter einander befindlichen Factoren und Addition ihrer Theilproducte bilden. In dieser Form lernte Referent die auch an Zahlen geübte Methode in den Vorlesungen über algebraische Analysis kennen, welche er im Wintersemester 1849 — 50 bei Professor M. Stern in Göttingen zu hören Gelegenheit hatte. Mag auch inzwischen durch Werke geschichtlichen Inhalts die Aufmerksamkeit auch in weiten Kreisen auf jenes alte Verfahren gelenkt worden sein, für die Schule blieb es so ziemlich verschollen, und wir würden uns freuen, wenn Herrn Giesing's Buch und sein patentirter Rechenapparat - eine Schiefertafel, in welcher ein Streifen verschiebbar ist und den vorerwähnten besondern Zettel vertritt — zur allgemeinen Einbürgerung führen möchte. Herr Giesing lehrt nach der symmetrischen Multiplication auch eine symmetrische Division. Das ist das Verfahren, welches Fourier in seiner Analyse des équations déterminées p. 187 (Paris 1830) als geordnete Division beschrieb und welches in ziemlich zahlreiche Elementarwerke, aber wieder nicht in den Schulunterricht Eingang zu finden vermochte. Endlich benützt der Verfasser seinen Apparat, also den Schieber, der das Wesen desselben bildet, zur Ausziehung von Quadratwurzeln. CANTOR.

Beitrag zur analytischen Behandlung der Umhüllungscurven. Von Wilh. Krimphoff. Coesfeld 1885. 16 S. 4°.

Bei Anwendung Cartesischer Punktcoordinaten sehen wir in den aufeinanderfolgenden Punkten einer Curve Durchschnitte gegebener linearer Gebilde, bei Liniencoordinaten erkennen wir in demselben Berührungspunkte mit jeweil gegebenen Geraden. So ist an sich klar, dass das natürliche Coordinatensystem zur Behandlung von Umhüllungsaufgaben nur das der Liniencoordinaten sein kann. Herr Krimphoff hat sich in seinem Programm deren bedient, und zwar der von Herrn Schwering erfundenen und in einem bekannten Buche (vergl. Referat in hist.-lit. Abthlg. dieser Zeitschrift Bd. XXIX S. 233) genauer auseinandergesetzten Abart. Herr Krimphoff hat nun allerdings nicht durchweg Schwering'sche Liniencoordinaten angewandt, und wir rechnen ihm dieses als Verdienst an. Wahre

Eleganz besteht nicht in dem unentwegten Verbleiben auf demselben Pfade, sondern in dem Benutzen des jedesmal Zweckdienlichsten, mag auch ein Wechsel der Hilfsmittel damit verbunden sein. So treten bei unserer Vorlage die Liniencoordinaten nur da, dann aber auch immer ein, wo die Gleichung der Geraden, welche die gesuchte Curve umhüllen soll, in Punktcoordinaten bereits gegeben ist. Hauptaufgabe ist ihm die Auffindung und Discussion der Umhüllungscurven gewisser Sehnen centraler Kegelschnitte. Allein nebenbei beweist er noch eine ziemliche Anzahl interessanter Sätze von Kegelschnitten selbst, so den Joachimsthal'schen Satz (Salmon-Fiedler, Kegelschnitte, S. 307 und nicht 327, wie irrig citirt ist), dass für die vier Schnittpunkte einer Ellipse oder einer Hyperbel mit einem Kreise die Summe der Argumente gleich Null sein muss. Herrn Krimphoff's mehr algebraischer als geometrischer Beweis ist sehr hübsch. Die Correctheit des Druckes lässt leider Manches zu wünschen übrig, und wenn die Irrthümer in den Formeln auch leicht zu verbessern sind, so stören sie darum nicht minder.

Histoire des sciences mathématiques et physiques. Par M. MAXIMILIEN MARIE, répétiteur de mécanique, examinateur d'admission à l'école polytechnique. Tome IV: De Descartes à Huyghens. 246 pages. Tome V: De Huyghens à Newton. 255 pages. Paris, Gauthier-Villars imprimeur-libraire, 1884.

Wieder sind zwei Bände des umfangreich angelegten Werkes in unseren Händen. Descartes, Cavalieri, Roberval, Fermat, Torricelli, Wallis, Pascal, Huyghens, Newton sind die Namen derjenigen Mathematiker, welchen der Verfasser den meisten Raum widmet, sich dadurch in Uebereinstimmung mit der Anerkennung setzend, welche Zeit-Senossen und Späterlebende diesen Männern mit Recht widmeten. Herr Marie hat - das geht aus der ganzen Darstellung zweifellos hervor die Schriften dieser Männer gelesen und, wie es bei seiner von Niemand Verkannten mathematischen Bedeutung nur natürlich war, auch zu verstehen Sewasst, so viele Schwierigkeiten ihm manchmal der durchaus ungewohnte Wortlant bereiten mochte. Er ist nicht der Einzige, dem diese Schwierig-Keit sich darbot, nicht der Erste, der sie überwand, und hätte er in der In thematisch-geschichtlichen Literatur neuerer Sprachen Rundschau gehalten, So hatte er vielleicht manche Mühe erspart. Im Ganzen finden wir nichts Von den Worten zurückzunehmen, mit welchen wir Bd. XXIX, hist.-lit. Abthlg. S. 45, den Bericht über die beiden ersten Bände schlossen: "Wir hoffen auf Besseres in den späteren Bänden, in welchen Herr Marie sich mit Schriftstellern zu beschäftigen haben wird, deren Werke er selbst ge lesen hat."

Bei dem Lesen der Werke eines Schriftstellers bilden sich fast unbewusst Neigungen und Abneigungen, über die kaum zu rechten ist. hat Herr Marie, wie es scheint, eine grössere Vorliebe für Descartes, als für Fermat gefasst, während Referent in entgegengesetztem Sinne Licht und Schatten zu sehen sich gewöhnt hat. Dadurch sind unsere Anschauungen von dem Charakter des Jesuitenzöglings Descartes einander sehr widersprechend, die mathematische Grösse des Verfassers der analytischen Geometrie bewundern wir gleichmässig. Mögen auch Vorstufen in der analytischen Geometrie von Diesem und Jenem erreicht worden sein, ein wirkliches Operiren mit den Gleichungen einer Curve hat vor Descartes Niemand der Oeffentlichkeit übergeben. Andererseits hüte man sich aber wohl, in dessen Geometrie ein Lehrbuch modernen Schnittes zu vermuthen, ausgehend von der Gleichung der Geraden, daran anknüpfend die Gleichungen des Kreises, des Kegelschnittes u. s. w. Descartes schrieb absichtlich scheinbar planles, ungeordnet und dadurch schwer, weil, wie er in einem Briefe sich ausdrückt, die Leute Dinge, die sie verstehen, nicht als neu anzuerkennen pflegen. Diese mangelnde Ordnung macht es sogar dem heutigen Leser schwer, sich zurecht zu finden, und Herr Marie hat vielleicht nur ihretwegen übersehen oder hervorzuheben vergessen, was eines der wichtigsten Verdienste von Descartes ist: die Erfindung der Methode der unbestimmten Coefficienten, gerade so, wie er bei Pascal die Nennung der von diesem erfundenen Beweismethode von n auf n+1 vermissen lässt. Auch die Anfänge der Wahrscheinlichkeitsrechnung mussten, sei es bei Pascal, sei es bei Huyghens, in einer annähernd den Weg dieser Erfinder veranschaulichenden Weise zur Kenntniss der Leser gebracht werden. und dass unter den zahlentheoretischen Arbeiten von Fermat gerade das Theorem nicht genannt ist, welches die Unmöglichkeit der Gleichung $x^n = y^n$ $+s^n$ mit ganzzahligen Wurzeln betrifft, sofern n>2, während der Sonderfall n=3 (IV, 105 letzte Zeile) erwähnt ist, kann einigermassen erstaunen.

Wir haben nur diese grossen Lücken aufdecken wollen; kleinere Mängel beabsichtigen wir nicht zu betonen, wozu der IV. Band sehr häufig, der V. Band etwas seltener Gelegenheit böte. Es handelt sich weniger oft als in den früheren Bänden um Unrichtigkeiten, vielmehr meistens nur um Vernachlässigung bedeutsamer Dinge, und was Herr Marie an Auszügen liefert, ist, wenn nicht immer vollständig, doch für die wichtigsten Schriften namentlich von Huyghens und Newton richtig.

Bibliographie

vom 16. Februar bis 30. April 1885.

Periodische Schriften.

Sitzungsberichte der mathem.-physikal. Classe der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1884, Heft 4. München, Franz. 1 Mk. 20 Pf. -. Jahrg. 1885, 1. Heft. Ebendas. 1 Mk. 20 Pf. Sitzungsberichte der königl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, mathem.physikal. Classe. 1884, I und II. Leipzig, Hirzel. Sitzungsanzeiger der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, mathemat.-naturwissenschaftl. Classe. Jahrgang 1885, Nr. 1-4. Gerold. compl. 3 Mk. Annalen des physikalischen Centralobservatoriums; herausgeg. von H. Wild. Jahrg. 1883, Thl. 1 u. 2. Petersburg und Leipzig, Voss. 25 Mk. 60 Pf. Archiv der Mathematik und Physik, begründet von GRUNERT, fortgesetzt von R. Hoppe. 2. Reihe, 2. Theil (4 Hefte), 1. Heft. Leipzig, Koch. compl. 10 Mk. 50 Pf. Acta mathematica, herausgeg. v. MITTAG-LEFFLER. 5. Jahrg. 1885, 1. Heft. Berlin, Mayer, & Müller. compl. 12 Mk. Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, herausgeg. von C. Ohrt-MANN. 14. Bd., Jahr 1882, 2. Heft. Berlin, G. Reimer. Astronomische Nachrichten, herausgeg. v. A. Krüger. 111. Bd. Nr. 2641. Hamburg, W. Mauke Söhne. compl. (24 Nrn.) 15 Mk. Fortschritte der Physik im Jahre 1879. (35. Jahrg.) Redig. v. Neessen. 8 Mk. Abth. Berlin, G. Reimer. Die Fortschritte der Physik. Nr. 8, 1884. Köln, Mayer. 2 Mk. Meteorologische Zeitschrift der deutschen meteorolog. Gesellschaft, redig. v. W. KÖPPEN. 2. Jahrg. 1885 (12 Hefte). 1. Heft. Berlin, Asher & C. compl. 16 Mk. Gezeitentafeln für das Jahr 1886. Hydrogr. Amt der kaiserl. Admiralität. 1 Mk. 60 Pf. Berlin, Mittler. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Redig. von L. Fröhlich. 2. Bd. (Juni 1883 — Juni 1884). Budapest und Berlin. Friedländer & S.

Reine Mathematik.

LÜROTH, J., Ueber die kanonischen Perioden der Abel'schen Integrale. Мünchen. Franz. 1 Mk. 20 Pf.
Biermann, O., Ueber die singulären Lösungen eines Systems gewöhnlicher Differentialgleichungen. (Akad.) Wien. Gerold. 25 Pf.
GEGENBAUER, L., Ueber das quadratische Reciprocitätsgesetz. Ebendas.
20 Pf.
, Zahlentheoretische Studien. Ebendas. 1 Mk.
Kraus, L., Die Functionaldeterminanten Ebendas. 30 Pf.
WEISS, E., Entwickelungen zu Lagrange's Reversionstheorem mit Anwen-
dung auf die Lösung der Keppler'schen Gleichung. Ebendas. 60 Pf.
HECHT, W., Zur Integration der Differentialgleichung $M dx + N dy = 0$.
Leipzig, Teubner. 1 Mk. 20 Pf.
GEGENBAUER, L., Ueber das Legendre-Jacobi'sche Symbol. (Akad.) Wien, Gerold. 45 Pf.
IGEL, B., Ueber ein simultanes System dreier binärer cubischer Formen.
Ebendas. 1 Mk. 20 Pf.
Pick, G., Ueber die Modulargleichungen der elliptischen Functionen. Ebendas. 25 Pf.
BORK, H., Untersuchungen über das Verhalten zweier Primzahlen in Bez.
auf ihren quadratischen Restcharakter. (Dissert.) Berlin, Gärtner. 1 Mk.
SERRET, A., Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung. Deutsch
bearb. von A. HARNACK. 2. Bd., 1. Hälfte: Integralrechnung. Leipzig,
Teubner. 7 Mk. 20 Pf.
SCHUBERT, H., System der Arithmetik und Algebra. Potsdam, Stein.
1 Mk. 80 Pf.
SCHENDEL, L., Grundzüge der Algebra nach Grassmann's Principien. Halle,
Schmidt. 2 Mk. 50 Pf.
SCHURIG, R., Lehrbuch der Arithmetik. 3. Theil. Leipzig, Brandstetter.
6 Mk. 40 Pf.
BOBEK, K., Ueber die Flächen IV. Ordnung mit einem Doppelkegelschnitte.
1. u. 2. Mitth. (Akad.) Wien, Gerold. 1 Mk. 60 Pf.
ESCHERICH, G. v., Die Construction der algebraischen Flächen aus den sie
bestimmenden Punkten. Ebendas. 50 Pf.
HOCEVAR, F., Bemerkungen zur Simp-on'schen Methode der mechanischen
Quadratur. Ebendas. 30 Pf.
HERBIG, W., Lehrbuch der geometrischen Formen. Berlin, Herbig. 7 Mk.
Hoch, J., Lehrbuch der ebenen Geometrie. 2. Thl. Halle, Schmidt.
1 Mk. 75 Pf.
HAMMER, E Lehrbuch der ebenen und sphärischen Trigonometrie. Stutt-
gart, Metaler. 3 Mk. 20 Pf.
ESCHEA V Danstellanda Geometria, 4. Bd. Wien, Gerold. 21 Mk.

HOFFMANN, G., Anleitung zur Lösung planimetrischer Aufgaben mit Beispielen. Leipzig, Fues.

1 Mk. 40 Pf.

LAMPE, E., Geometrische und mechanische Aufgaben zur numerischen Auflösung von Gleichungen höherer Grade. (Diss.) Berlin, Gärtner. 1 Mk. LEBOULLEUX, L., Traité élémentaire des déterminants. Genf, Stapelmohr. 2 Mk. 40 Pf.

Angewandte Mathematik.

- KRAFT, F., Sammlung von Problemen der analytischen Mechanik. 7. u. 8. Lief. Stuttgart, Metzler. 4 Mk.
- WEYRAUCH, J., Aufgaben zur Theorie elastischer Körper. Leipzig, Teubner. 8 Mk.
- FINGER, J., Elemente d. reinen Mechanik. 4. Lief. Wien, Hölder. 3 Mk. 60 Pf. NEUMANN, F., Vorlesungen über theoretische Optik; herausgeg. v. E. Dorn. Leipzig, Teubner. 9 Mk. 60 Pf.
- KRAMER, A., Allgemeine Theorie der zwei- und dreitheiligen astronomischen Fernrohr-Objective. Berlin, G. Reimer. 10 Mk.
- WEBER, L., Curven zur Berechnung der von künstlichen Lichtquellen indicirten Helligkeit. Berlin, Springer.

 1 Mk. 40 Pf.
- Schoute, H., Einige Bemerkungen über das Problem der Glanzpunkte.
 (Akad.) Wien, Gerold. 60 Pf.
- HARRDTL, F. v., Bahnbestimmung des Planeten "Adria". 3. Thl. Ebendas.

 4 Mk.
- Bruhns, C., Astronomisch-geodätische Arbeiten für die europäische Gradmessung im Königreich Sachsen. 3. Thl.: Astronomische Arb., herausgegeben v. Th. Albrecht. 2. Heft. Berlin, Friedberg & Mode. 12 Mk.
- Albrecht, Th., Bestimmungen der Länge des Secundenpendels in Leipzig, Dresden und dem Abrahamschachte bei Freiberg. Ebendas. 5 Mk.
- LAUNHARDT, W., Mathematische Begründung der Volkswirthschaftslehre. Leipzig, Engelmann. 6 Mk.
- WITTWER, W., Grundzüge der Molecularphysik und der mathematischen Chemie. Stuttgart, Wittwer. 5 Mk.
- Boussinesq, J., Application des potentiels à l'étude de l'équilibre et du mouvement des solides élastiques. Paris, Gauthier-Villars. 18 Frs.
- MATTHIEU, E., Théorie du potentiel et ses applications à l'électrostatique et au magnétisme. I. partie. Ebendas. 6 Frs.

Physik und Meteorologie.

- WEYRAUCH, J., Das Princip der Erhaltung der Energie seit Rob. Mayer.

 Zur Orientirung. Leipzig, Teubner.

 1 Mk.
- SCHREIBER, P., Beitrag zur Frage der Reduction von Barometerständen auf ein anderes Niveau. Leipzig, Engelmann. 1 Mk. 20 Pf
- Kahlbaum, A., Siedetemperatur und Druck in ihren Wechselbesieit Leipzig, Barth.

Schriftsteller erfolgreiche Mühe zugewandt. Was die Herren Allman, Glaisher, De Morgan, Ch. Taylor für verschiedene Capitel unseres Lieblingsfaches geleistet haben, ist von Allen, welche deren Arbeiten kennen zu lernen Gelegenheit hatten, anerkannt und geschätzt; aber hier ist eine Schattenseite: die zuletzt genannten Schriftsteller, mit Ausnahme von Herrn Taylor, dessen Introduction to the ancient and modern geometry of conics (vergl. diese Zeitschrift Bd. XXVII, hist.-lit. Abth. S. 87 flgg.) als selbständiges, mit einer längeren Einleitung versehenes Werk auch in das Ausland drang, haben ihre geschichtlichen Abhandlungen für solche Zeitschriften und Sammelwerke verfasst, die dem festländischen Leser kaum je unter die Augen kommen, es sei denn, dass freundliche Beziehungen zu den Verfassern ihn in den Besitz von Sonderabdrücken setzten. wollte diesem engeren Bekanntwerden, welches, wie wir es für das europäische Festland zu bestätigen im Stande waren, auch für Grossbritannien selbst stattzufinden scheint und welches als eine unliebsame Folge mangelndes Interesse der Leser an dem behandelten Gegenstande nach sich zieht, für seinen Theil ein Ende setzen, indem er einen ganzen Band der Geschichte der griechischen Mathematik widmete. Herr Gow ist nicht Mathematiker, sondern Philologe, aber er hat auf seinem Studiengange gleich allen Engländern die griechische Mathematik, insbesondere die griechische Geometrie hinlänglich genau kennen gelernt, um, von seinen Sprachkenntnissen getragen und unterstützt durch Vorarbeiten von Mathematikern, die Originalliteratur einer Durchmusterung unterwerfen zu können, von deren Genauigkeit einige Stellen des Bandes zeugen, wo er zu Ergebnissen gelangt, die von den in den Vorlesungen des Referenten veröffentlichten abweichen, während allerdings in den meisten Fällen Herr Gow mit unseren Auffassungen einverstanden erscheint. So schmeichelhaft eine solche Uebereinstimmung für uns ist, so fürchten wir doch, sie theilweise auf den Umstand zurückführen zu müssen, dass Herr Gow diejenigen Abhandlungen, welche nach dem Erscheinen unserer Vorlesungen und, dürfen wir vielleicht uns rühmen, infolge derselben zur Veröffentlichung gelangten, nicht kennen lernte und deshalb auch nicht berücksichtigte.

Wir haben hierbei vorzugsweise die glänzenden Arbeiten von Herrn Paul Tannery im Auge, welche bald in der Revue archéologique, bald in den Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux und in den Mémoires de la société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, bald in der Revue philosophique, bald und hauptsächlich in neuester Zeit in dem Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques (unter Mathematikern oft Bulletin Darboux genannt) erschienen. Wohl mehr als 30 grössere und kleinere Aufsätze des unermüdlichen geistvollen Gelehrten sind in unseren Händen. Fast überall handelt es sich um Dinge, in welchen Herr Tannery unsere Ansichten nicht theilt, und wir haben immer mit Vergnügen seine liebenswürdigen, von Rechthaberei fernen Angriffe gelesen, welchen

er den Charakter des Angriffs so vollständig zu nehmen weiss; wir haben stets aus diesen Abhandlungen gelernt, auch da, wo es ihrem Verfasser nicht gelang, uns zu seiner Meinung zu bekehren. Leider haftet diesen Abhandlungen der gleiche Mangel an, welchen wir von englischen Arbeiten betonten. Mag das Bulletin Darboux, die Revue archéologique, vielleicht die Revue philosophique von grösseren Bibliotheken gehalten werden, die beiden in Bordeaux erscheinenden Sammlungen dürften nur in sehr wenigen Exemplaren ihren Weg ins Ausland finden, so dass man eine Veröffentlichung in denselben nur mit halber Oeffentlichkeit begabt nennen kann. Vielleicht sehen es unsere Leser deshalb nicht ungern, wenn wir einige wichtige Ergebnisse Tannery'scher Forschung über griechische Mathematik hier zusammenstellen, wobei wir die zeitliche Folge der Persönlichkeiten, um welche es sich handelt, unserer Aufzählung zu Grunde legen.

Thymaridas (Annal. Faculté lettr. Bord. 1881), der Erfinder der unter dem Namen Epanthem bekannten Auflösungsmethode von Gleichungen, ist der als T. von Paros bezeichnete Pythagoräer, der, wenn auch nicht zu den unmittelbaren Schülern des Pythagoras, doch zu den älteren Gliedern der Schule gehörte. Ihm wird nämlich auch die Erfindung der Benennung geradliniger Zahlen für Primzahlen zugeschrieben, und das muss früher als zur Zeit Platon's gewesen sein, denn

Speusippos (Annal. Faculté lettr. Bord. et Toulouse 1883), der Neffe Platon's, schrieb schon über diese ἀριθμολ γραμμικοί, wie aus einer für die Geschichte der Mathematik noch nicht verwerthet gewesenen Stelle der Theologoumena hervorgeht.

Der heilige Hippolytos (Bullet. Darboux T. VI, 1882) bezeugt gegen Ende des II. S. p. C. in einer gleichfalls unbenutzt gebliebenen Stelle, dass zu seiner Zeit das Wort Pythmen den Sinn des Restes hatte, welcher bei Division einer Zahl durch 9 oder auch durch 7 übrig bleibt. Offenbar ist hier eine unverkennbare Spur der Neuner- und der Siebenerprobe vorhanden, und zwar wird die erforderliche Rechnung als Pythagoräisch bezeichnet. Wie weit diese Auffassung geschichtlich rückverfolgbar, und ob schon den Pythmenes des Apollonius die gleiche Tragweite beizulegen ist, darüber möchten wir mit einiger Vorsicht schweigen.

Diophant hat Herrn Tannery den Gegenstand zu zwei Abhandlungen geboten (Bullet. Darboux T. III, 1879 und T. VIII, 1884). In der ersten Abhandlung untersuchte er die Zeitverhältnisse des grossen Alexandrinischen Algebraikers und gelangte zu dem Ergebnisse, er müsse um die Mitte des III. S. gelebt haben. Ihre Hauptstütze hat diese Behauptung allerdings nur in Weinpreisen, welche in einer einzigen Aufgabe (V, 33) vorkommen und welche eine solche Höhe ausser in der genannten Zeit kaum je zu einer überhaupt in Frage tretenden Zeit erreicht haben dürften. Da aber mit dieser Annahme auch die Verfassung des bekannten Epigramms über die Lebensdauer des Diophant durch Metrodorus in Eingramms über die Lebensdauer des Diophant durch Metrodorus in Eingramms über die Lebensdauer des Diophant durch Metrodorus in Eingramms

klang steht, welche bei der bisher landläufigen Annahme unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet, so sind wir sehr geneigt, Herrn Tannery zuzustimmen. Weniger sagt uns die in der zweiten Abhandlung verfochtene Behauptung zu, dass doch mehr von Diophant verloren gegangen sei, als man seit Nesselmann anzunehmen sich gewöhrt hat. Die Lehre von den unbestimmten Aufgaben mit ganzzahligen, nicht blos mit rationalen Auflösungen, die Lehre von den Seitenzahlen rechtwinkliger Dreiecke, die befreundeten Zahlen, Untersuchungen über die Unmöglichkeit der Gleichung $x^3 + y^3 = z^3$ und über die sogenannte Pell'sche Aufgabe scheinen Herrn Tannery genügenden Stoff für die verloren gegangenen Bücher zu bieten-Unsere Bedenken richten sich dahin, ob nicht damit zuviel den Griechen zugewiesen werden will, und wenn Diophant mehr Compilator als Erfinder war - ein Zugeständniss, welches wir Herrn Tannery auch nicht zu machen vermögen —, woher flossen die Quellen, aus welchen er schöpfte? Waren es griechische Quellen, uns bis auf die Erwähnung von solchen verloren? Waren es gar indische, und nähert sich Herr Tannery der Meinung Hankel's von dem fremdländischen Ursprunge der Diophantischen Algebra? Diesen Zweifeln wird unser gelehrter Freund sicherlich in der Vorrede zu der Diophant-Ausgabe Rede stehen, welche er nach seiner ausdrücklichen Erklärung vorbereitet, und, gestehen wir es offen, diese Erklärung war uns das Liebste in der eben berührten Abhandlung.

Sporus von Nicäa (Annal, Faculté lettr. Bord. 1882) wird von Herrn Tannery an das Ende des III. S. gesetzt, und zwar als Verfasser einer Sammlung 'Αριστοτελικά κήρια, in welcher mannigfache Auszüge auch aus mathematischen Schriften sich fanden, welche später von Pappus, von Simplicius, von Eutokius benutzt wurden.

Serenus von Antissa (Bullet. Darboux T. VII, 1883) soll im IV. S. zwischen Pappus und Hypatia seinen Platz finden. Nach Pappus wird er gesetzt, weil er seiner eigenen Aussage nach einen Commentar zu den Kegelschnitten des Apollonius schrieb, der noch nicht vorhanden gewesen sein könne, als das VII. Buch des Pappus entstand. Andererseits ist er doch zu wissenschaftlich, um ihn als der Zeit des Hyppatia angehörig betrachten zu können.

Domninus von Larissa (Bullet. Darboux T. VIII, 1884), ein Mitschüler des Proclus, unter welchem er auch nach dem Tode des gemeinsamen Lehrers Syrianus an der Athener Hochschule thätig war, hat eine Arithmetik verfasst, welche längst durch Boissonade (Anecdota Graeca IV, 413—429) im Druck herausgegeben und von Mathematikern nie untersucht worden ist. Herr Tannery hat dieser Mühe sich unterzogen und die unterscheidenden Merkmale gegen Nikomachus hervorgehoben.

Mit dieser Aufzählung sind keineswegs alle Leistungen des französischen Geschichtskundigen erschöpft, es sind auch keineswegs überall alle Gründe hervorgehoben, durch welche er seine Ansichten zu stützen weins; es in

vielmehr nur eine Art von Inhaltsverzeichniss, welches wir geben und aus welchem hervorgehen soll, dass eine ganze Anzahl von Gegenständen neuerdings der Forschung erschlossen ist, welche man nicht mehr das Recht hat mit Schweigen zu übergehen und welche sicherlich auch Herr Gow besprochen haben würde, wären die betreffenden Aufsätze zu seiner Kenntniss gelangt. Hat er doch die leichter zu beschaffenden und nicht minder wichtigen Arbeiten unsers dänischen Fachgenossen Heiberg seinen Zwecken fast überall dienstbar zu machen gewusst, wenn ihm auch die Auffindung des Namens von Archimedes' Vater Pheidias (Φειδία δὲ τοῦ ἀμοῦ πατρός Archimed ed. Heiberg II, 248, 8), welche Herrn Heiberg schon gelungen war, als Herr F. Blass (Astronomische Nachrichten CIV, 255) die gleiche Entdeckung selbständig und früher veröffentlichte, und einiges Andere entgangen ist.

Wollten wir Herrn Gow vorzugsweise Vorwürfe machen, so wäre es nicht schwer, aus seinem Buche Behauptungen zu sammeln, deren Rechtfertigung ihm kaum gelingen möchte. Das kann man ja bei jedem umfassenden Werke jedes Verfassers. Wir ziehen es vor, einige Eigenthümlichkeiten seines Werkes zu nennen, welche uns verdienstlich erscheinen. Herr Gow beschäftigt sich, wie es von dem Philologen nicht anders zu erwarten stand, eingehend mit den Zahlwörtern, und auch wer die Schriften von Pott genau kennt, wird hier Neues finden, wofür besonders Tylor's Primitive Culture als Quelle gedient zu haben scheint. Neu war uns z. B., dass für die Zwei von den Chinesen der Name der Ohren, von den Thibetanern der der Flügel, von den Hottentotten der der Hände gebraucht werde (S. 7), neu, dass der Drei die Bedeutung unbestimmt grosser Vielheit beiblieb, z. B. τρισάθλιος, ter felix als Ueberbleibsel aus einer Zeit, wo man nicht über 3 hinauszählte und den einzigen vorhandenen Zahlen auch die Sprachformen des Singular, Dual, Plural zugeordnet waren (S. 8). Auf die Frage, ob die Buchstabenzahlen von den Griechen zu den Hebräern gelangt seien oder umgekehrt, kommt Herr Gow wiederholt (S. 44, 46, 48) zu reden. Er entscheidet sich für den ersteren Weg, und zwar sei von einer eigentlichen Erfindung zu sprechen, welche im III. S. a. Chr. in Alexandria gemacht worden sei. Das Wort Gematria, welches eine Spielerei mit dergleichen Buchstabenzahlen bedeutet, sei selbst eine Umstellung aus γραμματεία. Eine Platonische Stelle, in welcher ausdrücklich ausgesprochen ist, dass die Gottheit stets geometrischen Regeln folge (τον θεον αεί γεωμετρείν), kennt Herr Gow so wenig wie Andere, wohl aber macht er (8. 173 Note 2) auf Rep. 527 B aufmerksam, wo es heisst, Geometrie richtig behandelt sei Kenntniss des Ewigen.

Wir wollen ferner nicht verfehlen, auf S. 187 Note 1 aufmerksam zu machen, wo ein nicht unwichtiger Irrthum verbessert ist, den wir uns (Vorlesungen I, 197) zu Schulden kommen liessen. Wohl kommt zönes in dem Berichte des Eutokios über die Würfelverdoppelung des Archytes vor.

aber es ist gleichgiltig, ob dieses Wort dem Urtexte entnommen oder spätere Einschaltung ist, da es hier keinenfalls "geometrischer Ort", sondern nur "Stelle" bedeutet. Auch die allgemein angenommene Uebersetzung von τόπος ἀναλνόμενος = aufgelöster Ort widerstrebt Herrn Gow. Er behauptet vielmehr (S. 211 Note 1), τόπος bedeute hier wieder nicht geometrischer Ort, sondern Aufbewahrungsort, Schatzkammer; so komme das Wort häufig bei Aristoteles vor, so heisse Pappus VI, 1 τόπος ἀστρονομούμενος die Gesammtheit astronomischer Schriften, von denen in der Folge die Rede ist, so müsse also auch τόπος ἀναλνόμενος = the treasury of analysis gesetzt werden. Wir bemerken, dass auch Hultsch in dem Wörterbuche des III. Bandes seiner Pappus-Ausgabe, p. 114 col. 2 lin. 15—19, τ. ἀστρ. und τ. ἀναλ. zusammenstellt mit der Bedeutung quidquid aliqua mathematicorum parte comprehenditur. Deutsch wäre also dafür etwa zu schreiben "Sammelwerke analytischer Natur".

Als eine der Geschichte der Erfindungen angehörende Thatsache, von welcher wir keine Kenntniss besassen, heben wir hervor (S. 237 Note 1), dass Archytas ausser der Schraube und dem einfachen Rad an der Welle auch das Kinderrasselchen erfand als nützliches Spielzeug, welches die Kinder verhindere, wirkliches Hausgeräthe zu zerbrechen.

Herr Gow kommt (S. 108 Note 1) auf die Abkürzungen zu reden, deren Diophant sich für die Unbekannte und für die Subtraction bediente. Er hält diese Zeichen für die Wiedergabe hieratischer Muster, die zu identificiren er freilich nicht vollständig im Stande sei. Wir wollen diese Möglichkeit gar nicht bestreiten, vielmehr auf die kleine Monographie des Herrn Léon Rodet, Sur les notations numériques et algébriques antérieurement au XVI^o siècle. Paris 1881, chez Ernest Leroux, 80 pages, hinweisen, in welcher der gleiche Gedanke auf S. 37 figg. sehr ausführlich durchgesprochen ist. Herr Rodet giebt dort die hieratischen Zeichen wirklich an, die Diophant copirt habe, wobei allerdings der Phantasie einiger Spielraum gelassen ist.

Schon Nesselmann hatte die Ausmerksamkeit auf gewisse Zahlzeichen gelenkt, die er bei Heilbronner, und dieser bei Hostus und bei Noviomagus angesührt fand und welche gewissen Astronomen gedient haben sollen. Dem Referenten gelang es, die Stelle bei Hostus aufzusinden, und Friedlein wies die Stelle bei Noviomagus nach, von der die Rede sein muss. Alle diese Angaben sinden sich bei Herrn Gow (S. 64 Note 1). In einer brieflichen Mittheilung vom 21. März 1885 weiss nun Herr Gow jene Zeichen in noch beträchtlich frühere Zeit zurückzuverfolgen. Sie sind deutlich beschrieben bei Math. Paris, Chronica V, 285 (ed. Luard, Cambridge 1872—1883), mit der Bemerkung, Johann von Basingstoke habe dieselben in England eingesührt und sie selbst kennen gelernt quando studuit Athenis. John of Basingstoke aber starb 1252 und war etwa 1240 in Athen.

Der Satz des Menelaos, welcher die Grundlage der ganzen sphärischen Trigonometrie der Griechen und später der Araber bildete, giebt S. 292 Gelegenheit zu der Bemerkung, im Mittelalter sei dieser Satz mit arabischem Namen regula catha genannt worden, während später bei Michael Stifel der Name regula sex quantitatum sich finde. Herr Gow verweist für diese Namen auf Costard's Ausgabe der von Halley herrührenden Uebersetzung der Sphaerica aus einer hebräischen Uebertragung (Oxoniae 1758) S. 82. Dort ist in der That mit arabischen Lettern ein Wort abgedruckt, welches in der jetzt gebräuchlichen Transcription Al-katta heisst und Sector (hier mit Transversale zu übersetzen) bedeutet, mithin Regula kattå oder, wie man nun schreiben mag, die Regel von der Transversalen. Costard giebt als seine Quelle für den Gebrauch von regula catha ein der Biblioth. Bodleiana angehörendes mehrbändiges handschriftliches Werk von Simon de Bredow an, welcher um 1350 socius Mertonensis war, d. h. Fellow of Merton College in Oxford. Wir sind in der Lage, auf eine im Druck herausgegebene, um anderthalb Jahrhunderte ältere Quelle zu verweisen, indem bei Leonardo von Pisa wiederholt von der figura cata und von der figura chata die Rede ist und damit nur der Satz des Menelaos gemeint sein kann.

Unsere Leser mögen die Bemerkungen, welche wir fast mehr zu als über Herrn Gow's Werk niedergeschrieben haben, als Zeichen des Interesses auffassen, mit welchem wir den Band studirt haben. Vielleicht finden sie in diesem Interesse selbst ein noch deutlicheres Lob des uns vorliegenden Buches, als es bis hierher von uns ausgesprochen worden ist.

CANTOR.

Der Begriff der Physis in der griechischen Philosophie. Von Dr. E. HARDY. I. Theil. Berlin 1884, Weidmann'sche Buchhandlung. III. 229 S.

Dass Wörter dem Begriffswechsel unterliegen, dass sie je nach Zeit und Ort, wo, oder auch je nach der Persönlichkeit, durch welche sie benutzt werden, bald diese, bald jene Bedeutung annehmen, dafür giebt es zahllose Beispiele. Wir erinnern nur an Aether, an Salz u. dergl. Diesen verschiedenen Bedeutungen nachzuspüren, bedarf es einer unumschränkten Herrschaft tiber die gesammte Literatur, in welcher ein solches Wort vorkommt, und wem diese nicht in fast gleichem Maasse zu Gebote steht, der erscheint nicht berechtigt, anders als einfach berichtend über solche werthvolle, wichtige, aber ungemein schwierige Untersuchungen zu reden. Das ist unsere Lage gegenüber dem vorliegenden Bande, in welchem Herr Hard y den Bedeutungen nachforscht, welche das Wort prosig in der Geschichte der griechischen Philosophie nachweislich besessen hat. Wir können ihn nicht widerlegen noch bestätigen, aber wir glauben doch das Vorban-

densein seines Buches unseren Lesern wahrnehmbar machen zu müssen, sei es, dass unter ihnen wirklich befugte Richter, sei es, dass nur interessevolle Laien gleich uns dadurch auf die Quelle weiterer Belehrung hingewie-Von Thales bis Sokrates, Sokrates und Xenophon, Plato, sen werden. Aristoteles lauten die Ueberschriften der vier grossen Abschnitte, in welche der Stoff von selbst sich gliederte. In der ersten Periode gebraucht Thales das Wort Physis für die gesammte Welt der äusseren Erscheinungen und deren Bewegung, Anaximander für das, was wir heute etwa Physik nennen. Empedokles nennt Physis in wissenschaftlicher Bedeutung, die mit der populären nicht zu verwechseln sei, Verbindung und Trennung. Die Pythagoräer sahen in Physis das geheimnissvolle Wesen der Zahl, den Grund - und Inbegriff aller Eigenschaften eines Dinges, Heraklit die Vernunftordnung, welche alle Gegensätze aufhebt, welche das Niederste und Höchste, sogar der Menschen Denken und Thun bestimmt. Besonders für den Menschen ist nun in den Hippokratischen Schriften, den echten wie den unechten, Physis der innere Grund der Wirksamkeit. Als Naturordnung erkannte auch Demokrit die Physis gegenüber von dem Nomos, dem Staatsgesetze, und dieser Gegensatz steigert sich nur noch bei Hippias. Das Naturgesetz, die Physis, ist dem Sophisten erfahrungsmässig gegeben, und ein Merkmal desselben ist es, dass jede Handlung gegen die Natur ihre Strafe unausweichlich mit sich führt, während das Menschengesetz umgangen werden kann, ohne dass die Strafe aus der Umgehung selbst hervorgehe. Aber die Physis bleibt erfahrungsmässig. Sie ist nicht als Sittengesetz vor und über der Erfahrung vorhanden. Zu dieser Höhe erhob sie und sich erst Sokrates in der zweiten Periode. Ihm wurde Physis der letzte Grund der Erscheinungen des sittlichen Lebens, ergänzungsfähig durch Erziehung, und darum seine Bemühungen um die Erziehung, um dieser willen die Verwerthbarkeit von Xenophon's Cyropädie für das behandelte Thema. Plato, der eine dritte Periode bildet, findet in der Physis die mustergiltige Form für das menschliche Schaffen; sie beruht auf dem Wissen. Endlich schliesst der Band mit der vierten Periode, der des Aristoteles. Hier tritt, mehr an Sokrates wieder anknüpfend, das Ethische neuerdings in den Naturbegriff zurück. Wir haben selbst die Empfindung, der auch eingeschränkten Aufgabe eines blos übersichtlichen allgemeinen Berichts, die wir uns gestellt haben, nur sehr mangelhaft genügt zu haben. Möge die Schwierigkeit des Gegenstandes uns zur Entschuldigung gereichen.

CANTOR.

J. Dupuis, Le nombre géométrique de Platon. Paris 1881. 64 pages.
 — Seconde interprétation. Paris 1882. 32 pages. — Troisième Mémoire. Extrait de l'annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, augmenté de notes. Paris 1885. 56 pages. Libraire Hachette & Cie.

Die erste der drei in der Ueberschrift genannten Abhandlungen bot unserem gelehrten Freunde Herrn Fr. Hultsch Gelegenheit, sich gleichfalls mit der seit undenklicher Zeit übelberüchtigten Stelle in Platon's VIII. Buche vom Staate zu beschäftigen, und veranlasste so dessen Aufsatz, der im XXVII. Bande dieser Zeitschrift, hist.-lit. Abthlg. S. 41-60 abgedruckt ist. Herr Hultsch konnte mit dem Vorschlage des französischen Gelehrten, $21600 = 100(3^3 + 4^3 + 5^3)$ als die Lösung des mehr als zweitausendjährigen Räthsels anzuerkennen, sich nicht befreunden. Ebenso unbefriedigt war aber Herr Dupuis selbst. In einer zweiten Abhandlung liess er jene Zahl fallen, ohne jedoch dem Hultsch'schen Lösungsversuche 12960000 sich anzuschliessen. Er versuchte es vielmehr mit einer neuen, vorher noch nie vorgeschlagenen Zahl 760000. Heute kommt Herr Dupuis zum dritten Male auf die Stelle zurück, um seine Zahl 760000 mit neuen Gründen zu empfehlen. Referent steht der Frage ebenso skeptisch wie sonst gegenüber. Das letzte Wort scheint ihm immer noch nicht ausgesprochen. Was aber den Vorschlag der 76 Myriaden betrifft, so lehnen wir ihn einfach ab, und zwar aus dem gleichen Grunde, welchen Herr Hultsch am 9. November 1882 in einer von Herrn Dupuis (S. 21 u. 22) citirten Briefstelle aussprach. Im Platonischen Wortlaute kommen die Worte τρὶς αὐξη- $\theta \epsilon i \varsigma$ vor. Herr Dupuis verlangt, $\tau \varrho i \varsigma$ solle hier als Ausdruck unbestimmter Vielheit gedeutet werden; man solle mithin setzen "sehr vermehrt", was in diesem besondern Falle identisch sei mit "120000 mal". Das halten wir für durchaus unmöglich! Gewiss bedeutet rois recht oft eine unbestimmte Vielheit, und die von Herrn Dupuis S. 17-19 zusammengestellten Beispiele sind sehr gut gewählt, diese Bedeutung klar zu machen; aber dass zolg eine unbestimmte Vielheit bedeuten könne mitten in einem arithmetischen Zusammenhange, mitten zwischen Zahlen, die jede ihre naturgemässe, bestimmte Bedeutung besitzen, das erscheint uns undenkbar. Wählen wir ein ähnliches Beispiel geometrischer Unbestimmtheit. "Die Knaben stellten sich um ihren Lehrer im Kreise auf", d. h. sie bildeten irgend eine in sich zurücklaufende krumme Linie, ob einen Kreis, ob irgend eine Eilinie, gleichviel. Nun aber lesen wir folgenden Satz: "Die Knaben bildeten zuerst in ihrer Reihenfolge eine Archimedische Spirale, dann eine Cissoide, zuletzt einen Kreis. Kann hier auch Kreis irgend eine in sich zurücklaufende krumme Linie bedeuten? Nach unserer Ueberzeugung unmöglich! Wo einmal mathematisch bestimmte Begriffe in einem Satzgefüge Eingang gefunden haben, können sie nicht mehr mit unbestimmtem Sinne dort gefunden werden wollen. So wenigstens ist unsere Ueberzeugung. CANTOR.

Julius Klaproth's Schreiben an Alexander von Humboldt über die Erfindung des Compasses. Aus dem französischen Original im Auszuge mitgetheilt von Dr. phil. Armin Witterenn. Leipzig 1885 bei T. O. Weigel. XII, 49 S.

In unserem schnelllebenden Jahrhundert ist man wohl berechtigt, die Frage aufzuwerfen, inwiefern historische Untersuchungen, vor mehr als 50 Jahren angestellt, es verdienen können, nicht nur überhaupt noch gelesen zu werden, vielmehr in neuem Gewande zu erscheinen? Herr Wittstein hat bezüglich des Klaproth'schen Schreibens von 1834 diese Frage bejaht und, so weit wir bei dem uns ziemlich weit abliegenden Gegenstande ein Urtheil uns zutrauen dürfen, auch bejahen können. Vielleicht ist seitdem der unbedingte Glaube an die Zuverlässigkeit chinesischer Aussagen etwas mehr ins Schwanken gekommen, hat man sich einigermassen gewöhnt, mehr das Datum solcher Aussagen selbst, als die fabelhaften Vergangenheiten, von denen dieselben berichten, zu beachten, um eine untere Grenze für die Verbreitung dieses oder jenes Wissens zu erhalten; aber auch Klaproth scheint in dieser Beziehung bereits mit gutem Beispiel vorangegangen zu sein und eine Kritik geübt zu haben, welche in ihrer Besonnenheit sich nicht mit der eines Gaubil u. s. w. in Vergleich bringen lässt, Der deutsche Bearbeiter mag den vernichtenden Rothstift noch an einzelnen weiteren Thatsachen benutzt haben, welche bei Klaproth noch Aufnahme gefunden hatten; Neues hinzuzufügen war er kaum je in der Lage, da der Gegenstand seit Klaproth keine fördernde Bearbeitung mehr gefunden hat. Nicht als ob Bertelli's gelehrte Untersuchungen kein neues Licht auf die Geschichte des Compasses im Mittelalter und in unserem Welttheile geworfen hätten, aber die ostasiatische Urgeschichte erscheint darum in durchaus unveränderten Zügen, wie Klaproth sie in seinem Briefe hinzeichnete, wie Ed. Biot sie in den vierziger Jahren bestätigte. Herr Wittstein liefert uns eine verbesserte und verringerte Ausgabe jener Schrift von 1834, welche er etwa auf ihren dritten Theil zurückführte. Nur um so zuverlässiger gestalten sich seine Angaben, und wir glauben auf seine Bearbeitung als auf eine zweite Quelle hinweisen zu dürfen, aus welcher man unbedenklich schöpfen kann. CANTOR.

Gli scritti inediti di Leonardo da Vinci, secondo gli ultimi studi per Antonio Favaro. Venezia 1885. Estr. dagli Atti del R. Istituto veneto di scienze, lett. e arti. Tomo III, serie VI. Tipografia di G. Antonelli. 62 pag.

Auf das Jahr 1886 hat das R. Istituto Lombardo, statutarisch dazu genöthigt, zum ersten Male den Preis Tomasoni für die beste Geschichte des Lebens und der Werke Leonardo's da Vinci ausgeschrieben. Der Begründer dieses Preises hätte, so meinen wir mit Herrn Favaro, des französischen Kochrecepts eingedenk sein sollen: "Pour faire un civet de lièvre, il faut un lièvre." Die Würdigung von Leonardo's Werken kann genauer, als sie von Venturi auf Grund handschriftlicher Studien gegeben

worden ist, erst dann erfolgen, wenn die Werke gedruckt vorliegen. Zwei Gelehrte, Herr Charles Ravaisson-Mollien in Paris, Herr Jean Paul Richter in London, haben den Anfang mit der Druckgebung gemacht. Auch darin stimmen wir Herrn Favaro durchaus bei, dass in erster Linie nur die Pariser Abdrücke, in ihrer photographischen Vollständigkeit die Handschriften vollständig ersetzend, brauchbar erscheinen. Auszüge, wie die Londoner Ausgabe sie bietet, geben nie den Schriftsteller selbst, sondern nur was einem Dritten wissenswerth erschien, und der Begriff des Wissenswerthen ist damit in allzu enge persönliche Grenzen eingeschlossen. Endlich unterstützen wir aus ganzem Herzen Herrn Favaro's Wunsch, Italien möge sich nicht von fremden Staaten überflügeln lassen und möge dafür Sorge tragen, dass der Codice Atlantico aufhöre, nur eine Zierde der Mailänder Ambrosiana zu sein, vielmehr im Drucke Gemeingut der Wissenschaft werde.

Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes, eine Studie zur Geschichte der Physik von Dr. Emil Wohlwill. Separatabdruck aus der Zeit, schrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Weimar 1884, Hofbuchdruckerei. 163 S.

Die Bewegung dauert nur dadurch fort, dass das Bewegende mit dem Bewegten in Berührung bleibt, sei es in unmittelbarer Berührung, sei es in mittelbarer, indem die umgebenden Medien, Luft, Wasser u. dergl., die Eigenschaft besitzen, eine mitgetheilte Bewegung bewahren und weiter befördern zu können. Ausserdem ist aber die Kreisbewegung als solche eine von der Natur gegebene und darum unaufhörliche. So war die Lehre des Aristoteles, welche, wie dessen ganze Physik, die europäische Wissenschaft bis tief in das XVII. S. hinein beherrschte und in dem Satze der Aerzte: "Cessante causa cessat effectus" unbewusst bis in unsere Tage hineinragt. Dieser Lehre schroff gegenüber steht das Gesetz der Beharrung: Die Wirkung jeder Ursache verharrt! Wie hat der Uebergang von dem einen dem andern Satze stattgefunden? Hat Galilei in urplötzlicher Entdeckungsweise die neue Lehre aufgefunden? Hat sie allmälig sich gebildet und kann man die Geschichte dieser Begriffsbildung verfolgen? Das ist die hochinteressante Frage, welche Herr Wohlwill sich gestellt und welche er beantwortet hat. In raschem Fluge führt er uns in die Zeit des Cusaners, welcher, wie in vielen Dingen, auch in der Bewegungslehre Zweifel an Aristoteles zu hegen und auszusprechen wagte. Bei Tartaglia und bei dessen Gegner Cardano finden wir die vermeintliche Erfahrungsthatsache, dass ein Geschoss beim Verlassen des Rohres zu Anfang mit zunehmender, dann mit abnehmender Geschwindigkeit sich bewege. Eine Erklä-Tung einer so durchaus unwahren Erscheinung musste nothwendig falsch Sein! Nun folgt Benedetti, der Entdecker der in der Berührungslime zur Bahn wirkenden Fliehkraft. Auch in der Bewegungslehre bricht er mit dem Altherkömmlichen. Nicht das umgebende Mittel giebt dem bewegten Körper erneuten Antrieb, er enthält vielmehr die Ursache der Bewegung in sich selbst. Diese Lehre übernahm Galilei und setzte sie in einer von ihm nicht zum Drucke bestimmten Schrift aus der Zeit zwischen 1589 und 1592 auseinander. Die Handschrift dieser Abhandlung setzt sich allerdings mit einem Abschnitte fort, in welchem die Galilei'sche Mechanik auf ihrem Höhepunkte nicht zu verkennen ist. Aber Herr Wohlwill hat gezeigt, dass hier Stücke sehr verschiedenen Alters nur zufällig vereinigt sind, dass jener Schlussabschnitt nicht vor dem 16. October 1604 entstanden sein kann. Galilei's Leistungen umfassen die ganze Mechanik. Das Beharrungsgesetz erkannte er zuerst auf der horizontalen Ebene. Es war zunächst nur eine Erweiterung des bereits von Aristoteles erkannten Sonderfalles; denn was anders als Beharrung ist es, wenn der Stagyrite die Ewigkeit der Kreisbewegung fordert? — Wie alsdann Galilei in richtiger Erkenntniss weiter und weiter ging, wie fast jedes einzelne Werk, welches er verfasste, einen allmäligen Fortschritt enthält, das ist der Inhalt der zweiten, grösseren Hälfte der Wohlwill'schen Schrift. Bei dem Reichthum an in derselben theils ausführlich behandelten, theils gestreiften Gegenständen ist es kaum thunlich, darüber zu berichten, ohne in hier unstatthafte Weitläufigkeit zu verfallen. Wir verweisen unsere Leser auf das Original, dessen Bedeutsamkeit in rechtes Licht zu setzen einzige Absicht dieser Anzeige war. Herr Wohlwill bat entschieden Recht daran gethan, eine Vereinigung der in drei verschiedenen Zeitschriftheften erschienenen Abhandlung zu veran-Noch dankbarer wäre man ihm gewesen, wenn er auch eine Inhaltsübersicht hätte beifügen wollen; denn den leisen Vorwurf können wir ihm bei höchster Anerkennung des Geleisteten nicht ersparen, dass vollendete Uebersichtlichkeit seiner Anordnung nicht innewohnt.

Gewissermassen als Ergänzung zur hier angezeigten Abhandlung gestatten wir uns, auch auf einen Aufsatz von Herrn Fr. Poske, Der empirische Ursprung und die Allgemeingiltigkeit des Beharrungsgesetzes (Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie VIII, 4), mit nachfolgenden Bemerkungen von Herrn W. Wundt hinzuweisen.

Histoire des sciences mathématiques et physiques par M. MAXIMILIEN MARIE, répétiteur de mécanique, examinateur d'admission à l'école polytechnique. Tome VI. De Newton à Euler (Suite). 258 pag. Paris, Gauthier-Villars imprimeur-libraire. 1885.

Erst S. 115 dieses Bandes haben wir tiber Bd. IV und V des Marieschen Werkes berichtet, und schon wieder sind wir im Stande, einen neuen Band anmelden zu können. Er beschäftigt sich ziemlich ausschliesslich im ersten Drittel mit den Principien von Newton, in den beiden letzten Dritteln mit den Aufsätzen von Leibnitz, welche leider nicht in den Originaldrucken oder in der neuen Gerhardt'schen Ausgabe, sondern in der durch massenhafte Druckfehler entstellten Dutens'schen Ausgabe studirt wurden, wodurch Herr Marie sich seine Arbeit nicht unbeträchtlich erschwerte. Die Aufgabe, welche er sich an der Hand der umfänglichen Auszüge, die er liefert, stellt, ist die Beantwortung der berühmten oder berüchtigten Streitfrage über die Erfinderrechte an der Infinitesimalrechnung. Herr Marie gelangt dabei zu folgendem Urtheilsspruche. Es steht geschichtlich fest, dass Newton bei Veröffentlichung seiner Principien die Fluxionsrechnung besass. Wüsste man aber davon nicht aus anderen Schriftstücken, die Principien selbst könnten nur die entgegengesetzte Meinung erwecken. Der Brief Newton's vom 24. October 1676 ist ein wahres Meisterwerk in der Kunst, seine Gedanken zu verhüllen, und aus ihm war ebenso wenig, wie aus den Principien ein Plagiat möglich. dagegen geht überall offen mit der Sprache heraus. Er feilt so wenig, dass es ihm auch auf einen Rechenfehler nicht ankommt. Die Methoden sollen bekannt werden, damit die Wissenschaft Nutzen davon ziehen könne; in wessen Garten die Früchte reifen, sei gleich, sagt er in liebenswürdiger Hingebung seiner Entdeckungen. So ist Leibnitzens Unschuld in zweifellosester Weise gesichert. Wir brauchen unseren Lesern nicht erst zu sagen, dass wir immer die gleichen Sätze verfochten haben, und wollen nur ganz gelegentlich auf eine Untersuchung in der Zeitschrift "Nord und Süd" (Januar und Februar 1881) hinweisen, wo wir den Beweis geliefert haben, dass politische Gründe bei dem gehässig geführten und von der Londoner Königl. Gesellschaft ungerecht entschiedenen Streite in gewichtigem Maasse mitwirkten. Leibnitzens Briefwechsel, abgesehen von den Briefen an Oldenburg, hat Herr Marie noch nicht berücksichtigt. Weschtliche Verdienste, wozu wir den Anstoss zur modernen Coefficientenbezeichnung mittels einfacher und auch schon doppelter Indicirung rechnen, sind daher nicht berührt. CANTOR.

Algebraische Untersuchungen nach Tschirnhausens Methode, von Karl Hunrath. I. Programm des Gymnasiums zu Glückstadt, Ostern 1876. II. Programm des Gymnasiums zu Hadersleben, Ostern 1881. III. Programm des Gymnasiums und des Real-Progymnasiums zu Hadersleben, Ostern 1885.

Schon Cardano hat, wenn auch nur an dem besondern Falle der cubischen Gleichung, erkannt, dass die Substitution $y = b_0 + x$ unter nachträglicher zweckentsprechender Wahl der Constan der Gleichung $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x^{n-1}$ erhalten, in welcher ein Glied zwie

Tschirnhaus hat in den Acta eruditorum für 1683 pag. 204 figg. den grossen Schritt weiter gethan, mehr als nur ein Glied zum Wegfall zu bringen, indem er die Substitution $y = b_0 + b_1 x + x^2$ anwandte, in welcher zwei Constanten b_0 und b_1 zur zweckdienlichen Bestimmung vorkommen. Erst die neuere Zeit hat die ganze Tragweite dieses Tschirnhaus'schen Gedankens erkannt, und in dem bekannten Handbuche der höheren Algebra von J. A. Serret (deutsche Uebersetzung, Bd. I S. 346 flgg.) ist der allgemeine Gang jenes Substitutionsverfahrens in deutlichen Umrissen gezeichnet. Ein Anderes ist aber immerhin der allgemeine Gang, ein Anderes die Ausführung im Einzelnen, und Herr Hunrath, ein unerschrockener Rechner, dem kein noch so kraus gebauter Ausdruck Furcht einjagt, hat es in drei Schulprogrammen unternommen, die wirkliche Durchführung jenes Gedankens für Gleichungen bis zum fünften Grade einschliesslich kennen zu lehren. Er hat gezeigt, dass $y = b_0 + b_1 x + x^2$ die cubische sowie die biquadratische Gleichung zur Auflösung bringt, indem jene in eine rein cubische, diese in eine quadratische Gleichung übergeht, während die Bestimmung der vorher willkürlichen Constanten eine Gleichung niedrigeren Grades beansprucht. hat gezeigt, dass $y = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + x^3$, wiewohl drei Constante in sich schliessend, nicht gentige, um im Allgemeinen die Beseitigung von drei Gliedern der umgeformten Gleichung zu sichern. Er hat endlich gezeigt, dass dieser letztere Zweck bei der Gleichung fünften Grades durch Jerrard's Substitution $y = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3 + b_4 x^4$ erreicht werde. Die vollzogenen Rechnungen sind, wie wir schon mit einem Worte andeuteten, sehr verwickelt, wenn auch nicht gerade schwer, und es mag recht zweckmässig sein, dass der Lehrer sich einmal überzeuge, wie ein Verfahren in der Ausübung doch gewaltig anders, als in der allgemeinen Schilderung aussieht. CANTOR.

Nekrolog des königl. württembergischen Oberstudienraths Dr. Christian Heinrich v. Nagel. Separatabdruck aus dem Correspondenzblatt f. d. Gel.- u. Realschulen Württembergs. 1884, Heft 1 u. 2. Tübingen 1884, Verlag und Druck von Franz Fues (L. Fr. Fues'sche Sortimentsbuchhandlung). 18 S.

Als Verfasser zeichnet sich am Schlusse der Abhandlung Herr Otto Krimmel. Er hat eine warm empfundene Schilderung des einfachen Lebensganges und der mathematischen wie pädagogischen Verdienste des württembergischen Schulmannes geliefert, die bei der auch in weiteren Kreisen anerkannten Bedeutung Nagel's ein mehr als nur lokalpatriotisches Interesse wachzurufen vermag. Nagel war am 28. Februar 1803 in Stuttgart geboren, hat gleich vielen Zeitgenossen Theologie als Hauptfach, Mathematik nebenbei aber als Lieblingsfach studirt. Er starb in Ulm am 26. October 1882. Sein Name bleibt in der Geometrie durch die Nagelschen Punkte erhalten.

Der christliche Kalender alten und neuen Stils, in tabellarischer Form dargestellt von P. Schubring. Besonderer Abdruck aus den Jahrbüchern der königl. Akademie gem. Wissenschaften zu Erfurt. Neue Folge, Heft XII. Erfurt 1884, Druck von J. H. Cramer. 63 S. nebst 3 Beilagen. I. Immerwährender Kalender. II. Allgemeiner Ostervollmonds-Cyklus. III. Allgemeine Ostervollmonds-Tabelle für alten und neuen Stil.

Drei Zahlen, der Sonnenzirkel, die güldene Zahl, die Römer-Zinszahl, spielen in der Chronologie eine wichtige Rolle. Sie entsprechen dem 28 jährigen Sonnencyklus, nach dessen Ablauf die Sonntage auf die gleichen Monatstage zurückkehren, dem 19 jährigen Mondcyklus, nach welchem die Vollmonde auf die gleichen Monatstage zurückkehren, und endlich dem 15 jährigen Indictionscyklus. Aus den drei genannten Cyklen bildet sich ein grosser Cyklus von 28.19.15 = 7980 Jahren, der die Eigenschaften aller drei vereinigt. Diese grosse sogenannte Julianische Periode beginnt mit dem Jahre 4713 v. Chr. und das letzte Jahr ihrer ersten Vollendung wird das Jahr 3267 n. Chr. sein. Für das Jahr i nach Christi Geburt ist demnach stets:

- 1) Sonnenzirkel $\equiv i + 4713 \pmod{28}$ oder $= i + 9 \pmod{28}$,
- 2) Guldene Zahl $\equiv i + 4713 \pmod{19}$ oder $= i + 1 \pmod{19}$,
- 3) Römer-Zinszahl $\equiv i + 4713 \pmod{15}$ oder $\equiv i + 3 \pmod{15}$.

Abänderungen verursachen nun die Schaltjahre, deren Einführung und Berechnung erst im Julianischen, dann im Gregorianischen Kalender als allgemein bekannt vorausgesetzt werden darf. Will man in irgend einem Jahre das Datum der beweglichen Kirchenfeste, insbesondere des Osterfestes ermitteln, so muss also die Kenntniss der genannten Zahlen, vornehmlich des Sonnenzirkels und der güldenen Zahl, vorausgehen, auf welche die ganze sogenannte Osterrechnung sich stützt. Man verschafft sich die-^{3elben} entweder durch die erwähnten Congruenzen, die mit Hilfe der nöthigen Abänderungen richtig gestellt wurden, oder in bequemerer Weise durch em machinales Verfahren. Herr Schubring, von dessen chronologischwissenschaftlicher Thätigkeit im XXIX. Bande dieser Zeitschrift, hist.-lit. Abth. S. 180, die Rede war, hat die Aufgabe in der doppelten oben angedeuteten Art gelöst. Er hat in seiner Abhandlung die Berechnung jener wichtigen Zahlen gelehrt, er hat auch einen ungemein sinnreichen Apparat her-Zustellen gewusst, welcher durch einige Drehungen nach vollzogener Einstellung die Antwort auf die betreffenden Fragen abzulesen gestattet. Wir sind erzeugt, dass, wer Kalenderprobleme mehrfach zu lösen hat, sich an der and der Schubring'schen Belehrung bald auf einem Gebiete zu Hause hlen wird, das immerhin zu den von Schwierigkeiten durchschnitten Schört, wie sich schon daraus entnehmen lässt, dass Gauss es der with hielt, sich auf demselben umherzutummeln.

Kalender-Tabellen, zusammengestellt von Dr. Felix Müller, Oberlehrer am königl. Louisengymnasium zu Berlin. Berlin, bei Georg Reimer. 1885. 8 S. und 3 Tafeln.

Dieselbe Aufgabe, welche Herr Schubring, wie wir in der vorausgehenden kurzen Besprechung gesagt haben, seine Leser lösen lehrt, hat auch Herr Müller behandelt. Ein wesentlicher Unterschied besteht nur darin, dass Herr Müller die Rechnung selbst als ausgeführt voraussetzt und sich begnügt, die praktische Benutzung der Tabellen zu lehren, welche er mit Zugrundelegung der Piper'schen Abhandlung über die Gauss'sche Osterformel (Crelle XXII) herzustellen sich die grosse Mühe gab. Herrn Schubring's Arbeit muss man verstehen, um sie anzuwenden; Herrn Müller's Tabellen kann man anwenden, ohne ihre Herstellung klar zu übersehen, ühnlich etwa wie man Logarithmentabellen benutzen kann und thatsächlich auf der Schule benutzen lässt, ohne dass der Schüler weiss, wie die Tabelle eigentlich entstanden ist.

C. Neumann, Vorlesungen über Riemann's Theorie der Abel'schen Integrale. Leipzig, Teubner. 1884.

Dass ein Werk, wie das vorliegende, in zweiter Auflage erscheint, ist schon an und für sich mit grosser Freude zu begrüssen. Muss doch die Theorie der Abel'schen Functionen als die schönste Frucht der neueren Mathematik bezeichnet werden. Wenn also ein Werk, welches sich die Einführung in diese Theorie zur Aufgabe setzt, zahlreichen Absatz findet, so ist das ein erfreulicher Beweis, dass die Theorie selbst in immer weiteren Kreisen bekannt und gepflegt wird. Auch war die erste Auflage als ein sehr brauchbares Hilfsmittel bekannt und geschätzt, und es wurde allgemein anerkannt, dass der Verfasser es verstanden habe, der Riemann'schen Theorie ihre Schwierigkeit zu nehmen und Jedem, der die Elemente der Differential- und Integralrechnung erfasst hat, das Verständniss zu ermög-Die vorliegende zweite Auflage aber wird, daran zweifeln wir nicht, ihrem Zwecke noch weit besser dienen, da sie die Vorzüge der ersten Auflage beibehalten und denselben wesentliche neue hinzugefügt hat. Wenn das Vorwort zur ersten Auflage es als die Aufgabe des Werkes bezeichnete, die beiden in Riemann's Doctordissertation entwickelten Gedanken darzulegen, nämlich 1. die Definition einer Function durch gewisse Merkmale der Stetigkeit und Unstetigkeit, und 2. Ausbreitung einer Function auf einer mehrblättrigen Fläche: so trat in dem Werke selbst der zweite Gedanke, wenigstens räumlich, bedeutend mehr hervor als der erste und es wurde demselben in der Vorrede eine grössere Wichtigkeit beigelegt, als ihm nach der Ansicht vieler Mathematiker und, wie es scheint, nach der jetzigen Ansicht des Verfassers zukommt. Dagegen tritt dieser zweite Gedanks in der

11

neuen Auflage viel mehr zurück, und der erste Gedanke, die Bestimmung einer Function durch ihre charakteristischen Eigenschaften, wird bei der ganzen Behandlung bedeutend bevorzugt. Dadurch ist ein ganz neues Werk emtstanden, welches nicht nur den Inhalt der ersten Auflage (bis auf die Umkehrung der elliptischen Integrale und sonstig öfters wohl mit einigen Kurzungen) in sich aufgenommen hat, sondern demselben auch neue Partien hinzufügt, so dass das Werk in der neuen Gestalt nicht nur den Anfänger ohne zu grosse Mühe in die genannte Theorie einführt, sondern auch dem Forscher werthvolle Bereicherungen der Functionentheorie bietet. Zwar wird Jeder, welcher mit den Untersuchungen des Herrn Weierstrass bekannt ist, es lebhaft bedauern, dass derselbe noch immer seine Grundzüge der Functionentheorie nicht veröffentlicht hat; namentlich glauben wir, dass das sechste Capitel, die Theorie der algebraischen Functionen, kaum etwas bringt, was nicht schon in den Weierstrass'schen Vorlesungen bewiesen wird; aber das darf uns nicht hindern, den Untersuchungen des Buches alle Anerkennung auszusprechen.

Der Verfasser hat es sich keineswegs zur Aufgabe gestellt, die ausserste Strenge in seinen Entwickelungen und Beweisen zu beobachten. Er meint, es komme weniger auf eine strenge Darstellung, als darauf an, dass die angegebenen Methoden die zur strengen Darstellung erforderlichen Mittel gewähren. Demnach hat er die Theorie in derjenigen Form zu conserviren gesucht, in welcher sie von Cauchy und Riemann gegeben ist. Er hat, Torauf er selbst aufmerksam macht, manche fundamentalen Sätze in un-Senauer Form angegeben, ohne die Bedingungen, unter denen sie gelten, erschöpfend aufzuzählen. Hierdurch glaubt er dem Anfänger das Verständ-Piss erleichtert zu haben, während der Vorgeschrittene und an absolute Strenge Gewöhnte im Stande sei, "die in Rede stehenden Ungenauigkeiten eicht abzustreifen und die betreffenden Sätze in ihre wirklich correcte Ge-Stalt zu versetzen". Letzteres möchten wir bezweifeln; wir erinnern den Verfasser an seine Polemik mit Herrn Schwarz (S. 411), die sich ebenfalls auf solche Bedingungen bezieht. Auch auf folgenden Umstand möchten wir Anfmerksam machen: Im Werke selbst wird aus dem Satze, dass das Integral $\int f(s) ds$, hinerstreckt über die Begrenzung einer Fläche, auf wel-Cher f(s) überall stetig ist, stets gleich Null ist, gefolgert, dass auch die erste Ableitung auf der Fläche stetig ist; in der Vorrede heisst es um-Sekehrt: Das Cauchy'sche Theorem $\int f(z) dz = 0$ scheint nur dann ein Sebsolut strenges zu sein, wenn auf der Fläche A ausser der Stetigkeit **von** f(s) auch noch die von f'(s) vorausgesetzt wird. Dieser Gegensatz zwischen dem Werke selbst und der Vorrede zeigt, dass es nicht leicht ist, die Ungenauigkeiten abzustreifen. Was dann aber die Rücknicht auf den Anfänger angeht, so hätte sich dieselbe mit den Anforderungen den

Hist-lift Abthlg. d. Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXX, 4.

Strenge vereinigen lassen, wenn gewisse Partien äusserlich als für den Vorgeschrittenen bestimmt bezeichnet wären. Wir möchten jedoch ausdrücklich hervorheben, dass wir hiermit keinen Tadel gegen das Werk aussprechen wollen; wir sind dem Verfasser dankbar für das, was er uns bietet, ohne darüber zu rechten, was er uns hätte bieten können. Wenn wir aber einige leise Wünsche aussprechen dürfen, so möchten wir für die hoffentlich bald zu erwartende dritte Auflage die Aufmerksamkeit des Verfassers darauf richten, dass an solchen Stellen, wo ein genauer Ausdruck ebenso kurz und ebenso leicht verständlich ist wie ein ungenauer, ersterer vorzuziehen sei-Auch kann es uns nicht recht gefallen, dass er S. 393, ohne jede Andeutung, wie gewagt ein solcher Schluss ist, es als selbstverständlich hinstellt, dass jede reelle Function von zwei Veränderlichen, welche auf einer Fläche eindeutig und stetig ist, auf derselben einen Maximal- und Minimalwerth erreicht. Was die literarischen Notizen angeht, so möchten wir glauben, dass dieselben an einigen Stellen dem Anfänger (allerdings nur diesem) falsche Ansichten über den ersten Entdecker eines Satzes beibringen müssen, Dass die Function $\sqrt{(z-c_1)\dots(z-c_{2n-1})}$ im Punkte $s=\infty$ einen Windungspunkt hat, wird sehr schön hergeleitet, indem man in der Function $\sqrt{(s-c_1)\dots(s-c_{2n})}$ die Grösse c_{2n} unendlich gross werden lässt; daneben würden wir gern noch einen directen Beweis mitgetheilt sehen.

Als Hauptaufgabe des Werkes wird man es bezeichnen müssen, dass es in die Functionentheorie Cauchy's und Riemann's, mit specieller Rücksicht auf die Abel'schen Functionen, einführt. Dieser Aufgabe entspricht das Werk in vorzüglicher Weise. Die Klarheit des Ausdrucks und die Einfachheit der Beweise brauchen nicht ausdrücklich hervorgehoben zu werden: es sind das bekanntlich Vorzüge, welche allen Werken des Verfassers in hervorragendem Maasse eignen. Wir möchten daher vor Allem auf die passende Anordnung des Stoffes aufmerksam machen. Wenn wir die geometrischen Entwickelungen des Werkes übersehen, so erkennen wir, wie bedeutend der geometrische Apparat ist, den Riemann gebraucht, und wenn dem die geringe Ausdehnung dessen, was Riemann selbst giebt, zu widersprechen scheint, so muss man beachten, dass derselbe an den Lesereben ganz ausserordentliche Anforderungen stellt. Es war keine leichte-Aufgabe, die geometrischen Untersuchungen mit denen der Functionentheorie so zu verwirken, dass ein organisches Ganzes entstand. Es ging nicht an, den ganzen geometrischen Apparat in den Anfang zu stellen. Wenn wirauch anerkennen, dass diese analysis situs bei weiterer Ausbildung sich allgemein ein selbstständiges Interesse erringen wird, so glauben wir dochdass sie bei ihrem jetzigen Stande den Anfänger ermüdet, wenn er ihre-Anwendungen für die Functionentheorie nicht verfolgen kann. Demnachmuss es gebilligt werden, dass der Verfasser Geometrie und Analysis durch das ganze Werk hat abwechseln lassen. Dabei lag allerdings die Gefahr einer Zersplitterung des Stoffes sehr nahe: kaum sind die analytischen Untersuchungen begonnen und man muss wieder zu den ganz davon verschiedenen geometrischen Betrachtungen zurückkehren. Eine solche Zersplitterung ist unseres Erachtens beinahe gänzlich vermieden. Die ersten beiden Capitel bieten die Hauptsätze Cauchy's über Functionen; hier tritt die Nothwendigkeit, die Ausbreitung einer Function zu beachten, so deutlich hervor, dass die beiden folgenden Capitel, in denen diese Ausbreitung für sich betrachtet wird, keinen wesentlich verschiedenen Charakter zeigen, obwohl das Geometrische mehr hervortritt; und umgekehrt sind diese beiden Capitel, das dritte und vierte, mit so vielen analytischen Beispielen durchwirkt, dass das folgende Capitel nur eine allgemeine analytische Theorie dessen giebt, was vorher durch zahlreiche Beispiele vorbereitet war. In derselben Weise geht es weiter und wir stehen nicht an, die Anordnung des Stoffes (in dieser zweiten Auflage) geradezu als ein Meisterstück zu bezeichnen.

Der Stoff ist gegen die erste Auflage bedeutend vermehrt und umfasst das Abel'sche Theorem und das Jacobi'sche Umkehrproblem für beliebige algebraische Functionen, wobei die hyperelliptischen Functionen, auf welche sich die erste Auflage beschränkte, in den Vordergrund treten. Diese Er-Weiterung ist sehr zu billigen. Wenn der Anfänger sich in die allgemeine Theorie hineingearbeitet hat, so muss er auch die ganze Frucht seiner Anstrengungen geniessen und in dem gesteigerten Interesse einen Sporn erhalten, immer tiefer in die Theorie einzudringen. So hat das Buch jetzt den ganzen Inhalt der Riemann'schen Abhandlung "Theorie der Abel'schen Functionen" in sich aufgenommen und geht stellenweise darüber hinaus. Nur ist die Methode, durch welche Riemann für eine gegebene Gleichung die Verzweigung der entsprechenden Fläche ermittelt, nicht mitgetheilt, Vielmehr geht der Verfasser stets von der Riemann'schen Fläche aus und es gelingt ihm, in sehr einfacher Weise die Relation 2p = w - 2n + 2zwischen der Ordnungszahl 2p+1 der Fläche, der Zahl n ihrer Blätter und der Summe w der elementaren Windungspunkte zu ermitteln. An einer Stelle, wo Riemann's Behandlung sich auf einen nicht vollständig bewiesenen Satz zu stützen scheint, ist ein Weg angegeben, welcher nicht nur den betreffenden Beweis liefert, sondern auch direct zum Ziele führt. Es ist das der Anfang von § 23 der Riemann'schen Arbeit, welcher durch die Seiten 336-350 des Werkes eine neue Grundlage gewonnen hat.

Mitten im Werke werden die Riemann'schen Existenztheoreme betreffs der Abel'schen Integrale rein historisch mitgetheilt und auf ihre Herleitung vermittelst des Dirichlet'schen Princips nur hingedeutet. Hierbei wird diese Methode der Herleitung nur als eine mangelhafte, höchstens als eine divinatorische bezeichnet. Es gewährt vielleicht einiges Interesse, zu erfahren, dass Riemann selbst seine Methode im mündlichen Verkehr mit

Herrn Weierstrass durchaus nicht als streng angesehen wissen wollte, aber ganz richtig die Auffindung der Resultate als die erste, die strenge Beweisführung als die zweite Aufgabe der Wissenschaft bezeichnete. Herr Neumann hat nun in den drei letzten Capiteln einen Beweis dieser Existenztheoreme geliefert. Dieser Beweis wird geführt mittels derjenigen Methoden, welche sich in früheren Arbeiten des Verfassers als äusserst brauchbar erwiesen haben. Nach allgemeinen Vorbereitungen wird zunächst nach einer neuen Methode das schon öfters behandelte Problem gelöst: eine stetige Function U von x und y zu finden, welche innerhalb einer Kreisfläche der Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$$

genügt und am Rande beliebig vorgeschriebene Werthe erhält. Diese Lösung wird zunächst auf eine mehrblättrige Fläche übertragen und dann gezeigt, wie man aus einer solchen Kreisfläche der Reihe nach beliebig viele Kreise ausschneiden und jedesmal für die neue Fläche die Lösung angeben könne. In Betreff der Durchführung dieses Gedankens müssen wir auf das Werk selbst verweisen und fordern zum Schluss namentlich die Studirenden zum eifrigen Studium desselben auf.

Braunsberg.

W. KILLING.

Einleitung in die Theorie der elliptischen Functionen. Von Karl Bober, Privatdocent für Mathematik im Allgemeinen.

Das Buch stellt sich die Aufgabe, einen kurzgefassten, auf das Wesentlichste beschränkten Abriss der Theorie der elliptischen Functionen und Integrale zu geben, indem es dem Anfänger möglich macht, sich rascher in dieses Gebiet einzuführen, als dies die ausführlichen Lehrbücher gestatten. Die benutzten Methoden sind wesentlich dieselben wie in dem Koenigsberger'schen Werke über elliptische Functionen. In der Einleitung finden wir eine Zusammenstellung der wichtigsten Sätze über Functionen complexer Variabeln und die Integrale derselben. Nach des Referenten Ansicht hätte hierbei auf den allgemeinen Begriff der Function genauer eingegangen werden sollen; die Definition, dass f(z) als Function von z zu betrachten sei, wenn $\frac{df(z)}{dz}$ von dz unabhängig ist, dürfte für den Anfänger ohne weitere

Erläuterung kaum verständlich sein. Das bestimmte Integral $W = \int_{z_{c}}^{z_{c}} f(z) dz$

wird durch die Relation $\frac{dW}{dz} = f(s)$ definirt; hiernach ist aber nicht ersichtlich, was s_0 mit W überhaupt zu thun hat und was unter dem Integrationswege zu verstehen ist; auch wenn man sich das Fehlende in des

Definition ergänzt, dürften doch die folgenden Betrachtungen über den Einfluss des Integrationsweges nicht ausreichend sein. — Die Einführung doppeltperiodischer Functionen im ersten Theile geschieht nicht, wie bei Koenigsberger, auf Grundlage der elliptischen Integrale, sondern ohne weitere Begründung. Recht eingehend wird der Zusammenhang der doppelt-periodischen Functionen unter einander, sowie die Theorie der Additionstheoreme (letztere zuerst für die elliptischen Functionen und dann hierauf gestützt für die Thetas) behandelt, während die Entwickelung in unendliche Producte und Partialbruchreihen wegbleibt. Der zweite Theil umfasst in zweckmässiger Beschränkung die Theorie der Riemann'schen Flächen speciell für die Function $y = \sqrt{A(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)(x-a_4)}$, und hierauf basirt die Entwickelung der elliptischen Normalintegrale. — Sehr willkommen wird vielen Lesern der Anhang sein, der die Beziehungen der elliptischen Transcendenten zu den Curven vom Geschlecht 1 darthut und hiermit ein interessantes Gebiet dem Studium zugänglicher macht.

Die Darstellungsweise des Werkes ist, von schon erwähnten Einzelheiten abgesehen, klar, der Inhalt bei aller Einschränkung reichhaltig, so dass es mit Vortheil zum einleitenden Studium benutzt werden kann.

Frankfurt a. M., im April 1885.

Dr. Otto RAUSENBERGER.

FRANKE, Die Koordinaten-Ausgleichung nach Näherungsmethoden in der Klein-Triangulirung und Polygonalmessung. München, Grubert. 1884. VI u. 156 S. mit 1 Tafel. Preis 1,60 Mk.

Die vorstehende Schrift bildet eine Ergänzung zu des Verfassers bekannten "Grundlehren der trigonometrischen Vermessung im rechtwinkligen Coordinatensystem". Während in dem letztern Buche alle Ausgleichungsrechnungen streng nach der Methode der kleinsten Quadrate geführt sind, werden in der obigen Schrift für die Detailvermessungsarbeiten Näherungsmethoden der Ausgleichung entwickelt und Näherungsgrenzen der zulässigen Fehler aufgestellt. Am Schlusse werden Vergleiche zwischn methodischen und näherungsweisen Ausgleichungen gegeben, welche zeigen, dass die letzteren allen praktischen Ansprüchen an die Genauigkeit genügen.

Es fragt sich in der That, ob in den letzten Jahren, nachdem kaum Bussole und Messtisch als Instrumente zu genaueren Horizontalvermessungen verabschiedet wurden, nicht mit Einem Male des Guten etwas zuviel geschehen ist, als man selbst für ganz untergeordnete Aufgaben der Detailvermessung die strenge Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate verlangte; es möchte hier doch dann und wann ein Missverhältniss zwischen den Messungsgrundlagen einerseits und der angestrebten Genzzigkeit der Resultate, sowie dem dazu nöthigen Rechnungsapparat andererseits obwalten. Rationelle und vereinfachte Rechnungsverfahren, welche von

der Methode der kleinsten Quadrate ausgehen, scheinen für viele Zwecke ganz angezeigt und es sei deshalb die vorliegende Schrift als ein dahinzielender Versuch bestens empfohlen.

Börsch, Anleitung zur Berechnung geodätischer Coordinaten. 2. Aufl. Cassel, Freyschmidt. 1885. VIII u. 167 S. mit 2 Tafeln. Preis 6 Mk.

Diese Neuauflage der ursprünglich nur zur Verwendung bei der kurhessischen Neuvermessung bestimmten Schrift ist durch wesentliche Erweiterungen zu einem recht praktischen geodätischen Hilfsbuche geworden. Man möchte nur, nachdem im Abschnitt I eine Einleitung über die mathematische Grundlage der Formeln geboten werden soll, wünschen, dass dieselbe entweder etwas ausführlicher oder einfach als Formelsammlung behandelt wäre; denn ob auf 20 Seiten Analysis, sphärische Trigonometrie und analytische Geometrie so abgehandelt werden können, dass in der That "dem praktischen Feldmesser und dem in der mathematischen Analysis weniger Geübten jede Frage über die Ableitung der Formeln und über die Berechnung geodätischer Coordinaten beantwortet wird", erscheint zweifelhaft. zweite Abschnitt behandelt das Erdsphäroid, der dritte die verschiedenen Systeme geodätischer Coordinaten. Im Anhang dieses Abschnittes sind einige geodätische Aufgaben speciell behandelt, wobei für die Ausgleichung der Pothenot'schen Aufgabe eine elegante Methode durch Ausgleichung der gemessenen Winkel statt (nach Gauss und Gerling) der Coordinaten des zu bestimmenden Punktes gegeben ist. Der vierte Abschnitt endlich enthält vollständige Tafeln zur Berechnung geodätischer Coordinaten von 36° bis 71° Breite, also für ganz Europa ausreichend. Die sämmtlichen Tafeln scheinen sehr correct zu sein. HANNER.

Dr. Jac. J. WEYRAUCH, Prof. a. d. polytechn. Schule in Stuttgart:

- Theorie elastischer Körper, eine Einleitung zur mathematischen Physik und technischen Mechanik. Mit 42 Figuren im Text. Leip zig, Teubner. 1884;
- Aufgaben zur Theorie elastischer Körper. Mit 110 Figuren ims Text. Leipzig, Teubner. 1885;
- 3. Das Princip von der Erhaltung der Energie seit Robert Mayer_ Zur Orientirung. Leipzig, Teubner. 1885. 48 S.

"An Lehrbüchern der Mechanik fehlt es nicht; eine allgemeine Grundlage für meine Vorträge über Elasticitäts- und Wärmetheorie, Aero- und Ingenieurmechanik war jedoch nirgends zu finden" schrieb der Herr Verfasser an den unterzeichneten Referenten, als er sich mit dessen Absicht, die nunmehrige Anzeige des ersten Buches bis zum Erscheinen des zweiten zu verschieben, brieflich einverstanden erklärte. "Dass mein Buch beim Studium Schwierigkeiten bereitet, gebe ich zu, das ist bei jedem Werke über elastische Körper der Fall, bei dem meinigen aber, wie ich glaube, weniger als bei Clebsch, Kirchhoff u. A." Diesem Ausspruch ist gewiss beizupflichten; aber wenn es im Vorwort zu 1 heisst, dass von mathematischen Vorkenntnissen nur soviel vorausgesetzt wird, als man sich auf der Mittelschule oder doch nach einjährigem Besuche der Hochschule erwerben kann, so scheint mir für die grosse Mehrzahl der Studirenden der mündliche Vortrag eines Lehrers wie Herr Prof. Weyrauch sehr nothwendig, sollen dieselben von dem Buche einen Nutzen ziehen. Für reifere Leser sind aber die physikalischen Excurse wie z. B. auf das Gebiet der Schwingungslehre (die beiden letzten Abschnitte XI und XII) nicht ausreichend und auch vom Herrn Verfasser nicht angelegt.

Der erste Abschnitt, § 1—12, S. 1—29, handelt von den Grundbegriffen. In § 1 ist die bekannte Beschleunigung "specifische Massenkraft" genannt. In § 2 ist der elastischen Nachwirkung mit acht Zeilen gedacht. Auf die Verrückungen im § 4 folgen im § 5 die Dehnung und die Drehungen, in welchen schon Manches dem mündlichen Unterricht oder sonst zuwiel dem Privatverständnisse des Studenten (im dritten Semester) überlassen wird.

Das Aufgabenbuch (2) trägt an der Spitze ein Inhaltsverzeichniss von 134 Nummern, jede mit der Paragraphenzahl des Buches 1 versehen, welche zur Lösung nachgeschlagen werden soll. Die erste Aufgabe schliesst sich an vorhingenannten § 5 an, von Aufgabe 108 an ist wiederum die Schwingungslehre bedacht. Ein völliges Register hier zu geben, würde bei der Reichhaltigkeit des Buches weitläufig werden und ist auch nicht nöthig, da die Interessenten der reinen und angewandten Mathematik dasselbe gewiss selber in die Hand nehmen und auf seinen Inhalt prüfen werden.

3. Diese Brochure enthält einen Vortrag des Herrn Verfassers im Lande Robert Mayer's nebst wissenschaftlichen Ergänzungen und Literaturnachweisen. S. 8 sind nach diesem Autor als "Kraftformen" aufgeführt: "Fallfraft, Bewegung (!); Wärme (!), Magnetismus etc"; S. 9 kritisirt der Herr Verfasser die Vorgänger R. Mayer's, dass sie "den Begriff Kraft nicht allgemein genug fassten". Referent pflichtet der entgegengesetzten Ansicht bei, dass man Kraft nur als Masse mal Beschleunigung fassen solle, welchem Begriffe gegenüber auch Worte wie Magnetismus zu vag und allgemein Schalten sind.

perspectivischer Apparat, von Guido Hauck. Separatabdruck aus der Festschrift der königl. Technischen Hochschule zu Berlin zur Feier der Einweihung ihres neuen Gebäudes. Berlin 1884. 4°. 20 8. mit 2 Figurentafeln.

0 17

Die Aufgabe der darstellenden Geometrie im engeren Sinne des Wortes besteht darin, aus irgend zwei gegebenen Projectionen eines räumlichen Gebildes eine dritte Projection desselben zu ermitteln. Diese Aufgabe ist dem Grundgedanken nach nicht abhängig von der Art der Projectionen. Es mag nun verlangt werden, aus Aufriss und Grundriss eine Centralprojection entstehen zu lassen oder aus zwei Centralprojectionen (z. B. zwei photographischen Aufnahmen) eine orthogonale Parallelprojection, Grundriss oder Aufriss, abzuleiten, immer hat man es mit einer Aufgabe der ebengenannten Natur zu thun. Herr Hauck hat nun den Versuch gewagt, diese allgemeine Aufgabe mechanisch zu lösen, d. h. einen Apparat herzustellen, der mit zwei Führungsstiften die Umrisse der beiden gegebenen Projectionen verfolgt und zugleich durch einen Zeichenstift die gewünschte neue Projection erzeugt. Die uns vorliegende Abhandlung enthält die photographische Abbildung des von Herrn Hauck eigenhändig zugerichteten und bereits am 4. Mai 1883 in der Sitzung der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin fertig vorgezeigten und erläuterten Apparates mit der nöthigen wissenschaftlichen Erklärung und Begründung. Es erscheint kaum möglich, auszugsweise und ohne Figur über die ziemlich zusammengesetzte storchschnabelartige Verbindung mannigfacher geschlitzter Lineale zu berichten. Wir glauben daher, unter Verweisung unserer Leser auf die Abhandlung selbst uns mit dem Ausspruche des geometrischen Fundamentaltheorems begnügen zu müssen, auf welchem die ganze Ausführung beruht und welches Herr Hauck in folgende Worte kleidet:

Seien P und P' zwei Projectionsebenen, die sich in der als Grundschnitt bezeichneten Linie g schneiden; seien O und O' die zugehörigen Projectionscentren. Die Verbindungslinie OO' schneide die Ebenen P und P' beziehungsweise in den Punkten p und p', welche als die Kernpunkte der betreffenden Projectionsebenen bezeichnet werden. Sind nun x und x' die beiderseitigen Projectionen irgend eines Objectpunktes X, so müssen sich die nach ihnen gezogenen Kernstrahlen px und p'x' in einem Punkte g des Grundschnittes g schneiden, g schneiden, g schneiden

Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik und die Gesetze des Reliefs.

Rede, zum Geburtstage Seiner Majestät des Kaisers und Königs in der Aula der königl. Technischen Hochschule zu Berlin am 21. März 1885 gehalten von dem zeitigen Rector Guido Hauck. Berlin 1885. 20 S.

Hört eine Zeichnung grau in grau, also ohne Farbenunterschied gefertigt, auf, dem Gebiete der Malerei anzugehören? Ist eine mit Farben

thermalte Bildsaule dem Gebiete der Plastik entrückt? Man braucht beide Fragen nur auszusprechen, um ihrer sofortigen Verneinung sicher zu sein. Zugleich überzeugt man sich aber von der Nothwendigkeit, die Grenzezwischen beiden Kunstbereichen, die in unserem Bewusstsein scharf aus sinanderliegen, auch scharf zu definiren. Es war ein Ei des Columbus aufrustellen, und Herrn Hauck ist der Versuch vortrefflich geglückt. Die Malerei, sagt er, hat Licht und Schatten in sich selbst, die Plastik entlehnt es von aussen. Zwischen der Projection auf die Ebene mit angedeuteter Schattengebung und dem körperlichen Vollbilde mit natürlich entstehenden Schatten ist als Drittes das Relief. Von der Malerei entnimmt es Verkürzungen und Verschiebungen, auch einige Schattengebung, von der Plastik die nicht zu vermeidende Lichtwirkung körperlichen Vorund Zurücktretens. Es muss mathematische Gesetze des Reliefs geben, es muss möglich sein, die Forderung in eine Formel zu bringen, dass man einer photographischen Aufnahme nachträglich nicht ansehen dürfe, ob das Original Relief oder Vollrund war, eine Forderung, der Hanfstängel's grosse Photographien Thorwaldsen'scher Reliefs auf schwarzem Grunde vollauf gerecht werden. Das muss mathematisch aussprechbar sein. hat auch eine Zeit lang geglaubt, in der sogenannten Reliefperspective des Räthsels Lösung erkannt zu haben, es war ein Irrthum. Gerade Thorwaldsen's Reliefs, das Muster, an welchem eine richtige Regel sich bewahrheiten muss, sind Pfuschwerke, wenn die Gesetze der Reliefperspective Richtigkeit Anspruch machen könnten. Die umgekehrte Folgerung ist Tabweisbar und es bleibt der darstellenden Geometrie die noch ungelöste Aufgabe, mathematische Gesetze des Reliefs zu entdecken. So der wesentiche Inhalt der ungemein anregenden Festrede. CANTOR.

Wie studirt man Mathematik und Physik? Von einem Lehrer der Mathematik. Leipzig 1885, Rossberg'sche Buchhandlung. 12°. 32 S.

Für 60 Pf. beantwortet die Verlagshandlung diese Frage, und um den Bleichen Preis kann man erfahren, wie man Jurisprudenz, wie neuere Philologie und Germanistik, classische Philologie und Geschichte, Chemie und die beschreibenden Naturwissenschaften studire. Nur wie man sich zum Arzt und wie zum Landwirth bilde, kostet 80 Pf., und es ist eine Preisfrage, womit dieser Unterschied sich begründen lasse, warum gerade auf jenen beiden Gebieten guter Rath theurer sei? Jedenfalls scheint bei unserer studirenden Jugend das praktische Bedürfniss nach Rathschlägen über die Einrichtung des Studiums vorhanden zu sein, und unzweifelhaft wird Zeit und Mühe gespart, wenn die richtigen Vorlesungen in der richtigen Reihenfolge gehört werden. Für die Universität Leipzig haben die dortigen Professoren der Mathematik im März 1882 die nöthigen Weisungen vertigen

licht, und auf diese Weisungen bezieht sich unsere Vorlage. Nur schade, dass die mathematischen Vorlesungen anderer deutscher Universitäten sich nicht alle dem gleichen Schema einfügen, dass die Mathematiker gewöhnt sind, mit ihrem Stoffe frei zu schalten, so dass der gleiche Name nicht selten zwei ganz verschiedene, verschiedene Namen ziemlich übereinstimmende Vorlesungen bezeichnen können. Uns scheint daher am sichersten, der junge Studirende solle an irgend einen Lehrer der Hochschule, die er zu besuchen gedenkt, sich vertrauensvoll wenden, seine Bitte um Rath wird sicherlich nie eine Fehlbitte sein. Zieht er aber den Rath von Altersgenossen vor, was ja Manches für sich hat, so wende er sich an den mathematischen Verein der betreffenden Universität. Solche wissenschaftliche Vereine wirken an und für sich auf's Segenvollste und der Eintritt kann jedem Neuling nur dringend gerathen werden. CANTOR.

Bibliographie

vom 1. Mai bis 30. Juni 1885.

Periodische Schriften.

Physikalische Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1884. Berlin, Dümmler. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, mathemat.-naturwissenschaftl. Classe, Abth. II. 90. Bd., 3., 4. u. 5. Heft. Wien, Gerold. Publicationen des astrophysikalischen Observatoriums in Potsdam. Nr. 15. 4. Bd. 2. Stück. (Meteorolog. Beobacht.) Leipzig, Engelmann. 7 Mk. Astronomisches Jahrbuch von Berlin für das Jahr 1887, herausgeg. von 12 Mk. F. Tietjen. Berlin, Dümmler. Die veränderlichen Tafeln des astronom. u. chronolog. Theils des k. preuss. Normalkalenders f. 1886, herausgeg. v. Förster u. P. Lehmann. Berlin. Verl. d. statist. Bureaus. 5 Mk. Acta mathematica, herausgeg. von G. MITTAG-LEFFLER. 6. Bd. 1. Heft, Berlin, Mayer & Müller. compl. 24 Mk. Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, herausgeg. von C. Ohrt-MANN. 14. Bd. Jahrg. 1882, 3. Heft. Berlin, G. Reimer. 6 Mk. Fortschritte der Physik im Jahre 1881, dargestellt von der physikal. Gesellschaft in Berlin. 37. Jahrg.; redig. v. Nerssen. 1. Abth.: Allgem. JW Physik und Akustik. Berlin, G. Reimer.

ĭ

Reine Mathematik.

- WEIGHTOLDT, E., Ueber Functionen, welche gewissen Differenzengleichungen höherer Ordnung gentigen. Kiel, Lipsius & Tischer. 2 Mk. 40 Pf.
- SPITZER, S., Untersuchungen im Gebiete linearer Differentialgleichungen.

 3. Heft. Wien, Gerold.

 3 Mk.
- GEGENBAUER, L., Arithmetische Theoreme. II. (Akad.) Wien, Gerold.

 1 Mk. 80 Pf.
- SIMONY, O., Ueber zwei universelle Verallgemeinerungen der algebraischen Grundoperationen. (Akad.) Ebendas. 1 Mk. 60 Pf.
- WEISS, E., Entwickelungen zum Lagrange'schen Reversionstheorem mit Anwend. auf die Keppler'sche Gleichung. (Akad.) Ebendas. 2 Mk.
- SERRET, A., Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung. Deutsch bearb. v. A. HARNACK. 2. Bd., 2. Hälfte. (Differentialgleichungen.) Leipzig, Teubner. 7 Mk. 20 Pf.
- DANITSCH, D., Conforme Abbildung des ellipt. Paraboloids auf d. Ebene.
 (Dissert.) Jena, Deistung.

 1 Mk.
- TAUBERTH, J., Die Abbildung des ebenen Kreissystems auf den Raum. (Dissert.) Ebendas. 60 Pf.
- WALLENTIN, F., Maturitätsfragen aus der Mathematik. 2. Aufl. Wien, Gerold. 3 Mk. 60 Pf.
- Grant, J., Ueber die sich rechtwinklig schneidenden Normalen einer Fläche zweiten Grades. Schaffhausen, Schoch. 2 Mk.
- THIRME, H., Sammlung von Lehrsätzen und Aufgaben aus der Stereometrie. Leipzig, Teubner. 1 Mk. 20 Pf.
- Möbius, A. F., Gesammelte Werke, herausgegeben von der K. S. Gesellsch. d. Wissensch. 4 Bde. 1. Bd. (geometr. Abhandl.), redig. v. R. Baltzer. Leipzig, Hirzel.
- BJERKNES, A., Niels Henrik Abel. Tableau de sa vie et de son action scientifique. Paris, Gauthier-Villars. 7 Frs.

Angewandte Mathematik.

- WITTEREN, Th., Das mathematische Risico der Versicherungsgesellschaften sowie aller auf dem Spiele des Zufalls beruhenden Institute. Hannover, Hahn.

 4 Mk.
- KOPPE, C., Die Ausgleichungsrechnungen nach der Methode der kleinsten Quadrate in der praktischen Geometrie. Nordhausen, Koppe. 6 Mk.
- KOPALLIE, J., Vorlesungen über die Chronologie des Mittelalters. Wien, Gerold.
- BOHMENBERGER, F., Die Berechnung trigonometrischer Vermessungen mit Rücksicht auf die sphäroidische Gestalt der Erde. Deutsch v. E. Hannen. Stuttgart, Metzler.

 1 Mk. 80 Pt.

ADAM, V., Bruchstücke aus der mathematischen Geographie mit bes. Rücksicht auf Beleuchtungsverhältnisse. Wien; Bermann & Altmann. 1 Mk. Kraft, E., Sammlung von Problemen der analytischen Mechanik. 9. u. 10. Lief. Stuttgart, Metzler. 4 Mk. Herz, N., Entwickelung der störenden Kräfte nach Vielfachen der mittleren Anomalie in independenter Form. (Akad.) Wien, Gerold. 80 Pf.

OERTEL, K., Astronomische Bestimmung der Polhöhen auf den Punkten Irschenberg, Höhensteig u. Kampenwand. (Akad.) München, Franz. 2 Mk. Serrieri. A.: Die mechanischen elektrostatischen und elektromagnetischen

SERPIERI, A., Die mechanischen, elektrostatischen und elektromagnetischen absoluten Maasse, elementar abgehandelt mit Aufgaben. Aus dem Italienischen von R. v. REICHENBACH. Wien, Hartleben. 3 Mk.

Physik und Meteorologie.

DREHER, E., Ueber den Begriff der Kraft mit Rücksicht auf das Gesetz von der Erhaltung der Kraft. Berlin, Dümmler. 1 Mk.

Kiessling, J., Die Dämmerungserscheinungen im Jahre 1883 und ihre physikalische Erklärung. Hamburg, Voss.

1 Mk.

Sohncke, L., Der Ursprung der Gewitter-Elektricität und der gewöhnlichen atmosphärischen Elektricität. Jena, Fischer. 1 Mk. 50 Pf.

Schlemüller, W., Grundzüge einer Theorie der kosmischen Atmosphären mit Berücksichtigung der irdischen Atmosphäre. Prag, Dominicus.

1 Mk. 20 Pf.

Mathematisches Abhandlungsregister.

1884.

Erste Hälfte: 1. Januar bis 30. Juni.

- Abbildung.

 1. Ueber die isothermische Spiegelung. Holzmüller. Crelle XCIV, 179.

 2. Zur conformen Abbildung der Cyklide auf Rechteck und unbegrenzte Ebene.
 Holzmüller. Crelle XCIV, 237, 342.
- 3 Ueber eine ein-dreideutige ebene Abbildung einer Fläche dritter Ordnung. S. Kantor. Crelle XCV, 147.
- 4. Sur la représentation sphérique des surfaces. G. Darboux. Compt. rend. XCV1, 866.

Vergl. Differentialgleichungen 91.

Abel'sche Transcendenten.

5. On some Abelian integrals. H. J. R. Rink. Quart. Journ. math. XIX, 347. 6. Ueber einige Abel'sche Integrale erster Gattung. H. J. Rink. Zeitschr. Math.

Phys. XXIX, 272.

7. Sur les équations différentielles abéliennes dans le cas de la réduction du nombre des périodes. E. Picard. Compt. rend. XCV, 898. Vergl. Differentialgleichungen 83.

Analytische Geometrie der Ebene.

- 8. Sur l'équation intrinsèque des courbes. E. Cesaro. Mathesis IV, 233.
- 9 Propriété de points harmoniques. Bastin. Mathesis IV, 206. Cesaro ibid. 207.
- Ueber das gleichseitige Dreieck. Em. Hain. Grun. Archiv LXIX, 44.
 Ueber das Centrum der mittleren Entfernungen der Schnittpunkte einer Geraden
- mit drei festen Geraden M. Greiner. Grun. Archiv LXIX, 323.

 12. Trouver, sur une droite donnée, le point M tel que le triangle ayant pour sommets les projections de ce point sur les côtés d'un triangle donné ABC, soit un minimum. Bastin. Mathesis IV, 118. J. Neuberg ibid. 119.
- 18. Lieu géométrique faisant ressortir deux triangles équivalents. Bastin. Ma-
- thesis IV, 88. Equation entre les aires de trois triangles construits sous certaines conditions.
 F. Minoliti, Mathesis IV, 69.

 Zur Trisection des Winkels. B. Sporer. Grun. Archiv LXIX, 224.
 Anerkennung einer Priorität. C. Hossfeld. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 192.

- [Vergl. Bd. XXIX, Nr. 8.] 17. Sur une courbe du 3. et une autre du 8. degré. Bastin. Mathesis IV, 225. Bergmans ibid. 236.
- 18. On the bitangents of a plane quartic. A. Cayley. Crelle XCIV, 93.
- Résumé de differentes recherches sur les ovales de Descartes et quelques autres courbes. A. Genocchi. Mathesis IV, 49.
 Sur une courbe dont l'abscisse s'exprime en fonction de l'ordonnée par une quadrature. Brocard. Mathesis IV, 126.
- ^{21.} Trajectoires orthogonales des courbes $e^2 = a^2 \log \frac{tg \, \omega}{c}$. Brocard. Mathecis
 - IV, 125. Vergl. Cissoide. Conchoide. Elliptische Transcendenten 184. Kagelschmitte-

Analytische Geometrie des Raumes.

- 22. Ueber Coordinatentransformationen nien Grades. Th. Reye. Crelle XCIV, 312.
 23. On curvilinear coordinates. A. Cayley. Quart. Journ. math. XIX, 1.
 24. Zur Polarentheorie der Complexe zweiten Grades. W. Stahl. Crelle XCIV, 819.

- 25. Ueber Strahlensysteme zweiter Ordnung. W. Stahl. Crelle XCV, 297.
 26. Erzeugung von Complexen ersten und zweiten Grades aus linearen Congruenzen. A. Weiler. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 187. [Vergl. Bd. XXVIII, Nr. 132.]
- 27. Bemerkungen über einige Complexe. A. Weiler. Zeitschr. Math. Phys. XXIX,
- 28. Einfache Erzeugung einiger Complexe zweiten Grades. A. Weiler. Crelle XCV, 140.
- 29. Ueber lineare und quadratische Strahlencomplexe und Complexen-Gewebe. Th. Reye. Crelle XCV, 330.

 30. Zur Theorie der Raumcurven. C. Hossfeld. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 242.

 31. Sur les courbes du sextant. Gruey. Compt. rend. XCVI, 240.

- 32. Sur une espèce de courbes symétriques de la sixième classe. C. Crone. Acta mathematica II, 81. Vergl. Oberflächen. Oberflächen zweiter Ordnung.

Astronomie.

- 33. Sur l'équation différentielle qui donne immédiatement la solution du problème des trois corps jusqu'aux quantités du deuxième ordre inclusivement. H. Gyldén. Compt. rend. XCV, 57. 34. Sur un point de la théorie des perturbations. R. Radau. Compt. rend. XCV, 117.
- 35. Sur les perturbations de Saturne dues à l'action de Jupiter. A. Gaillot. Compt. rend. XCVI, 626.
- 36. Tables auxilières pour calculer l'anomalie vraie des planètes. Ch. V. Zenger. Compt. rend. XCV, 208.
 87. Théorie du mouvement diurne de l'axe du monde. Folie. Compt. rend.
- XCV, 163.
- 88. Sur le calcul des variations séculaires des éléments des orbites. O. Callandreau. Compt. rend. XCVI, 1841.
- Bestermes à courte période dans le mouvement de rotation de la terre. C. Rozé. Compt. rend. XCV, 327.
 Sur la théorie du Soleil de C. W. Siemens. Faye. Compt. rend. XCV, 612, 1110; XCVI, 79, 136, 292, 355. Siemens ibid. XCV, 769, 1037; XCVI, 43. Hirn ibid. XCV, 812, 1195. Rey de Morande ibid. XCV, 980. J. Violle ibid. XCVI, 258.
- 41. Méthodes nouvelles pour la détermination des ascensions droites et des déclinaisons absolues des étoiles. Loewy. Compt. rend. XCVI, 1098, 1179, 1329, 1745, 1813.
- 42. Sur une manière de déterminer l'angle de position d'un point de la surface d'un astre à l'aide d'une lunette horizontale. Ch. Trépied. Compt. rend. XCVI, 1198.
- 43. Sur l'emploi de la lunette horizontale pour les observations de spectroscopie solaire. Thollon. Compt. rend. XCVI, 1200.
- 44. Sur la possibilité d'accroître dans une grande proportion la précision des observations des éclipses des satellites de Jupiter. A. Cornu. Compt. rend. XCVI, 1609.

Vergl. Keppler'sches Problem. Oberflächen 342. Reihen 417.

Bernoulli'sche Zahlen.

- 45. Studien über die Bernoulli'schen und Euler'schen Zahlen. J. Worpitsky. Crelle XCIV, 203. - Kronecker ibid. 268.
- 46. Ueber die Partialbruchzerlegung der Functionen, mit besonderer Anwendung auf die Bernoulli'schen. J. Worpitzky. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 45.

Bestimmte Integrale.

- 47. On certain definite integrals connected with spherical harmonics. P. Frost. Quart. Journ. math. XIX, 242.
- 48. Sur une classe de fonctions représentées par des intégrales définies. E. Goursat. Acta mathematica II, 1.

49. Sur l'intégrale
$$\int_{0}^{1} \varphi(x) \cdot \psi(x) \cdot dx$$
. A. Korkine. Compt. rend. XCVI, 826.

50. Ueber das Doppelintegral. P. du Bois-Reymond. Crelle XCIV, 273.

51. Sur les intégrales doubles
$$\int_{t_0}^{t_1} dt \int_{u_0}^{u_1} du \frac{F(u,t,z)}{G(u,t,z)} = \Phi(z)$$
. E. Goursat. Compt.

rend. XCVI, 1304. $\frac{2\pi 2\pi}{2}$ 52. Sur l'intégrale $\int_{-1}^{2\pi} \frac{\cos ix.\cos jy.dx.dy}{\sqrt{1+\alpha^2-2\alpha(\mu.\cos x+\nu.\cos y)}}$. O. Callandreau. Compt.

rend. XCVI, 1125. Vergl. Analytische Geometrie der Ebene 20. Differentialgleichungen 86. Ellipse 122. Elliptische Transcendenten. Gammafunctionen. Quadratur. Reihen 425. Rectification.

C.

Cissoide.

Die Cissoide des Diokles. M. Greiner. Grun. Archiv LXIX, 313.

64. Système des cissoïdes et sa trajectoire orthogonale. Brocard. Mathesis IV, 124.

Combinatorik.

55. Ein combinatorischer Satz. M. Stern. Crelle XCV, 102.

56. Sur les permutations de nobjets et sur leur classement. J. Bourget. Compt. rend. XCV, 508.

Complanation. 57. Die Oberfläche der beiden Paraboloide. O. Böklen. Grun. Archiv LXIX, 222.

Conchoide.

58. Sur un mode de génération des conchoïdes. H. Schoentjes. Mathesis IV, 145. - Derousseau ibid. 237. — M. d'Ocagne ibid. 237.

59. Sur le limaçon de Pascal. Bastin & Gillet. Mathesis IV, 117.

60. Conchoide comme lieu des points où certaines droites touchent des cercles qui leur correspondent. Brocard. Mathesis IV, 204.

Cubatur.

61. Volume limité par un plan et par une surface engendrée par une ellipse. Derousseaux & Keelhoff. Mathesis IV, 229.
62. Volume limité dans l'ellipsoide. Bastin. Mathesis IV, 192.

Vergl Quadratur 403.

D.

Determinanten. 68. Sur une application du déterminant cyclo-symmétrique. A. Legoux. Quart.

Journ. math. XIX, 41. — A Lodge ibid. 257. 84. Sur une formule de Lagrange déjà généralisée par Cauchy. Em. Barbier. Compt. rend. XCVI, 1845.

65. Ueber einige Determinantengleichungen. E. Hunyady. Crelle XCIV, 171. 66. Ueber einige Determinantenidentitäten, welche in der Lehre von den perspectivischen Dreiecken vorkommen. F. Caspary. Crelle XCV, 36. [Vergl. Bd. XXVIII, Nr. 58.] Vergl. Optik 371.

Differentialgleichungen. 67. Zur Theorie der linearen Differentialgleichungen L. W. Thomé. Crelle XCV,

44. [Vergl. Bd. XXVIII, Nr. 66.] 68. Sur les groupes d'équations linéaires. H. Poincaré. Compt. rend. XCIV, 691, 1802.

69. Sur les groupes de transformation des équations différentielles linéaires. E.

Picard. Compt. rend. XCVI, 1131.

70. Zur Theorie der totalen linearen Differentialgleichungen. B. Weinstein.

Gran. Archiv LXIX, 225.

71. Sur les intégrales algébriques des équations différentielles linéaires à coefficients rationnels. L Autonne. Compt. rend. XCVI, 58.

122. Moyenne de rayons vecteurs d'une ellipse. E. Cesaro. Mathesis IV, 40. Vergl. Cubatur 61. Hyperbel 256. Normalen 338. Quadratur 404, 406. Rectification.

Ellipsoid.

123. Propriété de l'ellipsoide. J. Neuberg. Mathesis VII, 227. Vergl. Cubatur 62.

Elliptische Transcendenten.

- 124. A revision of chapters XXIV and XXVI of Legendre's Fonctions Elliptiques
 T. I. A. G. Greenhill. Quart. Journ. math. XIX, 225.
 125. Beiträge zur Theorie der elliptischen Functionen. O. Rausenberger. Crelle
 XCIV, 251. [Vergl. Bd. XXVIII, Nr. 512.]
 126. Zur Transformationstheorie der elliptischen Functionen. L. Kiepert. Crelle
- XCV, 218. [Vergl. Bd. XXV, Nr. 350.]
- 127. On certain formulae in elliptic functions. J. W. L. Glaisher. Quart. Journ. math. XIX, 22.
- 128. Expressions for argsna and (argsna)² as definite integrals. J. W. L. Glaisher. Quart. Journ. math. XIX, 71.
- 129. A system of integrals involving elliptic functions. J. W. L. Glaisher. Quart. Journ. math. XIX, 145.
- 130. Sur une nouvelle série dans les fonctions elliptiques. Faa de Bruno. Compt, rend. XCV, 22.
- 131. Algebraische Ableitung der Multiplication von cosamu. C. Runge. Crelle XCIV, 349.
- 132. Ableitung des Additionstheorems für elliptische Integrale aus der Theorie eines Kegelschnittbüschels. Ad. Schumann. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 55.
- 133. Sur l'application des intégrales elliptiques et ultraelliptiques à la théorie des courbes unicursales. Laguerre. Compt. rend. XCVI, 769.
- 134. Ueber das Cartesische Oval. E. Haentzschel. Grun. Archiv LXIX. 395. Vergl. Umkehrungsproblem.

Factorenfolge.

135. Sur le produit indéfini $(1-x)(1-x^2)(1-x^3)$... Sylvester. Compt. rend. XCVI, 674. Vergl. Gammafunctionen 182.

Formen.

- 136. Ueber Relationen zwischen Classenanzahlen binärer quadratischer Formen von negativer Determinante. Jos. Gierster. Mathem. Annal. XXII, 190. [Vergl. Bd. XXIX, Nr. 130.]
- 137. Sur certaines formes quadratiques et sur quelques groupes discontinus. E. Picard. Compt. rend. XCV, 763.
- 138. Sur les formes quadratiques binaires à indéterminées conjuguées. E. Picard. Compt. rend. XCVI, 1567.
- 139. Sur la réduction continuelle de certaines formes quadratiques. E. Picard. Compt. rend. XCVI, 1779.
- 140. Bemerkungen über die Aequivalentsubstitutionen binärer quadratischer Formen. J. Hermes. Crelle XCV, 165.
- 141. Sur la réduction des formes quadratiques positives ternaires. Minkowski. Compt. rend. XCVI, 1205.
- 142. Table des formes quadratiques quaternaires positives reduites dont le déterminant est égal on inférieur à 20. L. Charve. Compt. rend. XCVI, 778. 143. Geometrischer Beweis der bekanntesten Eigenschaften einer binären cubischen
- Form. G. Loria. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 245.
- 144. Ueber abhängige Punktsysteme und deren Bedeutung für die reciproke Verwandtschaft zweier Ebenen. Rosanes. Crelle XCV, 247. [Vergl. Bd. XXVI, Nr. 322.]
- 145. Sur la formation des déterminants irréguliers. Jos. Per ott. Crelle XCV, 282. Vergl. Geometrie (höhere) 198, 206. Invariantentheorie.

Fourier'sche Beihe. 146. Sur la série de Fourier. Halphen. Compt. rend. XCV, 1217.
147. Démonstration simplifiée des formules de Fourier. P. Gilbert. Mathematy, Supplém. V.

148. Ueber die Integration der trigonometrischen Reihe. P. du Bois-Reymond. Mathem, Annal. XXII, 260.

Functionen.

- 149. Sur les transcendantes entières. H. Poincaré. Compt. rend. XCV, 23.
- 150. Sur les fonctions Fuchsiennes. H. Poincaré. Compt. rend. XCV, 626; XCVI, 1485.
- 151. Sur la théorie des fonctions uniformes d'une variable. Mittag-Leffler. Compt. rend. XCV, 335. [Vergl. Bd. XXIX, Nr. 678.]
 152. Sur les fonctions uniformes d'une variable, liées par une relation algébrique. E. Picard. Compt. rend. XCVI, 476.
- 153. Sur la théorie des fonctions uniformes. E. Goursat. Compt. rend. XCVI, 565.
- 154. Sur les fonctions uniformes. J. Farkas. Compt. rend. XCVI, 1646.
- 155. Sur les fonctions uniformes affectées de coupures et sur une classe d'équations
- différentielles linéaires. Appell. Compt. rend. XCVI, 1018.

 156. Sur les fonctions à espaces lacunaires. H. Poincaré. Compt. rend. XCVI, 1134.
- 157. Ueber den allgemeinen Functionsbegriff und dessen Darstellung durch eine willkürliche Curve. F. Klein. Mathem. Annal. XXII, 249.
 158. Zusammenhang der Hyperbeln und Lemniscaten höherer Ordnung mit dem
- Ausgangspunkte der Functionentheorie. G. Holzmüller. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 120.
- 159. Ueber eine gewisse Erweiterung des Cantor'schen Satzes, dass $\lim a_n = 0$ und $\lim b_n = 0$, sofern innerhalb der Grenzen a < x < b immer $\lim (a_n . sinn x + b_n . cosn x) = 0$ stattfindet. C. Neumann. Mathem. Annal. XXII, 406. 160. Sur le rapport de la circonférence au diamètre et sur les logarithmes népé-
- riens des nombres commensurables ou des irrationnelles algébriques. F. Lindemann. Compt. rend. XCV, 72.

- 161. Ueber cyklische Functionen. O. Dziobek. Grun. Archiv LXIX, 265.
 162. Die algebraische Transformation der doppeltperiodischen Functionen. M. Veltmann. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, Supplem. 73.
 163. Ueber die Perioden solcher eindeutiger, 2n-fach periodischer Functionen, welche im Endlichen überall den Charakter rationaler Functionen besitzen und reell sind für reelle Werthe ihrer n Argumente. Ad. Hurwitz. Crelle XCIV, 1.
- 164. Définition naturelle des paramètres différentiels des fonctions, et notamment
- de celui du second ordre A_2 . J. Boussin esq. Compt. rend. XCV, 479.

 165. Ueber arithmetische Eigenschaften gewisser transcendenter Functionen. Ad.
 Hurwitz. Mathem. Annal. XXII, 211. [Vergl. Bd. XXIX, Nr. 411.]

 166. Sur les fonctions d'un point analytique. Appell. Compt. rend. XCV, 624.

 167. Relations entre les résidus d'une fonction d'un point analytique (x,y) qui se reproduit, multipliée par une constante, quand le point (x,y) décrit un excle. Appell. Compt. rend. XCV, 714. cycle. Appell. Compt. rend. XCV, 714.
- 168. Sur des fonctions uniformes de deux points analytiques qui sont laissées invariables par une infinité de transformations rationnelles. Appell. Compt. rend. XCVI, 1643.

 169. Sur une classe de fonctions uniformes de deux variables indépendantes. E. Picard. Compt. rend. XCV, 594.
- 170. Beweis des Satzes, dass eine einwerthige Function beliebig vieler Variabeln, welche überall als Quotient zweier Potenzreihen dargestellt werden kann, eine rationale Function ihrer Argumente ist. A. Hurwitz Crelle XCV, 201.
- 171. Sur des fonctions de deux variables indépendantes analogues aux fonctions modulaires. Em. Picard. Acta mathematica II, 114.

 172. Sur les fonctions hypergéométriques d'ordre supérieur. E. Goursat. Compt.
- rend. XCVI, 185. 173. Sur les fonctions hypergéométriques de deux variables. E. Goursat. Compt.
- rend. XCV, 717, 903, 1044. 174 Sur les fonctions de plusieurs variables imaginaires. Ed. Combassure.

 Compt. rend. XCVI, 235, 483.
- 175. Sur les fonctions de deux variables. H. Poincaré. Cor 176. Sur une classe de fonctions de deux variables indép
- Compt. rend. XCVI, 320. 117. Sur une classe de fonctions de deux variables indu
- Acta mathematica II, 71. 178. Sur les fonctions de deux variables. H. Poincaré.

Vergl. Abel'sche Transcendenten. Bernoulli'sche Zahlen. Bestimmte Integrale. Differentialgleichungen. Elliptische Transcendenten. Factorenfolge. Fourier'sche Reihe. Hyperbolische Functionen. Imaginaires. Mannichfaltigkeiten. Modulargieichungen. Quaternionen. Reihen. Substitutionen. Thetafunctionen. Ultraelliptische Transcendenten. Zahlentheorie 474.

Gammafunctionen.

179. Sur la fonction eulérienne. Bourguet. Compt. rend. XCVI, 1307.

180. Sur les intégrales euleriennes et quelques autres fonctions uniformes.

Bourguet. Acta mathematica II, 261

181. Sur la fonction eulerienne. L. Bourguet. Acta mathematica II, 296.

182. Pour toute valeur positive de q, entière ou fractionnaire on a $\int \cos \varphi^{q-1} \cdot d\varphi$

 $= \prod_{1}^{\infty} \frac{(2n-1)(2n-1+q)}{2n(2n-2+q)}.$ E. Cesaro. Mathesis IV, 65.

183. Ueber die transcendente Function $Q(x) = \Gamma(x) - P(x)$. H. Mellin. Acta mathematica II, 231.

184. Sur l'intégrale $\int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{1-x^{\beta}} \cdot dx$. Cl. Servais. Mathesis IV, 154.

185. Rectification à une communication antérieure sur les intégrales eulériennes.

J. Tannery. Compt. rend. XCV, 75. [Vergl. Bd. XXIX, Nr. 695.] Vergl. Zahlentheorie 486.

Geodasie.

- 186. Observations astronomiques sans mesures d'angles. Ch. Rouget. Compt. rend. XCV, 120. [Vergl. Bd. XXIX, Nr. 696.]
- 187. Choix d'un premier méridien. Faye. Compt. rend. XCVI, 135. De Chancourtois ibid. 182. Vergl. Hypsometrie.

Geometrie (descriptive).

- 188. Ueber einen Fundamentalsatz der constructiven Schattentheorie. J. Streiss-
- ler. Grun. Archiv LXIX, 144. C. Pelz ibid. 437.

 189. Angle que fait le plan d'une circonférence avec le plan horizontal. Derousseau. Mathesis IV, 91. Verstraeten ibid. 167.

 190. Théorème sur deux triangles non situés dans un même plan. Jeiabek. Mathesis IV, 116. J. Neuberg ibid. 116.

Geometrie (höhere).

- 191. Ueber einen liniengeometrischen Satz. F. Klein. Mathem. Annal. XXII, 234.

- 191. Ueber einen innengeometrischen Satz. F. Klein. Mathem. Annal. XXII, 284.
 192. Ueber Reihen harmonischer Mittelpunkte vom zweiten Grade. Reinh. Slawyk. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, Supplem. 1.
 193. Das Zweieckschnittsverhältniss. A. Thaer. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 183.
 194. Ueber Tangentenconstructionen. Ad. Hurwitz. Mathem. Annal. XXII, 230.
 195. Ueber Collineation und Correlation. R. Sturm. Mathem. Annal. XXII, 569.
 196. Courbes avec point de dédoublement. P. Mansion. Mathesis IV, 164. [Vergl. Bd. XXIX, Nr. 430.]
- 197. Sur une relation d'involution, concernant une figure plane formée de deux courbes algébriques, dont l'une a un point multiple d'un ordre de multiplicité inférieur d'une unité à son degré. G. Fouret. Compt. rend. XCVI, 1213.

198. Ueber conjugirte binare Formen und deren geometrische Construction. O. Schlesinger. Mathem. Annal. XXII, 520.

199. Ueber sich in einem Punkte schneidende coordinirte Linien und über auf einer geraden Linie liegende coordinirte Punkte. A. Ramisch. Grun, Archiv LXIX, 54.

200. Zur Theorie der Curven gerader Ordnung. Ed. Mahler. Grun. Archiv LXIX, 108.

201. Ueber einige projectivische Sätze von Schlömilch. F. Graberg. Zeitzehr. Math. Phys. XXIX, 868.

- 203. Die Steiner'schen Polygone.
 203. Ueber die mit der Lösung Configuration (12₆, 16₅).
 204. Elementare Beweise einiger geometrischen Sätze. Study Crelle XCIV, 233.
 205. Sur un mode de transformation des figures dans l'espace. Vanéce k. Compt. rend. XCV, 1049, 1146; XCVI, 1714, 1773. [Vergl. Bd. XXIX, Nr. 700.]
- 206. Mémoire sur la représentation des homographies binaires par des points de l'espace avec application a l'étude des rotations sphériques. Cyp. Sté-phanos. Mathem. Annal. XXII, 299.
- 207. Neue Constructionen der Perspective und Photogrammetrie. G. Hauck. Crelle XCV, 1.
- 208. Ueber die eindeutige Beziehung von Räumen mittels projectiver Ebenenbüschel und ihre Anwendung auf Constructionsaufgaben. F. v. Krieg. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, Supplem. 38.
- 209. Das ebene Kreissystem und seine Abbildung auf den Raum. J. Thomae.
- Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 284. 210. Zur Theorie der Raumcurven. H. Valentiner. Acta mathematica II, 136. Vergl. Elliptische Transcendenten 132, 133. Formen 143, 144. Mehrdimensionalgeometrie.
- Geometrie (kinématische). 211. Kinematische Studien. Ant. Sucharda. Grun. Archiv LXIX, 218.
- 212. Sur les transformations centrales des courbes planes. M. d'Ocagne. Mathesis IV, 73, 97.
- 213. Sur les propriétés métriques et cinématiques d'une sorte de quadrangles con-
- jugués. Cyp. Stephanos. Compt. rend. XCV, 677.
 214. Zur Construction der Wendepunkte. M. Grübler. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 310.

Geschichte der Mathematik.

- 215. Zur Geometrie der Alten, insbesondere über ein Axiom des Archimedes. O.
- Stolz. Mathem. Annal. XXII, 504.
 216. Die arabische Tradition der Elemente Euklid's. J. L. Heiberg. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, hist.-lit. Abth. 1.
- 217. Ueber einige aus dem Arabischen entlehnte Sternnamen. A. Wittstein. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, hist.-lit. Abth. 169.
- 218. Die Irrationalitäten der Rabbinen. Ed. Mahler. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, hist.-lit. Abth. 41.
- 219. Der Tractatus "De quadratura circuli" des Albertus de Saxonia. H. Suter. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, hist.-lit. Abth. 81.
- Zeitschr. Math. Phys. XXIX, hist.-lit. Abth. 81.

 220. Esquisse biographique de Willebrord Snell. P. Mansion. Mathesis IV, 64.

 221. Eingabe Johann Kepler's an Kaiser Rudolf II. um Ertheilung eines Generalprivilegs für den Druck seiner Werke (1606 vor März 3). R. Döbner.

 Zeitschr. Math. Phys. XXIX, hist.-lit. Abth. 174.

 222. Discours prononcé à l'inauguration d'une statue de Fermat. Mouchez.

 Compt. rend, XCV, 399.

 223. Sur un manuscrit de Fermat récemment publié. A. Genocchi. Mathesis

- 224. Le deux-centième anniversaire de l'invention du calcul différentiel. P. Mansion. Mathesis IV, 163, 177.
- 226. Considérations générales sur les méthodes scientifiques et applications à la méthode a posteriori de Newton et à la méthode a priori de Leibnitz.

 E. Chevreul. Compt. rend. XCVI, 1521.
 226. Sur le problème de la décomposition d'un polygone convexe en triangles.

 E. Catalan. Mathesis IV, 37.
 227. The Residence de complexes Zahlan. R. Raltzar. Crelle XCIV, 87.
- 27. U cher die Einführung der complexen Zahlen. R. Baltzer. Crelle XCIV, 87.
 28. Sur les travaux de Frédéric Houtman. Veth. Compt. rend. XCV, 982.
- 229. Manuscrits sur la théorie de la Lune laissés par M. Biot. F. Lefort. Compt.
- rend. XCVI, 1483. 230. Funerailles de Jos. Liouville. Faye. Compt. rend. XCV, 468. — Laboulayo
- 231. Notice sur Jos. Liouville † 11, Sept. 1882. Jamin. Compt. rend. KCVI.
 232. Sur les vie et les travaux de Em. Plantamour. Faye. Compt. rend. XCVI.
 233. Sur les travaux de M. Roche. F. Tisserand. Compt. rend. KCVI.
- 234. Note biographique sur H. J. S. Smith + 9. Févr. 1888. C. Lorend. XCVI, 1095.

235. Funérailles de J. A. C. Bresse + 22. Mai 1883. Phillips. Compt. rend. XCVI, Vergl. Metrologie 332, 333.

Gleichungen.

- 286. Démonstration du théorème que toute équation algébrique a une racine. Walecki. Compt. rend. XCVI, 772.
- 237. Ueber die Darstellung der Wurzeln der algebraischen Gleichungen durch unendliche Reihen. R. Dietrich. Grun. Archiv LXIX, 337.
- 238. Beitrag zur Lösung von Gleichungen höheren Grades. Th. Sinram. Grun.
 Archiv LXIX, 111. [Vergl. Bd. XXVIII, Nr. 569.]
 239. Sur les fonctions du genre zero et du genre un. Laguerre. Compt. rend.
 XCV, 828. [Vergl. Bd. XXIX, Nr. 772.]
- 240. On Mr. Anglin's formula for the successive powers of the root of an algebraical equation. A. Cayley. Quart. Journ. math. XIX, 223.
 241. Die Rationalisirung irrationaler algebraischer Functionen. S. Polewski. Grun. Archiv LXIX, 149. [Vergl. Bd. XXVIII, Nr. 576.]
- 242. Ueber Gleichungen, deren Discriminante ein Quadrat ist. E. Netto. Crelle XCV, 287.
- 243. Zur Theorie der Gleichungen vierten Grades. Em. Oekinghaus. Archiv LXIX, 169.
- 244. Reduction einer biquadratischen Gleichung auf eine cubische. Hoppe. Grun. Archiv LXIX, 111.
- 245. Résoudre l'équation $\left(\frac{x-a}{x+a}\right)^2 + \left(\frac{x-b}{x+b}\right)^2 + \left(\frac{x-c}{x+c}\right)^2 + 2\frac{x-a}{x+a} \cdot \frac{x-b}{x+b} \cdot \frac{x-c}{x+c} = 1$.

 Gelin, Gob, Roersch, Collin, Pisani. Mathesis IV, 213.

 246. Conditions de divisibilité de $x^p + ax^{p-q}y^q + bx^{p-2q}y^{2q} + cx^{p-3q}y^{3q} + y^p$ par $(x+y)^3$. Gelin. Mathesis IV, 60, 165.

- 247. Identité de deux expressions algébriques. E. Cesaro. Mathesis IV, 67.
 248. Vérification de l'égalité de deux expressions irrationelles. Stuyvaerts.
 Mathesis IV, 198.
- 249. On the standard solutions of a system of linear equations. A. Cayley. Quart. Journ. math. XIX, 38.
 - Vergl. Determinanten 63. Imaginäres 262. Kepler'sches Problem. Substitutionen.

H.

Hydrodynamik.

- 250. Sur le mouvement et la déformation d'une bulle liquide qui s'élève dans une masse liquide d'une densité plus grande. H. Resal. Compt. rend. XCVI, 822.
- 251. On the forces experienced by a solid moving in an infinite mass of liquid.
 H. Lamb. Quart. Journ. math. XIX, 66.
- 252. On the motion of a liquid in and about cylinders whose transverse sections are the inverse of confocal ellipses with respect to their centre. A. B.
- Basset. Quart. Journ. math. XIX, 190.
 253. On certain physical problems connected with surfaces which are the inverses of ellipsoids of revolution. A. B. Basset. Quart. Journ. math. XIX, 349.
- 254. Sur le rapport de l'action lunaire à l'action solaire dans le phénomène des marées. Hatt. Compt. rend. XCV, 960.

Hyperbel.

- 255. Chercher le lieu des centres des hyperboles équilatères touchant deux droites données en deux points qui sont en ligne droite avec un point fixe. Bastin. Mathesis IV, 39. — Liénard & Gillet ibid. 39.
- 256. L'ordonnée du point d'intersection d'une ellipse et d'une hyperbole homofocale rencontre les asymptotes sur la circonférence qui a pour diamètre le grand axe de l'ellipse. Kaelhoff & Pisani. Mathesis IV, 208.

Hyperbolische Functionen.

- 257. Précis de la théorie des fonctions hyperboliques. P. Mansion. Mathesis IV, 5, 28, 80, 101.
- Hyperboloid. 258. Droites dans un tétraèdre situées sur un même hyperboloide. Jamet. Mathesis IV, 190.

Hypsemetrie.

259. Sur la différence des pressions barométriques en deux points d'une même verticale. J. Jamin. Compt. rend. XCVI, 395.

Imagināres.

- 260. Zur Interpretation der complexen Elemente in der Geometrie. F. Klein. Mathem, Annal. XXII, 242.
- 261. Eine Uebertragung des Pascal'schen Satzes auf Raumgeometrie. F. Klein. Mathem. Annal. XXII, 246.
- 262. Construction der imaginären Wurzeln einer Gleichung vierten oder dritten Grades mittels einer festen Parabel. R. Hoppe. Grun. Archiv LXIX, 216. Vergl. Zahlentheorie 475.

Invariantentheorie.

- 263. On seminvariants. A. Cayley. Quart. Journ, math. XIX, 131. P. A. Mac Mahon ibid. 337.
- 264. Zur Theorie der Combinanten. E. Stroh. Mathem. Annal. XXII, 393.
- 265. Reduction zweier Covarianten binärer Formen. E. Stroh. Mathem. Annal. XXII, 290.
- 266. Sur les relations qui existent entre les covariants et invariants des formes binaires. R. Perrin. Compt. rend. XCVI, 426, 479, 563, 1717, 1776, 1842.
- 267. Sur les relations qui existent entre les covariants et les invariants de caractère pair d'une forme binaire du sixième ordre. Cyp. Stephanos. Compt. rend. XCVI, 232, 1564.
- 268. Sur quelques propriétés d'une forme binaire du huitième ordre. F. Brioschi. Compt. rend. XCVI, 1689.

K.

- Kegelschnitte. 269. Ueber das gemischte Kegelschnittbüschel. H. E. M. O. Zimmermann. Zeitschr.
- Math. Phys. XXIX, 176.

 270. Bemerkungen über perspectivische Dreiecke auf einem Kegelschnitte und über eine specielle Reciprocität. C. Beyel. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 250.
- 271. Zur Construction der Durchschnittspunkte zweier Kegelschnitte. F. Tomes. Grun, Archiv LXIX, 307.
- 272. Einige Sätze über Kegelschnitte. H. Schroeter. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 160.
- 273. Osculationstripel am Kegelschnitt. K. Zahradnik. Grun. Archiv LXIX, 419.
 274. Méthode simple pour déterminer les foyers dans les courbes du second degré.
- G. Dostor. Grun. Archiv LXIX, 432.

 275. Équation quadratique des droites menées d'un point aux intersections d'une conique avec une droite. G. Dostor. Grun. Archiv LXIX, 427.
- 276. Construction der gemeinschaftlichen Tangenten eines Kreises und einer Kegelschnittslinie. C. Schirek. Grun. Archiv LXIX, 408.
 277. Conique enveloppe d'une certaine droite. Jeřabek. Mathesis IV, 155. —
 Bastin ibid. 157.
- 378. Ueber den Ort der Berührungspunkte der Tangenten von einem Punkte an die Kegelschnitte einer Schaar oder eines Büschels. M. Greiner. Grun. Archiv LXIX, 80.
- 279. Enveloppe des axes des coniques tangentes à deux droites données en deux points donnés. Pisani. Mathesis IV, 230.
 - Vergl. Conchoide 60. Ellipse. Elliptische Transcendenten 132. Formen 143. Hyperbel. Kreis. Parabel. Tetraeder 450.

Kepler'sches Problem

- 280. Solution rapide du problème de Kepler. Ch. V. Zenger. Compt. rend. XCV, 171, **2**07.
- 281. Solution du problème de Kepler pour des excentricités considérables. Ch. V. Zenger. Compt. rend. XCV, 416.
- 282. Remarques concernant le problème de Kepler. R. Radau. Compt. rend. XCV, 274.
- 283. Sur le problème de Kepler. A. de Gasparis. Compt. rend. XCV, 446.

Kettenbrüche.

- 284. Sur la théorie des fractions continues périodiques. E. de Jonquières. Compt. rend. XCVI, 568, 694, 832, 1020, 1129, 1210, 1297, 1351, 1420, 1490, 1571,
- 285, Studien über Kettenbrüche. K. E. Hoffmann. Grun. Archiv LXIX, 205.

Kreis.

- 286. The triplicate-ratio circle. R. Tucker. Quart. Journ. math. XIX, 342.
- 287. Sur une demi circonférence partagée en 7 parties égales. Fauchamps & Liénard. Mathesis IV, 41.
- 288. Circonférence passant par les projections de deux sommets d'un triangle sur la bissectrice du troisième angle. Van Laer & E. Liénard. Mathesis IV, 67. - Thiry ibid. 68.
- 289. Inscrire à un cercle donné un triangle qui soit semblable à un triangle donné, et homologique avec un second triangle donné, inscrit dans le même cercle. Gob & Stuyvaert. Mathesis IV, 197.
- 290. Sur un biangle et un triangle formés par des arcs de cercle. Weill. Mathesis IV, 219.
- 291. Aire d'une quadrilatère curviligne formé par des arcs de circonférence. Tasté. Mathesis IV, 115. — Dethier ibid. 115. — Jeřabek & Janeček ibid. 115.
- 292 On systems of circles and bicircular quartics. Hom. Cox. Quart. Journ. math. XIX, 74.
- 293. Sur deux circonférences homothétiques. De Rocquigny etc. Mathesis IV, 211.
- 294. Propriété géométrique d'un certain groupe de deux systèmes de circonférences concentriques. Brocard Mathesis IV, 219.
- 295. Construire deux circonférences tangentes entre elles, tangente chacune à une droite donnée en un point donné, et dont les rayons soient dans un rapport donné. De Boischevalier. Mathesis IV, 42. — Liénard ibid. 43. - Lamarle ibid. 43.

Krümmung.

- 296. Ueber die Krümmung der Flächen. O. Böklen. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 129. [Vergl. Nr. 369.]
- 297. Ueber die Krümmungsmittelpunkte der Polbahnen. M. Grübler. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 212, 382. Vergl. Oberflächen 343, 353.

M.

Magnetismus.

- 298. Les carrés des forces d'induction, produites par le Soleil dans les planètes et dues à la vitesse de révolution de ces corps, sont, toutes choses égales d'ailleurs, en raison inverse des septièmes puissances des distances à l'astre. Induction des comètes des bolides et des étoiles filantes. Quet, Compt. rend. XCV, 514.
- 299. Les forces d'induction que le soleil développe dans le corps par sa rotation varient, toutes choses égales d'ailleurs, en raison inverse des carrés des
- distances. Quet. Compt. rend. XCV, 682.

 300. Induction lunaire et ses périodes. Quet. Compt. rend. XCV, 722.

 301. Sur l'induction terrestre des planètes et, en particulier, sur celle de Jupiter.

 Quet. Compt. rend. XCV, 1155.
- 302. Action magnétique du soleil sur la terre et les planètes; elle ne produit pas de variation séculaire dans les grands axes des orbites. Quet. Compt. rend. XCVI, 372.
- 303. Sur les rapports de l'induction avec les actions électrodynamiques et sur une loi générale de l'induction. Quet. Compt. rend. XCVI, 1849.

Mannichfaltigkeiten.

- 304. Traduction des travaux principaux de Mr. Georg Cantor sur la théorie des ensembles publiés autrefois en allemand. Acta mathematica II, 305, 311, 329, 336, 349, 381.
- 305. Sur divers théorèmes de la théorie des ensembles de points situés dans un espace continu à N dimensions. G. Cantor. Acta mathematica II, 409.
- 306. Quelques théorèmes de la theorie des ensembles de points. J. Bendixson. Acta mathematica II, 415.

Mechanik.

M. De la nécessité d'introduire certaines modifications dans l'enseignement de la mécanique, et d'un bannir certains problèmes; par exemple, le mouve-ment du corps solide des géomètres. Y. Villarceau. Compt. rend. XCV, 1321.

Sur une extension des principes des aires et du mouvement du centre de gravité. M. Lévy. Compt. rend. XCV, 772, 986.
 Rapport sur un mémoire de M. Ph. Gilbert sur divers problèmes de mouvement relatif. C. Jordan. Compt. rend. XCV, 111. [Vergl. Bd. XXIX,

310. Bewegung eines Cylinders im Hohlcylinder auf schiefer Ebene unter Berührung ohne Gleitung. R. Hoppe. Grun. Archiv LXIX, 162.
311. Einfache Darstellung der Trägheitsmomente von Körpern. R. Mehmke. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 61.

312. Méthode générale pour la solution des problèmes relatifs aux axes principaux et aux moments d'inertie. Balance d'oscillation pour l'évaluation des moments d'inertie E. Brassinne. Compt. rend. XCV, 337, 446.
313. Die Trägheitsbahn auf der Erdoberfläche. H. Bruns. Mathem. Annal. XXII, 296.

314. Ueber die zusammengesetzte Centripetalbeschleunigung. M. Grübler. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 313.

315. Proportion des distances des sommets d'un triangle à la résultante de trois forces dirigées suivant les côtés. Pisani & Liénard. Mathesis IV, 244.

316. On the energy of strain of an isotropic solid. H. T. Stearn. Quart. Journ. math. XIX, 140.
317. Réduction à la forme canonique des équations d'équilibre d'un fil flexible et

inextensible. Appell. Compt. rend. XCVI, 688.

318. Comment se répartit, entre les divers points de sa petite base d'appui, le poids d'un corps dur, à surface polie et convexe, posé sur un sol horizontal élastique. J. Boussines q. Compt. rend. XCVI, 245.

319. Sur une propriété générale d'un agent dont l'action est proportionnelle au

produit des quantités en présence et à une puissance quelconque de la distance. E. Mercadier. Compt. rend. XCVI, 188.

320. Sur les solides d'égale résistance. H. Léauté. Compt. rend. XCV, 1219.

321. Théorie de la résistance des étoffes tissées à l'extension. Tresca. Compt. rend. XCV, 1315.

322. Sur les trajectoires des divers points d'une bielle en mouvement. H. Léauté. Compt. rend. XCVI, 639.

323. Règles pratiques pour la substitution, à un arc donné, de certaines courbes fermées engendrées par les points d'une bielle en mouvement. H. Léauté. Compt. rend. XCVI, 1356, 1649.

824. Sur le poinçonnage et les proues dont il détermine la formation. Tresca.
Compt. rend. XCVI, 816.

\$25. Sur un nouveau système de bascule. A. Picart. Compt. rend. XCVI, 1782. Vergl. Astronomie. Elasticität. Elektricität. Hydrodynamik. Hyperboloid. Magnetismus. Molekularphysik. Optik. Parabel 377. Pendel. Potential. Schwerpunkt. Wärmelehre.

Mehrdimensionalgeometrie.

326. Numerische Berechnung der Winkel von vier Dimensionen. R. Hoppe. Grun. Archiv LXIX, 278.

327. Relation zwischen fünf Elementurtetratopen mit vier unabhängigen Grössen. R. Hoppe. Grun. Archiv LXIX, 287.

328. Tetratop auf beliebiger Basis. R. Hoppe. Grun. Archiv LXIX, 297.
329. Drei Sätze für Inhaltsberechnung in der Mehrdimensionengeometrie. R. Hoppe. Grun. Archiv LXIX, 385.

330. Partielles Maximum eines Elementartetratops. R. Hoppe. Grun. Archiv LXIX, 439. Vergl. Zahlentheorie 477.

Metrologie. 321. Sur la théorie générale des unités. A. Ledieu. Compt. rend. XCV, 1828;

XCVI, 986. 332. Sur deux mètres en platine ayant appartenu à de Prony. Tresca.

rend. XCVI, 667. 383. Sur deux étalons de l'anne et du pied de Roi, récomment Compt. rend. XCV, 977.

Mittelgrössen.

334. Sur une suite de moyennes. J. Neuberg. Mathesis IV, Supplém. 3.

Modulargleichungen.

335. Ueber Congruenzgruppen von Primzahlstufe. J. Gierster. Mathem. Annal. XXII, 176. [Vergl. Bd. XXVII, Nr. 443.]

Molecularphysik.

336. La synthèse des cieux et de la terre. Moigno. Compt. rend. XCVI, 1166. 337. Sur l'influence de la quantité du gaz dissous dans un liquide sur sa tension superficielle. S. Wroblewski. Compt. rend. XCV, 284.

N.

Normalen.

- 338. Zum Normalenproblem der Ellipse. C. Schirek. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 239.
- 339. Quelques théorèmes sur les normales de la parabole. Gerondal. Mathesis IV, 128. Vergl. Cubatur 62.

Oberflächen.

- 340. Il est possible de tracer sur des surfaces quelconques, données de forme et de position, une série indéfinie de lignes identiques de part et d'autre. Gaspar & E. Cesaro. Mathesis IV, 41.
- 341. Ueber dreifach-orthogonale Flächenschaaren. Ed. Mahler. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 111.
- 342. Haupteigenschaften einer krummen in der Astronomie auftretenden Oberfläche.
 A. Wittstein. Grun. Archiv LXIX, 195.
- 343. Ueber die Eigenschaften des Linienelementes der Flächen von constantem
- Krümmungsmaass. J. Weingarten. Crelle XCIV, 181; XCV, 325.

 344. Ueber die Curven, welche sich so bewegen können, dass sie stets geodätische
 Linien der von ihnen erzeugten Flächen bleiben. J. N. Hazzidakis.
 Crelle XCV, 120.
- 345. Ueber die Classification der Flächen nach der Verschiebbarkeit ihrer geodätischen Dreiecke. H. v. Mangoldt. Crelle XCIV, 21.
- 346. Ueber die Flächen mit einem System sphärischer Krümmungslinien. H. Dobriner. Crelle XCIV, 116. A. Enneper ibid. 329.
 347. Sur les cercles géodésiques. G. Darboux. Compt. rend. XCVI, 54.
 348. Détermination d'une classe particulière de surfaces à lignes de courbure planes.

- dans un système et isothermes. G. Darboux. Compt. rend. XCVI, 1202, 1294.
- 349. Die geodätische Linie auf der Kreiskegelfläche. Em. Czuber, Grun. Archiv LXIX, 125.

350. On lines of striction. G. Larmor. Quart. Journ. math. XXIX, 381.

- 351. Ein Beitrag zur Theorie der biplanaren und uniplanaren Knotenpunkte K. Rohn. Mathem. Annal. XXII, 124.
- 352. Rapport sur un mémoire de M. de Salvert sur les ombilics coniques. C. Jordan. Compt. rend. XCVI, 105.
- 353. Sur les surfaces à courbure moyenne nulle sur lesquelles on peut limiter une portion finie de la surface par quatre droites situées sur la surface. H. A. Schwarz. Compt. rend. XCVl, 1011.

 354. Die developpable Fläche der conischen Schraubenlinie. Fr. Schiffner.

- Grun. Archiv LXIX, 444.

 355. Zur Theorie der Flächen, deren Krümmungsmittelpunktsflächen confocale Flächen zweiten Grades sind. F. Rudio. Crelle XCV, 240.
- 356. Propriété de la surface dont l'équation est F(x,y) + f(x) = 0, F(x,y) étant une fonction homogène. E. Cesaro & C. Servais. Mathesis IV, 45. 357. Note on parallel surfaces. Th. Craig. Crelle XCIV, 162. [Vergl. Bd. XXVIII,
- Nr. 688.]
- 358. Surfaces don't l'équation confient une fonction arbitraire. Brocard. Mathesis IV, 127.
- 859. Ueber das Minimum des Winkels zwischen zwei conjugirten Tangenten auf positiv gekrümmter Fläche. R. Hoppe. Grun. Archiv LXIX, 19.

- 360. Sur les plans tangents et osculateurs des courbes à double courbure et des surfaces. M. N. Vanecek. Compt. rend. XCVI, 1562. [Vergl. Bd. XXIX,

361. Zur Theorie der Flächen dritter Ordnung. Fr. Schur. Crelle XCV, 207.
362. On the sixteen-nodal quartic sarface. A. Cayley. Crelle XCIV, 270.
363. Ueber gewisse transcendente Flächen, welche die Cyklide als speciellen Fall enthalten. Holzmüller. Crelle XCIV, 239. Vergl. Differentialgleichungen 91. Krümmung 296. Quaternionen 409.

Oberflächen zweiter Ordnung.

- 364. Unterscheidungszeichen der Flächen zweiter Ordnung. A. Thaer. Zeitschr.
 Math. Phys. XXIX, 369.
- 365. Lineare Construction einer Fläche zweiten Grades aus neun gegebenen Punk-
- ten. C. Beyer. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 170.
 366. Bemerkungen über die Mittelpunkte von Kegelschnitten einer Fläche zweiten Grades. Beyel. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 123.
- 367. Généralisation d'une propriété des surfaces du deuxième ordre. Jamet. Mathesis IV, Supplém. II.
- 368. Problèmes sur les plans tangents aux surfaces de révolution du second degré.
 Songalayo. Mathesis IV, 166.
 369. Ueber die cubische Parabel mit Directrix. O. Böklen. Zeitschr. Math. Phys.
 XXIX, 378. [Vergl. Nr. 296.]
 Vergl. Ellipsoid. Hyperboloid. Sphärik. Tetraeder 445. Ultraelliptische
 Transcendenten 463.
- Optik. 370. Neue Untersuchungen über die Lage der Brennlinien unendlich dünner copu-
- lirter Strahlenbündel gegen einander und gegen einen Hauptstrahl. L. Matthiessen. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, Supplem. 86.

 371. Allgemeine Formeln zur Bestimmung der Cardinalpunkte eines brechenden Systems centrirter sphärischer Flächen mittels Kettenbruchdeterminanten
- dargestellt. L Matthiessen. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 343. 372. Ueber Länge und Vergrösserung, Helligkeit und Gesichtsfeld des Kepler-, Ramsden- und Campani-Fernrohrs. C. Bohn. Zeitschr. Math Phys. XXIX, 25, 74.
- 873. Du pouvoir amplifiant des instruments d'Optique. Monoyer. Compt. rend. XCVI, 1785.
- 374. Beiträge zur graphischen Dioptrik. F. Kessler. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 65.
- 375. Ueber Achromasie. F. Kessler. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 1.
- 376. Sur l'action de l'éther intermoléculaire dans la propagation de la lumière. De Klercker. Compt. rend. XCV, 588. Vergl. Analytische Geometrie des Raumes 31.

Parabel.

- 377. On the time of descent down the arc of a vertical parabola. J. W. L. Glaisher.
- Quart, Journ. math. XIX, 141.
 378. Parabole enveloppe d'un côté d'un triangle. Derousseau etc. Mathesis IV, 89. — E. Liénard ibid. 91.
- 379. Propriétés de la parabole. Cl. Thiry. Mathesis IV, 286. 380. Une parabole se déplace parallèlement à elle même en touchant une circonférence donnée. Quel est le lieu des foyers? Timmerhans. Mathesis IV, 92. Vergl. Imaginäres 262. Normalen 339.

Paraboloid.

Vergl. Complanation.

Pendel.

381. Sur le pendule. R. Lipschitz. Compt. rend. XCV, 1141.

Planimetrie.

- 382. Zur Theilung einer Strecke in n gleiche Theile. M. Sternberg. Grun. Archiv LXIX, 215.
- 383. Synthetischer Beweis eines elementar-geometrischen Satzes, sowie Einiges über Vertauschbarkeit der Elemente anharmonischer Gebilde. Fr. Hofmann, Grun. Archiv LXIX, 214.

384. Théorèmes sur trois points situés en ligne droite. Van Graefschepe & G. Andrien. Mathesis IV, 158, 189.

385. Étude de transversales. E. Cesaro. Mathesis IV, 85.

386. Théorie des médianes antiparallèles. Gillet. Mathesis IV, 193, 195. — Fa-

- lisse ibid. 194, 195. Sum ibid. 193, 194. Jeřabek ibid. 195. Lemoine ibid, 196.
- 387. Nouvelles propriétés du triangle. H. Brocard. Mathesis IV, Supplém. 1. 388. Sur les antiparallèles des côtés d'un triangle. E. Lemoine. Mathesis IV, 201.

389. Théorèmes sur le triangle rectangle. Servais. Mathesis IV, 53.

390. Trouver sur les côtés AB, AC du triangle ABC les points M, N tels que la droite MN soit parallèle à une direction donnée, et que sa longueur soit à la somme des segments MB, MC dans un rapport donné. Je rabek. Mathesis IV, 89. — Li énard ibid. 89.
391. Condition sous laquelle la moitié d'un côté d'un triangle est moyenne proportionelle entre les deux autres côtés. Van Laer etc. Mathesis IV, 174.
302. Somme constante des circs de trois triangles combleles deux deux sont six

392. Somme constante des aires de trois triangles semblables dont deux sont cir conscrits d'une certaine manière au troisième. Fonchamps. Mathesis IV, 66. - J. Neuberg ibid. 66.

393. Sur le point d'intersection des droites qui joignent les sommets d'un triangle aux points où le cercle inscrit touche les côtés opposés. Vandenbroeck etc. Mathesis IV, 245.

394. Démonstration de trois théorèmes élémentaires. Thiry. Mathesis IV, 53.

395. Constructions de triangles. Thiry. Mathesis IV, 54. - Gillet ibid. 55. -**– Sum ibid. 55**.

396. Transversales d'une série de triangles. Kiehl. Mathesis IV, 239.

- 397. Zu den Eigenschaften des vollständigen Vierseits. A. Ehlert. Grun. Archiv LXIX, 332.
- 398. Quadrilatère à diagonales rectangulaires. Cl. Thiry. Mathesis IV, 236. 399. Sur le quadrilatère inscrit à diagonales rectangulaires. Gelin etc. Mathesis IV, 248.

Vergl. Kreis. Mittelgrössen, Schwerpunkt 431.

Potential.

400. Examen de l'analogie entre les anneaux électrochimiques et hydrodynamiques et les courbes $\Delta V = 0$. Meilleur procédé de discussion dans la méthode expérimentale. A Ledicu. Compt. rend. XCVI, 98. Vergl. Elektricität. Mechanik 313.

Princip der Homogeneität.

401. De l'homogénéité des formules. A. Ledieu. Compt. rend XCVI, 1692, 1834.

Quadratur.

- 402. Sur un nouvel intégromètre. Abdank-Abakanowicz. Compt. rend. XCV, 1047.
- 403. Sur les quadratures et les cubatures approchées. P. Mansion. Compt. rend. XCV, 324.
- 404. Inhaltsbestimmung der einem Dreieck einbeschriebenen, umschriebenen und conjugirten Ellipsen. M. Greiner, Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 222.
- 405. Aire d'un secteur de la courbe $e^z = a^z \cdot log \frac{tg\,\omega}{tg\,\alpha}$. Brocard. Mathesis IV, 125.
- 406. Ueber die Verallgemeinerung des Pythagoräischen Lehrsatzes und des Satzes über die Lunulae Hippokratis. P. Schönemann. Zeitschr Math. Phys. XXIX, 306.
- 407. Minimum de la somme de trois triangles. Gob & Roersch. Mathesis IV, 241. - Bertrand & Collin ibid. 241. - Minoliti & Pisani ibid 242. - E. Lemoine ibid. 243.

Quaternionen.

408. Sur la théorie des quaternions. Cyp. Stéphanos. Mathem. Annal. XXII, 589. 409. Einige Sätze über abwickelbare Flächen, abgeleitet mit Hilfe von Quaternionen. Fr. Graefe. Grun. Archiv LXIX, 1. Vergl. Geometrie (höhere) 206.

B.

Reihen. 410. Ueber Irrationalität von Reihen. M. Stern. Crelle XCV, 197.

411. Sur un théorème d'Abel. E. Catalan. Mathesis IV, 25.

412. Zur Theorie der Potenzreihen. O. Stolz. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 127.

[Vergl. Bd. XXIX, Nr 417.]
413. Ueber gewisse Reihen, welche in getrennten Convergenzgebieten verschiedene, willkürlich vorgeschriebene Functionen darstellen. Alf. Pringsheim. Mathem. Annal. XXII, 109.

414. Ueber die Werthveränderungen bedingt convergenter Reihen und Producte. Alf. Pringsheim. Mathem. Annal. XXII, 455.

115. Ueber Convergenzbezirke. R. Dietrich. Grun. Archiv LXIX, 381. 416. Sur les séries des polynômes. H. Poincaré. Compt. rend. XCVI, 637.

- 417. Une nouvelle formule générale pour le développement de la fonction perturbatrice. B. Bailland. Compt. rend. XCVI, 1286, 1641.
- 418. Sur une série pour développer les fonctions d'une variable. Halphen. Compt. rend. XCV, 629.

419. Sur les séries trigonométriques. H. Poincaré. Compt. rend. XCV, 766.

- 420. Sur quelques développements en séries. Stieltjes. Compt. rend. XCV, 901, 1043.
- 421. Sur le développement des fonctions en séries d'autres fonctions. Hugoniot, Compt. rend. XCV, 907, 983. — P. du Bois-Reymond ibid. XCVI, 61. [Vergl. Nr. 146.]
- 422. Toute puissance ma d'un nombre m est égale à la somme des m premiers termes d'une progression arithmétique commençant par 1 et ayant pour raison 2(1+m+m²+...+m²-²). G. Farisano. Mathesis IV, 166. 423. Sommation d'une série finie. L. Vandenbroeck. Mathesis IV, 238.

124. Sommation de $\sum_{k=0}^{k} \binom{n}{k} a_k$ étant donné $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $a_k = (k-1)(a_{k-1} + a_{k-2})$. E. Cesaro. Mathesis IV, 173.

425. Ueber die Lambert'sche Reihe. Schlömilch. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 384.

426. Sur les sommes de puissances semblables d'une suite de cosinus. A. Radicke. Mathesis IV, 161.

427. Sommation de deux séries trigonométriques. J. Gillet. Mathesis IV, 46. 428. Une correction des formules stéréotypées de la préface de Callet (tirage de 1879). Em. Barbier. Compt. rend. XCVI, 1648. Vergl. Elliptische Transcendenten 130. Fourier'sche Reihe. Gleichungen 237. Wahrscheinlichkeitsrechnung 468, 469.

Rectification.

Sur l'approximation des intégrales définies et, en particulier, du périmètre de l'ellipse. P. Mansion. Mathesis IV, Supplém. IV.
 Ueber den Ellipsenquadranten. Schlömilch. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 876.

Vergl. Function 160.

Schwerpunkt.

431. Propriété du centre de gravité d'un triangle. Falisse & Henrard, Mathesis IV, 45.

432. Centre de gravité d'un tronc de pyramide triangulaire. J. Mister. Mathesis IV, 84.

433. Centre de gravité du tronc de prisme triangulaire et du parallélipipède tronqué. J. Mister. Mathesis IV, 121.

Sphärik.

434. Problèmes sur les sphères. Barbarin. Mathesis IV, 217.

435. On spherical cycloidal and trochoical curves. H. M. Jeffery. Quart. Journ. math. XIX, 44.

436. Théorèmes de géométrie sphérique. J. Neuberg. Mathesis IV, 56. 437. On the sphérical triangle in elliptic functions. W. W. Johnson. Quart. Journ. math. XIX, 185. [Vergl. Bd. XXVI, Nr. 319.]

438. Ueber sphärische Vielecke, die einem Kreise eingeschrieben und einem andern Kreise umgeschrieben sind. Stoll. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 91.

489. Soient α, β, γ les inclinaisons des médianes d'un triangle sphérique sur les côtés opposés. Démontrer que

$$\frac{\cot \alpha}{\cos \frac{a}{2} (\cos b - \cos c)} = \frac{\cot \beta}{\cos \frac{b}{2} (\cos c - \cos a)} = \frac{\cot \gamma}{\cos \frac{c}{2} (\cos a - \cos b)}.$$

Liénard. Mathesis IV, 23.

440. Un triangle sphérique n'est pas forcément isoscèle, lorsque deux medianes sont égales. E. Gelin etc. Mathesis IV, 209.

Stereometrie.

441. Description du dodécaèdre régulier complet. Em. Barbier. Compt. rend. Vergl. Mehrdimensionalgeometrie. Schwerpunkt 432, 433. Tetraeder.

- Substitutionen.
 442. Gruppentheoretische Studien. W. Dyck. Mathem. Annal. XXII, 70. [Vergl. Bd. XXIX, Nr. 434.]
- 443. Sur la primitivité des groupes. W. Dyck. Compt. rend. XCVI, 1024.
- 444. Sur les fonctions de sept lettres. F. Brioschi. Compt. rend. XCV, 665, 814,

T.

Tetraeder.

- 445. Ueber die einer algebraischen Fläche eingeschriebenen regulären Tetraeder mit Berücksichtigung der Flächen zweiter Ordnung. C. Hossfeld.
 Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 351.

 446. Sur les tétraèdres de Möbius. P. Mansion. Mathesis IV, 221.

 447. Das gleichseitige Tetraeder. Ad. Schmidt. Zeitschr. Math. Phys. XXIX, 321.

 448. Théorèmes sur le tétraèdre. V. Jamet. Mathesis IV, 68.

- 449. Si l'on choisit un point arbitrairement sur chaque arète d'un tétraèdre, les quatre sphères passant respectivement par chaque sommet et par les points situés sur les trois arêtes adjacentes ont un point commun. J. Neuberg. Mathesis IV, 16.
- 450. Lieu du sommet des tétraedres sur une base fixe, aux 6 arêtes desquels on peut inscrire une sphère. Jamet. Mathesis lV, 140. J. Neuberg ibid. 141.

Vergl. Hyperboloid.

Thetafunctionen.

- 451. Berechnung der Moduln Rosenhain'scher Thetafunctionen. J. Thomae. Ztschr. Math. Phys. XXIX, 117.
- 452. Ueber Thetafunctionen, deren Charakteristiken aus Dritteln ganzer Zahlen gebildet sind. A. Krazer. Mathem. Annal. XXII, 416.
 453. Zur Theorie der Thetafunctionen mit zwei Argumenten. F. Caspary. Crelle
- XCIV, 74.
- 154. Ueber die principale Transformation der Thetafunctionen mehrerer Variabeln. G. Frobenius. Crelle XCV, 264.

- Trigonometrie.

 455. La théorie des projections en trigonométrie. C. Bergmans. Mathesis IV, 222. 456. Sur trois équations trigonométriques qui sont une conséquence l'une de l'autre. Gelin. Mathesis IV, 47.
- 457. Sur une division d'un arc de cercle. H Brocard. Mathesis IV, 86.
- 458. Rapport du triangle dont les sommets sont les symétriques des sommets d'un triangle donné par rapport aux côtés opposés à ce premier triangle. Bastin. Mathesis IV, 112. — Polet ibid. 113. — Cesaro ibid. 114.
- 459. Rapport des côtés de deux triangles, des sommets de l'un étant les symétriques des sommets de l'autre par rapport aux côtés opposés. Ja ne cek etc. Mathesis IV, 140.
- 460. Expression for the area of a convex quadrilateral when the sum of two opposite angles is given. A. H. Anglin. Quart. Journ. math. XIX, 138. Vergl. Gleichungen 245. Sphärik.

Historisch-literarische Abtheilung.

Ueber das quadratische Reciprocitätsgesetz.

Eine vergleichende Darstellung der Beweise des Fundamentaltheoremes in der Theorie der quadratischen Reste und der denselben zu Grunde liegenden Principien.

> Von OSWALD BAUMGART.

Einleitung.

Die höhere Arithmetik zerfällt im Wesentlichen in zwei Hauptabschnitte, in die Theorie der Congruenzen und in die Theorie der homogenen Formen. Einen integrirenden Bestandtheil der Congruenzenlehre überhaupt bildet die Theorie der binomischen Congruenzen, deren Angelpunkt wiederum die Lehre von den Potenzresten ist. "Den Schlussstein dieser letzterwähnten Theorie aber bilden die Reciprocitätsgesetze. "1) Obwohl nun die Auffindung dieser Gesetze "von einfach ausgeprägtem Inhalt" 2) verhältnissmässig leicht durch Induction gelang, so war doch die Begründung derselben mit ganz Sewaltigen Schwierigkeiten verbunden: neue Methoden mussten zu diesem Zwecke gefunden und von Gebieten, die mit der Arithmetik anscheinend in Rar keinem Zusammenhange standen, musste Beweismaterial herbeigeschafft Und doch gelang zuvörderst nur, die Richtigkeit des quadratischen Gesetzes darzuthun. Aber die Principien, die einzelnen der Beweise für quadratische Reciprocitätsgesetz zu Grunde lagen, waren in so hohem Masse der Verallgemeinerung fähig, dass sie auch zur Ableitung der all-Semeinen Gesetze benutzt werden konnten.

Im Folgenden sollen nun die sämmtlichen vorhandenen Beweise für das Quadratische Reciprocitätsgesetz zusammengestellt und die ihnen zu Grunde liegenden Principien einer vergleichenden Betrachtung unterzogen werden. Der Verfasser glaubt, dass ein solches Beginnen nicht ganz unnütz sei, weil eben jenes Gesetz das Fundamentaltheorem der Lehre von den quadratischen Resten und Nichtresten ist, weil man ferner durch die Principien, die den

¹⁾ Kummer, Berliner Abh. 1859, S. 19.

²⁾ Gauss, Vorwort zu Eisenstein's Math. Abh., Berlin 1847.
Hiel-Hit. Abhlig. d. Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXX, 5.

Beweisen dafür zu Grunde liegen, zu neuen, sehr allgemeinen Methoden gelangt, und weil endlich durch die Beweise jenes Gesetzes eine förderliche Wechselwirkung zwischen bis dahin ziemlich oder ganz isolirten Gebieten der Mathematik eingetreten ist. Dazu kommt, dass die Geschichte unseres Satzes die gleichzeitige Geschichte unserer gesammten Mathematik im Kleinen treu wiederspiegelt.

Auf diesen ebenerwähnten eigenthümlichen und reizvollen Umstand wurde ich zuerst durch Herrn Professor Scheibner hingewiesen.

Im ersten Theile sind die sämmtlichen vorhandenen Beweise, soweit sie mir zugänglich waren, in Capitel so geordnet dargestellt, dass die Beweise je eines Capitels denselben Grundgedanken haben. Innerhalb der Capitel folgen sich die Beweise chronologisch. Die Principien selbst werden im zweiten Theile entwickelt. Historische Notizen beginnen und beschliessen die Arbeit.

Zur Bequemlichkeit des Lesers, und auch um die Uebereinstimmung oder Verschiedenheit der Beweise in recht helles Licht zu rücken, ist eine möglichst einheitliche Bezeichnung und Darstellung angewandt worden. Dass dabei nicht nur der Kernpunkt, sondern auch das individuelle Gepräge der einzelnen Beweise unangetastet geblieben ist, braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden.

Erster Theil.

Darstellung der Beweise für das quadratische Reciprocitätsgesetz.

I. Capitel.

Vorarbeiten von Fermat bis Legendre.

Nachdem Bachet de Méziriac¹) die Theorie der linearen diophantischen Gleichungen zu einem gewissen Abschlusse gebracht hatte, trat an die Mathematiker die Frage nach der Auflösung der Gleichungen zweiten Grades, in specie der binomischen Congruenzen zweiten Grades heran. Mit anderen Worten, es handelte sich um Aufsuchung leicht erkennbarer Bedingungen, unter welchen die Congruenz

$$x^2 \equiv p \mod q$$

wenn p und q gegeben sind, lösbar ist oder nicht.

Es wurden zunächst specielle Fälle untersucht.

Aus einem Briefe aus dem Jahre 1658 von Fermat an den Engländer Kenelm Digby²) geht da hervor, dass bereits Fermat die Beding-

¹⁾ Théorèmes plaisans et délect, qui se font par les nombres.

²⁾ Joh. Wallis' Werke, Bd. II 8, 867.

ungen kannte, unter welchen ± 1 , 2, ± 3 , 5 quadratische Reste oder Nichtreste von ungeraden Primzahlen q sind; aus einem 1641 von Frenicle ¹) an Fermat gerichteten Schreiben ist ferner evident, dass bereits Frenicle Kenntniss hatte, wann -2 quadratischer Rest oder Nichtrest von einer Primzahl ist. Wahrscheinlich war dies aber, wie auch Lagrange²) annimmt, dem Fermat eher bekannt und von diesem erst aus Frenicle herausgefragt worden.

All' diese Sätze sind durch Induction gefunden und sind ohne Beweis aufgestellt. Für -1 wurde der Satz zuerst von Euler³) mit Hilfe verwandter Reste (residua socia) bewiesen; doch misslang ihm das Verfahren für ± 2 . Diese Lücke wurde ausgefüllt von Lagrange⁴). Es ist eine merkwürdige Thatsache, dass Euler der Beweis für ± 2 nicht gelang, merkwürdig nämlich insofern, als er den Beweis des Gesetzes für ± 3 ⁵) kannte. Um noch über ± 5 zu berichten, so war es wiederum Lagrange⁶), dem es zuerst gelang, nachzuweisen, unter welchen Bedingungen diese Zahl quadratischer Rest oder Nichtrest einer Primzahl ist.

Diese Daten, ohne Einfluss auf die eigentliche Darstellung des Gesetzes, sind der Vollständigkeit halber angeführt und um darzuthun, mit welchen Schwierigkeiten die Mathematiker in diesem Falle zu kämpfen gehabt haben. Ist nämlich auch nicht zu verkennen, dass die Aufmerksamkeit der Mathematiker durch die Erfindung der Infinitesimalrechnung von der Zahlentheorie wesentlich abgelenkt wurde, so ist es doch eine bezeichnende Thatsache, dass so einfache Gesetze, wie die eben angeführten, über hundert Jahre ohne Beweis bleiben konnten.

Bis jetzt wurden nur specielle Fälle behandelt. Der Erste nun, der unser Gesetz in seiner vollen Allgemeinheit aufzufassen und aufzustellen versuchte, war Euler. Und es gelang ihm, einen bedeutenden Schritt vorwärts zu thun. In einer "Observationes circa divisionem quadratorum per numeros primos"") betitelten Abhandlung theilt er vier Sätze mit, die das quadratische Reciprocitätsgesetz vollständig ausmachen. Sie heissen:

- 1. Si divisor primus fuerit formae $4ns+(2x+1)^3$, existente s numero primo, tum in residuis occurrent numeri +s et -s.
- 2. Si divisor primus fuerit formae $4ns-(2x+1)^s$, existente s numero primo, tum in residuis occurret numerus +s, at -s in non-residuis.

¹⁾ Varia opera math. D. Petri de Fermat, senatoris Tolosae. (Joh. Pech), 1679. S. 168.

Nouv. mém. de l'ac. Royale des sciences et belles lettres de Berlin. 1775.
 387.

³⁾ Opusc. analyt. 1783. Bd. I S. 185. Vergl. S. 227 dieser Abh.

⁴⁾ Nouv. mém de l'ac. de Berlin 1775. S. 349, 351.

⁵⁾ Comment. nov. Petropol., Bd. VIII S. 165.

⁶⁾ Nouv. mém. de l'ac. Royale etc. 1775, 8, 852.

⁷⁾ Opuse, analyt. 1788, I S. 64, oder: Comm. arithm. collectae, I S. 486.

- 3. Si divisor primus fuerit formue 4ns-4z-1 excludendo omnes valores in forma $4ns-(2x+1)^2$ contentos, existente s numero primo, tum in residuis occurret -s; at +s erit non-residuum.
- 4. Si divisor primus fuerit formae 4ns+4z-1, excludendo omnes valores in forma $4ns+(2x+1)^2$ contentos, existente s numero primo, tum tam +s quam -s in non-residuis occurret.

Wie eine leichte Rechnung zeigt, ist Euler bei Aufstellung des Satzes 3 ein Fehler untergelaufen. Dieses Theorem muss nämlich in seinem zweiten Theile heissen: Ist s von der Form 4n+1, so ist +s Nichtrest und -s Rest; für s=4n-1 tritt das Umgekehrte ein.

Diese vier Sätze, ebenfalls ohne Beweis aufgestellt, involviren, wie schon bemerkt und wie eine spätere Vergleichung ohne Weiteres ergeben wird, das quadratische Reciprocitätsgesetz vollständig. Gauss scheint die eben besprochene Arbeit Euler's nicht gekannt zu haben und schreibt daher die Entdeckung unseres Gesetzes Legendre¹) zu.

Dieser berthmte Zahlentheoretiker hat allerdings das Verdienst, das Fundamentaltheorem zum ersten Male klar und deutlich in Formeln ausgesprochen [und zwar 1785 in seinen "Rech. d'analyse indéterminée"")] und zum Theil bewiesen zu haben. Im vierten Abschnitte seiner ebenerwähnten Arbeit sind folgende acht Theoreme aufgestellt, wobei A, a Primzahlen von der Form 4n+1, B, b dagegen solche von der Form 4n+3 sind.

Théor. I. Si
$$b^{\frac{a-1}{2}} = 1$$
, il s'ensuit $a^{\frac{b-1}{2}} = 1.5$)

" II. " $a^{\frac{b-1}{2}} = -1$, " " $b^{\frac{a-1}{2}} = -1$.

" III. " $a^{\frac{A-1}{2}} = 1$, " " $A^{\frac{a-1}{2}} = 1$.

" IV. " $a^{\frac{A-1}{2}} = -1$, " " $A^{\frac{a-1}{2}} = 1$.

" V. " $a^{\frac{b-1}{2}} = -1$, " " $a^{\frac{a-1}{2}} = -1$.

" VI. " $b^{\frac{b-1}{2}} = -1$, " " $a^{\frac{b-1}{2}} = -1$.

" VII. " $b^{\frac{a-1}{2}} = 1$, " " $a^{\frac{b-1}{2}} = -1$.

" VIII. " $b^{\frac{b-1}{2}} = 1$, " " $a^{\frac{b-1}{2}} = -1$.

" VIII. " $a^{\frac{b-1}{2}} = -1$. " $a^{\frac{b-1}{2}} = -1$.

Man sieht hieraus, dass Legendre bei Aufstellung seiner Sätze das Fermat'sche Theorem benutzt hat. In der That folgt aus:

$$x^2\equiv p\ mod\ q\ \ \mathrm{und}\ \ p^{q-1}\equiv 1\ mod\ q,$$
 dass die Möglichkeit der Congruenz $x^2\equiv p\ mod\ q$ abhängig ist von $p^{\frac{q-1}{2}}$. Ist nämlich $p^{\frac{q-1}{2}}\equiv 1\ mod\ q$, so ist jene Congruenz lösbar; ist dagegen

¹⁾ Disquis. Arithm. Art. 151.

²⁾ Hist. de l'ac. Royale des sciences 1785, S. 516-517.

³⁾ $b^{\frac{a-1}{2}} = 1, \dots$ muss eigentlich heissen $b^{\frac{a-1}{2}} \equiv 1 \mod a, \dots$

 $p^{\frac{q-1}{2}} \equiv -1 \mod q$ (andere Fälle können überhaupt nicht eintreten), so ist jene Congruenz nicht lösbar.

Zum ersten Male in der Form, wie wir den Satz gegenwärtig aussprechen, ist er ebenfalls von Legendre gegeben worden und zwar in seinem "Essai sur la théorie des nombres".¹) Auf S. 186 bemerkt da zunächst Legendre: "Comme les quantités analogues $N^{\frac{o-1}{2}}$ se rencontreront fréquemment dans le cours de nos recherches nous emploierons le caractère abrégé $\binom{N}{c}$ pour exprimer le reste que donne $N^{\frac{o-1}{2}}$ divisé par c, reste qui suivant ce qu'on vient de voir ne peut être que +1 ou -1." Auf S. 214 heisst es dann weiter: "Quelques soient les nombres premiers m et n, s'ils ne sont tous deux de la forme 4x-1, on aura toujours $\left(\frac{n}{m}\right) = \left(\frac{m}{n}\right)$; et s'ils sont tous deux de la forme 4x-1, on aura $\left(\frac{n}{m}\right) = -\left(\frac{m}{n}\right)$. Ces deux cas généraux sont compris dans la formule:

$$\left(\frac{\mathbf{n}}{\mathbf{m}}\right) = \left(-1\right)^{\frac{\mathbf{m}-1}{2} \cdot \frac{\mathbf{n}-1}{2}} \left(\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{n}}\right) \cdot \mathbf{n}$$

Dies Gesetz nennt Legendre das quadratische Reciprocitätsgesetz im Unterschied von Gauss, der es "Theorema fundamentale in doctrina de residuis quadraticis" bezeichnet. 150 Jahre nachdem die ersten speciellen Fälle entdeckt waren, war es also einem der bedeutendsten Zahlentheoretiker gelungen, das Gesetz in allgemeinster Form und elegantester Fassung auszusprechen.

Auf die Art, wie Legendre den Satz zu beweisen suchte, werden wir später zurückzukommen Gelegenheit haben. Hier bemerken wir nur, dass der Nachweis unvollständig ist; und eben dieser Unvollständigkeit halber übergehen wir ihn hier.²)

Wenden wir die Legendre'sche Bezeichnung an, so haben wir bis

I)
$$\left(\frac{-1}{q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2}};$$
 II) $\left(\frac{2}{q}\right) = (-1)^{\frac{q^2-1}{8}};$
III) $\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}},$

wobei p und q positive ungerade Primzahlen bedeuten.

Diese drei Formeln drücken das quadratische Reciprocitätsgesetz aus.

In den zunächst folgenden fünf Abschnitten werden wir nun den Beweis hauptsächlich für Formel III) erbringen und in einem besondern Capital,

¹⁾ A Paris ches Duprat. An VI (1798).

²⁾ Disquis. Arithm. Art. 151, 296, 297 und Additamenta.

S. 227, "die Ergänzungssätze des quadratischen Reciprocitätsgesetzes", wie die durch Formel I) und II) ausgedrückten Gesetze heissen, darthun.

Ehe wir dazu übergehen, haben wir noch eine von Jacobi¹) angegebene Verallgemeinerung des Legendre'schen Symbols zu erwähnen, weil dieselbe für das Rechnen mit jenem Symbol von grosser Wichtigkeit ist. Während nämlich Legendre voraussetzt, dass in $\left(\frac{a}{q}\right)$ q eine ungerade positive Primzahl und a eine zu derselben relative Primzahl ist, lässt Jacobi für q=b auch zusammengesetzte Zahlen zu. In $\left(\frac{a}{b}\right)$ werden a und b nur relativ prim vorausgesetzt, die nicht zugleich negativ sind und von denen die letztere ungerade ist. Diese verallgemeinerten Legendreschen Symbole werden von Jacobi durch die Formeln

$$\left(\frac{a}{p\,q\,r}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{a}{q}\right)\cdots, \quad \left(\frac{a}{-b}\right) = \left(\frac{a}{b}\right), \quad \left(\frac{a\,b\,c\,\ldots}{q}\right) = \left(\frac{a}{q}\right)\left(\frac{b}{q}\right)\cdots$$

definirt, worin p, q, r, \ldots absolute Primzahlen, welche verschieden, aber auch theilweise oder sämmtlich gleich sein können, bedeuten.

II. Capitel.

Gauss' Beweis durch vollständige Induction²) in der von Dirichlet³) gegebenen Form dargestellt.

1.

Gauss unterscheidet bei seinem ersten Beweise, ebenso wie Legendre, acht verschiedene Fälle, je nach der verschiedenen Natur der in Frage kommenden Primzahlen, so dass der eigentliche Beweis in acht Beweise zerfällt. Die acht Einzelfälle sind:

- 1. Ist q=4n+1, p=4n+1 und $\left(\frac{p}{q}\right)=1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{p}\right)=1$;
- 2. ist q=4n+1, p=4n+3 und $\left(\frac{p}{q}\right)=1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{p}\right)=1$;
- 3. ist q = 4n + 1, p = 4n + 1 und $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$;

¹⁾ Crelle J. XXX, S. 170.

²⁾ Disquis. Arithm. Art. 185 -144.

⁸⁾ Dirichlet, Crelle J. XLVII, 8. 189.

4. ist
$$q=4n+1$$
, $p=4n+3$ und $\left(\frac{p}{q}\right)=-1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{p}\right)=-1$;

5. ist
$$q=4n+3$$
, $p=4n+3$ und $\left(\frac{p}{q}\right)=1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{p}\right)=-1$;

6. ist
$$q = 4n + 3$$
, $p = 4n + 1$ und $\left(\frac{p}{q}\right) = 1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$;

7. ist
$$q=4n+3$$
, $p=4n+3$ und $\left(\frac{p}{q}\right)=-1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{n}\right)=1$;

8. ist
$$q=4n+3$$
, $p=4n+1$ und $\left(\frac{p}{q}\right)=-1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{p}\right)=-1$.

Diese acht einzelnen Sätze machen also das Reciprocitätsgesetz¹) vollständig aus; sie lassen sich nun zunächst in die folgenden drei zusammenziehen:

I. Ist
$$q = 4n + 1$$
 und $\left(\frac{p}{q}\right) = 1$, so ist zu zeigen, dass $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$;

II. ,
$$q=4n+1$$
 , $\left(\frac{p}{q}\right)=-1$, , , , , , $\left(\frac{q}{p}\right)=-1$;

III. ,,
$$q = 4n + 3$$
 ,, $\left(\frac{\alpha}{q}\right) = 1$, ,, ,, ,, ,, $\left(\frac{q}{\alpha}\right) = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2}}$.

Im Falle III ist $\alpha = \pm p$. Ist nämlich $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$, so folgt aus $\left(\frac{p}{q}\right) \equiv p^{\frac{q-1}{2}} \mod q \quad \left(\frac{-p}{q}\right) = +1$, so dass der Fall $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$ einer weiteren Untersuchung nicht bedarf.

Fassen wir noch den I. und III. Fall zusammen, so reducirt sich unser Beweis darauf, zu zeigen, dass, wenn

I.
$$q = 4n + 1$$
, $4n + 3$ und $\left(\frac{\alpha}{q}\right) = 1$, $\left(\frac{q}{\alpha}\right) = (-1)^{\frac{\alpha - 1}{2} \cdot \frac{q - 1}{2}}$ und II. $q = 4n + 1$, $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$, $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$ ist.

p repräsentirt dabei eine beliebige ungerade positive Primzahl, α eine beliebige ungerade positive oder negative Primzahl.

Im Folgenden setzen wir nun, was immer geschehen darf, q > p voraus und nehmen an, das Gesetz gälte für alle Primzahlen kleiner als q und

Das Wort "quadratisch" soll vor Rest, Nichtrest, Reciprocitätageseta fortgelassen werden, wenn nicht die Deutlichkeit darunter leidet.

Ist
$$\left(\frac{\alpha}{q}\right) = +1$$
, so ist zu zeigen, dass $\left(\frac{q}{\alpha}\right) = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$ ist. Aus

der Voraussetzung folgt, dass die Congruenz $x^2 \equiv \alpha \mod q$ lösbar ist. Bezeichnet man die gerade Wurzel derselben mit $e \ (e < q)$, so ist also

$$e^2 = \alpha + fq.$$

f ist hierin eine von Null verschiedene ganze Zahl, weil im andern Falle $\alpha = e^2 = 4e'$ wäre; ferner positiv, weil sonst $\alpha = +p$ und $p - e^2 > q$ wäre, was gegen die Voraussetzung q > p streitet; und ungerade, weil $fq = e^2 - \alpha$ ungerade ist. Ferner ist f < q - 1, denn e und p sind kleinerals q - 1, woraus $qf < q \cdot q - 1$ und f < q - 1 folgt. Nun sind in Gleichung 1) zwei Fälle möglich.

1. e und f sind relativ prim zu α . Aus $e^2 \equiv fq \mod \alpha$ ergiebsich, dass $\left(\frac{fq}{\alpha}\right) = 1$ oder $\left(\frac{f}{\alpha}\right) = \left(\frac{q}{\alpha}\right)$, während aus $e^2 \equiv \alpha \mod f\left(\frac{\alpha}{f}\right) = 1$ folgt. Mithin ist

$$\left(\frac{q}{\alpha}\right) = \left(\frac{f}{\alpha}\right) = \left(\frac{\alpha}{f}\right)(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\frac{f-1}{2}} = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2}\frac{f-1}{2}},$$

da nach unserer Voraussetzung das Gesetz für alle Primzahlen < q gillt. Da nun $e \equiv mod 2$, so ist $-\alpha \equiv af \mod 4$

oder

$$-(\alpha+1) \equiv qf-1 \equiv q-1+f-1 \mod 4$$

und

$$-\left(\frac{\alpha^2-1}{4}\right) \equiv \frac{q-1}{2} \cdot \frac{\alpha-1}{2} + \frac{f-1}{2} \cdot \frac{\alpha-1}{2} \mod 2.$$

 $\frac{\alpha^2-1}{4} = \frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{\alpha+1}{2}$ ist aber das Product zweier aufeinander folgenære. Zahlen, folglich gerade, woraus

$$\frac{f-1}{2} \cdot \frac{\alpha-1}{2} \equiv \frac{q-1}{2} \cdot \frac{\alpha-1}{2} \mod 2$$

resultirt, was zu beweisen war.

2. f und e sind durch α theilbar. Ist $f = \alpha \varphi$ und $e = \alpha \varepsilon$, wird

$$\alpha \, \varepsilon^{\mathbf{g}} = 1 + \varphi \, q \,,$$

worin α und q relativ prim sind. Zunächst ist nun $\left(\frac{\alpha}{\varphi}\right) = 1$ und s $12 = -\varphi q \mod \alpha \text{ folgt } \left(\frac{q}{\alpha}\right) = \left(\frac{-\varphi}{\alpha}\right), \text{ so dass mit Benutzung unserer}$

- 1 m.1 (

4. ist
$$q=4n+1$$
, $p=4n+3$ und $\left(\frac{p}{q}\right)=-1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{p}\right)=-1$;

5. ist
$$q=4n+3$$
, $p=4n+3$ und $\left(\frac{p}{q}\right)=1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{p}\right)=-1$;

6. ist
$$q = 4n + 3$$
, $p = 4n + 1$ und $\left(\frac{p}{q}\right) = 1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$;

7. ist
$$q=4n+3$$
, $p=4n+3$ und $\left(\frac{p}{q}\right)=-1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{n}\right)=1$;

8. ist
$$q=4n+3$$
, $p=4n+1$ und $\left(\frac{p}{q}\right)=-1$, so ist zu beweisen, dass $\left(\frac{q}{p}\right)=-1$.

Diese acht einzelnen Sätze machen also das Reciprocitätsgesetz¹) vollständig aus; sie lassen sich nun zunächst in die folgenden drei zusammenziehen:

Im Falle III ist $\alpha = \pm p$. Ist nämlich $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$, so folgt aus $\left(\frac{p-1}{q}\right) = \frac{q-1}{2} \mod q$ $\left(\frac{-p}{q}\right) = +1$, so dass der Fall $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$ einer weiter on Untersuchung nicht bedarf.

Fassen wir noch den I. und III. Fall zusammen, so reducirt sich unser Beis darauf, zu zeigen, dass, wenn

I.
$$q = 4n + 1$$
, $4n + 3$ und $\left(\frac{\alpha}{q}\right) = 1$, $\left(\frac{q}{\alpha}\right) = (-1)^{\frac{\alpha - 1}{2} \cdot \frac{q - 1}{2}}$ und II. $q = 4n + 1$, $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$, $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$ ist.

p repräsentirt dabei eine beliebige ungerade positive Primzahl, α eine beliebige ungerade positive oder negative Primzahl.

Im Folgenden setzen wir nun, was immer geschehen darf, q > p vorsumd und nehmen an, das Gesetz gälte für alle Primzahlen kleiner als q und

¹⁾ Das Wort "quadratisch" soll vor Rest, Nichtrest, Reciprocitätagesetz fort-Relassen werden, wenn nicht die Deutlichkeit darunter leidet.

3)
$$\frac{k \cdot q - 1^2 \cdot q - 2^2 \cdot \dots \cdot q - m^2}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (2m+1)} = s$$

eine ganze Zahl sein. Nun ist aber

$$(2m+1)! = [(m+1)-m] \cdot [(m+1)-(m-1)] \cdot \cdot \cdot \cdot [(m+1)-1] \times [(m+1)-0] \cdot \cdot [(m+1)+m] \cdot \cdot \cdot \cdot [(m+1)+1] = (m+1)[(m+1)^2 - m^2] \cdot \cdot \cdot \cdot [(m+1)^2 - 1].$$

Setzt man diesen Werth in 3) ein, so würde sich ergeben, dass

$$z = \frac{1}{m+1} \cdot \frac{q-1^2}{(m+1)^2-1} \cdot \cdots \cdot \frac{q-m^2}{(m+1)^2-m^2}$$

eine ganze Zahl sein müsste.

Nimmt man nun für m die grösste ganze Zahl unterhalb \sqrt{q} an, so dass unsere Voraussetzung 2m+1 < q bestehen bleibt, so folgt, da $(m+1)^2 < q$, dass s ein echter Bruch ist. Die Voraussetzung über den Restcharakter von q ist daher falsch und man kommt zu dem Resultat: Ist q eine Primzahl von der Form 8n+1, so giebt es unterhalb $2\sqrt{q}+1$, also unterhalb q mindestens eine ungerade Primzahl p', von der q quadratischer Nichtrest ist.

4

Es giebt also für jede ungerade Primzahl q=4n+1 eine ungerade Primzahl p' < q, so dass $\left(\frac{q}{p'}\right) = -1$ ist. Nun muss aber auch $\left(\frac{p'}{q}\right) = -1$ sein; denn wäre $\left(\frac{p'}{q}\right) = +1$, so hätte man nach dem Vorhergehenden $\left(\frac{q}{p'}\right) = (-1)^{\frac{p'-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} = +1$. Für p' und q gilt also das Reciprocitätagesetz.

Es war darzuthun, dass $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$ ist. Da aber $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$ ist, so kann die Aufgabe dahin modificirt werden: nachzuweisen, dass

$$\left(\frac{q}{p\,p'}\right) = +1$$

wird. Nach Voraussetzung ist $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$, folglich $\left(\frac{pp'}{q}\right) = +1$, d. h.: die Congruenz $x^2 \equiv pp' \mod q$ ist lösbar. Bezeichnet man die gerade Wurzel mit e(< q), so ist

$$e^2 = pp' + fq,$$

wobei f eine ungerade ganze Zahl, kleiner als q repräsentirt. Man hat nun zu unterscheiden:

1. e und f sind weder durch p, noch durch p' theilbar. Dann ist $e^2 \equiv pp' \mod f$, mithin $\left(\frac{pp'}{f}\right) = 1$, und ferner $e^2 \equiv qf \mod pp'$, mithin $\left(\frac{qf}{pp'}\right) = 1$ oder $\left(\frac{q}{pp'}\right) = \left(\frac{f}{pp'}\right)$, so dass sich ergiebt

$$\left(\frac{q}{p\,p'}\right) = \left(-1\right)^{\frac{f-1}{2}\cdot\frac{p\,p'-1}{2}}.$$

Da aber $e \equiv 0 \mod 2$ und ausserdem $q \equiv 1 \mod 4$, so ist

$$f \equiv -p p' \mod 4$$
, mithin $\frac{f-1}{2} \cdot \frac{pp'-1}{2} \equiv -\frac{pp'+1}{2} \cdot \frac{pp'-1}{2} \mod 2$.

Die rechte Seite der vorstehenden Congruenz ist aber das Product zweier aufeinander folgender Zahlen, also gerade, so dass

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = 1$$

resultirt, w. z. b. w.

2. e und f sind durch p', nicht aber durch p theilbar. Setzt man $e = \epsilon p'$, $f = \varphi p'$, so wird $\epsilon^2 p' = p + q \varphi$, worin φ relativ prim zu p, p' und q ist. Wir erhalten somit

$$\left(\frac{pp'}{\varphi}\right) = \left(\frac{q \varphi p'}{p}\right) = 1$$
 oder $\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{\varphi}{p}\right)\left(\frac{p'}{p}\right)$.

Da ferner $\epsilon^2 p p' = p^2 + p q \varphi$, so ist $\left(\frac{-q \varphi p}{p'}\right) = 1$, also $\left(\frac{q \varphi}{p'}\right) = \left(\frac{-p}{p'}\right)$, so dass

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = \left(\frac{\varphi}{pp'}\right)\left(\frac{pp'}{\varphi}\right)\left(\frac{p'}{p}\right)\left(\frac{-p}{p'}\right)$$

sich ergiebt. Man erhält so mit Rücksicht auf unsere Voraussetzung:

$$\left(\frac{q}{n\,n'}\right) = (-1)^{\frac{p\,p'-1}{2}\,\frac{\varphi-1}{2} + \frac{p-1}{2}\,\frac{p'-1}{2} + \frac{p'-1}{2}}.$$

Nun ist aber in $e^2p'=p+q\varphi$ ε gerade wegen $e\equiv 0 \mod 2$, folglich $\varphi\equiv -p \mod 4$. Demgemäss wird

$$\frac{\varphi - 1}{2} \cdot \frac{pp' - 1}{2} + \frac{p + 1}{2} \cdot \frac{p' - 1}{2} \equiv \frac{p + 1}{2} \left\{ \frac{pp' - 1}{2} + \frac{p' - 1}{2} \right\}$$

$$\equiv -p \cdot \frac{p + 1}{2} \cdot \frac{p' - 1}{2} \mod 2,$$

so dass $\left(\frac{q}{pp'}\right) = +1$ wird, w. z. b. w.

3. Der Fall, dass e und f durch p, nicht aber durch p' theilbar ist, ist dem vorigen durchaus analog.

4. e und f sind durch p und p' theilbar. Ist $e = \varepsilon pp'$, $f = \varphi pp'$, wird $(\varepsilon pp')^2 \equiv pp' + q \varphi pp'$ und $\varepsilon^2 pp' = 1 + q \varphi$.

Worin φ relativ prim ist zu p, p' und q.

Daraus folgt zunächst $\left(\frac{-q\,\varphi}{p\,p'}\right) = +1$ oder $\left(\frac{q}{p\,p'}\right) = \left(\frac{-\varphi}{p\,p'}\right)$. Da: $\left(\frac{p\,p'}{\varphi}\right) = 1$ ist, so ergiebt sich $\left(\frac{q}{p\,p'}\right) = \left(\frac{-\varphi}{p\,p'}\right)\left(\frac{p\,p'}{\varphi}\right)$, welche dem Resultat führt: $\left(\frac{q}{p\,p'}\right) = (-1)^{\frac{\varphi+1}{2}} \cdot \frac{p\,p'-1}{2},$

da φ , p, p' sämmtlich kleiner als q sind und somit unsere allgemeine Voraussetzung Platz greift. Nun ist aber e gerade und $q \equiv 1 \mod 4$, folglich

$$arphi \equiv -1 \mod 4$$
 oder $\dfrac{arphi+1}{2} \equiv 0 \mod 2$, so dass $\left(\dfrac{q}{p\,p'}\right) = +1$

sich ergiebt. Damit ist auch der zweite Theil des Beweises erledigt.

Es ist aber das Gesetz für p und q nur unter der Voraussetzung bewiesen, dass es zwei Primzahlen giebt, kleiner als die grösste jener beiden, für welche das Gesetz schon Giltigkeit hat, und dass, wenn das Beciprocitätsgesetz für Primzahlen gilt, dann auch das entsprechende Gesetz für verallgemeinerte Restcharakteristiken gilt.

Was den ersten Theil der Voraussetzung betrifft, so erledigt sich derselbe dadurch, dass die beiden kleinsten ungeraden Primzahlen 3 und 5 dem Euler'schen Gesetze gehorchen. In Bezug auf den zweiten Theil der Voraussetzung sei Folgendes bemerkt. 1)

Sind in $\left(\frac{P}{Q}\right)$ P und Q positive zusammengesetzte ungerade Zahlen ohne gemeinsamen Theiler und zerlegt man P und Q in ihre Primfactoren

$$P = p \cdot p' \cdot p'' \cdot \dots, \quad Q = q \cdot q' \cdot q'' \cdot \dots$$

so wird sein

$$\left(\frac{P}{Q}\right)\left(\frac{Q}{P}\right) = \prod_{p} \left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right),$$

wo jedes p mit jedem q zu combiniren ist,

Nimmt man nun an, das quadratische Reciprocitätsgesetz gälte für alle p und q, so erhält man

$$\left(\frac{P}{Q}\right)\left(\frac{Q}{P}\right) = \prod \left(-1\right)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} = (-1)^{\sum \left(\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}\right)},$$

wo das Summenzeichen alle Combinationen von p und q umfasst, so dass

$$\sum \left(\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}\right) = \sum \frac{p-1}{2} \cdot \sum \frac{q-1}{2}$$

wird. Aus

$$R = \Pi r = \Pi \{(r-1) + 1\} \equiv 1 + \Sigma(r-1) \mod 4$$

r ungerade vorausgesetzt, ergiebt sich aber, dass

$$\frac{R-1}{2}$$
 und $\sum_{r=1}^{r-1}$

gleichartige Zahlen sind. Aus demselben Grunde erhalten wir

$$\sum_{\text{lass}} \frac{p-1}{2} \cdot \sum_{\frac{q-1}{2}} \frac{q-1}{2} \equiv \frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2} \equiv \sum_{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} \right) \mod 2,$$

so dass

$$\left(\frac{P}{Q}\right)\left(\frac{Q}{P}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}}.$$

Die gemachte Voraussetzung ist also zulässig, folglich gilt das quadratische Beciprocitätsgesetz in voller Allgemeinheit.

¹⁾ Gauss, Disq. Ar. Art. 182 und Dirichlet, Crelle J. XIVII, S. 148.

III. Capitel. Beweise durch Reduction.

I. Gauss'1) dritter Beweis.

1.

Bezeichnet q eine positive Primzahl, so ist $1, 2, \cdots \frac{q-1}{2}$ ein vollständiges System incongruenter positiver absolut kleinster Reste Modulo q; während, a relativ prim zu q vorausgesetzt, $a, 2a, \cdots \frac{q-1}{2}$ a nur $\frac{q-1}{2}$ incongruente, nicht aber nothwendig positive absolut kleinste Reste Modulo q liefert. Sind in dieser letzteren Reihe $\varrho_1, \ldots, \varrho_k$ positive absolut kleinste, $-\mathfrak{c}_1, \ldots -\mathfrak{c}_k$ negative absolut kleinste Reste Modulo q, so erhellt zunächst, dass die ϱ und die \mathfrak{c} sämmtlich von einander und von Null verschieden sind, also abgesehen von der Reihenfolge Modulo q den Zahlen $1, \ldots \frac{q-1}{2}$ congruent sind.

Wären nämlich zwei Reste $ta \mod q$ und $sa \mod q$ einander gleich, so müsste sein $(t-s)a \equiv 0 \mod q$

oder, wenn man vom Vorzeichen der o absieht,

$$(t+s)a \equiv 0 \mod q$$

was beides nicht möglich ist, da t und s von einander verschieden und kleiner als $\frac{q}{2}$ sind. Man erhält somit

 $a = 1.2 \cdots \frac{q-1}{2} \equiv (-1)^{\mu} \prod_{q} \prod_{q} \mod_{q} \text{ oder } a = \left(\frac{a}{q}\right) = (-1)^{\mu} \mod_{q}.$ Diese Formel gilt für jedes zu q relativ prime a, also auch für eine von q verschiedene Primzahl p, so dass sich das Resultat findet: Sind p und q zwei positive ungerade Primzahlen, so ist $\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\mu}$, wenn μ die Anzahl der negativen absolut kleinsten Reste in p, 2p, ... $\frac{q-1}{2}p$ mod q bedentet.

2.

Um die in dem vorstehenden Lemma gefundene Zahl μ weiter zu untersuchen, wendet Gauss die Bezeichnung $\left[\frac{x}{y}\right]$ als grösste in $\frac{x}{y}$ enthaltene ganze Zahl an und findet

$$\mu = \sum_{r=1}^{\frac{q-1}{2}} \left\{ \left[\frac{2pr}{q} \right] - 2 \left[\frac{pr}{q} \right] \right\} \equiv \sum_{r} \left[\frac{2pr}{q} \right] \mod 2.$$

1) Comm. Soc. Gott. Vol. XVI S. 69, 1808, Jan. 15 oder Gauss' Works?

und bezeichnet man mit $(s)_{r,R}$ die Anzahl der s, welche Modulo p positiven absolut kleinsten, Modulo q aber negativen absolut kleinsten Resten congruent sind, ferner mit $(s)_{R,r}$ die Anzahl der s, welche Modulo p negativen absolut kleinsten, Modulo q aber positiven absolut kleinsten Resten congruent sind, so ergiebt sich zunächst

$$(s)_{Rr} = (S)_{rR},$$

wobei das Zeichen (S) in Bezug auf S dieselbe Bedeutung hat, wie (s) Bezug auf s. Nach dem oben abgeleiteten Satze ist aber ferner

2)
$$(s)_{rR} + (S)_{rR} = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$$

Gauss betrachtet nun die Reihe

$$\frac{q+1}{2}, \quad \frac{q+3}{2} \dots \quad q-1,$$

$$q+\frac{q+1}{2}, \quad \dots \quad 2q-1,$$

$$\frac{p-3}{2}q+\frac{q+1}{2}, \quad \dots \quad \frac{p-1}{2}q-1.$$

Die Anzahl der Glieder ist $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ und es sind sämmtliche Zahlem s, die Modulo q negativen absolut kleinsten Resten congruent sind, denn die nächste Horizontalreihe würde mit $\frac{pq+1}{2}$ beginnen. Gauss trennt jene $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ Zahlen in 3 Classen.

- 1. In die erste nimmt er die, welche Modulo p positiven absolut kleinsten Resten congruent sind; ihre Anzahl ist $(s)_{rR}$.
- 2. In die zweite nimmt er die, welche Modulo p negativen absolut kleinsten Besten congruent sind; ihre Anzahl ist $(s)_{RR}$.
- 3. Die übrig bleibenden haben die Form $pr_q \equiv R_q \mod q$. Bezeichnen man daher den zum Beste p und zum Modul q gehörigen Exponenten mit ν , so erhält man durch diese Eintheilung

3)
$$(s)_{rR} + (s)_{RR} + v = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} \cdot$$

Auf ganz analoge Weise folgt aus der Betrachtung des Systemes:

$$\frac{p+1}{2}, \qquad \frac{p+3}{2}, \qquad \cdots \qquad p-1,$$

$$p+\frac{p+1}{2}, \qquad p+\frac{p+3}{2}, \qquad \cdots \qquad 2p-1,$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$\frac{q-3}{2}p+\frac{p+1}{2}, \qquad \frac{q-3}{2}p+\frac{p+1}{2}, \qquad \cdots \qquad \frac{q-1}{2}p-1,$$

$$\mu \equiv \sum_{r} \left[\frac{p \, r}{q} \right] = 1 \left\{ \left[\frac{2 \, q}{p} \right] - \left[\frac{q}{p} \right] \right\} + 2 \left\{ \left[\frac{3 \, q}{p} \right] - \left[\frac{2 \, q}{p} \right] \right\} + \dots$$

$$\dots + \frac{p-1}{2} \left\{ \frac{q-1}{2} - \left[\frac{p-1}{2} \frac{q}{p} \right] \right\}$$

$$\equiv -\sum_{q=1}^{3_{2}(p-1)} \left[\frac{q \, q}{p} \right] + \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} \mod 2$$

$$\sum_{p=1}^{2} \left[\frac{p \, r}{q} \right] + \sum_{p=1}^{2} \left[\frac{q \, q}{p} \right] \equiv \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} \mod 2.$$

Damit ist aber das Reciprocitätsgesetz bewiesen.

II. Gauss' fünfter Beweis. 1)

1.

In der Reihe der Zahlen

oder

I)
$$1, 2, \ldots pq-1,$$

worin p und q > p zwei von einander verschiedene positive ungerade Primzahlen bedeuten mögen, sind q und nur q Zahlen, die Modulo p einem positiven absolut kleinsten Reste r_p congruent sind, nämlich

II)
$$r_p, r_p+p, \ldots r_p+(q-1)p.$$

Diese Reihe stellt ein vollständiges Restsystem Modulo q dar, denn es ist offenbar die Differenz zweier Glieder dieser Reihe nicht durch q theilbar. Von den q Gliedern der Reihe II) ergeben nun, wenn man sie Modulo q in drei Theile spaltet, $\frac{q-1}{2}$ Glieder positive absolut kleinste Reste und $\frac{q-1}{2}$ Glieder negative absolut kleinste Reste; die restirenden sind Vielfache von q. Man erhält dadurch den Satz:

In der Reihe 1, 2, ... pq-1 giebt es $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ Zahlen, welche Modulo p und Modulo q positiven absolut kleinsten Resten congruent sind, und ebenfalls $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ Zahlen, welche Modulo p positiven absolut kleinsten, Modulo q aber negativen absolut kleinsten Resten congruent sind.

Z,

Setzt man zur Abkürzung:

$$s = 1, 2, \dots \frac{pq-1}{2}, \quad S = \frac{pq+1}{2}, \dots pq-1,$$

 $r_p = 1, 2, \dots \frac{p-1}{2}, \quad R_p = \frac{p+1}{2}, \dots p-1,$
 $r_q = 1, 2, \dots \frac{q-1}{2}, \quad R_q = \frac{q-1}{2}, \dots q-1$

¹⁾ Comm. Soc. Gott. XVI S. 69, 1818, Febr. 10 oder Ganas' West

 $\left(\frac{p}{q}\right)=(-1)^{\mu}$ eine Zahl, welche (wiederum von einem geraden Summanden abgesehen) gleich ist der Anzahl der Gitterpunkte innerhalb OBCD, wenn noch $OB=\frac{q-1}{2}$ ist. Mithin ist $\mu+\nu$ Modulo 2 congruent der Anzahl der Gitterpunkte innerhalb OABC; denn es treten keine Punkte doppelt auf, da diese, wie sofort evident, auf der Geraden selbst liegen müssten, was nicht möglich ist. Die Anzahl jener Gitterpunkte ist aber, wie die Anschauung lehrt, gleich $\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}$, womit unser Gesetz abermals seinen Beweis gefunden hat.

IV. Beweis von Genocchi.1)

Genügen p und q wiederum den oft angegebenen Bedingungen und setzt man zur Abkürzung:

1)
$$\begin{cases} r = \frac{pq-1}{2} \\ u = hq - kp \\ v = hq + kp - r \end{cases} \begin{pmatrix} h < \frac{p-1}{2} \\ k < \frac{q-1}{2} \end{pmatrix},$$

ist ferner h' diejenige ganze positive Zahl, für welche

2) $hq = ip + h' \text{ oder } ip < hq < \frac{pq}{2}$

wird, dann wird kp < hq für k = 1, 2, ... i,

so dass für einen vorgegebenen Werth h der Ausdruck u, wenn darin k alle möglichen ganzzahligen positiven Werthe annimmt, i aber auch nur i positive Werthe hat. Das Nullwerden von u ist ausgeschlossen, was unmittelbar aus der Definition dafür folgt. Mit Hilfe von 2) ergiebt sich ferner: hq + kp = (i+k)p + h',

woraus, wenn man berücksichtigt, dass $r = \frac{pq-1}{2} = p\frac{q-1}{2} + \frac{p-1}{2}$ ist, sich ableitet

$$hq + kp > r$$
 für $k = \frac{q-1}{2} - i + 1$, $\frac{q-1}{2} - i + 2$, ... $\frac{q-1}{2}$ und für $k = \frac{q-1}{2} - i$,

wenn in diesem Falle ausserdem noch $h' > \frac{p-1}{2}$ ist. Denn $\frac{q-1}{2} - i$ kann nicht Null werden, weil sonst hq > r sein müsste, was nicht möglich ist. Also wird

v, wenn k die ganzen Zahlen 1, 2, ... $\frac{q-1}{2}$ durchläuft, i positive Werthe annehmen, wenn $h' < \frac{p}{2}$ und i+1, wenn $h' > \frac{p}{2}$,

¹⁾ Mém. courr. et mém. des sav. étrang. XXV, 1862.

d. b.:

Anz._k pos.
$$v = \text{Anz.}_k$$
 pos. u^1), $h' < \frac{p}{2}$

Anz., pos.
$$v = \text{Anz.}_k \text{ pos. } u + 1, \quad h' > \frac{p}{2}$$

Lässt man nun h die Werthe von 1 bis $\frac{p-1}{2}$ durchlaufen, und bezeichnet man mit μ die Anzahl der Reste hq, welche Modulo p grösser als $\frac{p}{2}$ sind, so ist also

4)
$$\mu \equiv \operatorname{Anz}_{h,k} \operatorname{pos}_{\cdot} v - \operatorname{Anz}_{h,k} \operatorname{pos}_{\cdot} u \mod 2.$$

Ist analog Anz. pos. u' = Anzahl der positiven (kp - hq) und ν die Anzahl der Reste kp, welche Modulo q negative absolut kleinste sind, so ist ebenso

5)
$$\nu \equiv \operatorname{Anz}_{h,k} \operatorname{pos.} v - \operatorname{Anz}_{h,k} \operatorname{pos.} u' \operatorname{mod} 2,$$

woraus, wenn man die Werthe für u und u' einsetzt, sich ergiebt:

$$\operatorname{Anz}_{h,k}\operatorname{pos.}(hq-kp)-\operatorname{Anz}_{h,k}\operatorname{pos.}(kp-hq)\equiv \mu+\nu \ mod \ 2, \ q. \ e. \ d.$$

V. Beweis von Stern.²)

1.

Sind p und q wie bisher zwei ungerade positive Primzahlen, so gilt die Congruenz:

1) 1.2 ...
$$\frac{p-1}{2} \equiv (-1)^{n} \cdot 2 \cdot 4 \cdot ... \cdot p-1 \mod p$$
,

wenn u die Anzahl der ungeraden Zahlen in der Reihe $1, \dots \frac{p-1}{2}$ ist. Danach wird

$$u=\frac{p-\varepsilon}{4},$$

wenn ε gleich 1 oder -1 ist, je nachdem p die Form 4n+1 oder 4n-1 hat. Ebenso wird

$$q.2q....\frac{p-1}{2}q=q^{\frac{p-1}{2}}1....\frac{p-1}{2}\equiv (-1)^{n_1}.2.4...p-1 \mod p,$$

wenn u_1 die Anzahl der positiven ungeraden Reste Modulo p in der Reihe q, 2q, ... $\frac{p-1}{2} \cdot q$ repräsentirt, oder

$$q^{\frac{p-1}{2}} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} \equiv q^{\frac{p-1}{2}} (-1)^{u} \cdot 2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot p-1 \mod p,$$

woraus

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{u_1 - u}$$

folgt. Daher ergiebt sich

3)
$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{y_1+y_2-y_2-y_1},$$

¹⁾ Die Bezeichnung Anz, pos. v ist nach Schering gewählt und ist zu lesen: Anzahl der positiven Werthe von v bei variabelem k.

²⁾ Göttinger Nachrichten 1870, S. 237. Dieser Beweis ist nicht ganz correct. Er ist gleichwohl eingereiht der Vollständigkeit halber und weil in ihm ein neuen fruchtbringender Gedanke liegt.

wenn v und v_1 in Bezug auf q dieselbe Bedeutung haben, wie u und u in Bezug auf p. Mit Rücksicht auf 2) hat man daher, um das Reciprocitäts gesetz darzuthun, zu zeigen, dass

4)
$$\begin{cases} u_1 + v_1 \equiv \frac{p-1}{4} + \frac{q-1}{4} \mod 2, \text{ wenn } p \text{ und } q \text{ gleichförmige Zahlen}^1 \\ \text{oder} \\ u_1 + v_1 \equiv \frac{p-1}{4} \mod 2, \text{ wenn } p \text{ und } q \text{ ungleichförmige Zahlen sind.} \end{cases}$$

Ist ferner u' resp. v' die Anzahl der geraden positiven Reste in

$$q, 2q, \dots xq, \dots \frac{p-1}{2}q \mod p$$

resp.

$$p, 2p, \dots yp, \dots \frac{q-1}{2}p \mod q$$

so ist zunächst $u_1 + u' = \frac{p-1}{2}$, $v_1 + v' = \frac{q-1}{2}$ oder $(u_1 + v_1) + (u' + \cdots + v') = \frac{p-1}{2} + \frac{q-1}{2}$.

Setzt man nun zur Abkürzung

5)
$$U = u_1 + v_1, \quad G = u' + v',$$

so hat man, um das Reciprocitätsgesetz darzuthun, mit Rücksicht auf 4) zu zeigen, dass

 $U-G\equiv 0 \mod 4$, wenn p und q gleichförmige Zahlen,

 $U-G\equiv 1 \mod 4$, wenn p und q ungleichförmige Zahlen sind,

oder dass

$$U-G \equiv \frac{q-p}{2} \bmod 4^{2}$$

wird.

2.

Um die Formel $U-G \equiv \frac{q-p}{2} \mod 2$ zu verificiren, bemerkt Ste zu zunächst, dass nicht derselbe Rest r zugleich in $xq \mod p$ und $yp \mod q$ vorkommen kann. Wäre nämlich gleichzeitig aq = gp + r und a'p = g'q + r so müsste

7)
$$(a+g') q = (a'+g) p$$

sein. Nun ist aber $a < \frac{q}{2}$, folglich $g < \frac{p}{2}$, so dass, da auch $a < \frac{p}{2}$ is a + g < p wird.

Mit Rücksicht auf die Eigenschaften von p und q folgt daher der Unmöglichkeit der Gleichung 7) und die Richtigkeit der obigen Bemerkung

¹⁾ Zwei Zahlen heissen gleichförmig, wenn sie beide von der Form 4**+: oder 4**+3 sind, ungleichförmig, wenn die eine von der Form 4**+1, die ander von der Form 4**+3 ist.

²⁾ Stern erbringt im Folgenden nur den Nachweis, dass $U-G = \frac{q-p}{2}$ wod ist. Hierauf wurde ich zuerst durch Herrn Prof. Schering aufmerksam gemach

Macht man nun die Voraussetzung q > p und setzt man

8)
$$aq = gp + r, \quad a < \frac{p}{2}, \quad r < p,$$

so mass $g < \frac{q-1}{2}$ sein. Wäre nämlich $g = \frac{q-1}{2}$, so wäre, da a für dieses g gleich $\frac{p-1}{2}$ wird, $r = \frac{p-1}{2}q - \frac{q-1}{2}p = -\frac{q-p}{2}$, also negativ, was nicht eintreten soll. Es ist also $g < \frac{q-1}{2}$. Gleichung 7) kann aber auch geschrieben werden:

(g+1) p = aq + (p-r)

oder

9)
$$bp = aq + r', \quad b = g + 1 < \frac{q}{2}, \quad r' = p - r < q.$$

Aus 7) und 9) resultirt aber:

Setzt man q < p voraus, so enthalten die beiden Restsysteme $xq \mod p$ und $yp \mod q$ sämmtliche Zahlen p-1, jedes davon die Hälfte. — Die Anzahl der Reste in $yp \mod q$ ist $\frac{q-1}{2}$, so dass in dieser Reihe $\frac{q-p}{2}$ Reste grösser als p vorkommen. Sind hierunter G' gerade und U' unserade, so ist also

$$U'+G'=\frac{q-p}{2},$$

ferner ist, wie sofort evident:

$$G = \frac{p-1}{2} + G', \quad U = \frac{p-1}{2} + U',$$

MOLSUS

$$U-G\equiv U'+G'\equiv rac{q-p}{2} mod 2$$

folgt

VI. Beweis von Zeller.1)

1

Nach dem Gauss'schen Lemma ist $\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\mu+\nu}$, wenn μ resp. ν die Anzahl der negativen absolut kleinsten Reste in

1)
$$q, 2q, \dots \frac{p-1}{2} q \mod p$$

Fesp.

$$p, 2p, \dots \frac{q-1}{2} p \mod q$$

bedeuten.

Setzt man p < q voraus, so kommen die $\frac{p-1}{9}$ entweder in Reihe 1) oder in Reihe 2), nie al

¹⁾ Monateber. der Berl. Ak. 1872, S. 848.

vor. Denn ist $hq \equiv r \mod p$, so gilt die Gleichung hq - kp = r, woraus nach der Voraussetzung p < q folgt, dass k eine ganze positive Zahl ist. Daraus ergiebt sich

$$kp \equiv -r \mod q$$
;

mithin erhalten wir

$$\mu + \nu \equiv \frac{p-1}{2} + \tau \mod 2,$$

wo τ die Anzahl der negativen absolut kleinsten Reste in 2) bedeutet, welche grösser als $\frac{p}{2}$ sind.

Ist nun

$$kp \equiv -r \mod q \ \left(k < \frac{q-1}{2} \ \text{und} \ \frac{p}{2} < r < \frac{q}{2}\right)$$

2.

und setzt man

$$k' = \frac{1}{2}(q-1) - k$$
, $r' = \frac{p+q}{2} - r$,

so ergiebt sich, dass k' und r' denselben Ungleichheitsbedingungen genügen wie k und r und dass $k'p \equiv -r' \mod q$ ist. Das heisst: Im Allgemeinen kommen alle zwischen $\frac{p}{2}$ und $\frac{q}{2}$ liegenden negativen absolut kleinsten Reste $kp \mod q$ paarweise vor, geben also keinen Beitrag zu τ , da τ Exponent von -1 ist, man aber Multipla von 2 fortlassen kann. Ausgenommen sind, wie sofort erhellt, die Fälle

$$k=0$$
 and $k=k'\left(=\frac{q-1}{4}\right)$.

- 1. Ist zuerst k = 0, so wird $k' = \frac{q-1}{2}$ und $k'p \equiv \frac{q-1}{2}p$ $\equiv \frac{q-p}{2} \mod q$. Da aber q > p, so ist dieser Rest positiv und giebt daher keinen Beitrag zu τ .
- 2. Ist zweitens $k = k' = \frac{q-1}{4}$, so kann nur dann von einem Reste die Rede sein, wenn q von der Form 4n+1 ist.

Für q = 4n + 3 erhält man somit

$$\tau \equiv 0 \mod 2 \quad \text{and} \quad \mu + \nu \equiv \frac{p-1}{2} \mod 2.$$

Für q = 4n + 1 wird $kp = \frac{q-1}{4}p \equiv \frac{1}{4}(-p \pm q) \mod q$ und man hat zu unterscheiden:

- 1. $p \equiv 1 \mod 4$. Dann giebt kp einen positiven Rest: $\tau \equiv 0 \mod 2$.
- 2. $p \equiv 3 \mod 4$. In diesem Falle muss q negativ genommen werden, so dass $\tau \equiv 1 \mod 2$ resultirt.

Fasst man alle diese Fälle zusammen, so erhält man unsere bekannte Formel.

VII. Beweis von Kronecker.1)

Sind wiederum p und q zwei von einander verschiedene positive ungeracte Primzahlen, und definirt man das Symbol $\left(\frac{p}{q}\right)$ als das Vorzeichen von

$$\prod_{h,k} \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q}\right) \binom{h=1, \dots \frac{p-1}{2}}{k=1, \dots \frac{q-1}{2}},$$

ist unmittelbar evident, dass

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}$$

ist. Aus

$$\prod \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q}\right) = \frac{1}{p} \prod \left(h - \frac{k}{q}\right)$$

ergiebt sich ferner

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\sum_{k} \left[\frac{kp}{q}\right]}.$$

Setzt man nun $p \equiv p' \mod q$, so wird $\left[\frac{kp'}{q}\right] \equiv \left[\frac{kp}{q}\right] \mod q$ und daher

Withrend $p' \equiv -p \mod q$

Siebt. Ist ferner $kp \equiv \pm k' \mod q$, wo k' ebenfalls einem absolut kleinsten Restsystem Modulo q angehören soll, und bezeichnet man mit r die positive Grösse k' resp. q - k', so wird:

$$\cdot \left[\frac{kpp'}{q}\right] = p'\left[\frac{kp}{q}\right] + \left[\frac{p'r}{q}\right]$$

Oder, wenn man die Identität:

$$\left[\frac{p'r}{q}\right] + \left[p'\frac{q-r}{q}\right] = p'-1$$

berücksichtigt:

$$\left[\frac{kp\ p'}{q}\right] = p'\left[\frac{kp}{q}\right] + p' - 1 - \left[p'\frac{q-r}{q}\right],$$

worsus wiederum folgt:

$$\left\lceil \frac{kp\,p'}{q} \right\rceil \equiv \left\lceil \frac{k\,p}{q} \right\rceil + \left\lceil \frac{k'\,p'}{q} \right\rceil \bmod \gamma$$

¹⁾ Berl. Mon.-Ber. 1876, S. 801

Aus dieser Formel ergiebt sich die Beziehung

$$\left(\frac{pp'}{q}\right) = \left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{p'}{q}\right).$$

Wendet man hierauf Formel 1) an und vertauscht dann p' mit q, so wird

$$\left(\frac{p'}{p\,q}\right) = \left(\frac{p'}{p}\right)\left(\frac{p'}{q}\right).$$

Die Formeln 2) bis 5) zeigen nun, dass die in 1) vorkommenden Symbole $\left(\frac{p}{q}\right)$ und $\left(\frac{q}{p}\right)$ genau denselben Gesetzen gehorchen, wie die Legendre-Jacobi'schen Zeichen. Sollen sie mit diesen identisch sein, so muss noch werden:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = +1$$
, wenn p quadratischer Rest von q ist, und $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$, wenn p quadratischer Nichtrest von q ist.

Und diese Beziehungen gelten in der That. Setzt man, um dies für den ersten Fall darzuthun, in 4) p'=p, so ergiebt sich sofort in Verbindung mit 2) $\left(\frac{p^2}{q}\right)=+1$. Was den zweiten Fall betrifft, so wäre, wenn es nur eine einzige Zahl p gäbe, für die $\left(\frac{p}{q}\right)=-1$ wäre, mit Hilfe von 2) und 4) evident, dass jeder andere Nichtrest dieselbe Bedingung erfüllte. Und eine solche Zahl p giebt es. Für q=8n+1 hat dies bereits Gauss in seinem ersten Beweise, wie wir gesehen haben, dargethan; es erübrigt also nur noch, den Nachweis für q=8n+3, 8n+5, 8n+7 oder, was dasselbe ist, für

 $q \equiv -1 \; mod \, 4 \; \; ext{und} \; \; q \equiv 5 \; mod \, 8$ zu erbringen.

Ist zunächst $q \equiv -1 \mod 4$, so folgt aus Formel 3), wenn man p = 2q - 1 setzt, unmittelbar $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$.

Für $q \equiv 5 \mod 8$ und $p = \frac{q+1}{2}$ erhält man mit Hülfe derselben Formel 3) $\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{2p-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1$ und wegen Formel 1) wiederum $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$.

Nach alledem ist erwiesen, dass $\left(\frac{p}{q}\right)$ identisch ist mit dem Legendreschen Symbole, und Formel 1) enthält somit den Beweis für unseren Setz.

Sind a und r (1 < r < 2a - 1) zwei positive ungerade Zahlen ohne gemeinsamen Theiler und ist p=2an+r eine ungerade Primzahl, so werden die Zahlen 1, 2, ... $\frac{p-1}{2}$ oder 1, 2, ... $an + \frac{r-1}{2}$ dargestellt werden durch das System:

Bezeichnet man das Product der Glieder einer Horizontalreihe mit dem An fangsgliede r_1 mit (r_1, a) , so dass

$$(r_{\lambda}, a) = r_{\lambda}(r_{\lambda} + a)(r_{\lambda} + 2a)\dots$$

ist . so wird:

A)

2)
$$1.2 \cdots \frac{p-1}{2} = (1, a) \cdot (2, a) \cdot (a, a).$$

Da die Zahlen 1, 2, ... a Modulo a mit den Zahlen

$$0, r_1 \ldots r_{\frac{a-1}{2}}, \ldots a-r_1, \ldots a-r_{\frac{a-1}{2}}$$

zusammenfallen, wenn

$$\lambda r = r_1 \mod a$$

bedeutet, so kann man 2) auch schreiben:

3) 1.2 ...
$$\frac{p-1}{2} = (0, a) \prod_{k} (r_k, a) \prod_{k} (a - r_k, a), \quad k = 1, \dots \frac{a-1}{2}$$

Bouniakowsky betrachtet nun in Bezug auf den Modul p das Verhalten der einzelnen Factoren von

A)
$$(0, a)$$
; B) (r_1, a) ; C) $(a - r_1, a)$.
 $(0, a) = a \cdot 2a \cdot 3a \cdot ...$

Seder Factor von (0, a) ist Modulo p einem positiven Vielfachen (ka) von aCongruent; und da $n < \frac{p-1}{2}$, so ist stets $k < \frac{p-1}{2}$.

B)
$$(r_1, a) = r_2 \cdot (r_2 + a) \cdot (r_2 + 2a) \cdot .$$

¹⁾ Ball, d. St. Pétersbourg, Bd. XXII (1876).

Bouniakowsky nimmt an, r_1 sei Modulo p einem negativen fachen von a congruent, d. h. es sei $r_1 \equiv -ka \mod p$.

Substituirt man den Werth für $r_1 = \lambda r - a q_1$, so wird:

$$\lambda r - aq_1 \equiv -ka \mod p$$
, oder, da $r + 2an = p$,
 $-ka \equiv -2a\lambda n - aq_1 \mod p$ oder
 $k \equiv 2\lambda n + q_1 \mod p$.

Die Annahme über r_{λ} ist also richtig: r_{λ} ist, wie die letzte Congreigt, in der That Modulo p einem negativen Vielfachen (>n) von a gruent.

Das Maximum von λ ist: $\frac{a-1}{2}$ und das von q: $\left[\frac{a-1}{2}r\right]$, we letztere sich aus $r_{\lambda} = \lambda r - aq_{\lambda}$ ergiebt.

Da nun
$$\frac{a-1}{2}r = \frac{r-1}{2} + \frac{a-r}{2a}$$
, so wird: $\left[\frac{a-1}{2}r\right] = \frac{r-1}{2}$

Das Maximum von k wird also

$$(a-1)n+\frac{r-1}{2}=\frac{p-1}{2}-n.$$

Es ist also in $r\lambda \equiv ka \mod p$

$$4) n < k < \frac{p-1}{2}.$$

Man kann nun unmittelbar das System Congruenzen aufstellen:

$$r_{1} \equiv -ka$$

$$r_{1} + a \equiv -(k-1)a$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$r_{1} + (n-1)a \equiv -(k-n+1)a$$

$$\text{und im Falle } r_{2} \equiv \frac{r-1}{2}$$

$$r_{1} + na \equiv -(k-n)a$$

Mit Rücksicht auf 4) ergiebt sich so das Resultat: Jeder Factor (r_1, a) ist Modulo p congruent -ka, $k < \frac{p-1}{2}$, d. h. einem negs: Vielfachen von a.

C) Ganz analog zeigt man, dass jeder Factor in $(a-r_1, a)$ Modulo $p < \frac{p-1}{2}$, d. h. einem positiven Vielfachen von a congruent ist.

Ist daher M die Anzahl der Factoren in $\Pi(r_2, a)$, so wird aus δ

5)
$$1.2 \cdots \frac{p-1}{2} \equiv 1.a.2a, \cdots \frac{p-1}{2} a.(-1)^{M} \mod p.$$

Auf der rechten Seite müssen als Factoren von a sämmtliche Zahlen $1, \dots \frac{p-1}{2}$ stehen, wie leicht zu übersehen ist. Aus 5) folgt weiter

$$\left(\frac{a}{n}\right) = (-1)^{M}$$
.

Es ist aber

$$\Pi(r_1,a) = (r_1,a) \cdot (r_2,a) \cdot \cdot \cdot \left(\frac{r_{a-1}}{2},a\right).$$

Jedes
$$(r_2, a)$$
 besteht aus $\binom{n}{n+1}$ Factoren, wenn $r_2 \left(> \frac{r-1}{2} \right) \le \frac{r-1}{2}$.

Bezeichnet man daher die Anzahl der (r_{λ}, a) , welche aus n+1 Factoren bestehen, mit m, so dass m nur abhängig ist von a und r, so erhält man:

$$M = m(n+1) + \left(\frac{a-1}{2} - m\right)n = \frac{a-1}{2}n + m$$

also resultirt:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(-1\right)^{\frac{a-1}{2}n+m}.$$

Ist nun q = 2an' + r, so erhält man die wichtige Beziehung:

$$\left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{a}{q}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2}(n+n')}.$$

2.

Sind p und q < p zwei positive ungerade Primzahlen, so können beide nur durch dieselbe lineare Form ausgedrückt werden, so dass also

• p=2an+r, q=2an'+r $(a \equiv r \equiv 1 \mod 2)$ ist. Ist nämlich

7)
$$p = q + 2^{r}a$$
, so ist $a = \frac{p - q}{2^{r}}$.

Wäre aber nun

$$p=2an+r$$
, $q=2an'+r'$, so dass $p-q=2a(n-n')+(r-r')$,

so müsste r-r', dessen Maximalwerth 2(a-1) ist, durch 2a theilbar sein, was nicht möglich ist. Es muss also r=r' sein. Aus 7) folgt aber

$$\left(\frac{p}{a}\right) = \left(\frac{2^{\nu}a}{a}\right) \text{ und } \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{-2^{\nu}a}{p}\right)$$

Setzt man $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = (-1)^{\left[\frac{p+1}{4}\right]}$ als bekannt voraus¹), so erhält man mit Hilfe von 5):

8)
$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} + \nu \left\{\left[\frac{p+1}{4}\right] + \left[\frac{q+1}{4}\right]\right\} + \frac{\sigma-1}{2}(n+n')}$$

¹⁾ Vergl. S. 227.

Es sind nun zwei Fälle zu unterscheiden:

I. $p \equiv q \mod 4$. Dann wird $v\left\{\left[\frac{p+1}{4}\right] + \left[\frac{q+1}{4}\right]\right\} \equiv 0 \mod 2$.

erstens $p = 4\mu + 1$, $q = 4\mu' + 1$, so ist $\left[\frac{p+1}{4}\right] + \left[\frac{q+1}{4}\right] = \mu + 1$ und $p - q = 4(\mu - \mu') = 2^{\nu}a$. Die Fälle $\nu = 0, 1, 2$ kommen hier nicht in Betracht, da a ungerade vorausgesetzt ist und $p - q \equiv 0 \mod 4$ Wird aber $\nu > 2$, so ist $\mu - \mu'$, mithin auch $\mu + \mu' \equiv 0 \mod 2$, so described $v = 4\mu' + 1$ is a so ergiebt sich aus ganz denselben Gründen dasselbe Result $v = 4\mu' + 1$ is of old the solution of the property of $v = 4\mu' + 1$ is of old the solution of $v = 4\mu' + 1$ in the solution of $v = 4\mu' + 1$ is of old the solution of $v = 4\mu' + 1$ in the solution of $v = 4\mu' + 1$ is of old the solution of $v = 4\mu' + 1$ in the solution of $v = 4\mu' + 1$ is of old the solution of $v = 4\mu' + 1$ in the solution of $v = 4\mu' + 1$ is of old the solution of $v = 4\mu' + 1$ in the solution of $v = 4\mu' + 1$ is of old the solution of $v = 4\mu' + 1$ in the solution of $v = 4\mu' + 1$ is of old the solution of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of old the solution of $v = 4\mu' + 1$ in the solution of $v = 4\mu' + 1$ is the solution of $v = 4\mu' + 1$ in the solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of $v = 4\mu' + 1$. So explicitly solution of $v = 4\mu' + 1$ is of v

Was $\frac{a-1}{2}(n+n')$ betrifft, so folgt aus $p-q=2a(n-n')\equiv 0$ mod 2 2 dass n-n', also auch n+n' und damit $\frac{a-1}{2}(n+n')$ gerade Zahlen sind.

Man erhält somit:

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}, \ p \equiv q \mod 4.$$

II. $p-q\equiv 2 \mod 4$. Es ist dann $p=4\mu+3$, $q=4\mu'+1$ oder $p=4\mu+1$, $q=4\mu'+3$. Beide Fälle sind vertauschbar, da die Voransetzung p>q nicht mehr nöthig ist. Es genügt daher die Betrachtung eines Falles. Es sei $p=4\mu+1$, $q=4\mu'+3$. Es ist dann:

$$\nu\left\{\left\lceil\frac{p+1}{4}\right\rceil+\left\lceil\frac{q+1}{4}\right\rceil\right\}=\mu+\mu'+1,$$

ferner

$$\mu - q = 2a = 2 \cdot 2(\mu - \mu') - 1$$
, so dass $\mu - \mu' = \frac{a+1}{2}$

und

$$\mu + \mu' + 1 \equiv \frac{a+1}{2} + 1 \equiv \frac{a-1}{2} \mod 2$$

wird. Es ist also

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} + \frac{\alpha-1}{2}(\alpha+\alpha'+1)}.$$

Bedenkt man nun, dass p-q=2a(n-n')=2a ist, so ergiebt sich n-n'=1 und damit $n+n'+1\equiv 0 \mod 2$, so dass

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{q}}, \quad p-q \equiv 2 \mod 4.$$

Fasst man die Fälle I und II zusammen, so ergiebt sich die bekannte Formel.

IX. Beweis von Schering.1)

Setzt man das Gauss'sche Lemma voraus: $\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\mu}$, und be-

zeichnet mit $\frac{kp}{q}$ eine der Grössen $\frac{p}{q}$, $\frac{2p}{q}$, \cdots $\frac{q-1}{2}$, so wird $\frac{kp}{q}$ einen Beitrag zu μ liefern, d. h. kp wird Modulo q einen negativen absolut kleinsten Rest geben, wenn es eine ganze Zahl giebt, die zwischen $\frac{kp}{q}$ und $\frac{kp}{q} + \frac{1}{2}$ liegt. Durchläuft also h die Werthe von 1 bis τ , wo τ eine beliebige ganze Zahl grösser als $\frac{kp}{q}$ ist, so wird die Anzahl der positiven Werthe des Ausdruckes $\frac{kp}{q} + \frac{1}{2} - h$ vermindert um die Anzahl der positiven Werthe des Ausdruckes $\frac{kp}{q} - h$ gleich Eins oder Null sein, je nachdem kp Modulo q einen negativen oder positiven absolut kleinsten Rest giebt. In Zeichen:

Anz. pos.
$$\left\{ \frac{kp}{q} + \frac{1}{2} - h \right\} - \text{Anz. pos.} \left(\frac{kp}{q} - h \right) = 1, 0$$

Für µ erhält man somit:

$$\mu \equiv \sum_{k=1}^{\frac{q-1}{2}} \left\{ \underset{h=1}{\overset{\tau}{\text{nz. pos.}}} \left(\frac{kp}{q} + \frac{1}{2} - h \right) - \underset{h=1}{\overset{\tau}{\text{nz. pos.}}} \left(\frac{hp}{q} - h \right) \right\} \mod 2.$$

Da nun $\left\{\frac{q-1}{2}p\right\}:q$ der Maximalwerth von $\frac{kp}{q}$ ist, so kann man

$$\tau = \left[\frac{\frac{q-1}{2}p}{q} + \frac{1}{2}\right] = \frac{p-1}{2} = p'$$

setzen. Es ist dann, wenn man noch in $\frac{kp}{q} + \frac{1}{2} - h$ an Stelle von h, $\frac{p+1}{2} - h$ substituirt, was offenbar erlaubt ist, da die Anzahl der positiven Glieder einer Reihe unabhängig von der Anordnung dieser Glieder ist und die charakteristische Eigenschaft $1 \le h \le \tau$ gewahrt bleibt, und man ferner die einzelnen Summenglieder mit der positiven Grösse p dividirt, was ebenfalls gestattet ist, da es nur auf die Vorzeichen ankommts.

¹⁾ Gött, Nachr. 1879, Nr. 6 oder Compt. Rend. Bd. 88, S. 1073.

$$\mu \equiv \sum_{k=1}^{q'} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{A}_{nz}^{p'} & \text{pos.} \left(\frac{k}{q} + \frac{h}{p} - \frac{1}{2} \right) - \mathbf{A}_{nz}^{p'} & \text{pos.} \left(\frac{k}{q} - \frac{h}{p} \right) \right\} \ \textit{mod} \ 2 \,, \\ p' = \frac{p-1}{2} \,, \quad q' = \frac{q-1}{2} \,. \end{array}$$

Bezeichnet man weiter den zum Reste q und Modul p gehörigen Exponenten mit ν , so dass also $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^p$ ist, so erhält man ganz analog wie für μ :

$$\nu \equiv \sum_{h=1}^{p'} \left\{ \underset{k=1}{\text{Anz. pos.}} \left(\frac{h}{p} + \frac{k}{q} - \frac{1}{2} \right) - \underset{k=1}{\text{Auz. pos.}} \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q} \right) \right\} \mod 2;$$

die beiden Congruenzen für μ und ν ergeben nun die folgende:

$$\mu + \nu \equiv \text{Anz. pos.} \left(\frac{k}{q} - \frac{h}{p}\right) + \text{Anz. pos.} \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q}\right) \mod 2.$$

Die beiden Doppelsummen enthalten je $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ Glieder. Da p und q Primzahlen sind, so kann nie $\frac{k}{q} - \frac{h}{p}$ Null werden. Es ist aber nothwendig dann entweder $\frac{k}{q} - \frac{h}{p}$ oder $\frac{h}{p} - \frac{k}{q}$ positiv, woraus sich ergiebt: $\mu + \nu = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} \mod 2, \text{ q. e. d.}$

X. Beweis von Petersen.1)

Sind p und q > p zwei von einander verschiedene positive ungerade Primzahlen und ist $2n+1=1,3,5,\ldots,q-2$, so wählt Petersen m so, dass in

1)
$$(2n+1) p - 2mq = r$$

r zwischen +q und -q liegt und ungerade ist. Ist nun die Anzahl der negativen r gleich μ , so ist offenbar $\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\mu}$. Von den Resten in 1) trennt nun Peters en diejenigen, welche zwischen +p und -p liegen. Als Bedingung erhält er hierfür die Gleichung: (2n'+1)q-2m'p=r, oder wenn man in 1) pq additiv und subtractiv hinzufügt:

2)
$$(p-2m)q-(q-2m-1)p=r$$
.

Hieraus folgt, dass in 1) r zwischen +p und -p liegt für:

$$p-2m=1, 3, \ldots p-2$$
, also für $m=1, 2, \ldots \frac{p-1}{2}$.

Am. Journal of math. pure and applied Bd. II (1879), S. 285 and Tideskrift for Math. udgived af Zeuthen, 1879, S. 86.

Setzt man nun für μ , wenn man p und q vertauscht, ν , so dass also $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^p$ wird, so sieht man, ergiebt sich ν aus 2) in ganz derselben Weise, wie sich μ aus 1) ergiebt.

 $\left(\frac{p}{q}\right)$ und $\left(\frac{q}{p}\right)$ werden also das gleiche oder das entgegengesetzte Vorzeichen haben, je nachdem die Anzahl der Reste r zwischen -p und -q gerade oder ungerade ist. Für solche Reste -q < (2n+1)p - 2mq < -p ergiebt sich aber, wenn man setzt m=n-k, $p=q-2\alpha$:

3)
$$2m+1 < \frac{k+1}{\alpha} q < 2n+2.$$

Daher ist die Anzahl jener negativen Reste r gleich der Anzahl der Brüche $\frac{q}{\alpha}$, $\frac{2q}{\alpha}$, \dots $\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot q$, in denen die darin enthaltene grösste ganze Zahl ungerade ist. Die Summe der gleichweit von Anfang und Ende abstehenden Brüche ist aber gleich q, also ungerade. Daher ist die Summe der zu diesen Brüchen gehörigen ganzen Zahlen gerade, sie selbst sind mithin zugleich gerade oder zugleich ungerade.

1) Ist daher
$$\alpha \equiv 1 \mod 2$$
, so ist $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$

2) Is t dagegen $\alpha \equiv 0 \mod 2$, so ist $\frac{q}{2}$, das Mittelglied in jener Bruchreihe, zu berücksichtigen.

Für
$$q=4n+1$$
 wird $\left[\frac{q}{2}\right]=2n$, also wird: $\left(\frac{p}{q}\right)=\left(\frac{q}{p}\right)$.

Für q=4n+3 dagegen ist $\left[\frac{q}{2}\right]=2n+1$, so dass $\left(\frac{p}{q}\right)=-\left(\frac{q}{p}\right)$ entsteht.

Diese Fälle zusammengefasst ergeben: $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right) \cdot (-1)^{\frac{(\alpha-1)(q-1)}{2}}$. Es war aber $p = q - 2\alpha$, folglich ist:

$$(\alpha - 1) \frac{q - 1}{2} = \frac{q - 1}{2} \left(\frac{p - 1}{2} - \frac{q - 1}{2} - 1 \right) = \frac{p - 1}{2} \cdot \frac{q - 1}{2} - \frac{q - 1}{2} \cdot \frac{q - 3}{2}$$

$$\equiv \frac{p - 1}{2} \cdot \frac{q - 1}{2} \mod 2,$$

was zu beweisen war.

XI. Beweis von Voigt.1)

Bezeichnet man die in $\frac{kp}{q}$ enthaltene grösste ganze Zahl mit h-1, so wird kp Modulo q einen negativen absolut kleinsten Rest geben, wenn

¹⁾ Schlömilch's Zeitschrift f. Math. u. Phys., Bd. XXVI, 1881, von Prof. Thomae mitgetheilt.

 $h-\frac{1}{2}<\frac{kp}{q}< k$ oder $\left(h-\frac{1}{2}\right)q< kp< hq$ ist, und umgekehrt werden zu solchen Grössen kp, die die vorstehende Ungleichheit erfüllen, Modulo q negative absolut kleinste Reste gehören. Der Maximalwerth von h ist $\frac{p-1}{2}$, was sich durch Einsetzen des grössten Werthes für k, der $\frac{q-1}{2}$ sein soll, in die Ungleichheit ergiebt. Dividirt man die Glieder der Ungleichheits-

bedingungen durch p, so erhält man: $\frac{h-\frac{1}{2}}{p}q < k < \frac{hq}{p}$, k kann also bei

gegebenem $h\left[\frac{hq}{p}\right] - \left[\frac{h - \frac{1}{2}}{p}q\right]$ verschiedene Werthe annehmen. Daher ist, wenn ν die Anzahl der negativen absolut kleinsten Reste Modulo q in p, 2p, $\dots \frac{q-1}{2}p$ bezeichnet:

$$\nu = \sum_{h=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\{ \left[\frac{h \, q}{p} \right] - \left[\frac{h - \frac{1}{2}}{p} \, q \right] \right\}.$$

 $h-\frac{1}{2}$ durchläuft die Werthe von $\frac{1}{2}$ bis $\frac{p-2}{2}$, was offenbar, abgesehen von der Reihenfolge, die hier aber nicht in Betracht kommt, auch von $\frac{p-2h}{2}\left(h=1,\cdots\frac{p-1}{2}\right)$ geleistet wird, so dass man schreiben kann:

$$v = \sum_{h} \left\{ \left[\frac{hq}{p} \right] - \left[\frac{\frac{q}{2} (p-2h)}{p} \right] \right\} = \sum_{h} \left\{ \left[\frac{hq}{p} \right] - \left[\frac{q}{2} - \frac{hq}{p} \right] \right\}$$

oder

$$v \equiv \sum_{h} \left\{ \left[\frac{h q}{p} \right] + \left[\frac{q}{2} - \frac{h q}{p} \right] \right\} \mod 2.$$

Setzt man:

$$\left[\frac{h\,q}{p}\right]=t_h,$$

so wird

$$v \equiv \sum \left\{ t_h + \left[\frac{q}{2} - t_h - r_A \right] \right\} \mod 2,$$
 wo $r_h = \frac{h \, q}{p} - \left[\frac{h \, q}{p} \right]$, also wo

 $r_h < \frac{1}{5}$, wenn hq Modulo p einen positiven,

 $r_h > \frac{1}{2}$, wenn hq Modulo p einen negativen absolut kleinsten Rest giebt.

Nun ist aber:

$$\begin{bmatrix} \frac{q}{2} - t_h - r_h \end{bmatrix} = -1 - \left[t_h - \frac{q}{2} - r \right]$$
$$= -t_h + \left[\frac{q}{2} - r_h \right],$$

so dass

$$u \equiv \sum_{k} \left[rac{q}{2} - r_{k}
ight] \mod 2$$

wird. Nach der Definition von r_h ist $\left[\frac{q}{2} - r_h\right] = \frac{q-1}{2}$, wenn hq Modulo p einen positiven, dagegen $= \frac{q-1}{2} - 1$, wenn hq Modulo p einen negativen absolut kleinsten Rest giebt. Bezeichnet man daher den zum Reste q und Modul p gehörigen Exponenten mit μ , so ergiebt sich:

$$v \equiv \frac{p-1}{2} \; \frac{q-1}{2} - \mu \; \operatorname{mod} 2,$$

was zu erweisen war.

XII. Beweis von Busche.1)

1

Dem eigentlichen Beweise des quadratischen Reciprocitätsgesetzes schickt Busche folgenden schönen Hilfssatz voraus:

"Nimmt man an, eine und dieselbe Relation (x, y) sei giltig für:

- $x = \pm 1, \qquad y = q;$
- 2) x=p, y=+1;
- $3) x=p+2\lambda q, y=q;$

4)
$$x=p$$
, $y=q+2\lambda' p$,

worin λ und λ' ganze Zahlen, p und p zwei ganze ungerade Zahlen ohne gemeinschaftlichen Theiler bedeuten, so gilt die Relation (x, y) allgemein für zwei beliebige ganze ungerade Zahlen ohne gemeinsamen Theiler."

Der Beweis dieses eleganten Satzes folgt in einfacher Weise aus dem Euklid'schen Algorithmus:

$$p = 2g_1 \quad p_1 + p_2,$$

$$p_1 = 2g_2 \quad p_3 + p_3,$$

$$p_{v-1} = 2g_v \quad p_v + p_{v+1},$$

$$p_v = 2g_{v+1}p_{v+1} \pm 1.$$

 p, p_1, p_2, \ldots seien ungerade und $|p_1| > |p_2| > |p_3| \ldots^2$) Nach Voraussetzung 1) gilt dann die Relation (x, y) für $\pm 1, p_{r+1}$, folglich nach

Inaug.-Diss. Göttingen 1883; enthält ausser dem hier mitgetheilten Beweise noch verschiedene Anwendungen einer neuen Beweismethode.

^{2) |}x| bedeutet nach Kronecker und Weierstrass "absoluter Betrag von zin Hist.- lit. Abthlg. d. Zeitschr. 1. Math. u. Phys. XXX, 5.

3) auch für p_r und p_{r+1} , und nach 4) auch für p_r und p_{r-1} u. s. w., folglich auch für p und p_1 oder p_1 und p. — Fände man nämlich für die Anfangswerthe $x = \pm 1$, $y = p_{r+1}$ die Richtigkeit der Relation für p und p_1 , so würde Voraussetzung 2) die Giltigkeit der Relation für p_1 und p ergeben.

Jenen Satz kann man aber auch folgendermassen aussprechen:

"Jede Relation (p, q) zwischen zwei beliebigen ungeraden Zahlen ohne gemeinschaftlichen Theiler p und q gilt allgemein, sobald sie gilt für:

1)
$$\pm 1$$
, q ; 2) p , ± 1 ;
3) $p + 2\lambda q$, q ; 4) p , $q + 2\lambda' q$

 (λ, λ') ganze Zahlen), immer die Giltigkeit von (p, q) für p und q vorausgesetzt; d. h. sie gilt allgemein, sobald die Relationen:

I) $(\pm 1, q)$; II) $(p, \pm 1)$; III) $(p+2\lambda q, q)$; IV) $(p, q+2\lambda' p)$ immer unter der Annahme der Giltigkeit von (p, q), als richtig sich erweisen lassen."

Das quadratische Reciprocitätsgesetz in seiner einfachsten Form spricht sich in der Formel aus:

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}$$
 (p, q positive ungerade Primzahlen).

Um die Allgemeingiltigkeit dieser Formel nachzuweisen, hat man daher, wenn man die Symmetrie derselben bedenkt, zu zeigen, dass:

I)
$$\left(\frac{\varepsilon}{q}\right)\left(\frac{q}{\varepsilon}\right) = (-1)^{\frac{s-1}{2}\frac{q-1}{2}}, \quad (\varepsilon = \pm 1),$$

II)
$$\left(\frac{p+2\lambda q}{q}\right)\left(\frac{q}{p+2\lambda q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2}\cdot\frac{p+2\lambda q-1}{2}},$$

wenn

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$

9

Da $\left(\frac{\varepsilon}{q}\right) = (-1)^{\frac{\varepsilon-1}{2}\frac{q-1}{2}}$ und $\left(\frac{q}{\varepsilon}\right) = +1$ ist, so ist die Richtigkeit von Formel I) ohne Weiteres klar.

Um Formel II) zu verificiren, sucht Busche eine Relation zwischen

$$\left(\frac{q}{p+2\lambda q}\right)$$
 und $\left(\frac{q}{p}\right)$

auf, und zwar eine Relation zwischen den Gauss'schen charakteristischen Zahlen, die zu jenen Symbolen gehören. Setzt man:

1)
$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\mu},$$
 so wird $kq\left(k=1, \dots \frac{p-1}{2}\right)$ einem Beitrag zu μ geben, wenn:

2)
$$\begin{cases} kq = hp + \frac{p+1}{2} + r & \text{oder:} \\ kq = hp + p - r', \end{cases}$$

wobei r, r positive ganze Zahlen kleiner als $\frac{p}{2}$ sind. μ soll jetzt abhängig gemacht werden von h. Da der Maximalwerth von k $\frac{p-1}{2}$ ist, so ist der von h $\frac{q-3}{2}$, wobei zu bemerken ist, dass h nicht nothwendig $\frac{q-3}{2}$ werden muss. Lässt man nun h die Werthe von 1 bis $\frac{q-3}{2}$ durchlaufen, so möge es für jedes h μ_h Werthe kq geben, so dass μ_h auch definirt werden kann als die Anzahl der Lösungen k von:

$$kq = hp + \frac{p+1}{2} + r, \quad r < \frac{p}{2}$$

Und es ist:

$$\mathbf{3}) \qquad \qquad \mu = \sum_{h=0}^{\frac{q-3}{2}} \mu_h.$$

Wenn q < p, so wird μ_h für jedes h grösser als Null, während, wenn q > p, $\mu_h = 0$ oder 1 wird. Dies ergiebt sich aus der Vergleichung der Maximalwerthe für h und k. Ist ferner für $P = p + 2\lambda q$:

$$\frac{q}{P} = (-1)^M, \quad \mathbf{M} = \sum_{h=0}^{\frac{q-3}{2}} \mathbf{M}_h,$$

80 ist wiederum M_h die Anzahl der Lösungen von:

5)
$$\begin{cases} Kq = hP + \frac{P+1}{2} + r & \text{oder:} \\ Kq = hP + P - r'; & r, r' < \frac{P}{2} \end{cases}$$

Nimmt man zunächst an $\mu_h = +1$, d. h. sind die Gleichungen 2) unöglich, so ergiebt sich daraus, λ positiv vorausgesetzt:

$$\{k+\lambda(2h+1)\}\ q = hP + \frac{P+1}{2} + r,$$

 $\{k+\lambda(2\lambda+2)\}\ q = hP + P - r',$

Oder wenn man

6)
$$K_1 = k + \lambda (2h + 1), \quad K_2 = k + \lambda (2h + 2)$$

Betzt:

7)
$$\begin{cases} K_1 q = h P + \frac{P+1}{2} + r, \\ K_2 q = h P + P - r'. \end{cases}$$

Hieraus ergiebt sich aber, dass Gleichung 5) $K_2 - K_1 + 1$ verschiedene ganzzahlige Wurzeln hat, dass somit

8)
$$M_h = K_9 - K_1 + 1 = \lambda + 1 = \lambda + \mu_h$$

ist. Um zu zeigen, dass die M_h Werthe K Modulo P sowohl unter sich, als auch von denen, welche für ein anderes h entstehen, verschieden sind, dazu genügt der Hinweis auf q < P.

Ist zweitens $\mu_h = 0$, so giebt es in dem Intervalle von $hp + \frac{p+1}{2}$ bis hp + p keine durch q theilbare Zahl, also auch nicht in dem Intervalle von $hP + \frac{P+1}{2}$ bis $hP + p + \lambda p$, da $hP + \frac{P+1}{2} \equiv hp + \frac{p+1}{2} \cdot \dots hP + p + \lambda p \equiv hp + p \mod q$ ist. Nun sind aber von den Zahlen $hP + \frac{P+1}{2} \cdot \dots hP + P$ mindestens λ Zahlen durch q theilbar, weil die Anzahl jener $\frac{p-1}{2} + \lambda q + 1 > \lambda q$ ist; es giebt aber auch nur λ solcher Multipla von q. da die ersten $\frac{p+1}{2}$ Zahlen durch q nicht theilbar sind. Die Gleichung:

$$Kq = hP + \frac{P+1}{2} + r$$

hat also \(\) Wurzeln; es ist

$$M_h = \lambda = \lambda + \mu_h,$$

so dass allgemein, wenn man q > p voraussetzt.

$$\mathbf{M}_{h} = \lambda + \mu_{h}$$

wird. Daher erhält man, da, wie oben gezeigt, jedes h ein von Null verschiedenes M_h liefert:

$$\mathbf{M} = \frac{q-1}{2} \lambda + \Sigma \mu_h,$$

d. h.:

11)
$$\mathbf{M} = \frac{q-1}{2}\lambda + \mu \text{ oder } \left(\frac{q}{p+2\lambda q}\right) = (-1)^{\lambda \frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p}\right).$$

Da y ungerade, so ist auch

$$\left(\frac{y}{p+2\lambda q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2}\lambda q} \left(\frac{q}{p}\right).$$

Nun ist aber:

$$\left(\frac{p+2\lambda q}{q}\right) = \left(\frac{p}{q}\right),$$

also:

$$\left(\frac{p+2\lambda q}{q}\right)\left(\frac{q}{p+2\lambda q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2}\lambda q}\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right)$$

oder

$$= (-1)^{\frac{q-1}{2}} \lambda_q + \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2},$$

$$= (-1)^{\frac{q-1}{2}} \cdot \frac{p+2\lambda_{q-1}}{2},$$

was zu beweisen war.

IV. Capitel.

Eisenstein's Beweis durch functionentheoretische Sätze.1)

1.

Sind p und q zwei von einander verschiedene positive ungerade Primzahlen und die r positive absolut kleinste Reste Modulo q, so wird sein $pr \equiv r$ oder $\equiv -r' \mod q$, wo die r' wiederum positive absolut kleinste Reste Modulo q bedeuten. Oder es ist

$$\frac{pr}{q} = \frac{r'}{q} + f \text{ oder } = -\frac{r'}{q} + f',$$

wobei f, f' ganze Zahlen sind. Hieraus folgt:

$$sin\left(p\frac{2r\pi}{q}\right) = sin\frac{2r'\pi}{q}$$
 oder $= -sin\frac{2r'\pi}{q}$

Die in den vorstehenden Gleichungen ausgedrückte Eigenschaft der Sinusfunctionen führt sofort zu dem Resultat:

$$pr \equiv rac{\sinrac{2r'p\,\pi}{q}}{\sinrac{2r'\pi}{q}} mod q\,,$$

woraus sich wiederum ergiebt:

$$p^{rac{q-1}{2}} \Pi r \equiv \Pi r' \prod rac{sin rac{2r'p\pi}{q}}{sin rac{2r'\pi}{a}} mod q,$$

wo die Productenzeichen sich auf sämmtliche positive absolut kleinste Reste Modulo q erstrecken. Da die r' mit den r, abgesehen von der Reihenfolge, identisch sind, so erhält man:

A)
$$\left(\frac{p}{q}\right) = \prod_{r=1}^{\frac{q-1}{2}} \frac{\sin \frac{2rp\pi}{q}}{\sin \frac{2r\pi}{q}}$$
 und ganz analog $\left(\frac{q}{p}\right) = \prod_{q=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{\sin \frac{2\varrho q\pi}{p}}{\sin \frac{2\varrho \pi}{p}}$.

2

Eisenstein hat es nach dem Vorstehenden also im Wesentlichen zu thun mit Ausdrücken von der Form $\frac{sintv}{sinv}$, wobei t eine ungerade Primzahl ist.*) Nimmt man zunächst an, der Ausdruck $\frac{sin(t-2)v}{sinv}$ sei eine

¹⁾ Crelle J. XXIX (1845), p. 257.

²⁾ Zur Ableitung der folgenden, sich auf sinte beziehenden State W

ganze Function von sinv, so folgt sofort, dass er eine ganze gerade l tion von sinv ist und dass diese Eigenschaft auch $\frac{\cos(t-2)v}{\sin v}$ zuko Bildet man nun $\frac{\sin tv}{\sin v} = \sin(t-2)v \cdot \cos 2v + \cos(t-2)v \cdot \sin 2v$, so er sich, dass $\frac{sintv}{sinv}$ ebenfalls eine ganze gerade Function von sinv ist, Grad den von $\frac{\sin(t-2)v}{\sin v}$ um zwei Einheiten übersteigt. Es ist daher, man bedenkt, dass $\frac{\sin 3v}{\sin v} = 3 - 4 \sin^2 v$, allgemein:

$$\frac{\sin t v}{\sin v} = a_{t-1} \sin^{t-1} v + a_{t-3} \sin^{t-3} v + \dots$$

Eisenstein verwandelt nun die rechte Seite der vorstehenden Gleic in ein Product. Dazu muss ausser den Wurzeln von $\frac{\sin t v}{\sin v} = 0$ der C cient $a_{\ell-1}$ bekannt sein. Nimmt man an:

$$\frac{\sin(t-2)v}{\sin v} = (-1)^{\frac{t-3}{2}} 2^{t-3} \sin^{t-3} v + \dots,$$

so ergiebt sich durch leichte Zwischenrechnung:

$$\frac{\sin t \, v}{\sin v} = (-1)^{\frac{t-1}{2}} 2^{t-1} \sin^{t-1} v + \dots$$

Aus $\frac{\sin 3v}{\sin n} = 3 - 4 \sin^2 v = (-1)^{\frac{3-1}{2}} 2^{3-1} \sin^{3-1} v + \dots$ findet sich nun, jene Formel für $\frac{sintv}{sinv}$ in der That allgemeine Giltigkeit hat.

Bezeichnet man daher mit $\tau = \tau_1, \ldots \tau_{p-1}$ die $\frac{p-1}{2}$ verschied Wurzeln von $\frac{\sin tv}{\sin v}$, so wird

$$\frac{\sin t \, v}{\sin v} = (-1)^{\frac{t-1}{2}} 2^{t-1} \, \Pi(\sin^2 v - \tau^2)^{-1})$$

3.

Mit Rücksicht auf das eben Entwickelte wird daher, wenn may $\frac{p-1}{2} \text{ verschiedenen Wurzeln von } P = \frac{\sin\frac{2rp\pi}{q}}{\sin\frac{2r\pi}{q}} = 0 \text{ mit } \xi, \text{ die } \frac{q-1}{2}$ schiedenen Wurzeln von $Q = \frac{\sin\frac{2\varrho q\pi}{p}}{\sin\frac{2\varrho \pi}{q}} = 0 \text{ mit } \eta \text{ und die Variable } \sin \theta$ w bezeichnet:

æ bezeichnet:

¹⁾ In Eisenstein's Abh. stehen die Potenzen von 2 falschlich im '

 $P=(-1)^{\frac{p-1}{2}}2^{p-1}\Pi(x^2-\xi^2),\quad Q=(-1)^{\frac{q-1}{2}}2^{q-1}\Pi(x^2-\eta^2).$ Setzt man zur Abkürzung $\alpha=\sin\frac{2\pi\varrho}{q},\quad \beta=\sin\frac{2r\pi}{q},\quad \text{so nimmt }\alpha,\quad \frac{p-1}{2}$ und $\beta,\quad \frac{q-1}{2}$ verschiedene Werthe an; zugleich genügen sie aber den Gleichungen P=0 resp. Q=0. Es ist daher:

$$P = (-1)^{\frac{p-1}{2}} 2^{p-1} \Pi(x^2 - \alpha^2), \quad Q = (-1)^{\frac{q-1}{2}} 2^{q-1} \Pi(x^2 - \beta^2).$$

In **P** ist aber $x = \beta$ und in Q $x = \alpha$, so dass man erhalt:

$$P = (-1)^{\frac{p-1}{2}} 2^{p-1} \Pi(\beta^2 - \alpha^2), \quad Q = (-1)^{\frac{q-1}{2}} 2^{q-1} \Pi(\alpha^2 - \beta^2).$$

Mit Rücksicht auf Formel A) im ersten Artikel folgt hiernach:

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{p}{q}\right) = \prod_{\alpha\beta} (\beta^2 - \alpha^2) \prod_{\alpha\beta} \left\{ (-1)^{\frac{p-1}{2}} 2^{p-1} \right\}, \\ \left(\frac{q}{p}\right) = \prod_{\alpha\beta} (\alpha^2 - \beta^2) \prod_{\alpha\beta} \left\{ (-1)^{\frac{q-1}{2}} 2^{q-1} \right\}. \end{array} \right.$$

oder

$$\begin{pmatrix}
\frac{p}{q} = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} 2^{\frac{p-1 \cdot q-1}{2}} \Pi(\beta^2 - \alpha^2), \\
\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} 2^{\frac{p-1 \cdot q-1}{2}} \Pi(\alpha^2 - \beta^2),$$

WOTAus sich ergiebt:

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = \frac{\Pi(\beta^2 - \alpha^2)}{\Pi(\alpha^2 - \beta^2)} = \prod \frac{-(\alpha^2 - \beta^2)}{\alpha^2 - \beta^2}.$$

Da nie $\alpha = \beta$ werden kann, weil p und q Primzahlen sind, so folgt, dass $\frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2 - \beta^2}$ stets gleich 1 ist, woraus unmittelbar

 $\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = \left(-1\right)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}$

sich ergiebt.

V. Capitel.

Beweise durch Sätze aus der Lehre von der Kreistheilung.

I. Beweis von Gauss (7. Bew.)-Lebesgue (2. Bew.).1)

1.

Ist q eine primitive Wurzel der Gleichung $\frac{x^{p-1}-1}{x-1}=0$, wohei n sine Positive ungerade Primzahl bedeutet, und g eine primitive ∇ so kann man die Wurzeln von $\frac{x^{p-1}-1}{x-1}=0$ in folgender

¹⁾ Gauss (Nachlass), Bd. II S. 283, und Lebe

Setzt man:

$$y_1 = \varrho^g + \varrho^{g^2} + \ldots + \varrho^{g^{g-2}}, \quad y_2 = \varrho + \varrho^{g^2} + \ldots + \varrho^{g^{g-1}},$$

so heissen y_1 , y_2 $\frac{p-1}{2}$ -gliedrige Perioden der "Kreistheilungsgleichung"

 $\frac{x^{p-1}-1}{x-1}=0$. Unter Benutzung der Eigenschaft dieser Perioden:

$$y_1 - y_2 = (\varrho^{-1} - \varrho)(\varrho^{-3} - \varrho^3) \dots (\varrho^{p-2} - \varrho^{-p+2})$$

und der Relation:

$$(x-\varrho^2)(x-\varrho^4)\dots(x-\varrho^{2(p-1)})=x^{p-1}+x^{p-2}+\dots+1$$

ergiebt sich:

$$(y_1-y_2)^2=(-1)^{\frac{p-1}{2}}p.$$

Es ist aber:

$$y_1 + y_2 = -1$$
, so dass $y_1 y_2 = \frac{1 - (-1)^{\frac{p-1}{2}} p}{4}$ wird.

Die beiden Perioden y_1 und y_2 sind also Wurzeln der quadratischen Gleich-

ung
$$f(x) = x^2 + x + \frac{1 - (-1)^{\frac{p-1}{2}}p}{4} = 0.$$

2.

Gauss resp. Lebesgue untersuchen nun, unter welchen Bedingungen $f(x) \equiv 0 \mod q$,

wo q ebenso wie p eine positive ungerade Primzahl sein soll, reelle ganzzahlige Wurzeln hat. Die Bedingung hierfür kann auf zwei verschiedene Weisen ausgedrückt werden, aus deren Vergleichung das Reciprocitätsgesetz sich ergiebt.

Aus der Congruenz:

$$f(x) \equiv 0 \mod q$$

ergiebt sich durch die Substitution:

$$3) y = 2x + 1$$

die folgende:

4)
$$y^2 = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p \mod q$$
.

Soll also die Congruenz 2) reelle Wurzeln haben, so muss auch 4) reelle Wurzeln haben. Umgekehrt, ist 4) lösbar, so wird vermöge der Substitution 3) auch 2) lösbar sein. Daraus folgt, dass die Congruenz 2) möglich ist, wenn

$$\left(\frac{\left(-1\right)^{\frac{p-1}{2}}p}{q}\right) = +1$$

ist, oder wenn

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} \frac{q-1}{2} p^{\frac{q-1}{2}} \equiv 1 \mod q$$

ist. Dagegen hat $f(x) \equiv 0 \mod q$ keine reellen ganzzahligen Wurzeln, wenn

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}p^{\frac{q-1}{2}} \equiv -1 \mod q$$

wird. Die Identität ferner:

$$x^{q-1}-1 \equiv (x-1)(x-2)\dots(x-q+1) \mod q$$

oder

$$x^q - x \equiv x \cdot x - 1 \cdot x - 2 \cdot \dots \cdot (y - q + 1) \mod q$$

setzt sich durch die Substitution $x = y - y_h$ (h = 1, 2) in die folgende um:

$$(y-y_h)^q - (y-y_h)$$

$$\equiv (y-y_h)(y-1-y_h)(y-2-y_h) \dots (y-q+1-y_h) \mod q.$$

Es ist aber $y_h = x^{g^h} + x^{g^{2+h}} + \dots + x^{g^{p-3+h}}$, woraus, wenn

$$q \equiv g^{k} \mod p,$$

 $y_h^q \equiv y_{h+k} \mod q$ oder $(y-y_h)^q \equiv y-y_{h+k} \mod q$ oder aber $(y-y_h)^q = (y-y_h) \equiv y_h - y_{h+k} \mod q$ resultirt. Die Congruenz 6) giebt daher:

$$(y-y_h)(y-1-y_h)\dots(y-q+1-y_h) \equiv y_h-y_{h+k} \mod q$$

woraus unmittelbar die folgende Formel entspringt:

$$(y-y_1)(y-y_2)(y-1-y_1)(y-1-y_2)\dots(y-q+1-y_1)(y-q+1-y_2)$$

$$\equiv (y_1-y_1+k)(y_2-y_2+k) \mod q.$$

Es ist aber $f(y) = (y - y_1) \cdot (y - y_2)$, wonach die vorige Congruenz übergeht in:

8)
$$f(y).f(y-1).....f(y-q+1) \equiv (y_1-y_{1+k})(y_2-y_{2+k}) \mod q$$
.

Hätte nun $f(y) \equiv 0 \mod q$ reelle ganzzahlige Wurzeln, so würde

$$f(y), \ldots f(y-q+1) \mod q$$

ein vollständiges Restsystem darstellen und es wäre in diesem Falle:

$$f(y) \cdot f(y-1) \cdot \dots \cdot f(y-q+1) \equiv 0 \mod q$$
.

Umgekehrt, wäre diese Bedingung erfüllt, so wäre auch $f(y) \equiv 0$ und damit $f(x) \equiv 0 \mod q$ in ganzen reellen Zahlen lösbar. Mit Rücksicht auf die Congruenz 8) kann man auch so sagen: f(x) hat Modulo q reelle Wurzeln, wenn $\varphi = (y_1 - y_{1+k})(y_2 - y_{2+k}) \equiv 0 \mod q$, ist dagegen nach demselben Modul nicht reell und ganzzahlig lösbar, wenn $\varphi = (y_1 - y_{1+k})(y_2 - y_{2+k}) \equiv 0 \mod q$. Wie sofort evident, kommt es also auf den Werth von k an. k war definirt durch $q \equiv g^k \mod p$. Ist da $k \equiv 0 \mod 2$, d. h. $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$, so ist $y_h = y_{h+k}$; ist dagegen $k \equiv 1 \mod 2$, also $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$, so ist $y_h = y_{h+1}$. Hieraus erhellt: $f(x) \equiv 0 \mod q$ hat reelle ganzzahlige Wurzeln, wenn $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$, dagegen keine, wenn $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$. Aus der Vergleichung dieses Resultates mit dem durch die Formeln 5) und 5°) ausgedrückten folgt.

¹⁾ Das Zeichen == bedeutet , nicht congr

II. Gauss' vierter Beweis.1)

1.

Sind, wie gewöhnlich, p und q zwei von einander verschiedene positive ungerade Primzahlen, und ist

bezeichnen ferner Modulo q a die quadratischen Reste und b die quadratischen Nichtreste, so ist

1)
$$\begin{cases} \sum_{\lambda=1}^{q-1} e^{\lambda^2 p} = G\left(\frac{pi}{q}\right) = 1 + 2\sum_{a} e^{ap},^{2} \\ \sum_{a} e^{ap} + \sum_{b} e^{bp} = e^{p} + e^{2p} + \dots = -1, \end{cases}$$
also
$$G\left(\frac{pi}{q}\right) = \sum_{b} \left(\frac{\lambda}{q}\right) q^{2p} = \left(\frac{p}{q}\right) \sum_{a} \left(\frac{\lambda p}{q}\right) e^{\lambda p} = \left(\frac{p}{q}\right) \sum_{a} \left(\frac{\lambda}{q}\right) e^{\lambda}.$$

Diese letztere Gleichung kann man auch schreiben:

$$2) \qquad G\left(\frac{p\,i}{q}\right) = \left(\frac{p}{q}\right)\,G\left(\frac{i}{q}\right) = (1+\varrho+\varrho^4+\ldots+\varrho^{(q-1)^2})\cdot\left(\frac{p}{q}\right)\cdot$$

Gauss ermittelt zunächst den Werth für $G\left(\frac{i}{a}\right)$. Mit Hilfe des Systems identischer Gleichungen:

$$\begin{cases} \frac{1-\varrho^{q-1}}{1-\varrho} = \frac{1-\varrho^{-1}}{1-\varrho} = \varrho^{-1}, \\ \frac{1-\varrho^{q-2}}{1-\varrho^2} = \frac{1-\varrho^{-2}}{1-\varrho^2} = -\varrho^{-2}, \\ \frac{1-\varrho^{q-(q-1)}}{1-\varrho^{q-1}} = \frac{1-\varrho^{-(q-1)}}{1-\varrho^{q-1}} = -\varrho^{-(q-1)} \end{cases}$$

bildet er die Reihe:

3)
$$\begin{cases} f(\varrho, q-1) = 1 - \frac{1 - \varrho^{q-1}}{1 - \varrho} + \frac{1 - \varrho^{q-1} \cdot 1 - \varrho^{q-2}}{1 - \varrho \cdot 1 - \varrho^2} + \dots \\ \dots - \frac{1 - \varrho^{q-1} \cdot 1 - \varrho^{q-2} \cdot \dots \cdot 1 - \varrho}{1 - \varrho \cdot 1 - \varrho^2 \cdot \dots \cdot 1 - \varrho^{q-2}} \\ = 1 + \varrho^{-1} + \varrho^{-2} + \dots + \varrho^{-\frac{q \cdot q - 1}{2}}. \end{cases}$$

Setzt man zur Abkürzung:
$$(q-1, \mu) = \frac{1 - \varrho^{q-1} \cdot 1 - \varrho^{q-2} \cdot \dots \cdot 1 - \varrho^{q-\mu}}{1 - \varrho \cdot 1 - \varrho^2 \cdot \dots \cdot 1 - \varrho^{\mu}},$$

¹⁾ Summatio serier. quarund. sing. Bd. II S 69, oder Comm. soc. reg. scient. Gott. rec. Vol. I.

²⁾ Die Bezeichnung G ist nach Kronecker (Berl, Ber, 1880) gewählt.

⁸⁾ Die folgenden Entwickelungen gelten auch für beliebige ungerade Zahlen.

worin also q ganz, positiv und grösser als $\mu+1$ ist, so ergiebt sich, wenn man noch berücksichtigt, dass

$$\frac{1-\varrho^m}{1-\varrho^{\mu+1}} = \frac{1-\varrho^{m-\mu-1}}{1-\varrho^{\mu+1}} + \frac{\varrho^{m-\mu-1}(1-\varrho^{\mu+1})}{1-\varrho^{\mu+1}}:$$

$$(\varrho-1, \mu+1) = \varrho^{\varrho-\mu-2}(\varrho-2, \mu) + (\varrho-2, \mu+1).$$

Wendet man diese Formel auf 3) an, so erhält man:

4)
$$f(\varrho, q \cdot 1) = (1 - \varrho^{q-2}) - (1 - \varrho^{q-3})(q-2, 1) + (1 - \varrho^{q-4})(q-2, 2) - (1 - \varrho^{q+5})(q-2, 3) + \dots$$

Nun ist aber:

$$(1 - \varrho^{q-1-(\lambda+1)})(q-2,\lambda) = (1 - \varrho^{q-2})(q-3,\lambda),$$

$$f(\varrho, q-1) = (1-\varrho^{q-2})\{1-(q-3, 1) + (q-3, 2) \pm \ldots\}$$

oder

5)
$$f(\varrho, q-1) = (1-\varrho^{q-2}) f(\varrho, q-3).$$

Da nun $q = 1 \mod 2$ ist, so findet sich:

$$\begin{cases} f(\varrho, q-1) = (1 - \varrho^{q-2}) f(\varrho, q-3), \\ f(\varrho, q-3) = (1 - \varrho^{q-4}) f(\varrho, q-5), \\ \vdots \\ f(\varrho, 2) = (1 - \varrho), \end{cases}$$

woraus durch Multiplication resultirt:

6)
$$f(\varrho, q-1) = (1-\varrho)(1-\varrho^3)(1-\varrho^5)\dots(1-\varrho^{q-2}).$$

Es sind also für f(q, q-1) zwei Entwickelungen 3) und 6) gewonnen.

Durch Verbindung dieser beiden Resultate entsteht:

$$1 + e^{-1} + e^{-3} + \ldots + \frac{-q^{\frac{q-1}{2}}}{2} = (1 - e)(1 - e^3) \ldots (1 - e^{q-3}).$$

Berücksichtigt man, dass $(\varrho^{q-2})^{\nu} = \varrho^{-2\nu}$ ist bei ganzem ν , so erhält man: $1 + \rho^2 + \rho^6 + \rho^{12} + \ldots + \rho^{q \cdot q - 1} = (1 - \rho^{-2}) \cdot (1 - \rho^{-6}) \cdot \ldots \cdot (1 - \rho^{-2(q - 2)}).$

Multiplicirt man beiderseits mit $e^{\left(\frac{q-1}{2}\right)^2} = e \cdot e^3 \cdots e^{q-2}$, so entsteht:

$$\varrho^{\left(\frac{q-1}{2}\right)^{2}} + \varrho^{2} + \left(\frac{q-1}{2}\right)^{2} + \dots + \varrho^{q,q-1} + \left(\frac{q-1}{2}\right)^{2} \\
= (\varrho - \varrho^{-1})(\varrho^{3} - \varrho^{-3}) \dots (\varrho^{q-2} - \varrho^{-q+3})$$

oder, wenn man in Rechnung zieht, dass die Exponenten auf der linken Seite identisch sind mit $\left(\frac{q-1}{2}\right)^3$, $\left(\frac{q-3}{2}\right)^3$, ..., also Modulo q ein halbes Restsystem darstellen,

$$1 + \varrho + \varrho^4 + \ldots + \varrho^{(q-1)^9} = \varrho - \varrho^{-1} \cdot \varrho^3 - \varrho^{-3} \cdot \ldots \cdot \varrho^{q-3} - q^{-q+3}.$$

Es ist also:

7)
$$G\left(\frac{i}{q}\right) = \varrho - \varrho^{-1} \cdot \varrho^3 - \varrho^{-8} \cdot \dots \cdot \varrho^{q-2} - \varrho^{-q+2}$$

oder mit Berücksichtigung von $e^{\mu} - e^{-\mu} = -(e^{q-\mu} - q^{-q+\mu})$:

8)
$$G\left(\frac{i}{q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{3}} \cdot e^{2} - e^{-3} \cdot e^{4} - e^{-4} \cdot \dots \cdot e^{q-1} - e^{-q+1}$$

Durch Multiplication von 7) und 8) erhält man:

$$G^{2}\left(\frac{i}{q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2}} e^{q \cdot \frac{q-1}{2}} (1 - e^{-2}) (1 - e^{-4}) \dots (1 - e^{-2(q-1)})$$

oder, da ϱ eine primitive Wurzel von $x^q = 1$ ist,

$$G^2\left(\frac{i}{a}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2}}q.$$

Hieraus ergiebt sich aber:

9)
$$G\left(\frac{i}{q}\right) = \pm i^{\left(\frac{q-1}{2}\right)^2} \sqrt{q} \text{ und } G\left(\frac{pi}{q}\right) = \pm i^{\left(\frac{q-1}{2}\right)^2} \left(\frac{p}{q}\right) \sqrt{q}.$$

Um das Vorzeichen von G zu bestimmen, gehe man auf Gleichung 7) zurtick. Da $e^{\mu} - e^{-\mu} = 2i \sin \frac{2\mu\pi}{a}$ ist, so ergiebt sich:

$$G\left(\frac{i}{q}\right) = \left(2i\right)^{\frac{q-1}{2}} \sin\frac{2\pi}{q} \cdot \sin\frac{6\pi}{q} \cdot \sin\frac{10\pi}{q} \cdots \sin\frac{(q-2)2\pi}{q}$$

Die Grössen $\frac{2\pi}{q}$, \cdots $\frac{(q-2)2\pi}{q}$ sind nun sämmtlich kleiner als 2π ; q ist eine ungerade Zahl und man hat zu unterscheiden:

1. q = 4n + 1. Dann sind $\frac{q-1}{4}$ der Winkelgrössen grösser als π , so dass $G\left(\frac{i}{a}\right) = i^{\frac{q-1}{2}} \left(-1\right)^{\frac{q-1}{4}} C = C.$

wird, wenn C eine positive Constante bedeutet.

2. q = 4n + 3. In diesem Falle ist die Anzahl der Winkelgrössen, welche grösser als π sind, $\frac{q-3}{4}$, so dass sich ergiebt:

$$G\left(\frac{i}{q}\right) = i^{\frac{q-1}{2}} \left(-1\right)^{\frac{q-3}{4}} C = iC,$$

so dass man schliesslich erhält:

10)
$$G\left(\frac{i}{q}\right) = i^{\left(\frac{q-1}{2}\right)^2} \sqrt{q} \text{ und } G\left(\frac{pi}{q}\right) = \left(\frac{p}{q}\right) i^{\left(\frac{q-1}{2}\right)^2} \sqrt{q}.$$

3

Da auch p ungerade vorausgesetzt war, so ergiebt sich:

11)
$$G\left(\frac{pi}{q}\right) \cdot G\left(\frac{qi}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) i^{\left(\frac{p-1}{2}\right)^2} + \left(\frac{q-1}{2}\right)^2 \sqrt{p} \cdot \sqrt{q}$$

Nun ist aber nach Definition:

$$G\left(\frac{p\,i}{q}\right)G\left(\frac{q\,i}{p}\right) = \sum_{\lambda=1}^{q-1} \sum_{\mu=1}^{p-1} e^{\left(\frac{\lambda^2 p}{q} + \frac{\mu^2 q}{p}\right) 2\pi i}$$
$$= \sum_{\lambda} \sum_{\mu} e^{\frac{(\lambda p + \mu q)^2}{p q} 2\pi i},$$

denn

$$\frac{\lambda^2 p}{q} + \frac{\mu^2 q}{p} = \frac{pq}{(\lambda p + \mu q)^2} - 2 \lambda \mu.$$

Wie sofort ersichtlich, nimmt $\lambda p + \mu q$ Modulo pq, pq Werthe an und stellt, wie sich aus $p(\lambda - \lambda') = q(\mu' - \mu)$ ergiebt, Modulo pq ein vollständiges System incongruenter Reste dar. Es ist daher:

$$G\left(\frac{pi}{q}\right)G\left(\frac{qi}{p}\right) = G\left(\frac{i}{pq}\right) = i^{\left(\frac{pq-1}{2}\right)^2}\sqrt{pq}$$

oder mit Hilfe von Gleichung 11)

$$i^{\frac{1}{2}(p \cdot q - 1)^2} \sqrt{p \cdot q} = \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) i^{\left(\frac{p-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{q-1}{2}\right)^2} \sqrt{p} \cdot \sqrt{q}.$$

Da stets das positive Wurzelzeichen zu nehmen ist, so entsteht somit:

12)
$$i^{\frac{1}{2}(pq-1)^2} = \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) i^{\left(\frac{p-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{q-1}{2}\right)^2},$$

woraus sich unmittelbar das Reciprocitätsgesetz ableitet.

III. Gauss' sechster Beweis. 1)

1.

Haben p und q ihre gewöhnliche Bedeutung und bezeichnet man mit G die Reihe:

1)
$$G = x - x^{g} + x^{g^{2}} + \dots - x^{g^{g-2}},$$

worin g eine primitive Wurzel Modulo p ist, so folgt aus der Natur der polynomialen Coefficienten: $G^q - (x - x^g \pm \dots)^q \equiv 0 \mod q$ oder, da q ungerade ist,

2)
$$G^q - G_q \equiv 0 \mod q$$
, wenn $G_q = x^q - x^{qg} + x^{qg^2} \mp \dots - x^{qg^{p-2}}$

Ist ferner $q \equiv g^{\mu} \mod p$, so folgt aus dem System identischer Gleichungen $q = g^{\mu} + f_1 p$, $qg = g^{\mu+1} + f_2 p$, ... $qg^{p-2} = g^{\mu+p-2} + f_3 p$:

3)
$$x^{qg^{\lambda}} - x^{g^{\mu+\lambda}} = (1 - x^{p}) f(x),$$

wobei f(x) eine ganze Function von x ist. Ist W ebenfalls eine ganze Function von x, so ergiebt sich somit:

4)
$$G_q - \{x^{g^{\mu}} - x^{g^{\mu+1}} + \dots + x^{g^{\mu+p-2}}\} = (1-x^p)W.$$

Die Exponenten der in der Klammer stehenden (p-1) Grössen sind nun der Natur von g gemäss identisch mit den Zahlen $1, 2, \ldots p-1$; und da auch die Vorzeichen alterniren, so erhält man für $x^{p^{\mu}} - x^{p^{\mu}+1} \pm \ldots$ den Werth $\pm G$. Das Vorzeichen von G ist das von $-(-1)^{p-\mu}x$, so dass, da p ungerade ist, $\pm G = (-1)^{\mu}G$ folgt. Aus $q \equiv g^{\mu} \mod p$ ergiebt sich aber $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{p-1}{g^2}\right)^{\mu} \equiv \left(\frac{q}{p}\right) \mod p$, und da $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \mod p$, so folgt:

¹⁾ Theorematis fund, in doctrina de residuis quadrat demonstr. et ampl. novae. G. Werke Bd. II S. 55,

und
$$(-1)^{\mu} = \left(\frac{q}{p}\right)$$
5)
$$G_q - \left(\frac{q}{p}\right)G = (1-x)^p W.$$

2.

Betrachtet man ferner das System identischer Gleichungen:

$$-x^{g^{p-2}}G - x^{2g^{p-2}} + x^{g^{p-1}+g^{p-2}} + \dots + x^{g^{2p-4}+g^{p-2}}$$

$$= x^{g^{p-2}+1} \{ x^{g^{p-1}-1} - 1 - (x^{g^{p-1}}-1) - \dots \}$$

so entsteht durch Addition:

6)
$$\Omega = G^2 - f(x^{g^0+1}) + f(x^{g+1}) + \dots + f(x^{g^{p-2}+1}),$$

wenn man zur Abkürzung Ω gleich der Summe der rechten Seiten der v- orstehenden Gleichungen und $f(x^1) = 1 + x^1 + x^{1g} + \dots + x^{1g^{g-2}}$ setzt.

 Ω ist, wie ohne Weiteres folgt, durch $1-x^p$, also auch durch $\frac{1-x^p}{1-x}$ theilbar; $f(x^k)$ aber ist, weil g eine primitive Wurzel zu p ist, theil durch $\frac{1-x^{k-p}}{1-x^k}$. Es wird also auch $f(x^k)$ durench $\frac{1-x^p}{1-x}$ theilbar sein, wenn

$$\frac{1-x^{\lambda_p}}{1-x^{\lambda}} \equiv 0 \mod \frac{1-x^p}{1-x}$$

ist. Es sind da zwei Fälle zu unterscheiden.

I. λ und p sind relativ prim. Dann ist $y\lambda = hp + 1$ für y = -nd h ganzzahlig lösbar. Demgemäss wird

$$\frac{1 - x^{\lambda p}}{1 - x^{\lambda}} : \frac{1 - x^{p}}{1 - x} = \frac{1 - x^{\lambda p}}{1 - x^{p}} \cdot \frac{1 - x^{y\lambda}}{1 - x^{\lambda}} - x \frac{1 - x^{\lambda p}}{1 - x^{\lambda}} \cdot \frac{1 - x^{\lambda p}}{1 - x^{p}}$$

woraus sich ergiebt, dass $f(x^{1})$ durch $\frac{1-x^{p}}{1-x}$ theilbar ist.

II. λ und p sind nicht relativ prim. Dann ist

$$f(x^1) - p = x^1 \{ (x^g - 1) + (x^{g^2} - 1) + \dots + (x^{g^{p-2}} - 1) \},$$

woraus unmittelbar hervorgeht, dass $f(x^{2})-p$ durch $\frac{1-x^{p}}{1-x}$ theilbar ist

Nach alledem und mit Rücksicht darauf, dass g^0+1 , g+1, ... $g^{p-2}+1$ in beliebiger Reihenfolge die Zahlen 2, 3, ... p repräsentiren, ergiebt sich aus 6):

$$\Omega = G^2 - (-1)^{\frac{p-1}{2}} f\left(x^{\frac{p-1}{2}+1}\right) = 0 \mod \frac{1-x^p}{1-x}$$

oder, wenn Z eine ganze Function von x bedeutet,

7)
$$G^{2} = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p = \frac{1-x^{p}}{1-x} Z.$$

Unmittelbar aus Formel 7) fliesst die folgende:

8)
$$G^{q-1} - (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} p^{\frac{q-1}{2}} = \frac{1-x^p}{1-x} Y,$$

worin Y ebenfalls eine ganze Function von x ist.

3.

Mit Hilfe der Formeln 3), 4), 7) und 8) kann man nun das Reciprocitätsgesetz ableiten. Zunächst ergiebt sich aus den Formeln 3) und 4):

$$q G X = G^{q+1} - G \left\{ (1-x^p) W + \left(\frac{q}{p}\right) G \right\},\,$$

wenn noch X eine ganze Function von x bedeutet, die sich aus 2; definirt als:

$$G^q - G_q = q X.$$

Nach Formel 8) erhält man ferner:

$$q G X = \left\{ (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} p^{\frac{q-1}{2}} + \frac{1-x^p}{1-x} Y \right\} G^2 - G(1-x^p) W - \left(\frac{q}{p}\right) G^2$$

oder, mit Benutzung von 7):

9)
$$q G X = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p \left\{ (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} p^{\frac{q-1}{2}} - {q \choose p} \right\} + \frac{1-x^p}{1-x} \left\{ Z \left((-1)^{\frac{p-1}{2}} q^{\frac{p-1}{2}} - {q \choose p} \right) + YG^p - WG(1-x) \right\}$$

G ist nach 1) vom Grade p-1. Setzt man daher $GX = \frac{1-x^p}{1-x}U+T$, wo U und T ebenfalls ganze Functionen von x sind, so wird T eine ganze Function von x sein, deren Grad kleiner als p-1 ist. Substituirt man den Werth für GX in q, so wird:

$$q T - (-1)^{\frac{p-1}{2}} \dot{p} \left\{ (-1)^{\frac{q-1}{2}, \frac{p-1}{2}} p^{\frac{q-1}{2}} - \left(\frac{q}{p}\right) \right\}$$

$$= \frac{1 - x^p}{1 - x} \left\{ Z \left[(-1)^{\frac{p-1}{2}, \frac{q-1}{2}} p^{\frac{q-1}{2}} - \left(\frac{q}{p}\right) \right] + YG^2 - WG(1 - x) - qU \right\},$$

worin der Grad der linken Seite kleiner als p-1 ist. Z, Y, W sind aber ganze Functionen, folglich ist der Grad der rechten Seite grösser als p-1. Die vorstehende Gleichung kann also nur erfüllt werden, wenn beide Seiten gleich Null sind. Es ist daher:

$$q T = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p \left\{ (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} p^{\frac{q-1}{2}} - \left(\frac{q}{p}\right) \right\}$$

oder

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}p^{\frac{q-1}{2}}-\left(\frac{q}{n}\right)\equiv 0 \mod q$$
,

q. e. d.

IV. Beweis von Cauchy¹) · Jacobi²) · Eisenstein⁵).

Gauss hat nachgewiesen, dass

1)
$$G\left(\frac{qi}{p}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)G\left(\frac{i}{p}\right) \text{ und } G^2\left(\frac{i}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}p.$$

Daraus ergiebt sich ohne Weiteres:

$$G^{q+1}\left(\frac{i}{p}\right) - G\left(\frac{i}{p}\right)G\left(\frac{qi}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q+1}{2}}p^{\frac{q+1}{2}} - \left(\frac{q}{p}\right)G^2\left(\frac{i}{p}\right)$$

oder

2)
$$G\left(\frac{i}{p}\right)\left[G^{q}\left(\frac{i}{p}\right)-G\left(\frac{qi}{p}\right)\right] = (-1)^{\frac{p-1}{2}}p\left\{\left(-1\right)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}p^{\frac{q-1}{2}}-\left(\frac{q}{p}\right)\right\}$$

Nun ist aber

$$G\left(\frac{i}{p}\right) = \sum_{k=1}^{p-1} \left(\frac{\lambda}{p}\right) e^{\lambda}, \quad G\left(\frac{qi}{p}\right) = \sum_{k=1}^{p} \left(\frac{\lambda}{p}\right) e^{\lambda q},$$

wobei ϱ eine primitive Wurzel von $x^p = 1$ bedeutet; somit ist auch:

$$G^{q}\left(\frac{i}{p}\right) = G\left(\frac{qi}{p}\right) + q(A' + B'\varrho + C'\varrho^{2} + \ldots),$$

worin A', B', ... ganze Zahlen sind. Mithin ergiebt sich, wenn man Abkürzung setzt

3)
$$X = \left[(-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} p^{\frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p} \right) \right] (-1)^{\frac{p-1}{2}} p:$$

$$X = G\left(\frac{i}{p} \right) \cdot q[A' + B'\varrho + \dots] \quad \text{oder} \quad = q[A + B\varrho + \dots],$$

worin A, B, ... wiederum ganze Zahlen bedeuten. Setzt man nun fter der Reihe nach ρ^2 , ... ρ^{p-1} ein und addirt die so entstehenden Gleungen, so erhält man:

4)
$$(p-1)X = q[(p-1)A - B - C - ...],$$

woraus, da q eine Primzahl ist und man unbeschadet der Allgemeir p-1 < q annehmen kann, nach 3)

$$(-1)^{\frac{p-1}{2},\frac{q-1}{2}}p^{\frac{q-1}{2}} - \left(\frac{q}{p}\right) \equiv 0 \mod q$$

folgt. Dies ist aber unsere bekannte Formel.

V. Zweiter Beweis von Eisenstein.4)

1.

Ist p eine positive ungerade Primzahl und durchläuft r ein vollständiges Restsystem Modulo p, so wird $\sum \left(\frac{r}{p}\right) = 0$, und ebenso ist

¹⁾ Bull, de Férussac, XII. Bd. (1829) S. 205; Mém, de l'Inst, XVIII, p. 451.

²⁾ Legendre, Théorie des nombres, 3ième éd. II (1830), p. 391.

³⁾ Crelle J. XXVIII (1844), S. 41.

⁴⁾ Crelle J. XXVII (1844), S. 322.

1)
$$\psi_{(\mu)} = \left\{ \sum_{r} \left(\frac{r}{p} \right) \right\}^{\mu} = 0.$$

Sind nun $\alpha_1, \ldots \alpha_{\mu}, \mu$ Zahlen r, so folgt sofort:

$$\psi_{(\mu)} = \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha_1}{p} \right) \cdots \left(\frac{\alpha_{\mu}}{p} \right),$$

we die Summation über sämmtliche α von 1 bis p-1 hin zu erstrecken ist. Repräsentirt $\psi_{(\mu,k)}$ die Summe $\sum \left(\frac{\alpha_1}{p}\right)\cdots\left(\frac{\alpha_{\mu}}{p}\right)$, $\Sigma \alpha = k$, so erhält man:

3)
$$\psi_{(\mu)} = \psi_{(\mu,0)} + \psi_{(\mu,1)} + \ldots + \psi_{(\mu,p-1)} = 0.$$

Setzt man $\alpha_1 \equiv k \beta_1$, $\alpha_2 \equiv k \beta_2$, ... $\alpha_{\mu} \equiv \kappa \beta_{\mu} \mod p$, woraus sich ergiebt $\Sigma \alpha = k \Sigma \beta$, $\Sigma \beta = 1$, so wird:

4)
$$\psi_{(\mu,k)} = \left(\frac{k}{p}\right)^{\mu} \psi_{(\mu,1)}.$$

Ist nun μ eine gerade Zahl, so erhält man $\psi_{(\mu,k)} = \psi_{(\mu,1)}$ oder:

5)
$$\psi_{(\mu,1)} = \psi_{(\mu,2)} = \dots = \psi_{(\mu,p-1)},$$
 mithin nach Formel 3)

6)
$$\psi_{(\mu,0)+(p-1)} \; \psi_{(\mu,1)} = 0.$$

Ist dagegen μ ungerade, so resultirt $\psi_{(\mu,k)} = \left(\frac{k}{p}\right) \psi_{(\mu,1)}$, woraus

$$\psi_{(\mu,1)} + \psi_{(\mu,2)} + \ldots + \psi_{(\mu,p-1)} = \psi_{(\mu,1)} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{r}{p}\right) = 0$$

folgt, so dass

$$\psi_{(\mu,0)}=0$$

wird. Die Definitionsgleichung $\psi_{(\mu, \nu)} = \sum_{\alpha} \left(\frac{\alpha_1}{p}\right) \cdots \left(\frac{\alpha_{\mu}}{p}\right), \quad \Sigma \alpha \equiv \nu \mod p$ kann man auch schreiben:

$$\psi_{(\mu,\,\mathbf{p})} = \sum \left\{ \left(\frac{\alpha_{\mu}}{p} \right) \sum \left(\frac{\alpha_{1}}{p} \right) \cdots \left(\frac{\alpha_{\mu-1}}{p} \right) \right\}.$$

so dass sich findet:

$$\psi(\mu,\nu) = \sum \left\{ \left(\frac{\alpha_{\mu}}{p} \right) \psi(\mu-1,\nu-\alpha_{\mu}) \right\},$$

woraus sich im speciellen Falle $\nu = 0$ ergiebt:

$$\psi(\mu,0) = \sum \left(\frac{\alpha\mu}{n}\right) \psi(\mu-1,-\alpha\mu)$$

oder mit Benutzung von 4):

$$\psi(\mu-1,-\alpha_{\mu})=\left(\frac{-\alpha_{\mu}}{p}\right)^{\mu-1}\psi(\mu-1,1),$$

so dass

$$\psi(\mu,0) = \sum \left(\frac{-\alpha_{\mu}}{p}\right)^{\mu} \left(\frac{-1}{p}\right) \psi(\mu-1,1)$$

wird. Für ein gerades μ ergiebt sich daraus:

$$\psi(\mu, 0) = \left(\frac{-1}{p}\right) \psi(\mu - 1, 1) \cdot (p - 1)$$

oder mit Benutzung von 6):

8)
$$\psi(\mu, k) = -\left(\frac{-1}{p}\right)\psi(\mu-1, 1), \quad \mu \equiv 0 \mod 2.$$

Für ein ungerades µ erhält man aus der Recursionsformel:

$$\psi(\mu, k) = \sum \left(\frac{\alpha_{\mu}}{p}\right) \psi(\mu - 1, k - \alpha_{\mu})$$

$$= \left(\frac{k}{p}\right) \psi(\mu - 1, 0) + \sum \left(\frac{\alpha_{\mu}}{p}\right) \psi(\mu - 1, k - \alpha_{\mu}).$$

Demnach ergiebt sich nach Formel 5):

$$\psi(\mu, k) = \left(\frac{k}{p}\right) \psi(\mu - 1, 0) + \psi(\mu - 1, 1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha\mu}{p}\right)$$
$$= \left(\frac{k}{p}\right) \{\psi(\mu - 1, 0) - \psi(\mu - 1, 1)\}$$

oder

oder aber mit Benutzung von 6):

9)
$$\psi(\mu,k) = -\left(\frac{k}{p}\right)p \ \psi(\mu-1,1), \quad \mu \equiv 1 \mod 2.$$

Aus den beiden Formeln 8) und 9) resultirt, wenn λ eine ganze Zebbedeutet, ohne Weiteres folgendes System Gleichungen:

woraus sich durch Multiplication ableitet

$$\psi(2\lambda + 1, 1) = (-1)^{2\lambda} \left(\frac{-1}{p}\right)^{\lambda} p^{\lambda} \psi(1, 1)$$
oder, da $\psi(1, 1) = 1$ ist,
$$\psi(2\lambda + 1, 1) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\lambda} p^{\lambda}.$$

9

Ist $q = 2\lambda + 1$ wie p eine positive ungerade Primzahl, so ist nach de^r eben gefundenen Formel:

11)
$$\psi(q,1) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \frac{q-1}{2}.$$

Nach der Definitionsgleichung ist aber:

$$\psi(q,1) = \sum \left(\frac{\alpha_1}{p}\right) \cdots \left(\frac{\alpha_q}{p}\right), \quad \Sigma \alpha \equiv 1 \mod p;$$

für $\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_q = \alpha$ nun wird $q \alpha \equiv 1 \mod p$. Es giebt hiernsch in jener Summe für $\psi(q, 1)$ nur ein Glied, in welchem die α gleich sind. Daher folgt aus 11):

$$\psi(q,1) = \left(\frac{\alpha}{p}\right)^{\frac{q}{2}} + \Delta = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} p^{\frac{q-1}{2}}.$$

In $\Delta = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha_1}{n}\right) \cdots \left(\frac{\alpha_q}{n}\right)$ durfer die α nicht gleichzeitig einander gleich werden. — Da q ungerade ist, so erhält man schliesslich, wenn man noch berticksichtigt, dass aus

12)
$$q \alpha \equiv 1 \mod p, \quad 1 = \left(\frac{q}{p}\right) \left(\frac{\alpha}{p}\right) \text{ folgt:}$$

$$(-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} p^{\frac{q-1}{2}} - \left(\frac{q}{p}\right) = \Delta.$$

Schreibt man die Summe *d* in extenso, so entsteht:

13)
$$\begin{cases}
\left(\frac{\alpha_{1}}{p}\right)\left(\frac{\alpha_{3}}{p}\right)\cdots\left(\frac{\alpha_{q}}{p}\right) \\
\left(\frac{\alpha_{3}}{p}\right)\left(\frac{\alpha_{3}}{p}\right)\cdots\left(\frac{\alpha_{+1}}{p}\right) \\
\vdots \\
\left(\frac{\alpha_{q}}{p}\right)\left(\frac{\alpha_{1}}{p}\right)\cdots\left(\frac{\alpha_{q-1}}{p}\right)
\end{cases}.$$

Man kann also ⊿ in eine Reihe von Gruppen zerlegen, so dass jede Gruppe aus q einander gleichen Summanden besteht. Es ist daher $\Delta \equiv 0 \mod q$ und nach 12):

 $(-1)^{\frac{p-1}{3}\cdot\frac{q-1}{3}}p^{\frac{q-1}{3}}\equiv \left(\frac{q}{p}\right) \bmod q, \quad q. \text{ e. d.}$

VI. Beweis von Liouville.1)

Ist p eine positive ungerade Primzahl und ρ eine primitive Wurzel von

1)
$$\frac{x^p-1}{x-1} = (x-\varrho^2) \cdot (x-\varrho^4) \cdot \dots + (x-\varrho^{2(p-1)}) = 1+x+x^2+\dots+x^{p-1}$$

woraus für
$$x = 1$$
:
 $p = (-1)^{\frac{p-1}{2}} (\rho - -1)^2 \cdot \dots \cdot (\rho^{\frac{p-1}{2}} - \rho^{-\frac{p-1}{2}})^2$

Durch Potenzirung erhält man hieraus:

2)
$$p^{\frac{q-1}{2}} = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \prod_{n=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{e^{\alpha q} - e^{-\alpha q}}{e^{\alpha} - e^{-\alpha}} \equiv \left(\frac{p}{q}\right) \mod q,$$

wobei q eine von p verschiedene positive ungerade Primzahl bedeuten möge.

Die einzelnen Factoren von $\prod \frac{e^{aq}-e^{-aq}}{e^a-e^{-a}}$ werden nun positiv oder negativ, je nachdem aq einen positiven oder negativen absolut kleinsten Rest Modulo p lässt. Mit Hilfe des Gauss'schen Lemmas erhält man demnach aus 2):

 $\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot \frac{q-1}{2} \left(\frac{q}{p}\right),$

unsere bekannte Gleichung.

¹⁾ C. R. XXIV (1847), S. 577, und Liouville J. XII, S. 95.

(a, b, c) a, b und c relativ prim, so nennt man die Form eine ursprüngliche oder primitive; ist der Theiler σ von a, 2b, c wiederum 1, so ist (a, b, c) eine ursprüngliche Form erster Art, während, wenn $\sigma = 2$, man sie eine ursprüngliche Form zweiter Art nennt. Eine forma anceps en lich ist eine solche, bei der der doppelte mittlere Coefficient (2b) durch den ersten theilbar ist. (1, 0, -D) nennt man die Hauptform der Determinante D; die Classe, in die sie gehört, die Hauptclasse. Sind die susseren Coefficienten einer Form positiv, so nennt man die Form einer positive.

Sind nun z, z' durch dieselbe quadratische Form darstellbar, ist als $s = a \alpha^2 + 2b \alpha \beta + c \beta^2, \quad z' = a \gamma^2 + 2b \gamma \delta + c \delta^2,$

so wird $x^2 - zz' = Dy^2$, so dass, wenn z, z' relativ prim zu D sind:

1)
$$\left(\frac{ss'}{D}\right) = +1 \text{ oder } \left(\frac{s}{D}\right) = \left(\frac{s'}{D}\right)$$

ist. Wir setzen nun D = pq = 4n + 1, wo p und q Primzahlen sinvoraus. Dann werden $\left(\frac{s}{p}\right)$, $\left(\frac{s}{q}\right)$ ganz bestimmte Werthe (Charakten haben. Diese können verschieden gruppirt sein. Wenn D nur in zverschieden sich zerfällen lässt, so sind die verschiedenen Gruppen:

$$\begin{cases}
+1, +1; -1, -1; \\
+1, -1; -1, +1.
\end{cases}$$

Ist die Anzahl der Factoren von D, um dies der Vollständigkeit hal zu erwähnen, λ , so giebt es 2^{λ} verschiedene Gruppirungen der Vorzeichen Mehmen nun die Charaktere $\left(\frac{s}{p}\right)$ und $\left(\frac{s}{q}\right)$ für eine bestimmte Formen von der Determinante D=4n+1 die Werthe c_1 , c_2 an, so nennt den Inbegriff aller ursprünglichen Formen von gleicher Determinante Art, welche dieselben Charaktere (denselben Totalcharakter) haben, Geschlecht.

Aus 1) ergiebt sich, dass jedes Geschlecht aus einer Anzahl Formandelssen besteht. Dasjenige Geschlecht, welches die Hauptform und danstit die Hauptclasse enthält, nennt man das Hauptgeschlecht. Unmitteller evident ist, dass der Totalcharakter des Hauptgeschlechtes für D = pq = 4n + 1:1, 1 ist, weil ja $\left(\frac{1}{p}\right) = 1 = \left(\frac{1}{q}\right)$ ist.

I. Gauss' zweiter Beweis.1)

Dieser Beweis beruht auf folgendem Lemma: Die Anzahl der für eine gegebene Determinante wirklich existirenden Geschlechter ist halb so gross als die Anzahl der möglichen Geschlechter, d. h. halb so gross als die Anzahl

¹⁾ D. A. Art. 257. Dirichlet, Zahlenth., Suppl. IV, und X.

worin $P \equiv p^{\frac{q-1}{2}}(-1)^{\frac{p-1\cdot q-1}{4}} \mod q$ und $Q \equiv 1 \mod q$ ist. Durch Vergleichung von 7) mit 4) ergiebt sich:

8)
$$n_q \equiv \frac{(p-1)^q + 1}{p} + p^{\frac{q-1}{2}} (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \mod q.1$$

2.

Die Congruenz $x^2 \equiv a \mod p$ hat, wenn sie überhaupt möglich ist, stets zwei, Modulo p von einander verschiedene Wurzeln. Daraus geht hervor:

9) $n_q = 2^q S_q$, wobei S_q ganzzahlig ist (incl. Null). Wenn ferner:

10)
$$x_1^2 + \cdots + x_q^2 \equiv a \mod p$$
 erfullt wird für $x_1 = x_q = \cdots = x_q$, so ist $qx_1^2 \equiv a \mod p$ oder $\left(\frac{aq}{p}\right) = 1$. Ist umgekehrt $\left(\frac{aq}{p}\right) = 1$, und setzt man $qx_1^2 \equiv a \mod p$, so wird 10) immer lösbar sein für $x_1 = x_2 = \cdots = x_q$. Bedenkt man weiter, dass die Anzahl der Lösungen von 10), die x nicht gleich vorausgesetzt, ein Multiplum von q ist, da q eine Primzahl sein soll, so ergiebt sich:

11)
$$\begin{cases} S_q = qR + 1, & \text{wenn } \left(\frac{q}{p}\right) = +1 \\ S_q = qR, & \text{wenn } \left(\frac{q}{p}\right) = -1 \end{cases}$$
 (R ist eine ganze Zahl).

Andererseits war $n_q = 2^q S_q$, so dass:

$$n_q \equiv 2^q \equiv 1 + 1 \mod q, \quad \text{wenn } \left(\frac{q}{p}\right) = +1, \quad \text{und}$$

$$n_q \equiv 0 \equiv 1 - 1 \mod q, \quad \text{wenn } \left(\frac{q}{p}\right) = -1 \quad \text{ist, woraus}$$

$$12) \qquad \qquad n_q \equiv 1 + \left(\frac{q}{p}\right) \mod q$$

resultirt. Aus der Vergleichung dieser Formel mit 8) folgt unter Anwendung des Fermat'schen Satzes unmittelbar unsere Formel.

VI. Capitel.

Beweise durch Sätze aus der Theorie der quadratischen Formen.

Vorbemerkung.

Bekanntlich nennt man den Complex sämmtlicher äquivalenter Formen derselben Determinante eine Formenclasse. — Sind ferner in der Formenclasse.

¹⁾ Ganz ähnliche Formeln ergeben sich für no, no, No, No, No, No,

b und c relativ prim, so nennt m. 2b, c wiener primitive; ist der Theiler 6 von a, 2b, c wiener ine ursprüngliche Form erster Art, während, wenn 6=2, man rsprtingliche Form zweiter Art nennt. Eine forma anceps end eine solche, bei der der doppelte mittlere Coefficient (2b) durch FifEL Ind on theilbar ist. (1, 0, -D) nennt man die Hauptform der Detak D; die Classe, in die sie gehört, die Hauptelasse. n Coefficienten einer Form positiv, so nennt man die Form einer and nun z, z durch dieselbe quadratische Form darstellbar, ist als $z=a\alpha^2+2b\alpha\beta+c\beta^2$, $z'=a\gamma^2+2b\gamma\delta+c\delta^2$, fird x2-zz = Dy2, 80 dass, wenn z, z relativ prim zu D sind: Wir setzen nun D = pq = 4n + 1, wo p und q Primzahlen sin Dann werden $\left(\frac{z}{p}\right)$, $\left(\frac{z}{q}\right)$ ganz bestimmte Werthe (Charakter Diese können verschieden gruppirt sein. Wenn D nur in .) Primzahlen sich zerfällen lässt, so sind die verschiedenen Gruppen: Ist die Anzahl der Factoren von D, um dies der Vollständigkeit hal $\left\{ \begin{matrix} +1, & +1; & -1, & -1; \\ +1, & -1; & -1, & +1. \end{matrix} \right.$ Zu erwähnen, \(\lambda\), 80 giebt es 2\(\lambda\) verschiedene Gruppirungen der Vorzeich Nehmen nun die Charaktere $\binom{s}{p}$ und $\binom{s}{q}$ für eine bestimmte FOF von der Determinante D = 44+1 die Werthe G, G an, 80 neunt man den Inbegriff aller urspringlichen Formen von gleicher Determinante und Art, Welche dieselben Charaktere (denselben Totalcharakter) haben, ein Aus 1) ergiebt sich, dass jedes Geschlecht aus einer Anzahl Formenclassen besteht. Dasjenige Geschlecht, welches die Hauptform und damit die Hauptclasse enthält, nennt man das Hauptgeschlecht. evident ist, dass der Totalcharakter des Hauptgeschlechtes für D=pq Geschlecht. =4n+1:1, 1 ist, weil ja $(\frac{1}{p})$ =1= $(\frac{1}{q})$ ist.

Dieser Beweis beruht auf folgendem Lemma: Die Anzahl der für e gegebene Determinante Wirklich existirenden Geschlechter ist halb so g Anzahl der möglichen Geschlechter, d. h. halb so gross als die Ar der existirenden Totalcharaktere. Der Nachweis der Richtigkeit dieses Satzes soll nicht geführt werden, da zu diesem Zwecke ein grosser Theil der Theorie der quadratischen Formen zu reproduciren wäre.

Gauss schliesst nun in folgender Weise:

I. $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$; p und q mögen den oft angeführten Bedingungen genügen und ausserdem sei $p \equiv 1 \mod 4$. Ist zunächst $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$, so ist auch $\left(\frac{-q}{p}\right) = 1$. Bestimmt man nun das Vorzeichen von q so, dass $\pm q \equiv 1 \mod 4$ wird, so ist die Gleichung $\pm q = b^2 - cp$ möglich. Setzt man $\pm q \equiv D$, so ist also (p, b, c) eine ursprüngliche Form erster Art von der Determinante $D \equiv 1 \mod 4$, Da nun D eine Primzahl von der Form 4n+1 ist, so ist die Anzahl der angebbaren Totalcharaktere 2. Es existirt also nach unserem Lemma nur ein Geschlecht, das Hauptgeschlecht. Da somit (p, b, c) stets in die Form (1, 0, -D) transformirt werden kann, so ergiebt sich, da $\left(\frac{1}{D}\right) = 1$:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = +1.$$

Ist $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$, so muss auch $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$ sein. Wäre nämlich $\left(\frac{p}{q}\right) = +1$, so gäbe es eine ursprüngliche Form erster Art, (q, b, c), von der Determinante $D = p \equiv 1 \mod 4$, woraus $\left(\frac{q}{p}\right) = +1$ folgen würde, was der Annahme $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$ widerspricht.

II. $\left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{q}{p}\right)$; beide Primzahlen sind von der Form 4n+3. Gauss betrachtet in diesem Falle Formen von der Determinante $D=pq \equiv 1 \mod 4$. Die Anzahl der angebbaren Totalcharaktere ist da gleich 4. Es giebt also zu D, nach unserem Lemma, höchstens zwei verschiedene Geschlechter. Die beiden ursprünglichen Formen erster Art: (1, 0, -pq) und (-1, 0, pq) gehören aber zwei verschiedenen Geschlechtern, die erstere davon dem Hauptgeschlecht an; folglich muss die Form (p, 0, -q) einem der durch jene beiden Formen repräsentirten Geschlechter angehören. Ist nun (p, 0, -q) in das Hauptgeschlecht zu rechnen, so ist $\left(\frac{p}{q}\right) = +1$, $\left(\frac{-q}{p}\right) = 1$, mithin $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$, während, wenn (p, 0, -q) zu dem durch die Form (-1, 0, pq) repräsentirten Geschlecht gehört, $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$, $\left(\frac{-q}{p}\right) = -1$, also $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$ ist. Damit aber ist unser Gesetz be-

II. Kummer's erster Beweis.1)

In der Pell'schen Gleichung:

$$t^2 - Du^2 = 1$$

habe D die Form 4n+1, so dass t ungerade und u gerade wird. $\triangle^{us}(t+1)$ $(t-1)=Du^2$ ergiebt sich:

2)
$$\begin{cases} t+1=2mx^{2} \\ t-1=2m'\lambda^{2} \end{cases} \binom{mm'=D}{2x\lambda=u},$$

woraus durch Subtraction

$$1 = m x^2 - m' \lambda^2$$

folgt. Sind nun t und u die kleinsten positiven Werthe, welche Glei hung 1) erfüllen, so findet nach 2) nur eine einzige Zerfällung von D statt, und das Werthepaar m=1, D=m' oder m=D, m'=1 ist ausgeschloss weil x und λ kleiner als t sein sollen.

Aus $1 = m x^2 - m' \lambda^2$ erhält man nun die wichtige Relation:

4)
$$\left(\frac{m}{m'}\right) = 1, \quad \left(\frac{-m'}{m}\right) = 1, \quad \left(\frac{-m'}{p}\right) = 1,$$

wenn prein beliebiger Factor von m ist.

Kummer zerfällt nun D auf verschiedene Weise in Primfactoren.

I. D = pp' und $p \equiv p' \equiv 3 \mod 4$. Dann kann Gleichung 3), respectively. Absonderung der Formen $1 = \kappa^2 - pp' \lambda^2$, $1 = \kappa^2 pp' - \lambda^2$, die nach obsideren Annahme ausgeschlossen sind, nur die beiden Formen annehmen:

$$1 = p x^{2} - p' \lambda^{2}, \text{ wenn } \left(\frac{p}{p'}\right) = 1, \quad \left(\frac{p'}{p}\right) = -1,$$

$$1 = p' x^{2} - p \lambda^{2}, \text{ wenn } \left(\frac{p'}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{p'}\right) = -1,$$
so dass also,
$$\text{wenn } \left(\frac{p}{p'}\right) = 1 \text{ ist, } \left(\frac{p'}{p}\right) = -1, \text{ und}$$

$$\text{wenn } \left(\frac{p}{p'}\right) = -1 \text{ ist, } \left(\frac{p'}{p}\right) = +1 \text{ wird.}$$

II. D = pp'q, $p \equiv p' \equiv 3 \mod 4$ und $q \equiv 1 \mod 4$. Dann kann is auf $2^3 = 8$ -fache Weise in 2 Factoren zerlegt werden; also wären nach obiger Annahme, wonach die beiden Fälle m = 1 resp. m' = 1 auszwischliessen sind, 6 Fälle zu unterscheiden. Bestimmt man nun p' so, dass

$$\left(\frac{p'}{p}\right) = -1$$
, also $\left(\frac{p}{p'}\right) = +1$, und $\left(\frac{p'}{q}\right) = -1$,

und schliesst von jenen 6 Fällen noch die aus, welche diesen Bedingungen widersprechen, so bleiben folgende 3 Fälle übrig:

¹⁾ Abh. der Berl, Akad, 1861.

1)
$$1 = p \kappa^2 - p' q \lambda^2$$
, wenn $\left(\frac{p}{q}\right) = 1$, $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$;

2)
$$1 = q x^2 - p p' \lambda^2$$
, wenn $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$, $\left(\frac{q}{p'}\right) = 1$, $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$;

3)
$$1 = pp' x^2 - q \lambda^2$$
, went $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$, $\left(\frac{q}{p'}\right) = -1$, $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$.

Es giebt aber nur eine Zerfällung von D; und \mathfrak{E} s findet, wenn $\left(\frac{p}{q}\right) = +1$ ist, nur der erste der drei Fälle statt; und wenn $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$, nur der dritte. Das heisst:

wenn
$$\left(\frac{p}{q}\right) = +1$$
, so $\left(\frac{q}{p}\right) = +1$,
wenn $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$, so $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$.

III. D = p p' q q', $p \equiv p' \equiv 3 \mod 4$ und $q \equiv q' \equiv 1 \mod 4$. Kummer nimmt an, es könnten die Zahlen p und p' so gewählt werden, dass

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{p'}{q'}\right) = -1$$
 und $\left(\frac{p}{q'}\right) = \left(\frac{p'}{q}\right) = +1$

sei. Schliesst man dann von den 16 Fällen, die bei der Zerlegung von D möglich sind, die aus, welche den eben gestellten Bedingungen widersprechen und die beiden Fälle, in denen m' resp. m gleich 1 wird, so sieht man, kann Gleichung 3) nur die folgenden 3 Formen haben:

1)
$$1 = pq \quad \kappa^2 - p'q' \lambda^2$$
, wenn $\left(\frac{p}{p'}\right) = 1$, $\left(\frac{q'}{q'}\right) = 1$, $\left(\frac{q'}{q}\right) = 1$.

2)
$$1 = p' q \, n^2 - p \, q' \, \lambda^2$$
, wenn $\left(\frac{p'}{p}\right) = -1$, $\left(\frac{q}{q'}\right) = -1$, $\left(\frac{q'}{q}\right) = -1$.

3)
$$1 = p'q'\kappa^2 - pq \lambda^2$$
, wenn $\left(\frac{p'}{p}\right) = 1$, $\left(\frac{q'}{q}\right) = 1$, $\left(\frac{q}{q'}\right) = 1$.

Wenn nun $\left(\frac{q}{q'}\right) = -1$ ist, so ist nur der zweite Fall möglich, nach welchem $\left(\frac{q'}{q}\right) = -1$ wird, während, wenn $\left(\frac{q}{p}\right) = +1$ ist, entweder

Fall 1 oder Fall 3 eintritt; in beiden Fällen resultirt $\left(\frac{p}{q}\right) = +1$. Die bewiesenen drei Theoreme, die sich so aussprechen:

Wenn $\left(\frac{p}{p'}\right) = 1$, so $\left(\frac{p'}{p}\right) = -1$; wenn $\left(\frac{p}{p'}\right) = -1$, so $\left(\frac{p'}{p}\right) = 1$. $\left(\frac{p}{q}\right) = 1, \quad \left(\frac{q}{p}\right) = 1; \quad n \quad \left(\frac{p}{q}\right) = -1, \quad \left(\frac{q}{p}\right) = -1$ $\left(\frac{q}{q'}\right) = -1, \quad n \quad \left(\frac{q'}{q}\right) = -1; \quad n \quad \left(\frac{q}{q'}\right) = +1, \quad n \quad \left(\frac{q'}{q}\right) = +1$ $\left(p \equiv p' \equiv 3 \mod 4, \quad q \equiv q' \equiv 1 \mod 4\right),$

lassen sich nun sofort in das bekannte Fundamentatheorem in der Theorie der quadratischen Reste und Nichtreste zusammenfassen.

Es ist bei diesem Beweise die Voraussetzung gemacht, dass es stets Primzahlen p von der Form 4n+3 giebt, für die $\left(\frac{p}{r}\right)=-1$, $\left(\frac{p}{q}\right)=+1$ ist (r) ist eine beliebige positive ungerade Primzahl, q eine solche von der Form 4n+1). Wie aber leicht zu übersehen, ist diese Voraussetzung erfüllt, wenn nachgewiesen werden kann, dass es in einer unbegrenzten arithmetischen Reihe, deren erstes Glied und deren Differenz ganze, relativ prime Zahlen sind, unendlich viele Primzahlen giebt. Der Beweis hierfür ist aber von Dirichlet¹) erbracht worden, wodurch die Voraussetzung als richtig nachgewiesen ist.

III. Kummer's zweiter Beweis.2)

p und p' seien verschiedene positive Primzahlen von der Form 4n+3, und q und q' solche von der Form 4n+1.

Ist dann erstens r eine Primzahl, welche sich durch eine binäre quadratische Form C von der Determinante -p darstellen lässt, so dass

$$\left(\frac{-p}{r}\right) = 1$$

ist, so wird im Allgemeinen die Classe C, welcher jene darstellende Form angehört, die Hauptclasse K nicht sein; wohl aber wird eine Potenz von r durch $K = x^2 + py^2$ sich darstellen lassen, und der Exponent von r wird eine ungerade Zahl und ein Theiler der Classenanzahl n der quadratischen Formen von der Determinante -p sein. Die Classen K, C, C^2 , ... C^r gehören nämlich in das Hauptgeschlecht und können bei hinlänglich grossem ν nicht sämmtlich von einander verschieden sein. Ist nun für r > s:

$$C^r = C^s$$
, so ergiebt sich hieraus $C^{r+1-s} = C$.

Setzt man r-s=m-1, so ist nun entweder m=n, also $n\equiv 0$ mod m, oder m=n. Im ersteren Falle erschöpfen die Formenclassen:

2)
$$K, C, C^2, \ldots C^{m-1}$$

das Hauptgeschlecht vollständig; im anderen Falle geschieht dies nicht. Ist nun C' eine in $C, \ldots C^{m-1}$, K nicht enthaltene Formenclasse, so werden

3)
$$C', CC', C^2C', \ldots C^{m-1}C'$$

m von einander und auch von den in 2) dargestellten verschiedene Formen sein. Es ist da wiederum entweder 2m = n oder 2m < n. Im ersteren Falle ist die Behauptung, wonach $n \equiv 0 \mod m$ sein soll, erfüllt; im anderen Falle nicht. Man führt da wiederum eine neue Formenclasse C'', wenn

¹⁾ Abh. der Berl, Akad, 1887 oder Liouville J. XII., S. 898.

²⁾ Abh. der Berl. Akad. 1861.

auch diese noch nicht genügt, eine folgende u. s. w. ein. So gelangt man allgemein zu dem Resultat, dass m ein Theiler von n ist. Es ist jener Exponent m aber auch nothwendig ungerade, weil es für -p als Determinante nur eine forma anceps giebt, und die übrigen Formenclassen nach $C^{m-3} = C^3$ paarweise vorkommen.

Ist nun m=2h+1, so ist $x^2+py^2=r^{2h}$. r, worsus

Ist zweitens r eine Primzahl, welche sich durch eine Form von der Determinante q darstellen lässt, so dass also $\left(\frac{q}{r}\right) = 1$ ist, so wird ganz analog $x^2 - qy^2 = r^{2h}r,$

so dass $\left(\frac{r}{a}\right) = 1$ resultirt. Ist also

B)
$$\left(\frac{q}{r}\right) = 1$$
, so ist auch $\left(\frac{r}{q}\right) = 1$.

Die beiden Formeln A) und B) ergeben aber das Reciprocitätsgesetz, da r eine beliebige Primzahl und p von der Form 4n+3, q von der Form 4n+1 ist.

VII. Capitel.

Die Ergänzungssätze des quadratischen Reciprocitätsgesetzes und das verallgemeinerte Reciprocitätsgesetz.

I. Die Ergänzungssätze.

Wir haben bei unseren Betrachtungen die Annahme gemacht, dass die Ergänzungssätze des quadratischen Reciprocitätsgesetzes, welche durch die Formeln:

I) $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$ und II) $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$

ausgedrückt werden, schon bewiesen seien. In diesem Abschnitte wollen wir die Formeln I) und II) mit Hilfe der Methoden, die in den vorhergehenden Capiteln zur Ableitung der Relation $\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right)=(-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}$ entwickelt wurden, verificiren. Zuvörderst bemerken wir, dass Formel I) eine unmittelbare Folge des Fermat'schen Satzes ist.

Beweis für Formel I) durch "verwandte Reste"¹), für Formel II) durch vollständige Induction.

Die lineare Congruenz $ay \equiv 1 \mod p$ läest für relativ prime Zahlen a und p nur eine Lösung zu. Ist nun a ein beliebiger der $\frac{p-1}{2}$ quadra-

¹⁾ Euler, Opusc. anal. 1788. L. S. 185. Gauss, D. A., Art. 109.

tischen Reste nach der Primzahl p als Modul, so wird g entweder gleich and oder von a verschieden sein; im letzteren Falle nennt Euler a und verwandte Reste (residua socia). Kommt nun der erste Fall b mal, der zweite c mal vor, so ist

$$\frac{p-1}{2}=b+2c,$$

d. h. die Anzahl der quadratischen Reste a, welche der Congruenz $ay \equiv 1 \mod p$ genügen, so dass $a^2 \equiv 1 \mod p$ wird, ist gerade für p = 4n + 1, dagegen ungerade für p = 4n + 3; in Formeln:

$$b \equiv 0 \mod 2$$
, wenn $p = 4n + 1$, $b \equiv 1 \mod 2$, wenn $p = 4n + 3$.

1 und p-1 genügen der Congruenz $x^2 \equiv 1 \mod p$, sind also, da diese Congruenz nicht mehr als zwei Wurzeln hat, sämmtliche Wurzeln derselben, so dass $b \leq 2$. 1 ist Rest aller Primzahlen, so dass sich ergiebt:

 $p-1 \equiv -1 \mod p$ ist quadratischer Rest von p = 4n+1, da $b \equiv 0 \mod 2$ sein muss, dagegen quadratischer Nichtrest von p = 4n+3. da hier $b \equiv 1 \mod 2$ sein muss, q. e. d.

Der Nachweis der Richtigkeit der Formel II) ist von Gauss!) durch vollständige Induction geführt worden. Der Satz gilt zunächst, wie Zahlenbeispiele zeigen, für Primzahlen kleiner als z. B. 100. Wäre num jenseits $100 \left(\frac{2}{t}\right) = +1$, wobei t zunächst eine Primzahl von der Forme $8n \pm 3$ sein möge, so setzt Gauss $2 = a^2 \mod t$, wobei a ungerade und kleiner als t sein soll; dann ist in $-2 = -a^2 + tu$, u von der Forme $8n \mp 3$ und kleiner als t, und überdies $\left(\frac{2}{u}\right) = +1$. Nimmt man num an, dass t jenseits 100 die kleinste Zahl ist, für welche $\left(\frac{2}{t}\right) = 1$ is so widerspricht dem, dass in $\left(\frac{2}{u}\right) = 1$ u < t ist, und man erhalt demnach $\left(\frac{2}{t}\right) = -1$, wenn $t = 8n \pm 3$ ist. Ganz analog ist der Nacweis für t = 8n + 5, 7; nur muss da an Stelle von 2, -2 eingeführt werden.

2. Beweis der Ergänzungssätze durch Reduction.

Petersen²) legt bei seinem Beweise des quadratischen Reciprocitätsgesetzes Modulo der Primzahl p das halbe Restsystem 1, 3, 5, ... p-2 zu Grunde, lässt also nur ungerade Zahlen kleiner als p zu, und definirt μ in $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\mu}$ als die Anzahl der negativen ungeraden Reste kleiner

¹⁾ Gauss, D. A., Art. 112flgg.

²⁾ S. 53 der cit. Abh. im Am. J. of Math. vom Jahre 1879.

als p in q, 3q, ... (p-2)q. Für q=-1 ergiebt sich sofort μ als die Anzahl der negativen ungeraden Reste in -1, -3, ... -(p-2), so dass $\mu=\frac{p-1}{2}$ wird.

Ganz analog ist in $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\mu}$ μ die Anzahl der negativen ungeraden Reste kleiner als p in

A)
$$2, 2.3, 2.5, \ldots 2(p-2) \mod p$$
.

Da nun $2(p-a)+2a \equiv 0 \mod 2$ ist, so ergiebt sich z. B. für

$$p = 8n + 1$$
, $\mu = \frac{\frac{p-1}{2}}{2} = 2n$, also $(\frac{2}{p}) = 1$.

Ganz ebenso ist das Verfahren für p = 8n - 1, 8n + 3, 8n + 5, nur dass in den beiden ersteren Fällen das Mittelglied der Reihe A) besonders zu beachten ist.

3. Beweis der Ergänsungsformel $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$ durch Sätse aus der Kreistheilung.

Wir hatten gefunden (cfr. Cap. IV), dass

$$G = \Sigma r^a - \Sigma r^b = \sqrt{(-1)^{\frac{p-1}{2}}} p; \quad \Sigma r^a + \Sigma r^b = -1,$$

woraus

$$\Sigma r^a = (-1+G) \frac{1}{2}$$

folgt. Da nun

$$\sum_{a} r^{ka} + \sum_{b} r^{kb} = -1 \text{ und } \sum_{a} r^{ka} - \sum_{b} r^{kb} = \left(\frac{k}{p}\right)G$$

ist, so wird

2)
$$\Sigma r^{ka} = \frac{1}{2} \left(-1 + \left(\frac{k}{\nu} \right) G \right).$$

Die Formeln 1) und 2) ergeben aber:

3)
$$(\Sigma r^a)^2 - \Sigma r^{2a} - \frac{3 + (-1)^{\frac{p-1}{2}}p}{4} = \frac{1}{2} \left(1 + \left(\frac{2}{p} \right) \right) G,$$

woraus sich, da die rechte Seite ja eine ganze Zahl sein muss, unsere Formel ableitet.

Beweis der Ergänzungssätze mit Hilfe der Theorie der quadratischen Formen.¹)

Für die Determinante D=4n+1=p ist (-1,0,p) eine ursprüngliche Form 1. Art, die dem Hauptgeschlecht angehört. Es ist also -1 quadratischer Rest von p. Wäre nun auch für p=4n+3, -1 quadratischer Rest, wäre also $-1=b^2-cp$, so gäbe es eine Form, ursprünglich und 1. Art (p, b, c) von der Determinante -1, welche den

¹⁾ Gauss, D. A., Art. 262.

Charakter -1 haben müsste, was nicht möglich ist; folglich ist -1 quadratischer Nichtrest von p, was zu erweisen war.

Methodisch von dem eben Gesagten ist durchaus nicht verschieden der Nachweis für $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{5}}$, weshalb er übergangen werden mag. Bemerkt soll nur noch werden, dass für:

$$p = 4n + 1 \begin{cases} \equiv 9 \mod 16 \\ \equiv 1 \mod 16 \end{cases}$$
 die Form
$$\begin{cases} \left(8, 1, \frac{1-p}{8}\right) \\ \left(8, 3, \frac{q-1}{8}\right) \end{cases}$$
 und die Determ. p ;

$$p \equiv 7 \mod 8 \text{ die Form } (p, b, c) \text{ und die Determ. } 2,$$

$$p = \pm 3 \mod 8 \text{ n n } (p, b, c) \text{ n n n 2}$$

zu benutzen sind.

II. Das verallgemeinerte Reciprocitätsgesetz.

Wie wir gesehen haben, wurde das quadratische Reciprocitätsgesetz durch die drei Formeln ausgedrückt:

I)
$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$
; II) $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$; III) $\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}$.

Hierin waren p und q als verschiedene positive ungerade Primzahlen vorausgesetzt. Diese Formeln lassen sich zunächst verallgemeinern für negative Primzahlen. In der That erhält man, wenn man setzt

$$p = \varepsilon \mid p \mid, \quad q = \delta \mid q \mid \quad (\varepsilon, \delta = \pm 1):$$

$$1) \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{\mathfrak{o} p - 1}{2}}, \quad \text{II} \right) \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2 - 1}{2}},$$

$$\text{III} \right) \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = \frac{\mathfrak{o} p - 1}{2} \cdot \frac{\mathfrak{d} q - 1}{2} + \frac{\mathfrak{o} - 1}{2} \cdot \frac{\mathfrak{d} q - 1}{2} + \frac{\mathfrak{d} - 1}{2} \cdot \frac{\varepsilon p - 1}{2} \cdot \frac{\varepsilon p - 1}{2} \cdot \frac{\mathfrak{o} p - 1}{2} \cdot \frac{\mathfrak{d} q - 1}{2} \cdot$$

Mit Hilfe der Jacobi'schen Verallgemeinerung des Legendre'schen Symbols (cfr. Cap. I S. 174) und einer leichten Zwischenrechnung (cfr. S. 180) findet man ferner, dass diese drei Formeln auch giltig bleiben für zusammengesetzte Zahlen. Sind nämlich P und Q zwei theilerfremde ungerade Zahlen und setzt man

$$P = \varepsilon |P|, \quad Q = \delta |Q|,$$

so ergiebt sich:

$$\begin{split} \text{III)} \ \left(\frac{-1}{P}\right) &= (-1)^{\frac{\mathfrak{o}P-1}{2}}, \quad \text{II)} \ \left(\frac{2}{P}\right) = \frac{P^{\mathfrak{o}-1}}{8}, \\ \text{III)} \ \left(\frac{P}{Q}\right) \left(\frac{Q}{P}\right) &= (-1)^{\frac{\mathfrak{o}P-1}{2} \cdot \frac{\mathfrak{d}Q-1}{2} + \frac{\mathfrak{o}-1}{2} \cdot \frac{\mathfrak{d}Q-1}{2} + \frac{\mathfrak{d}-1}{2} \cdot \frac{\mathfrak{o}Q-1}{2}}. \end{split}$$

Sind schliesslich P und Q nicht relativ prim, so verliert das Symbol $\left(\frac{P}{Q}\right)$ seinen Sinn. In diesem Falle sagt man: $\left(\frac{P}{Q}\right)$ ist Null.

¹⁾ Vergl. auch Busche, Dissert., Göttingen 1883.

Hier ist auch noch zu erwähnen die Verallgemeinerung des Gaussschen μ -Lemmas von Schering.¹) Diese Verallgemeinerung besteht darin, dass Schering zeigt, dass, wenn A und P zwei ganze Zahlen sind und ausserdem P relativ zu 2A ist: $\left(\frac{A}{P}\right) = (-1)^{\mu}$ wird, wo μ die Anzahl der negativen absolut kleinsten Reste in der Zahlenreihe:

$$A, 2A, 3A, \cdots \frac{P-1}{2} A \mod P$$

bedeutet. In der zu zweit citirten Abhandlung (Act. math. 1880) hat Schering hierfür einen einfachen arithmetischen Beweis gegeben.

Zu der Schering'schen Verallgemeinerung des Gauss'schen Lemmas ist wieder zu bemerken, dass Kronecker in einer 1876 in den Berliner Monatsberichten S. 301 abgedruckten Abhandlung darauf hinweist, dass er jene Verallgemeinerung schon seit 1869/70 in seinen Collegien vorgetragen habe. — Gestützt auf jenes verallgemeinerte Lemma hat nun Genocchi³) für die Richtigkeit von Formel III) einen sehr einfachen Beweis erbracht. Dieser schliesst sich aber dem von demselben Autor im III. Cap. Mitgetheilten so innig an, dass wir ihn hier übergehen dürfen.

VIII. Capitel.

Algorithmen zur Bestimmung des quadratischen Rest- oder Nichtrestcharakters einer Zahl in Bezug auf eine andere.

Im Folgenden wollen wir einige Arten der Bestimmung des Symbols $\left(\frac{a}{b}\right)$ darstellen. Es sind dazu im Wesentlichen zwei Methoden angewendet worden. Die eine gründet sich auf die directe Anwendung des Reciprocitätssatzes, die andere auf die Entwickelung des Bruches $\frac{a}{b}$ in einen Kettenbruch. Bei dieser letzteren Bestimmung ist noch zu unterscheiden, dass $\left(\frac{a}{b}\right)$ abhängig gemacht worden ist einmal von den Quotienten und zweitens von den Resten, die bei jener Kettenbruchentwickelung auftreten. Die erste Methode wird ohne Weiteres aus einem Beispiele klar. Es sei $x=\left(\frac{3}{3}\frac{4}{3}\frac{4}{3}\right)$ zu bestimmen. Da ist zunächst:

$$x = (\frac{365}{847}) = (\frac{847}{865}), \text{ weil } 365 \equiv 1 \text{ mod } 4,$$

$$= (\frac{117}{865}) = (\frac{365}{117}) = (\frac{14}{117}) = (\frac{117}{14}) = (\frac{5}{14}),$$

$$= (\frac{14}{5}) = (\frac{-1}{5}) = 1, \text{ also}$$

$$(\frac{365}{847}) = +1.$$

¹⁾ Berliner Monatsber. 1876, S. 300. — Act, math, I, 1880.

²⁾ Comptes Rendus, XC (1880) 8. 800.

I. Verfahren von Eisenstein. $x = (\frac{2933}{3785})$.

$$3785 = 2933 \cdot 2 - 2081$$
, $279 = 181 \cdot 2 - 85$; $2933 = 2081 \cdot 2 - 1229$, $181 = 85 \cdot 2 - 11$; $2081 = 1229 \cdot 2 - 377$, $85 = 11 \cdot 8 - 3$; $1229 = 377 \cdot 4 - 279$, $11 = 3 \cdot 4 - 1$; $377 = 279 \cdot 2 - 181$,

wonach $(\frac{2933}{8}) = 1$ folgt.

II. 1. Verfahren von Lebesgue:

$$3785 = 2933 \cdot 1 + 4 \cdot 213,$$

 $2933 = 213 \cdot 13 + 4 \cdot 41,$
 $213 = 41 \cdot 5 + 8,$
 $\mu = 0;$
 $\nu = 0;$

so dass ebenfalls $(\frac{2933}{3785}) = 1$ sich ergiebt.

2. Verfahren von Lebesgue:

Hieraus folgt: $\lambda = 0$, $\mu = 1$, $\nu = 1$, so dass $(\frac{2933}{3785}) = (-1)^2 = +1$ ist.

NB. Wenn ein Rest $\pm 2^m r^z$ wird, so sind die folgenden Operationen unnütz.

III. Die Algorithmen von Gegenbauer.1)

Während Gauss beliebige Reste, Eisenstein nur ungerade, Lebesgue nur gerade Reste zulässt, nimmt Gegenbauer zur Ableitung seiner Algorithmen abwechselnd gerade und ungerade Reste. Sind a und b ungerade und relativ prim, und a > b, so entwickelt Gegenbauer $\frac{-2b}{a}$ in einen Kettenbruch, dessen Theilzähler sämmtlich -1, dessen Theilnenner gerade sind. Die Reste sind dann abwechselnd gerade und ungerade; sind ihre Vorzeichen ε , so ist dann:

$$\left(\frac{b}{a}\right) = \left(-1\right)^{\frac{1}{8}\left\{2\sum_{\lambda}\epsilon_{\lambda} - 1 + (a-1)^{2}\right\}}.$$

Ist nun $a = +1 = \epsilon \mod 4$, so wird:

$$\left(\frac{b}{a}\right) = \left(-1\right)^{\frac{1}{b}\left\{2\sum_{i} \epsilon_{\lambda} \epsilon_{\lambda-1} + (\epsilon-1)^{2}\right\}};$$

b ist mithin Rest von a, wenn $\sum_{\ell_1 \ell_{1-1}} = -\frac{(\epsilon-1)^2}{2} \mod 8$, und b ist Nichtrest von a, wenn $\sum_{\ell_1 \ell_{1-1}} = 4 - \frac{(\epsilon-1)^2}{2} \mod 8$. Mit anderen

¹⁾ Wiener Ber. 1880, S. 981.

Worten: $\left(\frac{b}{a}\right) = +1$, wenn die Anzahl der Zeichenfolgen in der Reihe der ε_{λ} vermindert um die Anzahl der Zeichenwechsel congruent 0 oder 6 mod 8 ist; dagegen wird $\left(\frac{b}{a}\right) = -1$, wenn jene Differenz congruent 2 oder 4 mod 8 ist. Denn $\varepsilon_{\lambda} \varepsilon_{\lambda-1}$ ist positiv, wenn zwischen $\varepsilon_{\lambda-1}$ und ε_{λ} Zeichenfolge, dagegen negativ, wenn zwischen diesen Grössen Zeichenwechsel stattfindet.

Beispiel. Es ist $x = (\frac{1}{9},\frac{7}{8})^1$) zu bestimmen:

$$-346 = 913$$
. $0 -346$, $-29 = -20$. $2 + 11$; $-913 = -346$. $2 -221$, $20 = 11$. $2 - 2$; $+346 = -221$. $(-2) - 96$, $-11 = -2$. $6 + 1$; $+221 = -96$. $(-2) + 29$; $96 = 29$. $4 - 20$.

Die Anzahl der Zeichenfolgen ist 1, die der Wechsel 5, folglich wird: $(\frac{1}{9},\frac{7}{8})=-1.$

Das zweite von Gegenbauer angegebene Verfahren zur Bestimmung von $\left(\frac{a}{b}\right)$ besteht darin, dass er $\frac{a}{2\,b}$, worin a und $2\,b$ relativ prim sind, in einen Kettenbruch entwickelt, dessen Theilzähler wiederum gleich -1. dessen Theilnenner ungerade sind; dann sind wiederum die Reste abwechselnd gerade und ungerade. Durch die vorigen ganz analogen Schlüsse zeigt so Gegenbauer, dass $\left(\frac{b}{a}\right) = +1$ wird, wenn die Anzahl der Zeichenfolgen, vermindert um die Anzahl der Zeichenwechsel (bei den Resten) $mod\,8$ congruent 1 oder 7 ist, dass dagegen $\left(\frac{b}{a}\right) = -1$ wird, wenn jene Differenz congruent 3 oder 5 $mod\,8$ ist.

IV. Ein Algorithmus von Kronecker.3)

Um $\left(\frac{-n_1}{n_0}\right)$ zu bestimmen, worin $|n_0| > |n_1|$ sein soll, bildet Kronecker den Algorithmus:

$$\begin{cases}
 n_{ij} = 2r_1 & n_1 - n_2, \\
 n_1 = 2r_2 & n_2 - n_3, \\
 \vdots & \vdots & \vdots \\
 n_{r-2} = 2r_{r-1}n_{r-1} - 1.
\end{cases}$$

Die n seien sämmtlich ungerade und $|n_k| > |n_{k+1}|$. Ist φ die Anzahl der Folgen, ψ die Anzahl der Wechsel in der Reihe der Vorzeichen der Zahlen

 $^{1,} n_0, n_1, \ldots \mp 1,$

¹⁾ Dies Beispiel ist von Gegenbauer, dem aber ein Fehles un ist. Anstatt 96:29 steht bei Gegenbauer 96:27 v.s.f.

²⁾ Berl. Mon. Ber. 1884, S. 519.

aber φ' die Anzahl der Folgen und ψ' die Anzahl der Wechsel in der Beihe der Modulo 4 genommenen Zeichenwerthe derselben Zahlen, so ist $\left(\frac{-n_1}{n}\right)$ $=(-1)\frac{1}{2}(\varphi-\varphi')=(-1)\frac{1}{2}(\psi-\psi').$

Beispiel:
$$\left(\frac{-n_1}{n_0}\right) = \left(\frac{-105}{143}\right)$$
. Der Algorithmus ist:
 $143 = 2.105 \qquad -67$
 $105 = 2.67 \qquad -29$
 $67 = 2.29 \qquad +9$
 $29 = 2.(-2)(-9) = 7$
Om ist upgere Reibe der Zahlen m:

Dann ist unsere Reihe der Zahlen n:

1, 143, 105, 67, 29,
$$-9$$
, 7, -5 , 3, -1 .

Die Reihe ihrer Zahlenwerthe Modulo 4 ist:

$$1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1,$$

so dass $\varphi = \varphi' = 4$ and $\psi = \psi' = 5$ wird, woraus

$$\left(\frac{-105}{143}\right) = 1$$

folgt.

(Schluss folgt.)

Bibliographie

vom 1. Juli bis 31. August 1885.

Periodische Sehriften.

Sitzungsberichte der königl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, mathematisch-physikal. Classe. 1885, I und II. Leipzig, Hirzel. 2 Mk.
Sitzungsberichte der mathemphysikal. Classe der königl. bayer. Akademie
der Wissenschaften. Jahrgang 1885, Heft 2. München, Franz.
1 Mk. 20 Pf.
Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, mathe-
matnaturwissenschaftl. Classe, Abtheilung II. 91. Bd., 1. u. 2. Heft.
Wien, Gerold. 5 Mk. 50 Pf.
Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, mathemnatur-
wissenschaftl. Classe. 49. Bd. Ebendas. 38 Mk.
Mathematische Annalen, herausgegeben von F. Klein u. A. Mayer. 26. Bd.
(4 Hefte). 1. Heft. Leipzig, Teubner. compl. 20 Mk.
Mathematisch-naturwissenschaftliche Mittheilungen, herausgeg. v. O. Böklen.
2. Heft, 1885. Tübingen, Fues. 2 Mk.
Astronomische Nachrichten, herausgeg. von A. Krüger. 112. Bd. Nr. 1.
Hamburg, Mauke Söhne. compl. 15 Mk.
Vierteljahrschrift der astronomischen Gesellschaft, herausgeg. von E. Schön-
FELD u. H. SEELIGER. 19. Jahrg. (1884), 4. Heft. Leipzig, Engel-
mann. 2 Mk.
, 20. Jahrg. (1885), 1. u. 2. Heft. Ebendas. 4 Mk.
Stern-Ephemeriden für das Jahr 1887. Berlin, Dümmler. 6 Mk.
Nautisches Jahrbuch für das Jahr 1888, herausgegeben vom Reichsamt d. I.
Berlin, Heymann. 1 Mk. 50 Pf.
Astronomisch-geodätische Arbeiten in den Jahren 1883 und 1884, heraus-
gegeben vom königl. preuss. geodät. Institut. Berlin, Friedberg & Mode.
13 Mk. 50 Pf.
Beobachtungen der meteorolog. Stationen im Königreich Bayern, herausgeg-
von W. v. Bezold u. C. Lang. 7. Jahrg. (1885), 1. Heft. München,
Ackermann. compl. 18 Mk.
Bibliotheca historico-naturalis, physico-chemice ** R. v.
HANSTEIN. 34. Jahrg. 2. Heft, Ju
Vandenhoeck & Ruprecht.
A STATE OF THE COLUMN TO A THE COLUMN TO THE

Geschichte der Mathematik und Physik.

- OPPERT, J., Die astronomischen Angaben der assyrischen Keilinschriften.

 (Akad.) Wien, Gerold.

 30 Pf.
- Henrici, J., Die Erforschung der Schwere durch Galilei, Huygens und Newton. Leipzig, Teubner. 60 Pf.
- OFTERDINGER, L., Joh. Gottl. Friedr. v. Bohnenberger. Tübingen, Fues. 50 Pf.
- RÜHLMANN, M., Vorträge über die Geschichte der Mechanik. Leipzig, Baumgärtner. 14 Mk.
- ALBRECHT, G., Geschichte der Elektricität und ihrer Anwendungen. Wien, Hartleben. 3 Mk.

Reine Mathematik.

- HERZ, N., Siebenstellige Logarithmen der trigonometrischen Functionen für jede Zeitsecunde. Leipzig, Teubner.

 4 Mk.
- Stolz, O., Vorlesungen über allgemeine Arithmetik. 1. Thl.: Die reellen Zahlen. Ebendas. 8 Mk.
- GEGENBAUER, L., Ueber den grössten gemeinschaftlichen Divisor. (Akad.)
 Wien, Gerold.
 25 Pf.
- ---, Ueber die Divisoren der ganzen Zahlen. Ebendas. 45 Pf.
- -, Asymptotische Gesetze der Zahlentheorie. Ebendas. 2 Mk. 40 Pf.
- ----, Arithmetische Notiz. Ebendas. 20 Pf.
- ---, Ueber die ganzen complexen Zahlen. Ebendas. 25 Pf.
- SICKENBERGER, A., Die Determinanten in genetischer Behandlung. München, Ackermann. 1 Mk. 20 Pf.
- MERTENS, F., Ueber eine Formel der Determinantentheorie. (Akad.) Wien, Gerold. 30 Pf.
- Weiss, E., Notiz über zwei der Binomialreihe verwandte Reihen. Ebendas. 20 Pf.
- WINCKLER, A., Ueber die linearen Differentialgleichungen II. Ordn., zwischen deren partikulären Integralen eine Relation besteht. Ebendas, 50 Pf.
- MERTENS, F., Zur Theorie der elliptischen Functionen. Ebendas. 20 Pf.
- KLEIN, F., Ueber die elliptischen Normalcurven n^{ter} Ordnung und zugehörige Modulfunctionen n^{ter} Stufe. Leipzig, Hirzel. 1 Mk. 80 Pf.
- WIENER, H., Rein geometrische Darstellung binärer Formen durch Punktgruppen auf Geraden. Darmstadt, Brill. 2 Mk. 50 Pf.
- Bobek, K., Ueber gewisse eindeutige involutorische Transformationen der Ebene. (Akad.) Wien, Gerold. 70 Pf.
- MERTENS, F., Ueber die Gleichung des Strahlencomplexes, welcher aus allen, die Kanten des gemeinschaftlichen Poltetraeders zweier Flächen II. Ordnung schneidenden Geraden besteht. Ebendas. 20 Pf:
- LE PAIGE, C., Ueber die Hesse'sche Fläche der Fläche III. Ordnung. Ebendas.

1 Mk. 60 Pf.

- EBERHARD, V., Ueber eine räumliche involutorische Verwandtschaft 7. Grades und ihre Kernfläche 4. Ordn. (Dissert.) Breslau, Köhler. 1 Mk.
- Graefe, F., Aufgaben und Lehrsätze aus der analytischen Geometrie der Ebene. Leipzig, Teubner. 2 Mk. 40 Pf.
- MEYER, F., Rein-geometrische Beweise einiger fundamentalen Kegelschnittsätze. Tübingen, Fues.

 40 Pf.
- Petersen, J., Lehrbuch der Stereometrie. Kopenhagen, Höst & S.
- —, Die ebene Trigonometrie und die sphärischen Grundformeln. Ebendas.

 1 Mk. 25 Pf.
- Euclidis opera omnia. Ed. L. Heiberg et H. Menge. Vol. 4. Leipzig, Teubner. 4 Mk. 50 Pf.

Angewandte Mathematik.

- KOPALIK, J., Vorlesungen über die Chronologie des Mittelalters. Wien, Kirsch.
- Kraft, F., Sammlung von Problemen der analytischen Mechanik. 11. Lief. (Schluss.) Stuttgart, Metzler. 2 Mk.
- Herz, N., Entwickelung der störenden Kräfte nach Vielfachen der mittleren Anomalie in independenter Form. (Akad.) Wien, Gerold. 80 Pf.
- WITTRAM, TH., Zur Berechnung der speciellen Störungen der kleinen Planeten. (Dissert.) Dorpat, Karow. 1 Mk. 50 Pf.
- Hamburger, M., Ueber die Zeitdauer des Stosses elastischer Stäbe. (Dissert.)
 Breslau, Köhler.

 1 Mk.
- LITTMANN, O., Ueber das Verhältniss von Längsdilatation und Quercontraction elastischer Metallcylinder. (Dissert.) Ebendas. 1 Mk.
- Brinckmann, O., Ueber die Bewegung eines materiellen Punktes auf einem Rotationsparaboloid. (Dissert.) Jena, Neuenhahn. 2 Mk.
- Bender, E., Ueber stehende Schwingungen einer Flüssigkeit, die auf einer festen Kugel ausgebreitet ist. Kiel, Lipsius & Tischer. 1 Mk.
- Gusinde, O., Ueber den Ausfluss von Wasser aus kleinen kreisförmigen Oeffnungen. (Dissert.) Breslau, Köhler. 1 Mk.
- MAYER, J., Sternkarte mit beweglichem Horizont. (Lithogr.) Hierzu Text:
 Astrognosie. Schaffhausen, Rothermel.

 4 Mk.
- Krüger, A., Zonenbeobachtungen der Sterne zwischen 55° und 56° nördlicher Declination, angestellt zu Helsingfors und Gotha. 2. Bd. Leipzig, Engelmann.
 20 Mk.
- Paulus, Ch., Tafeln zur Berechnung der Mondphasen. Tübingen, Fues. 1 Mk. 80 Pf.
- MAHLER, E., Die centralen Sonnenfinsternisse des XX. Jahrhund. (Akad.) Wien, Gerold.
- —, Astronomische Untersuchung über die in de tische Finsterniss. Ebendas.

- Lippich, F., Ueber polaristrobometrische Methoden, insbesondere über Halbschattenapparate. Ebendas. 80 Pf.
- Waltenhofen, A. v., Die internationalen absoluten Maasse, besonders für Elektricität. Braunschweig, Vieweg. 2 Mk.

Physik und Meteorologie.

- WÜLLNER, A., Lehrbuch der Experimentalphysik. 3. Bd.: Wärmelehre. 4. Aufl. Leipzig, Teubner. 12 Mk.
- Wiedemann, G., Die Lehre von der Elektricität. 4. Bd. 2. Abth. (Schluss.)
 Braunschweig, Vieweg. 25 Mk. compl. 108 Mk.
- CZERMAK, P. u. R. HIECKE, Pendelversuche. (Akad.) Wien, Gerold.

 2 Mk. 40 Pf.
- EXNER, F., Ueber eine neue Methode zur Grössenbestimmung der Moleküle.

 Ebendas.

 45 Pf.
- HEPPERGER, J. v., Ueber die Verschiebung des Vereinigungspunktes der Strahlen beim Durchgange eines Strahlenbüschels durch ein Prisma. Ebendas. 50 Pf.
- AULINGER, E., Ueber das Verhältniss der Weber'schen Theorie der Elektrodynamik zum Hertz'schen Princip der Einheit der elektrischen Kräfte. Ebendas.

 30 Pf.
- KLEMENČIČ, J., Experimentaluntersuchung über die Dielektricitätsconstanten einiger Gase und Dämpfe. Ebendas. 1 Mk. 20 Pf.
- Lang, V. v., Messung der elektromotorischen Kraft des elektrischen Lichtbogens. Ebendas. 20 Pf.

Historisch-literarische Abtheilung.

Ueber das quadratische Reciprocitätsgesetz.

Eine vergleichende Darstellung der Beweise des Fundamentaltheoremes in der Theorie der quadratischen Reste und der denselben zu Grunde liegenden Principien.

> Von OSWALD BAUMGART.

> > (Schluss.)

Zweiter Theil.

Vergleichende Darstellung der den Beweisen für das quadratische Reciprocitätsgesetz zu Grunde liegenden Principien.

I. Capitel.

Gauss' Beweis durch vollständige Induction.

Wie schon im zweiten Capitel des ersten Theiles bemerkt wurde, unterscheidet Gauss bei seinem ersten Beweise acht verschiedene Fälle. Dadurch erhält der Beweis eine solche Ausdehnung, dass man ihn für nicht recht geeignet zur Begründung des so einfachen Gesetzes halten könnte. Indess ist dieser Mangel an Kürze nicht auf die dem Beweise zu Grunde liegenden Principien zurückzuführen, sondern auf die Bezeichnungsweise.

Gauss schreibt nämlich p R q an Stelle von $\left(\frac{p}{q}\right) = +1$ und p N q für $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$. Dadurch wird er gezwungen, jene acht Fälle zu unterscheiden, was eben durch Anwendung des Legendre'schen Zeichens zu vermeiden gewesen wäre. In der That haben wir gesehen, dass sich durch jene Bezeichnung die acht von Gauss unterschiedenen Walla auf zwai reduciren lassen. Dirichlet¹) hat zuerst auf jener

¹⁾ Crelle J., XLVII, 8. 189.

Gauss'schen Beweises hingewiesen und den Beweis unter Anwendung des Legendre-Jacobi'schen Symboles dargestellt. Wir sind ihm gefolgt.

Nach dieser Bemerkung, die sich auf das rein Formale an unseren Beweise bezieht, gehen wir auf das Wesen desselben näher ein. Der allgemeine Eindruck ist da zunächst hohe Befriedigung darüber, dass der Beweis "nirgend das Gebiet der Congruenzen 2. Grades verlässt".). Alle anderen Beweise, mögen sie sich auch durch besondere Kürze und Eleganz auszeichnen, lassen diese Einfachheit vermissen. Gauss?) selbst sagt von seinem ersten Beweise: "Sed omnes hae demonstrationes, etiamsi respecturigoris nihil desiderandum relinquere videantur, e principiis nimis heterogeneis derivatae sunt, prima forsan excepta quae tamen per ratiocinia magis laboriosa procedit, operationibus proxilioribus premitur."

Das Fundamentalprincip nun unseres Beweises kann man kurz das Princip der vollständigen Induction nennen. Der Umstand nämlich, dass das Gesetz gilt für die beiden kleinsten ungeraden Primzahlen 3 und 5, regte in Gauss den genialen Gedanken an, von den Zahlen 3 und 5 successive aufsteigend zu grösseren und grösseren Primzahlen, das Gesetz darzuthun.

Dieser Gedanke musste aber formulirt werden, um mathematische Deductionen aus ihm möglich zu machen. Dies ist von Gauss durch folgenden Schluss geschehen: Gilt das Gesetz für alle Primzahlen untwhalb q, und sind p und p' zwei solche Primzahlen kleiner als q, für die also $\binom{p}{p'}\binom{p'}{p}=(-1)^{\frac{p'-1}{2}\cdot\frac{p-1}{2}}$ ist, und kann man daraus die Richtigkeit des Fundamentaltheorems für p und q (p' und q sagt dasselbe) darthun, so ist das Gesetz in seiner Allgemeinheit bewiesen, eben der Eigenschaften der Zahlen 3 und 5 halber. Es stellte sich nun aber der Beweisführung ein grosses Hinderniss in den Weg, was Gauss zur Unterscheidung seiner acht Fälle nöthigte. Der Beweisgang hängt nämlich so intensiv von den Eigenschaften von p und q ab, dass eine Verschiedenheit dieser Eigenschaften verschiedene Methoden nöthig machte. Wie schon bemerkt, kommt man bei passender Bezeichnung nicht auf acht, aber doch auf zwei wesentlich verschiedene Fälle. Diese sind:

- I. Sind q und $\alpha < q$ beliebige ungerade Primzahlen, q positiv, α positiv oder negativ, und ist $\left(\frac{\alpha}{q}\right) = +1$, so ist zu zeigen, dass $\left(\frac{q}{\alpha}\right)\left(\frac{\alpha}{q}\right) = (-1)^{\frac{\alpha}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}}$.
- II. Sind q=4n+1 und p < q beliebige positive ungerade Primzahlen und ist $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$, so ist zu zeigen, dass ebenfalls $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$

¹⁾ Crelle J., XLVII, S 139.

²⁾ Gauss: Comm. soc. Gott. XVI, S. 70 oder Gauss' Werke II, S. 4.

Die Verificirung der in I. aufgestellten Behauptung war für Gauss verhältnissmässig leicht, weil die Annahme $\left(\frac{\alpha}{q}\right) = +1$ sofort eine weitere Handhabe zur Beweisführung lieferte, insofern als nämlich die Congruenz $x^2 \equiv \alpha \mod q$ möglich war. Die Einführung einer Hilfsgrösse f und die Benutzung der auf einfache Weise darlegbaren Eigenschaften derselben führte sofort zum Ziele. Ist e die gerade Wurzel unserer Congruenz $x^2 \equiv \alpha$ mod q, so ist jene Hilfsgrösse f definirt durch:

A)
$$e^2 = \alpha + fq.$$

Die Unterscheidung der beiden Fälle f und e relativ prim zu α und f und e theilbar durch α ergiebt auf einfache Weise unter Benutzung unserer allgemeinen Annahme die Richtigkeit des Theoremes.

Der zweite Punkt war nun viel schwieriger zu erledigen, und erst nach einem Jahre mühevollen Nachdenkens (am 29. April 1796) waren alle Hindernisse überwunden. "Gauss1) zeichnete sich selbst das Datum dieser Entdeckung auf, wie er ein Gleiches bei anderen seiner grossen Schöpfungen gethan hat." Die fragliche Schwierigkeit liegt darin, dass die Annahme $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$

sich mathematisch nicht formuliren lässt, da eben die Unmöglichkeit von $x^2 \equiv p \mod q$

nicht durch eine Formel, die mit dieser Congruenz in unmittelbarem Zusammenhange steht, darstellbar ist. Diese Thatsache machte einen Hilfssatz nöthig, dessen Formulirung und Begründung Gauss' ganzen Scharfsinn herausforderte. Kronecker²) nennt die Begrundung dieses Hilfssatzes neine Kraftprobe Gauss'schen Geistes". Jener Hilfsatz aber heisst: Es giebt stets eine positive ungerade Primzahl $p' \lt q$, von welcher q quadratischer Nichtrest ist. Der Vollständigkeit halber bemerke ich schon hier, dass dieser Satz nicht nur für q = 4n + 1, sondern auch dann gilt, wenn q die Form 4n+3 hat.³)

Für q = 8n + 5 ist der Satz unmittelbar evident; anders für q = 8n + 1. Wäre aber in diesem Falle q quadratischer Rest von allen Primzahlen kleiner als 2m+1 (< q), so müsste, wenn k eine Wurzel von

$$k^2 \equiv q \mod M; \quad M = (2n+1)!$$

$$k^2-1$$
 . $k^2-m^2=q-1$. $q-2^2$ $q-m^2$ mod M

wäre:
$$k^2-1$$
. $k^2-m^2=q-1$. $q-2^2$ $q-m^2$ mod M sein, d. h. $\frac{q}{(2m+1)!}\frac{q-1^2\cdot q-2^2\cdot ... \cdot q-m^2}{(2m+1)!}$ müsste eine ganze Zahl sein.

Die Unmöglichkeit hiervon ergiebt das Falsche der Annahme und zugleich, dass es stets eine Primzahl $p' < 2\sqrt{q} + 1$ giebt, von welcher q quadratischer Nichtrest ist.

¹⁾ C. F. Gauss. Festrede vo

²⁾ und 8) Kronecker, Mon

Es ist also
$$\left(\frac{q}{p'}\right) = -1$$
.

Um nun nachzuweisen, dass auch $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$ ist, genügt es jett!) darzuthun, dass

 $\left(\frac{q}{p\,p'}\right) = +1$

ist. Man sieht, der Hilfssatz war nur nöthig, das Kriterium $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$ in ein solches umzuformen, welches eine weitere mathematische Formulirung zuliess. Wir führen abermals eine Hilfsgrösse f ein, die, wenn e die gerade Wurzel < q von

ist, definirt wird durch

$$x^2 \equiv p p' \mod q$$

$$e^2 = p p' + fq.$$

Im weiteren Verlaufe des Beweises kommt es nun auf das Verhalten von e und f gegen p und p' an. Je nachdem nämlich e und f relativ prim zu p und p', p oder p', oder theilbar durch p und p' sind, macht sich eine verschiedene Behandlungsweise nöthig.

Principiell Neues kommt dabei nicht heraus.

Der erste Beweis von Gauss stützt sich also im Wesentlichen suf Eigenschaften von Zahlen f und f' in:

A)
$$e^{z} = \alpha + fq$$
 und

$$e^2 = p p' + f q.$$

Die beiden Gleichungen sind principiell nicht verschieden. Gleichung Abgeht dadurch, dass man in B) p'=1 setzt, aus B) hervor. Der Angelpunkt des Beweises liegt aber in der Aufstellung dieser Gleichungen, d. L. da eben A ein specieller Fall von B ist, in der Aufstellung der Gleichung B, mithin in dem Hilfssatze, dass es stets eine ungerade Primzahl

giebt, von der q quadratischer Nichtrest ist.

II. Capitel.

Ueber die Beweise durch Reduction.

Im III. Capitel des ersten Theiles sind zwölf Beweise reproducirt. Alle diese stützen sich auf ein und dasselbe Lemma, das wir in seiner Allegemeinheit kurz entwickeln wollen. Stellt

$$a_k = a_1, a_2, \ldots a_{\frac{q-1}{2}} (a_k < q)$$

ein beliebiges halbes Restsystem Modulo q dar, so wird

wiederum ein halbes Restsystem Modulo q geben. Die pa_k stehen mit den a_k in keiner Beziehung, können also mit denselben zusammenfallen oder

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass, wenn das Reciprocitätagesets für Primzahlen gilt, es auch für verallgemeinerte Restcharakteristiken gilt.

von denselben verschieden sein. Wir wollen uns das versinnlichen. Das vollständige Restsystem Modulo q wird offenbar dargestellt durch die in den beiden Verticalreihen enthaltenen Zahlen:

I. II.
$$\begin{array}{c|cc}
a_1 & -a_1 \\
a_2 & -a_2 \\
\vdots & \vdots \\
a_{q-1} & 2 \\
\end{array}$$

Die Reste pa_k werden dann in beiden Verticalreihen vorkommen konnen, nie aber doppelt in derselben Horizontalreihe, weil nie zwei Reste $a_k p$ Modulo q congruent sein können. Denn wäre z. B. $a_k p \equiv a_{k'} p \mod q$, so wäre $(a_k - a_{k'}) p \equiv 0 \mod q$ oder, da p und q Primzahlen sein sollen, $a_k - a_{k'} \equiv 0 \mod q$, was, da a_k und $a_{k'}$ Modulo q incongruent sind, nicht möglich ist. Kommen nun p Reste pa_k in der zweiten Verticalreihe vor, so werden wir erhalten:

$$p^{\frac{q-1}{2}}a_1, \ldots a_{\frac{q-1}{2}} \equiv (-1)^{\mu}a_1, \ldots a_{\frac{q-1}{2}} \mod q$$

$$p^{\frac{q-1}{2}} \equiv (-1)^{\mu} \mod q \text{ und } \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\mu}.$$

oder

Dies ist der Hilfssatz, auf den sich sämmtliche Beweise des III. Capitels stützen. Wir haben so das ursprüngliche Kriterium $\left(\frac{p}{q}\right) \equiv p^{\frac{q-1}{2}} \mod q$ reducirt auf $\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\mu}$. Nur aus diesem Grunde nenne ich die Beweise, denen dieses Lemma zu Grunde liegt, um unnöthige Weiterungen zu ersparen, Beweise durch Reduction. — Das Symbol $\left(\frac{p}{q}\right)$ ist also definirt durch $\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\mu}$, wo μ die Anzahl der Reste in $pa_1, pa_2, \ldots pa_{\frac{q-1}{2}}$ bedeutet, welche mit $a_1, \ldots a_{\frac{q-1}{2}}$ Modulo q nicht congruent sind.

Man kann nun bei den Beweisen für das quadratische Reciprocitätsgesetz die verschiedensten halben Restsysteme in Anwendung bringen, was auch geschehen ist. Der Eine benutzt ein halbes positives oder negatives absolut kleinstes Restsystem, der Andere die geraden Zahlen, wieder ein Anderer die ungeraden Zahlen unterhalb der in Frage kommenden Primzahl. Dies ist der erste Punkt, in dem sich die Beweise durch Reduction unterscheiden.

Wie aber μ die charakteristische Zahl von p in Bezug auf q ist, so giebt es eine dem μ ganz analoge Zahl ν , welche die charakteristische Zahl von q in Bezug auf p ist, so dass $\left(\frac{q}{i}\right) =$ dass, um das Reciprocitätsgesetz zu beweiss

die Differenz $\mu - \nu$ zu bestimmen hat. Dies kann in der Weise geschehen, dass man μ und ν getrennt, oder gleich ihre Summe resp. Differenz bestimmt. Hieraus ergiebt sich ein zweiter Punkt, in dem jene Beweise verschieden sein können und auch in der That verschieden sind.

Man kann ferner μ und ν zerlegen in $\mu = c + \mu'$, $\nu = c' + \nu'$, wo c und c' Constante sind — in den meisten Fällen Multipla von $2 - \mu'$ und ν' dagegen Zahlen, "welche die Eigenschaft der Reciprocität in einer leichter erkennbaren Form enthalten.") Diese Zerlegung von μ und ν ist auch vorgenommen worden.

Dies sind die drei wesentlichen Punkte, in denen sich unsere Beweise durch Reduction unterscheiden. Wir haben diese Bemerkungen zur allgemeinen Orientirung vorausgeschickt und gehen nun zur genaueren Betrachtung der Beweise über.

Wir beginnen mit Gauss' drittem Beweis. Gauss legt demselben ein halbes positives absolut kleinstes Restsystem zu Grunde. also Modulo der positiven ungeraden Primzahl q die Zahlen 1, 2. . . . $\frac{q-1}{2}$. Dann ist μ die Anzahl der negativen absolut kleinsten Reste in

$$p, 2p \cdots \frac{q-1}{2}p \mod q.$$

Gauss definirt nun $\left[\frac{x}{y}\right]$ als die grösste in $\frac{x}{y}$ enthaltene ganze Zahl und findet mit Hilfe von Sätzen über solche Grössen $\left[\frac{x}{y}\right]$

$$\mu = \sum_{k} \left\{ \left[\frac{2kp}{q} \right] - 2 \left[\frac{kp}{q} \right] \right\} = \sum_{k} \left[\frac{kp}{q} \right] \mod 2 \quad k = 1, \dots \frac{q-1}{2}.$$

Wird p < q vorausgesetzt, was keine Beschränkung ist, da die Primzahlen p und q ja von einander verschieden sein müssen, so kommen in $\mathcal{E}\left[\frac{pk}{q}\right]$ Glieder mehrfach vor. Die Bestimmung der Anzahl der Glieder, welche mehrfach vorkommen. führt zum Beweise unseres Satzes. Gauss transformirt so den Ausdruck $\mu = f(p, q)$ in $\mu = f(q, p) + c$, wo c eine angebbare Constante und zwar $c = 2 \cdot \text{ganz}$. Z. $+\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ ist.

Aehnlich wie Gauss verfährt Voigt, ein früh verstorbener Versicherungsbeamter aus Schwaben. Er wendet ebenfalls ein halbes positives absolut kleinstes Restsystem an und schliesst so: Ist $\left\lceil \frac{kp}{q} \right\rceil = h-1$, so wird kp einen negativen absolut kleinsten Rest Modulo q geben, wenn $(h-\frac{1}{2})$ q < kp < hq. Umgekehrt werden zu solchen Zahlen k, deren Anzahl übrigens $\left\lceil \frac{hp}{q} \right\rceil - \left\lceil \frac{h-\frac{1}{2}}{p} q \right\rceil$ ist, und die die vorstehende Ungleichheit erfüllen negative absolut kleinste Reste Modulo q gehören. Daher wird:

¹⁾ Schering, Gött. Nachr. 1879, 8. 21.

$$\mu \equiv \sum_{h} \left\{ \left[\frac{hq}{p} \right] - \left[\frac{(h-\frac{1}{2})q}{p} \right] \right\}, \quad h = 1, \dots \frac{p-1}{2},$$

da $\frac{p-1}{2}$ das Maximum von h wird. Durch Anwendung von Sätzen über Grössen [x] findet sich

$$\mu \equiv \sum_{h} \left[\frac{q}{2} - r_h \right] \mod 2 \left(r_h = \frac{h \, q}{p} - \left[\frac{h \, q}{p} \right] \right),$$

aus welcher Congruenz leicht die Legendre'sche Formel fliesst.

Der Unterschied des Voigt'schen Beweises von dem Gauss'schen ist der, dass Gauss μ umformt in $\mu \equiv \sum_{r} \left[\frac{kp}{q}\right] \mod 2 \ \left(k=1, \cdots, \frac{q-1}{2}\right)$ und nun die Anzahl der $\left[\frac{kp}{q}\right]$ bestimmt, welche denselben Werth h haben; ihre Anzahl ist: $\left[\frac{h+1}{p}q\right] - \left[\frac{hq}{p}\right]$. Durch Summation über h von 1 bis $\frac{p-1}{2}$ ergiebt sich dann $\mu = f(p,q) \equiv \frac{p-1}{2}, \frac{q-1}{2} - f(q,p) \mod 2$, unsere bekannte Formel. Voigt dagegen bestimmt sofort die Anzahl der kp, welche Modulo q negative absolut kleinste Reste lassen, und findet dieselbe bei vorgegebenem h gleich $\left[\frac{hq}{p}\right] - \left[\frac{h-\frac{1}{2}}{p}q\right]$, wobei $h-1 = \left[\frac{kp}{q}\right]$. Durch Summation über h erhält er ebenfalls das gewünschte Resultat.

Der eben behandelte dritte Beweis von Gauss, obwohl kurz und elegant, scheint seinen Autor aber noch nicht völlig befriedigt zu haben; vielleicht deshalb, weil darin die eine Primzahl vor der anderen bevorzugt wird. Derselbe Gedanke, der später zur Einführung der Determinanten Anlass gab, veranlasste wahrscheinlich auch Gauss, nach einem neuen Beweise zu suchen, um also nicht μ und ν getrennt, sondern sofort deren Summe Modulo 2 zu bestimmen. Und Gauss fand seinen fünften Beweis, der von dem erwähnten Mangel des dritten Beweises frei ist.

Die dem fünften Beweis von Gauss zu Grunde liegenden kleinsten Restsysteme sind: 1, 2, $\cdots \frac{p-1}{2}$ und 1, 2, $\cdots \frac{q-1}{2}$ Zur Bestimmung von $\mu + \nu$ wurde eine Hilfsreihe eingeführt:

A) 1, 2, . .
$$pq-1$$
,

und die Voraussetzung p < q gemacht. Die Glieder von A) haben nun in Bezug auf p und q als Moduln verschiedene Eigenschaften. Nimmt man nämlich ein beliebiges Glied aus A) heraus, so kann dies Modulo p oder q, oder aber Modulo p und q einem positiven oder negativen absolut kleinsten Rest geben, oder ein Vielfaches von p oder q, nie aber von p und q sein. Die Benutzung dieser Umstände führte nun zum Beweis des Fundamentaltheoremes.

Ist $(s)_{rR}$ die Anzahl der positiven absolut kleinsten Reste in $A(s=1, \dots \frac{pq-1}{2})$ Modulo pq, welche Modulo p positiven absolut kleinsten Resten, Modulo q aber negativen absolut kleinsten Resten congruent sind, so gelten die Formeln:

1)
$$(S)_{rR} = (s)_{Rr}, \quad (s)_{rR} + (S)_{rR} = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2},$$

worin S eine der Zahlen $\frac{pq+1}{2}$, \cdots pq-1 bedeutet und (S) in derselben Weise wie (s) zu verstehen ist.

Die
$$\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$$
 Zahlen ferner:
$$tq + R_q \quad \begin{pmatrix} t = 0, & \cdots & \frac{p-3}{2} \\ R_q = \frac{q+1}{2}, & \cdots & q-1 \end{pmatrix}$$

sind sämmtliche Zahlen s, welche Modulo q negative absolut kleinste Reste geben, und enthalten sämmtliche Zahlen pr_q $\left(r_q=1,\dots \frac{q-1}{2}\right)$. Theilt man sie Modulo p in drei Classen, jenachdem sie nach ihm positiven oder negativen absolut kleinsten Resten oder der Null congruent sind, so erhält man die Formel:

2)
$$(s)_{rR} + (s)_{RR} + \mu = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$$

wobei μ die Anzahl der pr_q ist, welche Modulo q negativen absolut kleinsten Resten congruent sind.

Mit Hilfe der $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ Zahlen endlich:

$$\tau p + R_p \quad \begin{pmatrix} \tau = 0, & \cdots & \frac{q-3}{2} \\ R_p = \frac{p+1}{2}, & \cdots & p-1 \end{pmatrix}$$

leitet man auf ganz analoge Weise, wie eben durchgeführt, die Formel ab:

3)
$$(s)_{Rr} + (s)_{RR} + v = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2},$$

worin ν die Anzahl der qr_p ist, welche Modulo p negativen absolut kleinsten Resten congruent sind.

Aus den Formeln 1), 2), 3) folgt unsere Formel:

$$2(s)_{RR} + \mu + \nu = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$$

Die Zahlen μ und ν werden in diesem Beweise in drei Summanden zerfällt, auf welche merkwürdige Zerlegung besonders hingewiesen sei; wir werden bei Bouniakowsky eine ähnliche finden.

Der fünfte Gauss'sche Beweis beruht also im Wesentlichen auf der Eintheilung und Abzählung der in der Reihe $1, 2, \ldots pq-1$ enthaltenen Zahlen:

$$tq + R_q \text{ und } \tau p + R_p$$
 $\begin{pmatrix} t = 0, & \cdots & \frac{p-3}{2}; & \tau = 0, & \cdots & \frac{q-3}{2} \\ R_q = \frac{q+1}{2}, & \cdots & q-1; & R_p = \frac{p+1}{2}, & \cdots & p-1 \end{pmatrix}$


und auf der Richtigkeit der Formel $(s)_{Rr} + (S)_{rR} = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$; er ist insofern sehr einfach und elementar, als ausser der Hilfsreihe 1, 2, ... pq-1 keine anderen Hilfsbetrachtungen nöthig sind. Ausserdem gehen, wie schon hervorgehoben, p und q zum Unterschiede vom dritten Gauss'schen Beweise vollständig gleichwerthig in die Rechnung ein.

Der dritte Beweis wurde 1808, der fünfte 1818 gefunden. 30 Jahre später (1847) veröffentlichte Eisenstein im Crelle'schen Journal seinen geometrischen Beweis des Fundamentaltheoremes, der im Grunde genommen der in die Sprache der Geometrie übersetzte dritte und fünfte Gauss'sche Beweis ist. Nach dem Gauss'schen μ Lemma ist:

$$\begin{cases} \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{u} = (-1)^{\sum \left[\frac{kp}{q}\right]} \\ \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{v} = (-1)^{\sum \left[\frac{kq}{p}\right]} \end{cases} \begin{pmatrix} k = 1, \cdots \frac{q-1}{2} \\ k = 1, \cdots \frac{p-1}{2} \end{pmatrix},$$

woraus $\mu + \nu \equiv \sum \left\{ \left[\frac{kp}{q} \right] + \left[\frac{hq}{p} \right] \right\}$ mod 2 resultirt. Eisenstein construirt nun in einem rechtwinkligen Axensystem eine Gerade yp = xq. Dann ist $\frac{xq}{p}$ resp. $\frac{yp}{q}$ die y- resp. y

x-Coordinate des Punktes xy unserer Geraden. Wird nun x = h resp. y = k, so werden $\left[\frac{hq}{p}\right]$ resp. $\left[\frac{kp}{q}\right]$ die Anzahl der um die Einheit von einander entfernten Punkte (Gitterpunkte) auf den Coordinaten $\frac{hq}{p}$ resp. $\frac{kp}{q}$ sein. Wie die Anschauung aber sofort lehrt, ist:



$$\sum \left\{ \left[\frac{kp}{q} \right] + \left[\frac{hq}{p} \right] \right\} = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} \cdot$$

Den Gauss'schen Ausdrücken $\left[\frac{kp}{q}\right]$ und $\left[\frac{hq}{p}\right]$ entsprechen also bei Eisenstein Punktreihen, den Summen $\sum \left[\frac{kp}{q}\right]$ und $\sum \left[\frac{hq}{p}\right]$ mehrere Punktreihen. Der Abzählung von Zahlen mit bestimmten Eigenschaften im fünften Gauss'schen Beweise entspricht hier die Abzählung von Punkten mit Hilfe der Anschauung. Den abstrakten Zahlbegriff bei Gauss hat

Eisenstein durch Einfthrung des Längsmaasses versinnlicht. Die arithmetische Transformation endlich im dritten Gauss'schen Beweise von $\mu = f(p,q)$ in $\mu = f(q,p) + c$ wird hier unmittelbar durch die Anschauung geleistet.

1852 wurde nun von Genocchi ein neues Moment geltend gemacht, das in fruchtbringender Weise von Schering und Kronecker ausgebeutet wurde. Um die Continuität unserer Darlegungen nicht zu stören, werden wir darauf später zurückkommen.

Wir wenden uns zunächst zu dem Gesichtspunkt, der zum ersten Male 1870 in dem Beweise von Stern zu Tage tritt, und der auch von Zeller und Petersen benutzt worden ist. Durch jenes Stern'sche Kriterium wird, wie eben die Arbeiten von Zeller und Petersen zeigen, der fünste Gauss'sche Beweis wenn auch nicht vereinfacht, so doch abgekürzt. An Stelle der Abzählung von Zahlen mit bestimmten Eigenschaften Modulo poder q treten neue Betrachtungen.

Das Kriterium Stern's ist folgendes: Setzt man in der Reihen

I)
$$1q, \ 2 \cdot q, \ \dots \ hq, \ \dots \ \frac{p-1}{2}q \ mod \ p$$
 und
$$\vdots$$
 II)
$$1p, \ 2 \cdot p, \ \dots \ kp \cdot \dots \ \frac{q-1}{2}p \ mod \ q,$$

z. B. p < q und dieselben halben Restsysteme voraus, so kommt kein Rest $h q \mod p$ in $kp \mod q$ vor; und umgekehrt, ist der in $h q \mod p$ enthaltene grösste Rest p', so kommt kein Rest $kp \mod q \le p'$ in $hq \mod p$ vor. Wohl aber kommt $-hq \mod p$ in $kp \mod q$ und -kp < p' in hq vor.

Wie schon S. 187 bemerkt, bieten die weiteren Ausführungen Stern's principiell nichts Neues und können daher um so eher übergangen werden als sie auch nicht ganz correct sind.

Zeller stützt sich auf die Restsysteme:

1)
$$q_1, \dots, \frac{p-1}{2}q_1, 2) p_1, \dots, \frac{q-1}{2}p_n$$

Setzt man p < q voraus und lässt man nur absolut kleinste Reste zu, so ist nach Stern $\mu + \nu = \frac{p-1}{2} + \tau$, wo τ die Anzahl der Reste in 2 bedeutet, die zwischen $-\frac{p}{2}$ und $-\frac{q}{2}$ liegen. Die Bestimmung dieser Zahl τ bildet den Kernpunkt des Zeller'schen Beweises. Aus der Substitution

$$k' = \frac{q-1}{2} - k$$
, $r' = \frac{p+q}{2} - r$,

wobei $kp \equiv -r \mod q$ ist, ist nun klar, dass die Glieder kp, welche zwischen $-\frac{p}{2}$ und $-\frac{q}{2}$ liegen, paarweise vorkommen, insofern einem r ein -r entspricht, bis auf die Glieder, welche den Grenzfällen der

Substitution entsprechen. Ist da, um diese Ausnahmefälle zu erledigen, zunächst k=0, so wird $k'p\equiv \frac{q-p}{2} \mod q$, also $\tau\equiv 0 \mod 2$.

Für $k = k' = \frac{q-1}{4}$ folgt sofort, dass $\tau \equiv 0 \mod 2$ wird für $q \equiv 3 \mod 4$, während für q = 4n + 1 sich ergiebt $kp \equiv \frac{1}{4}(-p \pm q) \mod q$, woraus sich verschiedene Resultate ergeben, je nachdem q von der Form $4n \pm 1$ ist.

Ganz analog diesem Beweise ist der von Petersen. Als halbes Restsystem Modulo q fungiren die ungeraden Zahlen: 1, 3, 5, ... q-2, so dass μ die Anzahl der negativen ungeraden Reste Modulo q in p, 3p, 5p, ... (q-2)p ist. Setzt man wiederum p < q voraus, so wird

$$\mu+\nu=\frac{p-1}{2}+\tau,$$

wo τ die Anzahl der zwischen -p und -q liegenden ungeraden Reste Modulo q aus $p, 3p, \ldots (q-2)p$ ist.

Bedeuten nun r die ungeraden Reste Modulo q, so wird

$$(2n+1)p-2mq=r$$
, $2n+1=1$, 3 , ... $q-2$;

m ist so gewählt, dass q > r > -q.

Durch die Substitution m=n-k, $p=q-2\alpha$ ergiebt sich nun, dass τ die Anzahl der Brüche $\frac{q}{\alpha}$, $\frac{2q}{\alpha}$, \cdots $\frac{\alpha-1}{\alpha}q$ ist, in denen die darin enthaltene grösste ganze Zahl ungerade ist. Es treten nun wieder Zeller'sche Betrachtungen auf, nach denen es auf die Beschaffenheit der Mittelglieder ankommt.

Wir kommen nun zu dem Beweise von Bouniakowsky. Dieser Autor bestimmt ebenfalls die Summe $\mu + \nu$, zerlegt aber μ und ν auf eine ganz eigenthümliche Weise. Zunächst bemerkt er, dass zwei Primzahlen in derselben Linearform enthalten sein müssen, dass also, wenn

$$p = 2an + r$$
, $q = 2an' + r$ ist $(a = r = 1 \mod 2, 1 < r < 2a - 1)$.

Weiter findet Bouniakowsky die wichtige Formel:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(-1\right)^{\frac{a-1}{2}n+m},$$

worin m eine von a und r, nicht aber von n abhängige Zahl ist, so dass ohne Weiteres

$$\left(\frac{a}{q}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2}n'+m}$$
 folgt, worsus $\left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{a}{q}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2}(n+n')}$ resultirt.

Die schöne Formel $\left(\frac{a}{2an+r}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2}n+m}$ ergiebt sich daraus, dass

Bouniakowsky die $\frac{p-1}{2} = \frac{r-1}{2} + an$ Reste

Nun greift ein von Busche gefundener Hilfssatz Platz. Aus dem Euklidschen Algorithmus zur Bestimmung des grössten gemeinschaftlichen Theilerzweier Zahlen ergiebt sich nämlich, dass, wenn sich aus der Richtigkeit der Relation (x, y) zwischen zwei ungeraden theilerfremden ganzen Zahlen x die Richtigkeit von

I) $(\pm 1, y)$, II) $(x, \pm 1)$, III) $(x + 2\lambda y, y)$, IV) $(x, y + 2\lambda'xy^{-1} + \lambda)$, λ' als ganze Zahlen vorausgesetzt, nachweisen lässt, (x, y) allgemestighteit hat für zwei beliebige ungerade theilerfremde Zahlen.

Die Annahme der Formel A) hat aber zur Formel B) geführt —
besteht eo ipso —; jene vier Bedingungen sind also erfüllt: das quadratisme so
Reciprocitätsgesetz gilt allgemein.

Es erübrigt noch, die Beweise von Genocchi, Schering und Kr
ecker zu betrachten. Es ist diesen Beweisen — obgleich sie den mit
getheilten analog sind, insofern in ihnen ebenfalls die Summe $\mu + - be$.
stimmt wird — eine besondere Stellung deshalb einzuräumen, weil si
der eine mehr, der andere weniger — eine gewisse functionentheoret - scheBedeutung haben.

Wie bereits erwähnt, hat Genocchi seinen Beweis 1852 veröffent. icht. Er betrachtet darin Ausdrücke von der Form:

$$u = hq - kp$$
, $v = hq + kp - \frac{pq - 1}{2}$ $\left(q > p, h < \frac{p}{2}, k < \frac{q}{2}\right)$

und untersucht, unter welchen Bedingungen u und v positiv resp. negativ sind. Durch Vergleichung dieser Bedingungen findet er, dass

Anz., pos.
$$v - \text{Anz}$$
, pos. $u = 0$ oder 1 ist $\left(k = 1, \dots, \frac{q-1}{2}\right)$

je nachdem hq einen positiven oder negativen absolut kleinsten Rest Modulo p giebt. Darnach ist:

und analog

$$\mu \equiv \operatorname{Anz}_{h,k} \operatorname{pos.} v - \operatorname{Anz}_{h,k} \operatorname{pos.} u \mod 2$$
 $v \equiv \operatorname{Anz}_{h,k} \operatorname{pos.} v - \operatorname{Anz}_{h,k} \operatorname{pos.} u' \mod 2$

wenn
$$u' = pk - qh$$
 und $\begin{pmatrix} h = 1, & \cdots & \frac{p-1}{2} \\ k = 1, & \cdots & \frac{q-1}{2} \end{pmatrix}$. Somit ergiebt sich:
 $\mu + \nu \equiv \text{Anz.}_{h,k} \text{ pos. } u + \text{Anz.}_{h,k} \text{ pos. } u' \text{ mod } 2.$

unsere bekannte Formel sofort liefernd.

Schering führt an Stelle der Ausdrücke u. v die folgenden ein-

$$U = \frac{u}{pq} = \frac{h}{p} - \frac{k}{q}, \quad V = \frac{v}{pq} - \frac{1}{2pq} = \frac{h}{p} + \frac{k}{q} - \frac{1}{2}$$

Dedurch werden seine Ausführungen einfacher als die Genocchi's, lass auch eine rationellere functionentheoretische Behandlung zu. Es wird de

Ans., pos.
$$\left(\frac{h}{p} + \frac{k}{q} - \frac{1}{2}\right)$$
 - Anz., pos. $\left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q}\right)$ = 0, 1,

Aus diesen Formeln geht zunächst die merkwürdige Zerlegung von μ und ι hervor. Was die Legendre'sche Formel betrifft, so erhält man dieselbe leicht aus der letzten Gleichung durch Unterscheidung der beiden Fälle

$$p \equiv q \mod 4$$
 und $p-2 \equiv q \mod 4$.

Eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Beweis von Bouniakowsky hat der Beweis von Busche insofern, als der Angelpunkt dieses letzteren Beweises der Nachweis ist, dass $\left(\frac{q}{2\lambda q + p}\right) = (-1)^{\lambda \frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p}\right)$. Diese Formel ergiebt sich aber unmittelbar aus der allgemeineren von Bouniakowsky: $\left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{a}{q}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2}(n+n')}$, wenn man darin q = r, also n' = 0 setzt.

Während sich aber, wie wir gesehen haben, Bouniakowsky bei Ableitung seiner Formel der Abzählungsmethode des fünften Gauss'schen Beweises bedient, schliesst sich Busche den Ausführungen des dritten Gauss'schen Beweises an.

Busche setzt, ähnlich wie vor ihm Voigt, wenn $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\mu}$:

$$\mu = \Sigma \mu_h \quad \left(h = 1, \cdots \frac{q-3}{2}\right),$$

wo μ_A die Anzahl der ganzzahligen Auflösungen k von

$$kq = hp + r, \quad \frac{p+1}{2} > r > p$$

bei vorgegebenem h bedeutet, und, wenn $\left(\frac{q}{p+2\lambda q}\right)=(-1)^{M}$:

$$M = \mathcal{E} M_h \quad \left(h = 1, \cdots \frac{q-3}{2}\right),$$

wo M_h analog wie μ_A die Anzahl der ganzzahligen Auflösungen K von

$$Kq = h(p+2\lambda q) + r', \quad \left(\frac{p-1}{2} + \lambda q < r' < p + 2\lambda q\right)$$

darstellt.

Setzt man q > p und λ positiv voraus, so ergiebt sich

$$M_h = \lambda + \mu_h$$
, folglich $M = \lambda \frac{q-1}{2} + \mu$.

Nimmt man nun an, das Reciprocitätsgesetz gelte für p und q, d. h. es sei

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}},$$

so ergiebt sich

B)
$$\left(\frac{q}{2\lambda q + p}\right) \left(\frac{2\lambda q + p}{q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2} \cdot \frac{p+2\lambda q - 1}{2}}.$$

Ausserdem ist

C)
$$\left(\frac{\varepsilon}{q}\right)\left(\frac{q}{\varepsilon}\right) = (-1)^{\frac{s-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}, \quad s = \pm 1,$$

Es sind nun zum Schluss dieses Capitels noch zwei Abhandlungen Kronecker's 1) zu erwähnen, in denen an hierher Gehörigem hauptsächlich Zweierlei geleistet wird: die Umformung der Schering'schen Potenz in ein Product und der directe Nachweis, dass

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \text{Vorz.} \prod \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q}\right) \quad {h = 1, \dots \frac{p-1}{2} \choose k = 1, \dots \frac{q-1}{2}}.$$

Aus der Bemerkung, dass $(a-x)(a-x+\frac{1}{2})$ negativ wird, wenn x zwischen a und $a+\frac{1}{2}$, oder a zwischen $x-\frac{1}{2}$ und x liegt, ergiebt sich, wenn man mit R(a) den Rest bezeichnet, welcher verbleibt, wenn man von a die nächstgrösste an a gelegene ganze Zahl abzieht:

Vorz.
$$R(a) = \text{Vorz. } (a-k)(a-k+\frac{1}{2}),$$

wenn $k = [a + \frac{1}{2}]$ ist. Da nun $(a - k)(a - k + \frac{1}{2})$ positiv bleibt für $k \ge [a + \frac{1}{2}]$, nur $k = [a + \frac{1}{2}]$ ist ausgeschlossen, so erhält man:

Vorz.
$$R(a) = \text{Vorz.} \prod_{k=1}^{r} (a-k)(a-k+\frac{1}{2}), \quad r \ge [a+\frac{1}{2}],$$
 woraus

Vorz.
$$R(qa) = \text{Vorz.} \prod (qa-k)(qa-k+\frac{1}{2})$$

oder, q positiv vorausgesetzt,

$$\text{Vorz. } R(q\,a) = \text{Vorz. } \prod \left(a - \frac{k}{q}\right) \left(a - \frac{k}{q} + \frac{1}{2\,q}\right), \quad k = 1, \ldots, r \ge \frac{q-1}{2}.$$

Durch die Substitution $k = \frac{q-1}{2} - k'$, welche erlaubt ist, da durch dieselbe nur die Anordnung der Factoren auf den rechten Seiten der vorstehenden Gleichungen eine andere wird, resultirt:

Vorz.
$$(qa) = \text{Vorz.} \prod \left(a - \frac{k}{q}\right) \left(a + \frac{k}{q} - \frac{1}{2}\right) \quad \left(k = 1, \cdots, \frac{q-1}{2}\right)$$

Ueber den Werth von a ist nichts vorausgesetzt worden; wir setzen $a < \frac{1}{2}$. — Sind nun ferner p und $h < \frac{p}{2}$ positive Grössen, so wird:

Vorz.
$$\left(\frac{qh}{p}\right) = \text{Vorz.} \prod \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q}\right) \left(\frac{h}{p} + \frac{k}{q} - \frac{1}{2}\right) \quad \left(k = 1, \cdots, \frac{q-1}{2}\right)$$

Durchläuft ferner h ein halbes positives absolut kleinstes Restsystem Modulo p, so ergiebt sich:

K)
$$\left(\frac{q}{p}\right) = \text{Vorz.} \prod \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q}\right) \left(\frac{h}{p} + \frac{k}{q} - \frac{1}{2}\right) \begin{pmatrix} h = 1, \dots \frac{p-1}{2} \\ k = 1, \dots \frac{q-1}{2} \end{pmatrix}$$

Schering hatte nun für ν in $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\nu}$ gefunden:

¹⁾ Berliner Mon.-Ber. 1884, S. 519-587 und 645-647, oder Crelle Journ. XCVI S. 348 und XCVII S. 93.

S)
$$v \equiv \sum \left\{ \text{Anz. pos.} \left(\frac{h}{p} + \frac{k}{q} - \frac{1}{2} \right) - \text{Anz. pos.} \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q} \right) \right\} \mod 2$$

$$\begin{pmatrix} h = 1, & \dots & \frac{p-1}{2} \\ k = 1, & \dots & \frac{q-1}{2} \end{pmatrix}.$$

Durch Vergleichung der Formeln S) und K) fällt die Verwandtschaft derselben sofort ins Auge.

Wie wir ferner gesehen haben, beruhte der Beweis von Kronecker darauf, dass er mit Hilfe Gauss'scher Betrachtungen nachwies, dass der Ausdruck:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \text{Vorz.} \prod \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q}\right) \quad \begin{pmatrix} h = 1, \dots \frac{p-1}{2} \\ k = 1, \dots \frac{q-1}{2} \end{pmatrix}$$

mit dem Legendre'schen Symbol identisch sei. Im Juni-Heft des Berliner Berichts von 1884 giebt nun Kronecker die directe Ableitung jener Formel. Nach Gauss (3. Beweis, II. Bd. S. 6) ist:

Vorz.
$$R(p a_0) = (-1)^{p \alpha} \begin{pmatrix} 0 < \alpha_0 < \frac{1}{2}, & \alpha < \frac{1}{2}, \\ \text{so dass } \alpha = 2 \alpha_0 \text{ oder } 1 - 2 \alpha_0 \end{pmatrix}$$
. Offenbar ist ferner:

$$(-1)^{p\alpha} = \text{Vorz.} \prod \left(\frac{h}{p} - \alpha\right) \quad \left(h = 1, \dots \frac{p-1}{2}\right),$$

so dass für

$$a_0=\frac{k_0}{q}$$
 $\left(k_0=1, \cdots \frac{q-1}{2}\right)$:

Vorz.
$$R\left(\frac{pk_0}{q}\right) = \text{Vorz.} \prod \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q}\right) \begin{pmatrix} h = 1, \dots \frac{p-1}{2} \\ k = 2k_0 \text{ oder } = 1 - 2k_0, \frac{k}{q} < \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

ist, woraus:

$$pk_0 \equiv k'_0 \, \text{Vorz.} \prod \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q} \right) \, mod \, q \quad \left(k_0, \, k'_0 = 1, \, 2, \, \cdots \, \frac{q-1}{2} \right)$$

Hieraus aber folgt ohne Weiteres:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \text{Vorz.} \prod \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q}\right) \quad {h = 1, \dots \frac{p-1}{2} \choose h = 1, \dots \frac{q-1}{2}}.$$

Die Gauss'schen Betrachtungen über R(a) haben also Kronecker zu einer sehr eleganten und brauchbaren Formel für $\left(\frac{p}{a}\right)$ und zu einem neuen Beweise des Reciprocitätsgesetzes geführt.

Schliesslich will ich der Vollständigkeit halber noch bemerken, dass Genocchi seine Formel:

$$\mu \equiv \mathcal{E}(\text{Anz. pos. } v - \text{Anz. pos. } u) \mod q$$

auch aus dem von Eisenstein her uns bekannten Ausdrucke ableitet: Hist-lit. Abthlg. d. Esitechr. & Math. u. Phys. XXX, &

$$\frac{\sin q \frac{2h\pi}{p}}{\sin \frac{2h\pi}{p}} = 2^{q-1} \prod \sin \frac{2\pi (hq + kp)}{pq} \sin \frac{2\pi (hq - kp)}{pq}$$
$$= 2^{p-1} \sin^2 \frac{2\pi h}{p} \cdot \prod \sin^2 \frac{2\pi k}{q} \quad \left(k = 1, \dots, \frac{q-1}{2}\right).$$

Das Princip der Reduction ist also im Laufe der Jahre in die verschiedensten Formen gegossen worden. Das Merkwürdigste aber ist wohl an jenem Princip, dass es, wie Kronecker gelehrt hat, ersetzt werden kann durch das Princip der Induction.

Wir recapituliren kurz:

Eisenstein übersetzte die Gauss'sche arithmetische Sprache des dritten und fünften Beweises in sehr anschaulicher Weise in die der Geometrie. nocchi benutzte die im dritten Beweise aufgestellten Gesetze, welchen Grössen [x] gehorchen, und die später von Kronecker in so helles Licht und unserem Verständnisse so nahe gerückt wurden, um daraus gewisse — von Schering und Kronecker erweiterte und vervollständigte — functionentheoretische Betrachtungen zu knüpfen. Stern erkannte, dass zwischen den Gliedern der halben Restsysteme $p, \cdots \frac{q-1}{2}p$ und $q, \cdots \frac{p-1}{2}q$ gewisse Beziehungen stattfinden, deren Verwerthung den Gauss'schen fünften Beweis abkürzt. Zeller und später Petersen benutzten und vervollständigten diese Darlegungen. Zeller erkannte ausserdem durch eine schöne Substitution, dass in q, $\cdots \frac{p-1}{2}q$ oder p, $\cdots \frac{q-1}{2}p$ Paare von Gliedern vorkommen. Voigt vereinfachte den dritten Gauss'schen Beweis dadurch, dass er von vornherein die Anzahl der kp, welche negative absolut kleinste Reste Modulo q geben, durch eine Differenz zweier grösster ganzer Zahlen darstellte. Bouniakowsky zerfällte μ und ν in eigenthümlicher Weise, indem er zeigt, dass für p = 2an + r $(a \equiv r \equiv 1 \mod 2, 1 < r < 2a - 1)$

$$\left(\frac{a}{v}\right) = \left(-1\right)^{\frac{a-1}{2}n+m}$$

wird, wobei m nur von a und r, nicht aber von n abhängt, so dass für q = 2an' + r:

$$\left(\frac{a}{q}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2}n'+m} \text{ wird oder } \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{a}{q}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2}(n+n')}.$$

Mit Hilfe dieser letzteren Formel und der folgenden:

$$p = q + 2^{\gamma}a$$

leitet Bouniakowsky die Legendre'sche Formel ab. — Busche endlich wies mit Hilfe eines speciellen Falles der Bouniakowsky'schen Formel, die er durch Gauss'sche Methoden (3. Beweis) ableitete, nach, dass die Existenz der Formel:

$$\left(\frac{p}{q}\right)\!\left(\frac{q}{q}\right)\!=\!\left(-1\right)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}$$

die der andern:

$$\left(\frac{q}{p+2\lambda q}\right)\left(\frac{p+2\lambda q}{q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2},\frac{p+2\lambda q-1}{2}}$$

bedingt, und folgert hieraus - da die Gleichung

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \cdot e = \pm 1$$

co ipso besteht — unter Anwendung seines allgemeinen Satzes die Allgemeingiltigkeit des quadratischen Reciprocitätsgesetzes.

So sind jene Gauss'schen Untersuchungen, die im dritten und fünften Beweise niedergelegt sind, nach allen Richtungen hin erweitert und vervollständigt worden.

III. Capitel.

Ueber Eisenstein's Beweis durch functionentheoretische Sätze.

Stellt r ein halbes Restsystem dar Modulo q, so wird auch rp ein halbes Restsystem Modulo q repräsentiren. Setzt man nun $rp \equiv \epsilon r' \mod q$, wo $\epsilon = \pm 1$ sein möge, und r' demselben halben Restsystem wie r angehört, so wird für ein beliebiges ω :

$$\frac{p r \omega}{q} = \frac{\varepsilon r' \omega}{q} \mod \omega.$$

Hieraus ergiebt sich aber:

$$p\left(\frac{p \, r \, \omega}{q}\right) = p\left(\frac{\epsilon \, r' \omega}{q}\right),$$

wenn p eine einfach periodische Function mit der Periode ω ist.

Setzt man nun noch voraus, dass die Function p die negative Multiplication zulässt (ich gebrauche diesen Ausdruck "negativ" in Uebereinstimmung mit dem Ausdrucke complexe Multiplication), so erhält man:

$$p\left(\frac{p r \omega}{q}\right) = \varepsilon p\left(\frac{r'\omega}{q}\right).$$

Die r' sollten aber mit den r, abgesehen von der Reihenfolge, zusammenfallen, so dass wir bekommen:

$$\prod_{r} \mathsf{P}\left(\frac{p \, r \, \omega}{q}\right) = \prod \varepsilon \prod_{r} \mathsf{P}\left(\frac{r \, \omega}{q}\right) \text{ oder } \left(\frac{p}{q}\right) = \prod \varepsilon = \prod_{r} \frac{\mathsf{P}\left(\frac{p \, r \, \omega}{q}\right)}{\mathsf{P}\left(\frac{r \, \omega}{q}\right)}.$$

Nun erhebt sich die Frage, ob es eine Function p von den angegebenen Eigenschaften giebt. Wie allgemein bekannt, genügt aber die Sinusfunction den gestellten Anforderungen, wenn wir $\omega = 2\pi$ setzen; es resultirt aomit:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \prod_{r} \frac{\sin \frac{2rp\pi}{q}}{\sin \frac{2r\pi}{q}}.$$

Setzt man zur Abkürzung $v = \frac{2r\pi}{a}$, so haben wir es also zu thun mit Ausdrücken von der Form: sinpv

Die Eigenschaften der Sinus-Function (einfach periodisch, gestattet die negative Multiplication) genügen nun vollständig, um mit Hilfe derselben das Reciprocitätsgesetz abzuleiten. D. h.: Die Existenz einer einfach periodischen Function, die die negative Multiplication zulässt, ermöglicht den Beweis des quadratischen Reciprocitätsgesetzes.

Wir gehen der Vollständigkeit halber noch etwas genauer auf den Eisenstein'schen Beweis ein, der noch lange nicht nach seinem vollen Werthe gewürdigt ist, und der bald zu den Beweisen durch Reduction, bald zu denen durch Kreistheilung, mit welchen beiden Arten er ja auch in gewisser Beziehung steht, gerechnet wird.

Da $\frac{\sin 3v}{\sin v}$ eine gerade Function von $\sin v$ von der Form: $(-1)^{\frac{3-1}{2}}2^{3-1}\sin^{3-1}v+\dots$

$$(-1)^{\frac{3-1}{2}}2^{3-1}\sin^{3-1}v+\dots$$

ist, so ergiebt sich durch den Schluss von n auf n+2:

$$\frac{\sin t v}{\sin v} = (-1)^{\frac{t-1}{2}} 2^{t-1} \sin^{t-1} v + \dots$$

Hieraus folgt, wenn wir die Wurzeln von $\frac{\sin tv}{\sin v} = 0$ mit τ bezeichnen, dass

$$\frac{\sin t \, v}{\sin v} = (-1)^{\frac{t-1}{2}} \, 2^{t-1} \, \Pi(\sin^2 v - \tau^2),$$

da die Wurzeln doppelt vorkommen, d. h.:

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{p}{q}\right) = \prod \left((-1)^{\frac{p-1}{2}} 2^{p-1} \prod \left\{ \sin^2 \frac{2 r \pi}{q} - \alpha^2 \right\} \right), \\ \left(\frac{q}{p}\right) = \prod \left((-1)^{\frac{q-1}{2}} 2^{q-1} \prod \left(\sin^2 \frac{2 \varrho \pi}{p} - \beta^2 \right) \right), \end{array} \right.$$

wenn

die
$$\alpha$$
 die $\frac{p-1}{2}$ verschiedenen Wurzeln von $\frac{\sin\frac{2r\pi}{q}p}{\sin\frac{2r\pi}{q}}=0$ und

die
$$\beta$$
 die $\frac{q-1}{2}$ verschiedenen Wurzeln von $\frac{\sin\frac{2\sqrt{\pi}}{p}q}{\sin\frac{2\sqrt{\pi}}{p}}=0$ sind

and wenn ferner r and ho halbe Restsysteme Modulo q resp. Modulo p durchlanded.

Wie also in dem Kronecker'schen Beweise das Princip der Reduction ersetzt wurde durch das Princip der Induction, so wird in dem eben betrachteten Eisenstein'schen Beweis jenes Princip der Reduction ersetzt durch functionentheoretische Erörterungen; wieder ein Beispiel dafür, wie in der Zahlenlehre die verschiedensten Theorien sich verbinden und durchdringen.

IV. Capitel.

Ueber die Beweise mit Hilfe von Sätzen aus der Theorie der Kreistheilung.

Im V. Capitel des ersten Theiles unserer Arbeit finden sich die Beweise, welche sich auf Sätze aus der Kreistheilungslehre stützen. Begründet wurde diese Theorie von Gauss, der sie fand, als er nach einem ferneren Beweise seines Fundamentaltheoremes suchte. Bereits im Jahre 1796¹) kündigte er die Construction des 17-Ecks an. Abgesehen nun von den epochemachenden Sätzen über imaginäre Grössen und Functionentheorie, leitete Gauss aus der Kreistheilung drei (wenn man will auch vier) neue, von einander verschiedene Beweise des Reciprocitätsgesetzes ab.

Zunächst wollen wir das Lemma, auf welches sich sämmtliche Beweise durch Kreistheilung stützen, kurz entwickeln. Ist ϱ eine primitive Wurzel von $\frac{x^p-1}{x-1}=0$, wobei p eine Primzahl repräsentiren mag und g eine primitive Wurzel zum Modul p, so werden sich sämmtliche Wurzeln ϱ in zwei Reihen anordnen lassen, nämlich in:

$$\varrho$$
, ϱ^{g^2} , ϱ^{g^4} , ... $\varrho^{g^{p-3}}$ und ϱ^g , ϱ^{g^3} , ... $\varrho^{g^{p-2}}$,

was gleichbedeutend ist mit:

$$\varrho^{a_1}$$
, ϱ^{a_2} , ϱ^{a_0} ... und ϱ^{b_1} , ϱ^{b_2} , ϱ^{b_3} , ...,

wenn a_1, a_2, \ldots sämmtliche quadratische Reste und b_1, b_2, \ldots sämmtliche quadratische Nichtreste Modulo p bedeuten.

$$y_1 = \Sigma \varrho^a$$
 and $y_2 = \Sigma \varrho^b$

nennt man dann Perioden und speciell $\frac{p-1}{2}$ -gliedrige Perioden von $\frac{x^p-1}{x-1}$. Von grosser Wichtigkeit ist nun der Ausdruck:

$$y_1 - y_2$$

Verhältnismässig leicht ist die Bestimmung des Quadrates dieser Differenz; es findet sich:

$$(y_1 - y_2)^2 = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p.$$

¹⁾ Allgem. Literaturs. 1796.

²⁾ Zur Orientirung diene Bachmann, Vorlesungen über Kreistheilung.

Sehr schwierig war aber die Bestimmung des Vorzeichens von $y_1 - y_2$ und erst nach langem, vergeblichem Bemühen überwand Gauss alle egegenstehenden Schwierigkeiten. Er schreibt in Bezug auf die Auffindu. 🕤 dieses Vorzeichens an Olbers 1805 1): "Dieser Mangel (d. h. das Feh des Vorzeichens) hat mir alles Uebrige, was ich fand, verleidet, und vier Jahren wird selten eine Woche vergangen sein, wo ich nicht ei oder den anderen vergeblichen Versuch, diesen Knoten zu lösen, gemesch hätte - besonders lebhaft wieder in der letzteren Zeit. Aber alles Bruten alles Suchen ist umsonst gewesen, traurig habe ich jedes Mal die Feder wieder niederlegen müssen. Endlich vor ein paar Tagen ist's gelungen aber nicht meinem mühsamen Suchen, sondern bloss durch die Gnade Gottes möchte ich sagen. Wie der Blitz einschlägt, hat sich das Räthsel gelöst; ich selbst wäre nicht im Stande, den leitenden Faden zwischen dem. was ich vorher wusste, dem, womit ich die letzten Versuche gemacht hatte - und dem, wodurch es gelang, nachzuweisen. Sonderbar erscheint die Lösung des Räthsels jetzt leichter als manches Andere, was mich wohl nicht so viele Tage aufgehalten hat, als dieses Jahre, und gewiss wird Niemand, wenn ich diese Materie einst vortrage, von der langen Klemme, worin es mich gesetzt hat, eine Ahnung bekommen."

Genug, Gauss fand, dass:

B)
$$y_1 - y_2 = i^{\left(\frac{p-1}{2}\right)^2} \sqrt{p}$$
.

Beide Formeln, A) sowohl wie B), sind nun zur Darlegung des Reciprocitätsgesetzes benutzt worden.

Wir beschäftigen uns zunächst mit den Beweisen, welche sich auf Formel B) gründen, und beginnen mit dem vierten Beweis von Gauss, demjenigen, in welchem jene wichtige Bestimmung des Vorzeichens von $(y_1 - y_2)$ geleistet worden ist.

Setzt man:

$$G\left(\frac{pi}{q}\right) = \sum_{i} \left(\frac{\lambda}{q}\right) e^{i \frac{2p\pi i}{q}} \quad (\lambda = 1, \ldots q - 1),$$

so ist zunächst:

$$G\left(\frac{pi}{q}\right) = \binom{p}{q} \sum_{i} e^{\frac{2\pi i}{q} x^{2}} = \left(\frac{p}{q}\right) (y_{1} - y_{2})$$
$$= \left(\frac{p}{q}\right) G\left(\frac{i}{q}\right).$$

Die Summen (oder Thetareihen) $G\left(\frac{pi}{q}\right)$ und $G\left(\frac{i}{q}\right)$ nennt man Gauss'sche Summen. Die Bezeichnung G ist von Kronecker eingeführt worden.

¹⁾ Schering, Festrede, S. 13.

²⁾ Berl. Ber. 1880.

Die Bestimmung von $G^2\left(\frac{i}{q}\right)=(y_1-y_2)^2$ verursacht nun, wie schon bemerkt, keine besonderen Schwierigkeiten und ist schon von Gauss in dem 156. Artikel seiner Disq. arithm. geleistet worden. Die Hauptsache bestand eben in der Bestimmung des Vorzeichens von $G\left(\frac{i}{q}\right)$. Diese Aufgabe löste Gauss dadurch, dass er die Reihe:

$$G\left(\frac{i}{q}\right) = 1 + \varrho + \varrho^4 + \cdots + \varrho^{(q-1)^2},$$

wo e also eine primitive nte Einheitswurzel ist, transformirte in:

$$G\left(\frac{i}{q}\right) = (\varrho - \varrho^{-1}) (\varrho^3 - \varrho^{-3}) \dots (\varrho^{q-2} - \varrho^{-q+2}).$$

Dadurch, dass dann:

$$\varrho = \cos\frac{2\pi k}{q} + i \sin\frac{2\pi k}{q}$$

eingeführt wird, resultirt:

$$G\left(\frac{i}{q}\right) = (2i)^{\frac{q-1}{2}} \sin\frac{2\pi}{q} \cdot \sin\frac{6\pi}{q} \cdots \sin\frac{(q-2)2\pi}{q},$$

woraus sich unser Vorzeichen ergiebt.

Des Näheren auf den Beweis einzugehen, dürfte hier nicht nöthig sein, da mit dieser Vorzeichenbestimmung sich der Beweis erledigt. Die Betrachtungen nun, welche zu jener Transformation von $G\left(\frac{i}{q}\right)$ in das Product: $(\varrho-\varrho^{-1})(\varrho^3-\varrho^{-3})\dots(\varrho^{q-2}-\varrho^{-q+2})$ führen, sind rein arithmetischer Art.\(^1\)) "La difficult\(^4\), bemerkt Dirichlet.\(^3\)» "de se rendre bien compte à quoi tient le succès des considérations délicates par lesquelles l'illustre auteur opère cette ingénieuse transformation m'ayant fait rechercher, si on ne pouvait pas résoudre la même question sans y recourir, je suis parvenu ..." Dirichlet bestimmte die Gauss'schen Summen mit Hilfe bestimmter Integrale und benutzt den Hilfssatz, dass, wenn der Werth:

$$F(\alpha) = c_0 + c_1 \cos \frac{2\pi}{n} + c_2 \cos 2 \frac{2\pi}{n} + \cdots$$

bekannt ist, die Werthe der Reihen:

$$c_{0} + c_{1} \cos \frac{2\pi}{n} + c_{2} \cos \frac{2^{3} 2\pi}{n} + \cdots \text{ und } c_{1} \sin \frac{2\pi}{n} + c_{2} \cos \frac{2^{3} 2\pi}{n} + \cdots$$

$$oder c_{0} + c_{1} e^{\frac{2\pi i}{q}} + c_{2} e^{\frac{2\pi i}{q}} + c_{3} e^{\frac{2\pi i}{q}} + \cdots = \mathcal{E}s e^{\frac{2\pi i}{q}s^{2}}$$

sich bestimmen lassen.

¹⁾ Brief an Olbers.

²⁾ Crelle J. XVII, S. 57 (ausserdem XVIII, XX, XXIII

Aus der bekannten Euler'schen Formel:

ergiebt sich:
$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-kx} x^{a-1} dx = \frac{\Gamma(a)}{k^a}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{ix^a} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}} (1+i),$$

woraus sich die folgenden Formeln ableiten:

$$\begin{cases}
\int_{-\infty}^{\infty} \cos x^{3} \cdot \cos 2\nu x \cdot dx = e^{i\nu^{3}} \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \\
\int_{-\infty}^{\infty} \sin x^{3} \cdot \cos 2\nu x \cdot dx = e^{-i\nu^{3}} \sqrt{\frac{\pi}{2}}.
\end{cases}$$

Substituirt man nun

$$D_{3} \rangle \qquad \qquad x = \frac{1}{2} \alpha \sqrt{\frac{n}{2\pi}},$$

wobei n eine positive Constante ist, so wird, wenn man zur Abkürzung $F(\alpha) = \sum c_{\bullet} \cos s \, \alpha$ setzt:

$$\begin{cases} \int_{0}^{\infty} \cos \frac{n a^{2}}{8} \cdot F(\alpha) d\alpha = \frac{2\pi}{\sqrt{n}} \sum_{c} c_{e} e^{\frac{2\pi i}{n} a^{2}}, \\ \int_{0}^{\infty} \sin \frac{n a^{2}}{8} \cdot F(\alpha) d\alpha = \frac{2\pi}{\sqrt{n}} \sum_{c} c_{e} e^{-\frac{2\pi i}{n} a^{2}}. \end{cases}$$

Nimmt man F(a) als gegeben an, so lassen sich die Integrale dadurch auswerthen, dass man sie zerlegt in Theilintegrale zwischen den Grenzen $-(4k+1)\pi$ und $(4k+1)\pi$, worin k eine beliebige Zahl ist. Diese Integrale zerlegt man wiederum in (4k+1) andere zwischen den Grenzen $(2k-1)\pi$ und $(2k+1)\pi$, worin k die Werthe von -2k bis +2k annimmt. Diese Integrale zwischen den eben angegebenen Grenzen lassen sich aber bestimmen, und dadurch, dass man k unendlich werden lässt, auch die ursprünglichen Integrale, wodurch auch die Summen $\Sigma c_s e^{\frac{2\pi i}{n}s^2}$ und $\Sigma c_s e^{\frac{2\pi i}{n}s^2}$ gegeben sind.

Unsere Gauss'schen Summen sind aber ein specieller Fall dieser allgemeinen Summen. Setzen wir $c_s=1$, so erhalten wir unmittelbar: $\sum c_s e^{\frac{2\pi i}{n}s^2} = G\left(\frac{i}{n}\right) - \text{Für diesen speciellen Fall } c_s = 1 \text{ ist aber auch unsere Annahme, dass } F(\alpha) \text{ bekannt sei, gerechtfertigt; es ist dann nämlich: } F(\alpha) = 1 + \cos \alpha + \cdots + \cos (n-1) \alpha \text{ nach einer bekannten Formel}$

gleich
$$\frac{\sin{(2n-1)}\frac{\alpha}{2}}{\sin{\frac{\alpha}{2}}}$$
. Dies ist die Schlussweise, die Dirichlet

zur Bestimmung der Gauss'schen Summen anwendet.

Ehe wir zu den Cauchy'schen Arbeiten übergehen, erwähnen wir noch die Abhandlungen von Libri¹), Heine²) und Lebesgue³).

Libri beweist in seinem Mémoire über Zahlentheorie, S. 187, die Formel:

$$G = \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \cos \frac{2x^2n}{n} + i \sin \frac{2x^2n}{n} \right\} = \pm \sqrt{n(-1)^{\frac{n-1}{2}}},$$

und macht das Vorzeichen ebenfalls abhängig von:

$$A = (2i)^{\frac{n-1}{2}} \sin \frac{2\pi}{n} \sin \frac{6\pi}{n} \cdots \sin 2(n-2) \frac{\pi}{n}$$

Er sagt aber nicht, wie er zu dieser letzteren Formel kommt. formation der Summe in das vorstehende Product ist aber der Kernpunkt der ganzen Rechnung.

Was die Abhandlung von Heine betrifft, so fasst dieser die Sachlage vom Standpunkte der Reihenentwickelung auf, ohne auf die tiefere Bedeutung dieser Reihen Rücksicht zu nehmen. Ich stelle Heine's Worte hierher: "Lässt eine Function sich nicht bloss direct in eine nach ihrer Veränderlichen x aufsteigende Reihe entwickeln, sondern auch indirect, indem man sie als Product zweier Factoren darstellt, die nach Potenzen derselben Variabelen fortschreiten, so wird der Quotient einer jeden Potenz von x in der ersten Entwickelung als Summe der ersten Reihe auftreten, welche nach Ausführung der Multiplication der beiden vorerwähnten Factoren in dieselbe Potenz von x multiplicirt ist.

Der Grundgedanke endlich der Arbeit von Lebesgue ergiebt sich aus Folgendem: Ist

$$f(z) = \Theta(z) \cdot f[\varphi(z)]$$

und setzt man zur Abkürzung:

und setzt man zur Abkürzung:
.
$$\varphi[\varphi(z)] = \varphi^2(z); \quad \varphi[\varphi(z)] = \varphi^3(z), \dots,$$
so ergiebt sich:

wenn die f und O congruent bleiben. Durch Multiplication erhält man:

$$f(z) = f(\varphi^n(z)) \cdot \Theta(z) \cdot \Theta(\varphi(z)) \cdot \Theta(\varphi^2(z)) \cdot \dots \cdot \Theta(\varphi^{n-1}(z)).$$

¹⁾ Crelle J. IX, S. 54 und 139.

²⁾ Crelle J. IXL, S. 288.

³⁾ Liouv. J. V, S. 42.

Wird nun für $n = \infty$, $\varphi^{n}(z) = a$, so ergiebt sich:

$$f(z) = f(a) \cdot \Theta(z) \cdot \Theta(\varphi(z)) \cdot \Theta(\varphi^{2}(z)) \cdot \cdot \cdot \cdot \Theta(\varphi_{n-1}(z)).$$

Mit Hilfe von

$$f(b) = f(a) \Theta(b) \cdot \Theta(\varphi(b)) \cdot \cdot \cdot \cdot \Theta(\varphi^{n-1}(b))$$

erhält man somit:

$$f(z) = f(b) \underbrace{\frac{\Theta(z) \cdot \Theta\left[\varphi(z)\right]}{\Theta(b) \cdot \Theta\left[\varphi(b)\right]} \cdot \cdot \cdot \underbrace{\Theta\left[\varphi^{n-1}(z)\right]}_{\Theta\left[\varphi^{n-1}(b)\right]}$$

Setzt man nun:

$$f(z) = 1 + q \frac{1-z}{1-q} + q^3 \frac{(1-z)(1-qz)}{(1-q)(1-q^2)} + \cdots,$$

so findet sich dadurch, dass man im allgemeinen Gliede von f(z) an Stell von z, q^2z setzt und mit 1-qz multiplicirt:

$$f(z) = (1 - q z) f(q^2 z)$$

woraus

$$\varphi(z) = q^2 z$$
, $\varphi^2(z) = q^4 z$, ... $\varphi^n(z) = q^{2n} z$...

und

$$\Theta(z) = 1 - qz$$
, $\Theta[\varphi(z)] = 1 - q^3z$, ... $\Theta[\varphi^{n-1}(z)] = 1 - q^{2n-1}z$ folgt, so dass

$$f(z) = f(q^{2n}z) \cdot 1 - qz \cdot 1 - q^3z \cdot \dots \cdot 1 - q^{2n-1}z \dots$$

wird. Für q < 1 und $n = \infty$ wird $f(q^{\infty}z) = f(z) : 1 - qz \cdot 1 - q^3z \dots$ u and da f(1) = 1, so:

$$f(z) = \frac{1 - qz}{1 - a} \cdot \frac{1 - q^5z}{1 - a^3} \cdot \frac{1 - q^5z}{1 - a^5} \cdot \cdots,$$

woraus

$$1 + q \frac{1 - q^{-m}}{1 - q} + q^{3} \frac{1 - q^{-m}}{1 - q} \cdot \frac{1 - q^{-m+1}}{1 - q^{2}} + \cdots$$

$$= (1 - q^{-m+1}) (1 - q^{-m+3}) \dots (1 - q^{-1})$$

für $m \equiv 0 \mod 2$ resultirt.

Setzt man: $q^{n+1} = q^p = 1$, so ergiebt sich die Gauss'sche Formel

$$1+q+q^{3}+\cdots+q^{\frac{p-1}{2}p}=(1-q^{-p+2})(1-q^{-p+3})\cdots(1-q^{-1}).$$

Wir gehen nun zu den Cauchy'schen Arbeiten über. Es handsich darin, eben wie bei Gauss, darum. das Vorzeichen der fraglich-Quadratwurzel zu bestimmen. Bereits 1817 war dies Cauchy mit Hireciproker Functionen gelungen,²) und er hatte die Formel gefunden:

C)
$$\begin{cases} a^{\frac{1}{2}}(\frac{1}{2} + e^{-a^2} + e^{-4a^2} + \cdots) = b^{\frac{1}{2}}(\frac{1}{2} + e^{-b^2} + e^{-4b^2} + \cdots) \\ ab = \pi. \end{cases}$$

Mit Hilfe derselben Principien sind von Lebesgue auch verschiedene Formeln Jacobi's, Ell. Funct. S. 186, bewiesen.

²⁾ Bull. de la soc. philomat. 1817. — Vergleiche auch Exerc. de math. II., . 118. Compt. Rend. 1840. Liouv, J. V., S. 184.

Ars theser Firmel Rest sich die Gauss siehe Stunne bestimmen. Seits man nämben: $z=e^2-\frac{2\pi}{4}$: $t=S+\frac{2\pi}{2}$, we a unit 3 nach der Null convergirent, so wird runkelies az=2S. Multiplicits man non beide Seiten der Cauchy siehen Formel mit az, so ergrebt sieh nach Fortlassung des gemeinschaftlichen Factors $\int_{z^2-z^2}^{z}dz=\frac{1}{2}$ der Werth für $a=\frac{1}{2}$.

Wir haben nun zur Bestimmung des Gaussischen Vorseichens das Material vor uns, so dass wir an eine Sichtung desselben gehen können. Ein Blick auf die Gaussische Formel reigt, dass die Vorseichenbestimmung abhängig ist von der Transformation der Gaussischen Summe gester der Thetareibe $G\left(\frac{i}{p}\right)$ in das Product:

$$(q-q^{-1})(q^3-q^{-3})\dots(q^{p-2}-q^{-p+2})$$

Jene Transformation aber, "si ingenieuse", beruht auf rein arithmetischen Betrachtungen. Dirichlet, durch diesen Umstand veranlasst, ging einen Schritt weiter und zeigte, dass die Vorzeichenbestimmung abhängig ist von den Eigenschaften bestimmter Integrale. Cauchy endlich brachte vollständige Klarheit in die in Rede stehende Angelegenheit und wies nach, dass das fragliche Vorzeichen auftritt bei einer gewissen Transformation von Thetareihen. Seine Formel ist:

$$a^{\frac{1}{4}}(\frac{1}{2}+e^{-a^2}+e^{-4a^2}+\cdots)=b^{\frac{1}{2}}(\frac{1}{4}+e^{-b^2}+e^{-4b^2}+\cdots), \quad ab: \quad n.$$

Die vorstehende Formel erregte, wie Cauchy selbst bemerkt, auch das Interesse Lagrange's, der sie für kleine Werthe der Variabelen bereits kannte.

Auch Lebesgue war sich des Umstandes völlig bewusst, dass die Cauchy'sche Formel ihre Basis in der Theorie der elliptischen Functionen habe; er weist darauf hin, 1) dass die Cauchy'sche Formel schon Poinsot bekannt gewesen sei, und zwar in der Form:

$$\pi + 2\pi \sum_{n=1}^{\infty} e^{-4k\pi^2 n} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{k}} + \sqrt{\frac{\pi}{k}} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n^2}{4k}}$$

Und in der That, setzt man $a = \frac{1}{4k}$, $b^2 = 4k\pi^2$, so daes $ab = \pi$ wird, so geht die Formel von Poinsot-Lebesgue in die von Cauchy über. Ist ferner $a = \frac{1}{4k} = \pi x$, so erhält man:

$$\sqrt{\frac{1}{x}} = \frac{1+2e^{-\pi x}+2e^{-4\pi x}+\cdots}{1+2e^{-\frac{\pi}{x}}+2e^{-\frac{4\pi}{x}}},$$

eine Relation Jacobi's.2)

¹⁾ Liouv. Journ. V. S. 186.

²⁾ Jacobi, Crelle J. III, S. 308.

Der Wichtigkeit der Cauchy'schen Arbeit wegen reproduciren wir sie kurz, und zwar in Kronecker'scher Fassung.¹)

Aus der mit Hilfe Cauchy'scher Principien abgeleiteten Formel:

$$\begin{cases} \sum u^{(\log z)^2} = (\sqrt{\log v}) \sum_{-\infty}^{\infty} e^{-n^2 \pi} s^n \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi s^2} dx, \\ 4\pi \log u \log v = 1 \end{cases}$$

findet man:

$$\begin{cases} \sqrt{\log \frac{1}{x}} \cdot \frac{\sum_{x} x^{-\frac{1}{4\pi} (\log x + 2n\pi i)^{2}}}{\sum_{y} y^{n^{2}\pi} g^{n}} = 1, \\ \log x \cdot \log y = 1, \end{cases}$$

woraus wiederum folgt:

$$V = \sqrt{\log \frac{1}{x} \cdot \frac{\sum x^{n^2 \pi}}{\sum y^{n \pi}}} = 1.$$

Setzt man nun: $-\log x = v^2 + \frac{\lambda i}{\mu}$, wobei λ und μ ganze Zahlen sein sollen, und lässt w nach der Null convergiren, so entsteht:

$$\lim_{n=0}^{\lim} (\mu w) \sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2 \pi} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{2\mu - 1} e^{-k \frac{2 \lambda \pi i}{\mu}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-k^2 \pi} dx,$$
woraus, da $-\left(1 + \frac{\mu^2 w^2}{1^2}\right) \log y = \frac{\mu^2 w^2}{1^2} + \frac{\mu}{1 i}$ und (μw) positiv ist:

 $\lim_{w} (\mu w) \, \Sigma y^{n^2 \pi} = G\left(\frac{\mu}{\lambda \, i}\right),$ mithin nach K_2 :

$$K_{\rm S}$$
) folgt. $\sqrt{\frac{\lambda i}{\mu}} \cdot G\left(\frac{\lambda i}{\mu}\right) = G\left(\frac{\mu}{\lambda i}\right)$

Mit Hilfe dieser letzteren Formel ist aber die Transformation einer Gauss'schen Summe in eine andere geleistet; und mit Hilfe dieser Formel kann man leicht jenes fragliche Vorzeichen bestimmen: "Die Bestimmung desselben tritt in Evidenz.") In der oben citirten Abhandlung geht aber Kronecker noch einen Schritt weiter; er weist da auch nach, dass mit Hilfe der Gauss'schen Summen die Transformation der Thetareihen sich bewerkstelligen lässt. Es genügt hier, darauf hingewiesen zu haben.

Ein Punkt ist aber noch anzuführen: der Zusammenhang der Cauchyschen und Dirichlet'schen Arbeit. Wie wir sahen, ist Dirichlet's Vorzeichenbestimmung abhängig von den Formeln D_1 und D_2 und von der Substitution D_3 , die Cauchy's von der Substitution K_1 und den Formeln K_2 und K_3 . — D_1 und D_2 drücken aber die Grenzwerthe von Thetareihen aus, aus denen mit Hilfe der Substitution D_3 , also mit Hilfe einer Trans-

¹⁾ Berl. Mon.-Ber. 1880, S. 686, 854.

²⁾ Kronecker, Berl. Mon.-Ber. 1880.

formation derselben jenes Verseichen gewennen wird. Dirichlet bestimmt also erst den Grenzwerth einer Themreibe und transformirt dann dieselbe. Cauchy seitligt den umgekehren Weg ein: er transformirt erst eine Themreibe durch die Substitution kynkyy = 1 und geht dann zur Grenze über, durch welche Operation er ans K_i die Formei K_i erhält. Auf diesem Umstand beruht, wie Kronecker bemerkt, der ganze Unterschied der Arbeiten von Dirichlet und Cauchy.

Wir kommen nun zu den Beweisen, welche sich direct auf die Formel A), d. h. auf $y_1 - y_2^{-2} = (-1)^{-1} p$ gründen. Wir beginnen mit dem sechsten Beweis von Gauss und schliessen an denselben den von Gauchy-Jacobi-Eisenstein an.

Bezeichnet — nach dem sechsten Gauss'schen Beweise — G die Reibe $x^g - x^{-g} + x^{g^2} + \dots - x^{g^{g-2}}$, wobei g eine primitive Wursel von p ist, so ist zunächst

$$G^{q} - G_{q} \equiv 0 \mod q$$
, wenn $G_{q} = x^{q} - x^{q}x + \dots$ ist

oder, wenn X eine ganze Function von x ist:

$$G^{q}-G_{\bullet}=qX.$$

Setzt man ferner $q = g^{\mu} \mod p$, so ist:

$$G_{q} - \left(\frac{q}{p}\right)G = \frac{1 - x^{p}}{1 - x} W,$$

wo W wiederum eine ganze Function von x ist.

Aus dem System Gleichungen:

$$x^{g^k}G - x^{g^k+g^k} + x^{g^{k+1}+g^k} + \dots + x^{g^p+g^k} = x^{g^k+1} \{ (x^{g^k-g^{k-1}}-1) + \dots \}, \\ k = 0, 1, \dots, p-2$$

erhält man ferner durch rein algebraische Betrachtungen:

3)
$$G^{2}-(-1)^{\frac{p-1}{2}}p=\frac{1-x^{p}}{1-x}Z,$$

wo Z ebenfalls eine ganze Function von x ist. Hieraus folgt aber:

4)
$$G^{q-1} - (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} p^{\frac{p-1}{2}} = \frac{1-x^p}{1-x} Y,$$

worin Y dieselbe Eigenschaft wie X, W, Z hat.

Aus den Formeln 1) - 4) ist nun das Reciprocitätsgesetz leicht ableitbar.

Auf den ersten Blick scheint es, als ob der Gauss'sche sechste Beweis seine Hilfsmittel lediglich der Functionentheorie entlehne; aber bei gemauerer Betrachtung zeigt sich, dass das G nichts Anderes ist, als die Differenz $y_1 - y_2$.

Wenn man nun den allgemeinen Charakter von x in G beschränkt, d. h. dem x specielle Werthe beilegt, so ist zu erwarten, dass sich jener Gauss'sche Beweis vereinfachen wird. Und dies ist in der That der Kall.

Jacobi und Cauchy lassen x eine imaginäre Wurzel von x^{2} and x^{2}

į

Eisenstein setzt geradezu x = 1. Principiell sind diese drei Beweise unter einander und von dem Gauss'schen sechsten Beweise nicht verschieden.

Wir haben nun zwei Beweise zu betrachten, welche arithmetischer Natur zu sein scheinen und ihre Quelle doch in der Kreistheilung haben. Es sind dies Eisenstein's zweiter und Lebesgue's erster Beweis.

Was zunächst den Beweis von Eisenstein betrifft, so beruht dieser, wie auch schon Lebesgue¹) bemerkt, auf einer eigenthümlichen Entwickelung der Potenz:

$$\left\{\sum \left(\frac{\lambda}{p}\right)x^{\lambda}\right\}^{\mu}; \quad \lambda = 1, \ldots p-1.$$

Eisenstein setzt

$$\left\{ \sum \left(\frac{\lambda}{p}\right) x^{\lambda} \right\}^{\mu} = \left\{ \left(\frac{1}{p}\right) x + \left(\frac{2}{p}\right) x^{2} + \dots + \left(\frac{p-1}{p}\right) x^{p-1} \right\}^{\mu} \\ = \psi_{(\mu,0)} + \psi_{(\mu,1)} \cdot x + \psi_{(\mu,1)} \cdot x^{2} + \dots + \psi_{(\mu,\nu)} \cdot x^{\nu} + \dots + () x^{p-1}.$$

Die eingeführten ψ -Functionen sind also die Coefficienten der Variabelen in der Entwickelung jener Potenz nach eben dieser Variabelen. Auf rein arithmetischem Wege werden die Werthe für ψ bestimmt, wodurch als Endresultat:

$$\psi_{(q,1)} = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} p^{\frac{q-1}{2}} (q-1 \mod 2)$$

sich ergiebt. Es ist also

$$\psi_{(2\lambda_{+1,1})} = \psi_{(q,1)} = (y_1 - y_2)^{q-1} = G^{q-1}.$$

Diese Formel giebt das Reciprocitätsgesetz, wenn man bedenkt. dass in $\psi_{(q,1)} = \sum \left(\frac{\alpha_1}{p}\right) \cdots \left(\frac{\alpha_q}{p}\right)$ nur einmal die α gleich werden können, weil $q \alpha \equiv 1 \mod p$ nur eine Lösung zulässt.

Der Beweis von Lebesgue ist nach Bachmann?) von dem Eisenstein'schen nur dadurch verschieden, dass Lebesgue an Stelle von $\left\{\sum \left(\frac{\lambda}{p}\right)x^{\lambda}\right\}^{\mu}$ die Potenz $\left\{\sum x^{\lambda^{2}}\right\}^{q}$ anwendet. Dann wird: $(x+x^{4}+\ldots+x^{(p-1)^{2}})^{q}=n_{0}^{q}+n_{q}\sum x^{a}+n'_{q}\sum x^{b},$

worin a die quadratischen Reste, b die quadratischen Nichtreste Modulo q

$$n_0$$
 die Anzahl der Lösungen von $x_1^2 + \dots + x_q^2 \equiv 0 \mod p$, n_q ,, ,, ,, ,, $x_1^2 + \dots + x_q^2 \equiv a \mod p$ and n_q' ,, ,, ,, ,, ,, $x_1^2 + \dots + x_q^2 \equiv b \mod p$ ist.

Die Bestimmung der n ergiebt das Reciprocitätsgesetz.

In dem siebenten Gauss'schen Beweise, der, wie wir später sehen werden, eigentlich der dritte ist, tritt ein neuer Gesichtspunkt zu den bis-

herigen hinzu. Durch Anwendung der Formel $(y_1 - y_2)^2 = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p$ und

¹⁾ Liouville J. V.

²⁾ Vorlesungen über Kreistheilung.

der Relation $1 + y_1 + y_2 = 0$ ergiebt sich nämlich, dass y_1 und y_2 Wurzeln der quadratischen Gleichung

$$x^2 + x + \frac{1 - (-1)^{\frac{p-1}{2}}p}{4} = 0$$

sind, welche durch die Substitution y=2x+1 übergeht in die folgende:

B)
$$y^2 = (-1)^{\frac{p-1}{2}}p = G^2$$
.

Man verwandelt die Gleichung B) oder A) in Congruenz Modulo q. Die Möglichkeit oder Unmöglichkeit derselben kann auf doppelte Weise bestimmt werden und die Vergleichung der beiden Relationen ergiebt unsere bekannte Formel.

Der Beweis endlich von Liouville nimmt unter den in diesem Capitel analysirten Beweisen eine ähnliche Stellung ein, wie der von Kronecker unter den Beweisen durch Reduction; Liouville umgeht das Princip der Kreistheilung und führt dafür das Princip der Reduction ein. Aus $\frac{x^p-1}{x-1} = (x-\varrho^2)(x-\varrho^4), \ldots (x-\varrho^{2(p-1)})$ — ϱ ist primitive Wurzel von $\frac{x^p-1}{x-1} = 0$ —erhält er, wenn er x=1 setzt und die beiden Seiten der Gleichung auf die $\frac{q-1}{2}$ Potenz erhebt:

$$p^{\frac{q-1}{2}} = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \prod_{n=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{e^{\alpha q} - e^{-\alpha q}}{e^{\alpha - e^{-\alpha}}}$$

oder

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \text{Vorz.}\left\{ \left(-1\right)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \prod \frac{\varrho^{\alpha q} - \varrho^{-\alpha q}}{\varrho^{\alpha} - \varrho^{-\alpha}} \right\}.$$

Durch Einführung des Gauss'schen Lemmas folgt aber unsere Formel, wenn man noch bedenkt, dass $\left(\frac{\varrho^{\alpha q}-\varrho^{-\alpha q}}{\varrho^{\alpha}-\varrho^{-\alpha}}\right)=\pm 1$ wird, je nachdem αq einen positiven oder negativen absolut kleinsten Rest Modulo q giebt. Obgleich also die Beweise durch "Kreistheilung" nicht so zahlreich sind, wie die durch "Beduction", so ist doch auch das Princip der Kreistheilung, wie wir gesehen, in die verschiedensten Formen gegossen worden. — Geradezu bedeutende Arbeiten sind die von Dirichlet und Cauchy, in denen das berühmte Vorzeichen von y_1-y_3 bestimmt wird.

Zum ersten Male — wir kommen darauf in den Schlussbemerkungen zurück — ist der Beweis von Gauss mit Hilfe der Periodencongruenzen geliefert worden: die Möglichkeit, die Lösbarkeit oder Unlösbarkeit der Congruenz $y^2 \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} p \mod q$ auf zweifache Weise auszudrücken, führte zum Ziele. 1811 veröffentlichte er ferner seine berühmte "Summatio qua-

rund. serier. sing. etc.", welche den vierten Beweis enthält, der sich stätzt

auf $G\left(\frac{p\,i}{q}\right) = \left(\frac{p}{q}\right)G\left(\frac{i}{q}\right) = \left(\frac{p}{q}\right)(y_1 - y_2);$ 1818 bereits den sechsten Beweis, der nicht von $y_1 - y_2$, sondern von $(y_1 - y_2)^2$ abhängt. Jacobi. Cauchy und Eisenstein vereinfachten diese letzteren Darlegungen dadurch, dass sie der bei Gauss beliebigen Variabelen x specielle Werthe beilegten. — Liouville führte an Stelle des "Princips der Kreistheilung" das "Princip der Reduction" ein und zeigte dadurch wiederum, wie innig die verschiedenen Zweige der Zahlentheorie unter einander verwandt sind. Eise nstein und später Lebesgue weisen nach, dass die Coefficienten in der Entwickelung von $\left\{\sum\left(\frac{\lambda}{p}\right)x^2\right\}^{\mu}$ resp. $\left\{\sum x^{\lambda^2}\right\}^q$, $(\lambda=1\dots p-1)$ nach x gewisse zahlentheoretische Eigenschaften haben, welche zur Herleitung des Reciprocitätsgesetzes geeignet sind.

In der genialen Summatio Gauss' jedoch, welche die so schwierige Bestimmung des Vorzeichens der Quadratwurzel in $y_1 - y_2 = \pm \sqrt{(-1)^{\frac{p-1}{2}}} p$ gab, war noch ein dunkler Punkt insofern, als jene Bestimmung, unter arithmetischen Operationen verdeckt, nicht die klare Quelle erkennen lässt, aus der sie fliesst. Mannigfache Versuche wurden gemacht, diese Quelle zu finden. Dirichlet gelang ein bedeutender Schritt vorwärts, doch scheint er selbst die Wichtigkeit und Tragweite seiner Arbeit noch nicht völlig erkannt zu haben. Cauchy gebührt das Verdienst, uns gelehrt zu haben, dass das Vorzeichen jener Wurzel bei der Transformation von Thetareihen "in Evidenz tritt" — wie sich Kronecker ausgedrückt, welcher in lichtvoller, eleganter Weise die Dirichlet'schen und Cauchy'schen Abhandlungen bespricht. Die Thatsache aber, dass jenes Vorzeichen von $y_1 - y_2 = G$ seinen Ursprung hat in der Theorie der Thetareihen, ist wieder ein Beleg dafür, dass die höhere Arithmetik mit den verschiedenartigsten Gebieten der Mathematik in Connex steht.

V. Capitel.

Ueber die Beweise, welche sich auf Sätze aus der Theorie der quadratischen Formen stützen.

1. Anlangend den Beweis von Gauss, so ist dessen Hauptnerv, wie Kummer¹) sagt, die Thatsache, dass die Anzahl der wirklich vorhandenen Genera höchstens halb so gross ist, als die Anzahl der angebbaren. Gauss zeigt nun, dass, wenn das Reciprocitätsgesetz nicht statt hätte, jene Anzahl der wirklich existirenden Geschlechter grösser sein müsste, als die Hälfte der Anzahl der angebbaren. — Gauss unterscheidet bei seinem Beweise vier verschiedene Fälle, die sich aber bei passender Bezeichnung, wie

¹⁾ Abhandi. d. Berl. Akad. 1859.

Dirichlet') gezeigt hat, auf zwei reduciren lassen. Wir sind auch hier dem Vorgange Dirichlet's gefolgt.

2. Der erste Beweis von Kummer ferner beruht im Wesentlichen auf Eigenschaften der Pell'schen Gleichung $t^2 - Du^2 = 1$, woraus die folgende Gleichung sich ableitet:

K)
$$1 = m x^2 - m \lambda^2 \quad \begin{cases} mm' = D, \\ 2x \lambda = u. \end{cases}$$

Diese Gleichung liefert die Relationen:

$$\binom{m}{m'} = \left(\frac{-m'}{m}\right) = 1.$$

Zur Ableitung des Gesetzes lässt nun Kummer D verschiedene Werthe annehmen. Sind p und p' Primzahlen von der Form 4n+3, q und q' solche von der Form 4n+1, so setzt Kummer:

I)
$$D = pp'$$
, II) $D = pp'q$, III) $D = pp'qq'$.

Im ersten Falle kann D auf 4, im zweiten auf 8, im dritten auf 16 verschiedene Weisen in zwei Factoren zerfällt werden. Kummer schliesst nun zunächst die Fälle der Zerlegung aus, in denen m resp. m' gleich Eins werden, so dass 2 resp. 6 resp. 14 Zerlegungen von D restiren. Nun nimmt er an im zweiten Falle, p' sei so wählbar, dass

$$\left(\frac{p'}{p}\right) = -1, \quad \left(\frac{p'}{q}\right) = -1$$

sei, im dritten Falle, p und p' seien so wählbar, dass

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{p'}{q'}\right) = -1, \quad \left(\frac{p}{q'}\right) = \left(\frac{p'}{q}\right) = -1$$

seien. Die Zulässigkeit dieser Annahme ist aber von Dirichlet nachgewiesen worden, wie bereits bemerkt wurde.

Der zweite Beweis von Kummer gründet sich auf das Lemma, dass, wenn eine Primzahl r darstellbar ist durch eine quadratische Form von der positiven oder negativen Determinante $q \equiv 1 \mod 4$, welche die Hauptform nicht ist, es stets eine ungerade Potenz von r giebt, welche durch die Hauptform darstellbar ist. In Zeichen:

$$r^{2h+1} = x^2 - qy^2.$$

Hieraus erhält man durch Unterscheidung von

$$q = -p \equiv 1 \mod 4$$
, $q = +p \equiv 1 \mod 4$

und dadurch, dass man r gleich 4n+1, 4n+3 setzt, das Reciprocitätsgesetz.

¹⁾ Dirichlet, Vorlesungen über Zahlentheorie.

wärtigen, was Gauss in 20 Jahren in der Arithmetik allein geleistet hat. Die verschiedensten Gebiete der Mathematik sehen wir durch ihn verbunden: Ungeahnte Wege, man denke nur an die Kreistheilung, hat er auf diesem Felde aufgefunden, gebahnt und geebnet; Brücken über Abgründe geschlagen, welche verschiedene mathematische Disciplinen so schroff trennten, dass vor ihm Niemand an eine Verbindung der getrennten Theile denken mochte, noch konnte. Und der unermüdliche Pionier fand treffliche Nachfolger. Zunächst wurde sein sechster, der Zeit nach letzter Beweis fast zu gleicher Zeit von Cauchy, Jacobi und Eisenstein vereinsacht. 50 Jahre kaum nach dem Erscheinen des ersten Beweises war auch der dritte und fünfte Beweis in eleganter geometrischer Fassung dem Publikum vorgelegt, war das Princip der Kreistheilung in eine andere Form gegossen und hatte das Princip der Reduction eine bedeutende functionentheoretische Erweiterung erfahren, so dass das quadratische, cubische und biquadratische Gesetz aus einer Quelle floss. Dies alles that einer, Eisenstein. — 1847 zeigte Liouville die Verwandtschaft der Beweise durch Reduction und Kreistheilung; in demselben Jahre fand Lebesgue einen dem Eisenstein'schen ähnlichen Beweis durch Kreistheilung, 10 Jahre später den unbekannten siebenten Gauss'schen Beweis. 1852 machte Genocchi das Legendre'sche Symbol (von Jacobi mittlerweile bedeutend verallgemeinert) abhängig von der Differenz der Vorzeichen gewisser algebraischer Summen.

Bis jetzt hatten die Mathematiker, mit Ausnahme Eisenstein's, nur den Beweis für die quadratische Reciprocitätsformel erbracht. Da veröffentlichte Kummer 1861 zwei Beweise des quadratischen Gesetzes, die sich verallgemeinern liessen für n^{te} Potenzreste. Mit Hilfe der Theorie der Formen gelang die grosse That. Kummer's Arbeit bedeutet einen Markstein in der Entwickelung der Zahlentheorie.

Eine zehnjährige Pause trat ein: das Interesse an dem Reciprocitätsgesetz schien erkaltet zu sein; da kam in den siebziger Jahren ein grosser Aufschwung. Sieben Beweise sind in dieser Schrift mitgetheilt, die in einem Jahrzehnt (von 1870-1880) entstanden sind. Merkwürdigerweise liegt sämmtlichen sieben Beweisen das Princip der Reduction zu Grunde. Wollte man vielleicht ans diesem das allgemeine Gesetz herleiten? Stern geht auf den fünften Gauss'schen Beweis zurück und findet eine wichtige Verwandtschaft zwischen den Gliedern der halben Restsysteme $a_k p \mod q$,

dige Zerlegung der Zahl μ resp. ν. Schering weist nach, dass das μ in leicht angebbarer Weise von den Vorzeichen gewisser algebraischer Ausdrücke abhängt, die ähnlich denen Genocchi's gebaut sind. Kronecker, der schon 1876 die Vertauschbarkeit des Principe der Induction mit dem des

Reduction gelehrt hatte, stellte das Symbol $\left(\frac{p}{q}\right)$ als das Vorzeichen eines Productes dar, dessen Factoren Genocchi-Schering'sche Ausdrücke sind, und zeigt auch ferner, wie Gauss'sche Betrachtungen über Grössen [a], von denen der dritte Gauss'sche Beweis abhängt, zu der höchst eleganten Formel

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \text{Vorz.} \prod \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q}\right) \quad \left[h = 1, \dots \frac{p-1}{2}, \quad k = 1, \dots \frac{q-1}{2}\right]$$

leiten. Voigt benutzte die Methode des dritten Gauss'schen Beweises, macht aber den Beweis des Reciprocitätsgesetzes abhängig von der Anzahl der Zahlen h in:

 $kp = hq + r, \quad r > \frac{q}{2}$

bei vorgegebenem k. Busche endlich vereinfachte den Bouniakowskyschen Beweis durch Anwendung eines sehr eleganten Hilfssatzes, nach welchem das Reciprocitätsgesetz allgemein gilt, wenn es für specielle Fälle sich erweisen lässt.

Zum Schlusse sei nochmals erwähnt, dass es Cauchy gelang, das aus der "Summatio" her berühmte Vorzeichen von $\sqrt{(-1)^{\frac{p-1}{2}}p}$ aus der Transformation von Thetareihen herzuleiten.

Recensionen.

Bemerkungen zur Recension des Herrn Professor Kurs
über folgende Schriften:

WEYRAUCH, Theorie elastischer Körper, 1884;

٠-

- -, Aufgaben zur Theorie elastischer Körper, 1885;
- ---, Das Princip von der Erhaltung der Energie seit Robert Meyer, 185.

Herr Kurz beginnt mit der Behauptung, ich habe mich mit seiner Absicht, die Besprechung der "Theorie" bis zum Erscheinen der "Aufgaben" zu verschieben, brieflich einverstanden erklärt. Da hierbei zu meiner Ueberraschung auf eine vom Recensenten eingeleitete Privatcorrespondenz Bezug genommen ist, so wird auch mir gestattet sein, bei Richtigstellung des Sachverhalts davon Gebrauch zu machen. Herr Professor Kurz schrieb mir am 17. December 1884:

"Wie ich mit Freuden die Frage des Herrn Professors Cantor bejahte, ob ich eine Besprechung Ihrer Theorie elastischer Körper übernehmen wollte, so wuchsen die Sorgen beim Durchlesen derselben, ob ich der übernommenen Aufgabe gewachsen sei. Ich hatte anfänglich geglaubt, im August, den ich grösstentheils hier (in Augsburg) verbrachte, die Durchlesung vollenden zu können; aber erst im October und bis jetzt habe ich dieselbe nothdürftig neben meinen anderen Obliegenheiten zu Ende gebracht, wobei mich auch noch eine diphtheritische Anwandlung unterbrach.

So fasste ich denn seit einiger Zeit den Entschluss, Sie um einige Notizen und Winke angehen zu wollen über diejenigen Punkte, welche Sie zu einer gerechten Würdigung Ihres Buches als besonders gehörig betrachten, und glaube, dass ich mit solcher Unterstützung bis Neujahr meiner Aufgabe mich entledigen könnte, so dass die Besprechung noch im ersten Hefte des nächsten Jahres erschiene."

Ich beschränkte meine Antwort auf einige (in der Recension zum Theil wiedergegebene) allgemeine Bemerkungen über fragliche Arbeit, wies auf die bereits erschienenen Recensionen hin und stellte meinerseits Herrn Kurzanheim, die Besprechung bis zum Erscheinen der Aufgaben hinauszuschieben. Von dieser Anheimgabe hat Herr Professor Kurz laut Schreiben vom 24. December 1884 Gebrauch gemacht.

Bezüglich der Schwierigkeit des Studiums will ich mit dem Recensenten nicht streiten, über solche Dinge pflegen die Meinungen verschieden zu sein. Im Gegensatze zu Herrn Kurz findet Herr Professor Günther-Ansbach, dass mässige Kenntnisse in der Infinitesimalrechnung zum Verständnisse hinreichen. Uebrigens giebt Herr Kurz zu, dass die "Theorie" dem Studium weniger Schwierigkeiten als andere Werke ähnlicher Art bereite.

Die Bemerkung des Recensenten, dass in § 1 die bekannte Beschleunigung "specifische Massenkraft" genannt sei, ist unrichtig. Herr Kurz hat übersehen, dass auch Oberflächenkräfte Beschleunigungen erzeugen können (vergl. Grashof's Hydraulik, 1874, S. 4; Kirchhoff's Mechanik, 1877, Vorlesung 11; Weyrauch's Theorie elastischer Körper, 1884, S. 4, 25 u. s. w.).

Herr Professor Kurz bemerkt ferner, dass in § 2 "der elastischen Nachwirkung mit acht Zeilen gedacht sei". Bekanntlich hat jener Begriff bei der allgemeinen Behandlung elastischer Körper vorläufig überhaupt noch keine Verwendung gefunden (vergl. die einschlagenden Werke von Lamé, Beer, Clebsch, Saint-Venant, Grashof, Winkler, Kirchhoff, Klein, Castigliano u. s. w.), so dass auch die acht Zeilen noch fehlen konnten.

In § 5 soll "schon Manches dem mündlichen Unterricht oder sonst zuwiel dem Privatverständnisse des Studenten (im dritten Semester) überlassen" sein. Hierzu sei bemerkt, dass die Theorie weder in erster Linie für Studenten, noch gar für solche im dritten Semester bestimmt ist. Das Wesentliche liegt in dem der Sache oder Darstellung nach Neuen, wie andere Recensionen (von Grashof, Ritter, Wittmann) auch anerkannt haben. Wäre übrigens selbst bezüglich der Studenten im dritten Semester die Bemerkung des Herrn Kurz richtig, was ich bestreite, so würde sie dadurch an Gewicht verlieren, dass die in § 5 behandelten "Drehungen" neben den "Gleitungen" vollständig entbehrlich sind und thatsächlich in obigen Schriften keine Verwendung gefunden haben.

Die Besprechung der "Aufgaben" beschränkt sich auf einige Bemerkungen zum Inhaltsverzeichnisse. Wenn es dabei heisst, dass zu jeder Aufgabe die Nummer des Paragraphen angegeben sei, welcher zur Lösung nachgeschlagen werden soll, so ist das wieder nicht ganz richtig. Ich habe nur angeführt, nach welchem Paragraphen die betreffende Aufgabe eingeschaltet gedacht war, ohne dass die gegebene Reihenfolge eingehalten zu werden braucht.

Was Herr Professor Kurz schliesslich in Bezug auf die dritte obiger Schriften aussagt, beruht auf einer Verwechselung. Ich soll nach Robert Mayer Fallkraft, Bewegung (!), Wärme (!), Magnetismus etc. als Kraftformen aufführen, wogegen Herr Kurz, welcher vorstehende Ausrufungszeichen anbringt. Kraft nur als Masse mal Beschleunigung gelten lassen will. In Wahrheit handelt es sich an der betreffenden Stelle um eine Inhaltsangabe von Schriften Robert Mayer's, welche noch dazu durch folgende Worte eingeleitet ist: "Will man die Frage (nach der Priorität Mayer's)

prüsen, so ist zu beachten, dass Mayer mit Anderen Krast nennt, was man heute, einen Ausdruck Thomas Young's adoptirend, als Energie bezeichnet." Da im ganzen übrigen Verlause der Schrift (ausserhalb II) der Mayer'sche und Helmholtz'sche "Begriff Krast" Energie oder Arbeitssähigkeit genannt ist, so erscheint kaum begreislich, wie die Verwechselung bestehen bleiben konnte.

Der Unterzeichnete bedauert, die Geduld der Leser etwas lange in Anspruch genommen zu haben. Allein es konnte ihm nicht gleichgiltig sein, an hervorragender Stelle über drei seiner Schriften, welche das Resultat anstrengender Arbeit bilden, ohne jedes Eingehen auf den wesentlichen Inhalt in einer Weise abgeurtheilt zu sehen, welche mindestens der nöthigen Vorsicht ermangelte.

Stuttgart, August 1885.

J. J. WEYRAUCH.

Bibliotheca mathematica, herausgegeben von Gustaf Eneström. 1884. Stockholm, F. & G. Beyer. Berlin, Mayer & Müller. Paris, A. Hermann.

Eine neue Zeitschrift, welche in vierteljährlichen Heften erscheint und deren erster Jahrgang 62 je zweispaltige Seiten umfasst. Die Zeitschrift ersetzt alles Das, was wir durch unsere jedem Hefte dieser Zeitschrift beigegebenen Bibliographien und durch unsere beiden alljährlich erscheinenden Abhandlungsregister unseren Lesern zu bieten wünschen. Ein wesentlicher Unterschied besteht nur darin, dass Herr Eneström Bücher und Abhandlungen gemischt, und zwar nach der alphabetischen Reihenfolge der Namen der Verfasser angiebt. Ausserdem findet sich in jedem Hefte eine recht dankenswerthe geschichtliche Notiz aus der Feder des Herausgebers: 1. Notice sur un mémoire de Chr. Goldbach, relatif à la sommation des séries, publié à Stockholm en 1718; 2. Notice sur un nouvelle édition de Diofantos, préparée par M. Paul Tannery; 3. Notice sur les versions latines des éléments d'Euclide, publiées en Suède; 4. Notice sur les premières tables de logarithmes publiées en Suède.

Saggio di Tavole dei logaritmi quadratici del Conte Antonino di Prampero. Udine 1885, G. B. Doretti e Soci. IX, 53 pag.

Unter dem quadratischen Logarithmus der absoluten Zahl N, oder unter $L_q.N=x$ versteht Herr Prampero diejenige Zahl, welche der Gleichung $N=(a)^{2^{\pi}}$ genügt, wo a>1 aber sonst beliebig gewählt wird. Soll nun die E^{to} Potenz oder die E^{to} Wurzel aus N gesucht werden, so ist offenbar

im ersteren Falle $N^E = a^{E.2^a}$, und sofern $E = 2^y \left(\text{oder } y = \frac{\log E}{\log 2} \right)$, ist

auch $N^E = (\alpha)^{2^y \cdot 2^x} = (\alpha)^{2^y \cdot 2^x}$ oder $L_q.(N^E) = x + y = L_q.N + \frac{\log E}{\log 2}$. Im zweiten Falle ist $\sqrt[p]{N} = \alpha^{\frac{1}{E} \cdot 2^x} = (\alpha)^{2^{-y} \cdot 2^x} = '(\alpha)^{2^{x-y}}$ oder $L_q.(\sqrt[p]{N}) = x - y = L_q.N - \frac{\log E}{\log 2}$. Man hat also nur den von der Zahl E abhängigen Quotienten $\frac{\log E}{\log 2}$ zu berechnen, um zu jeder Zahl N sowohl $L_q.N^E$ als $L_q.\sqrt[p]{N}$ durch eine einfache Addition beziehungsweise Subtraction zu erhalten. Bei E=2 ist jener Quotient offenbar 1, bei E=3 ist er 1,584962, bei E=4 ist er 2 u. s. w. Mithin $L_q.(N^2) = L_q.N + 1$, $L_q.(\sqrt[p]{N}) = L_q.N - 1$; $L_q.(N^3) = L_q.N + 1,584962$, $L_q.(\sqrt[p]{N}) = L_q.N - 1,584962$ u. s. w. Lohnt dieser Vortheil die Berechnung einer Tabelle der quadratischen Logarithmen, mittels deren man, unter Anwendung der nöthigen Interpolationen, zu jeder Zahl den quadratischen Logarithmus, zu jedem quadratischen Logarithmus die zugehörige Zahl finden kann? Der Verfasser hat diese Frage offenbar bejaht und derartige Tafeln hergestellt, welche in höchst eleganter Ausstattung durch den Druck vervielfältigt wurden.

Bibliographie

vom 1. September bis 31. October 1885.

Periodische Schriften.

Sitzungsberichte der mathem.-physikal. Classe der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 1885, 3. Heft. München, Franz.

1 Mk. 20 Pf.

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, mathemat.-naturwissenschaftl. Classe, Abtheil. II. 91. Bd., 3. Heft. Wien, Gerold.

Publicationen des astrophysikalischen Observatoriums in Potsdam. Nr. 16. Leipzig, Engelmann. 4 Mk.

—, 4. Bd. 1. Thl., herausgeg. von C. Vogel. Ebendas. 17 Mk.

Jahrbücher der königl. ungar. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, herausgeg. von G. Schenzl. 13. Bd. Jahrg. 1883. Budapest, Kilian. 10 Mk.

Beobachtungen im astrophysikalischen Observatorium zu O-Gyalla, herausgeg. von N. v. Konkoly. 7. Bd. Jahrg. 1884. Halle, Schmidt. 10 Mk.

- Journal für reine und angewandte Mathematik. (CRELLE.) Herausgeg. von L. Kronecker und K. Weierstrass. 99. Bd. 1. Heft. Berlin, G. Reimer. compl. 12 Mk.
- Acta mathematica, herausgegeben von MITTAG-LEFFLER. 7. Bd. 1. Heft. Berlin, Mayer & Müller. compl. 12 Mk.
- Tageblatt der 58. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Strassburg. 1885. Strassburg, Trübner. 8 Mr.

Geschichte der Mathematik und Physik.

MARIE, M., Histoire des sciences mathématiques et physiques. Vol. VII.

Paris, Gauthier-Villars. 6 fr.

Reine Mathematik.

- PRYM, F., Neue Theorie der ultraelliptischen Functionen. 2. Ausg. Berlin, Mayer & Müller. 3 Mk. 6') Pf.
- HERMITE, CH., Sur quelques applications des fonctions elliptiques. Paris, Gauthier-Villars. 7 fr. 50 c.
- Beau, O., Analytische Untersuchungen über trigonometrische Reihen und Fourier'sche Integrale. 2. Aufl. Halle, Nebert. 5 Mk. 50 Pf.
- CAUCHY, A., Algebraische Analysis, deutsch herausgegeben von Itzigsonn.
 Berlin, Springer.

 9 Mk.
- GEGENBAUER, L., Zur Theorie der Determinanten höheren Ranges. (Akad.)
 Wien, Gerold.
 60 Pf.
- --- , Zur Theorie der aus den vierten Einheitswurzeln gebildeten complexen Zahlen. Ebendas. 1 Mk. 70 Pf.
- --- , Ueber die Darstellung der ganzen Zahlen durch binäre quadratische Formen mit negativer Discriminante. Ebendas. 50 Pf.
- GEIGENMÜLLER, R., Elemente der höheren Mathematik. II, Differentialrechnung. Mittweida, polytechn. Buchholg. 2 Mk.
- MERTENS, F., Einfache Bestimmung des Potentials eines homogenen Ellipsoids. (Akad.) Wien, Gerold. 15 Pf.
- Herz, N., Entwickelung der Differentialquotienten der geocentrischen Coordinaten nach zwei geocentrischen Distanzen in elliptischer Bahn. Ebendas. 60 Pf.
- SCHUBERT, H., System der Arithmetik u. Algebra. Potsdam, Stein. 1 Mk. 80 Pf. FUNCKE, H., Die analytische und die projectivische Geometrie der Ebene. Ebendas.

 1 Mk. 40 Pf.
- SPIEKER, TH., Lehrbuch der ebenen und sphärischen Trigonometrie. Ebendas.

 1 Mk. 40 Pf.
- PELZ, C., Bemerkung zur Axenbestimmung der Kegelflächen zweiten Grades.

 (Akad.) Wien, Gerold.

 60 Pf.
- KILLING, W., Die Nicht-Euklidischen Raumformen in analytischer Behandlung. Leipzig, Teubner. 6 Mk. 80 Pf.

Angewandte Mathematik.

NGER, J., Elemente der reinen Mechanik.	Lief.	Wien, Hölder.	
		3 Mk.	20 Pf.
PENHEIM, S., Ueber die Rotation und Präcession eines flüssigen Sphäroids.			
(Akad.) Wien, Gerold.			50 Pf.
TTTER, W., Die Bewegung des Wassers in	Kanälen	und Flüssen.	Berlin,
Parey.			7 Mk.
PDAN W Grandatica dar astronomische	n Zait- i	and Ortobootiv	mmuna

- BDAN, W., Grundzüge der astronomischen Zeit- und Ortsbestimmung.

 Berlin, Springer.

 10 Mk.
- ERZ, N., Bahnbestimmung des Planeten Kriemhild (242). (Akad.) Wien, Gerold. 35 Pf.
- PPENHEIM, S., Bahnbestimmung des Kometen VIII, 1881. Ebendas. 50 Pf. REDICHIN, Th., Révision des valeurs numériques de la force répulsive. Leipzig, Voss. 1 Mk. 20 Pf.
- EUVE, O., Tabulae quantitatum Besselianarum pro annis 1885 ad 1889 computatae. Ebendas. 2 Mk.

Physik und Meteorologie.

- TTELER, E., Theoretische Optik, gegründet auf das Bessel-Sellmeier'sche Princip. Braunschweig, Vieweg. 14 Mk.
- EPPERGER, J. v., Ueber Krümmungsvermögen und Dispersion von Prismen. (Akad.) Wien, Gerold. 80 Pf.
- Male Dispersion. Ebendas. Einige Versuche über totale Reflexion und anomale Dispersion.
- EVALLIER et MUNTZ, Problèmes de physique. Paris, Gauthier-Villars. 6 fr.

Cylinderfunctionen.

542. Bessel's functions of the second order. C. V. Coates. Quart. Journ. math. XX, 250.

Determinanten.

543. Généralisation du théorème de Jacobi sur les déterminants partiels du système adjoint. Em. Barbier. Compt. rend. XCVII, 82. [Vergl. Nr. 64.]

Differentialgleichungen.

544. Ueber Projectivität und partielle Differentialgleichungen in der Geometrie. Th. Sanio. Gran. Archiv LXXI, 225

545. Sur les multiplicateurs des équations différentielles linéaires. Halphen. Compt. rend. XCVII, 1408, 1541.

546. Sur un moyen de déterminer le facteur d'intégrabilité. W. Maximovitch. Compt. rend. XCVII, 1544.
547. Ueber die Irreductibilität der linearen Differentialgleichungen. L. Königs-

berger. Crelle XCVI, 123.

548. Uebersicht über die Thome'schen Abhandlungen über lineare Differentialgleichungen in Crelle LXXIV bis XCV. L. W. Thomé. Crelle XCVI, 185. 549. Sur l'intégration algébrique des équations linéaires. H. Poincaré. Compt.

rend. XCVII, 984, 1189.

550. Sur certaines équations différentielles linéaires. A. Steen. Acta math. HI, 277.
551. Sur un cas particulier de résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants. M. d'Ocagne. N. ann. math. XLIII, 138.
552. Sur une classe d'équations linéaires du quatrième ordre. E. Goursat.
Compt. rend. XCVII, 31.

553. Sur quelques équations linéaires du quatrième ordre. Halphen. Compt. rend. XCVII, 247.

554. On differential equations which belong to the class $\frac{dx}{(U_x)_n^2} + \frac{dy}{(U_y)_n^2} + \dots = 0,$ where $U_x \equiv (a, b, c, d, e, \dots)(x, 1)^n$. R. Russell. Quart. Journ. math. XX, 179.

555. On the differential equation $\frac{dx}{\sqrt{U_x}} + \frac{dy}{\sqrt{U_y}} + \frac{dz}{\sqrt{U_z}} + \frac{dw}{\sqrt{U_w}} = 0$, where $U_x = (a, b, c, d, e)(x, -1)^4$. R. Russell. Quart. Journ. math. XX, 265. Sur une equation différentielle du second ordre. De Sparre. Acta math.

HI, 105, 289.

557. Intégrer l'équation x(1-x) y"-(1-2x) y'+(1-3x+x²) y = -x²(1-x)². F. Borletti. N. ann. math. XLII, 426.
558. Integration von y^{1V} = xy'-y. S. Spitzer. Grun. Archiv LXXI, 90.
559. De l'intégration d'une classe de systèmes d'équations simultanées, linéaires et du premier ordre. Ibach. N. ann. math. XLIII, 172. - P. Tardy ibid. 257. - J. Juhel-Rénoy ibid. 262. - E. Catalan ibid. 263.
560. Ser une transformation des équations aux dériyées partielles du second ordre.

560. Sur une transformation des équations aux dérivées partielles du second ordre. à deux variables indépendantes, et sur quelques intégrations qui s'en déduisent. R. Liouville. Compt. rend. XCVII, 836, 1122.

561. Sur l'intégration d'une certaine classe d'équations différentielles partielles du second ordre à deux variables indépendantes. A. Picart, Compt. XCVII, 305.

562. Integration einiger partieller Differentialgleichungen zweiter Ordnung.
Valyi. Grun, Archiv LXX, 219; LXXI, 109.

563. Sur les équations linéaires aux dérivées partielles, à deux variables inde pendantes, du deuxième et du troisième ordre. A. Picart, N. ann. math. XLII, 34.

Vergl. Functionen. Invariantentheorie 711. Potential.

Differentialquotienten.

564. Grundzüge zu einer combinatorischen Darstellung der höheren Differential quotienten zusammengesetzter Functionen. J. Vollers. Grun. A. chiv LXXI, 64.

665. Sur le calcul des dérivées à indices quelconques. H. Laurent, N. math. XLIII, 240. Vergl Taylor's Reihe.

Analytische Geometrie des Raumes,

520. Eine Curve aus einer Beziehung zwischen den Winkeln, welche die Tangente, Hauptnormale und Binormale mit festen Geraden bilden, zu bestimmen. R. Hoppe. Grun. Archiv LXXI, 46.

521. Théorème sur les surfaces développables. E. Cesaro. N. ann. math. XLII, 129, 266. 522. Sur l'angle des lits oblique et normal de la vis Saint-Gilles. E. Lebon. N. ann. math. XLIII, 40.

Vergl. Ellipsoid. Hyperboloid. Oberflächen. Oberflächen zweiter Ordnung. Paraboloid.

Astronomie.

528. Neue Methode zur Berechnung der Excentricität bei astronomischen Instrumenten und Uhren. F. C. Lukas. Grun. Archiv LXX, 268.

524. Sur une démonstration nouvelle du théorème de Lambert. N. Joukovsky. N. ann. math. XLIII, 90. — E. Catalan ibid. 506.
525. Sur une formule de Hansen. F. Tisserand. Compt. rend. XCVII, 815, 880. - P. Appell ibid. 1086. - R. Radau ibid 1130, 1275. - O. Callandreau ibid. 1187.

526. Sur le calcul des perturbations. A. de Gasparis. Compt. rend. XCVII, 738. 527. Sur un développement particulier de la fonction perturbatrice. O. Backlund. Compt. rend. XCVII, 1470. — R. Radau ibid. 1548.

528. Sur quelques méthodes pour la détermination des positions des étoiles circompolaires. O. Callandreau. Compt. rend. XCVII, 561.
529. Distance de la terre à la lune. C. Bertrand. N. ann. math. XLIII, 126.

530. Étant données les durées des quatre saisons de l'année astronomique, trouver l'excentricité de l'orbite de la terre. E. Fauquembergue. N. ann. math. XLII, 413. Vergl. Chronologie. Mechanik 771, 772.

Bernoulli'sche Zahlen.

 Beiträge zu der Kenntniss der Bernoulli'schen Zahlen. A. Lipschitz. Crelle XCVI, 1. Vergl. Reihen 852.

Bestimmte Integrale.

532. Démonstration du théorème de Cauchy. E. Goursat. Acta math. IV, 197. 583. Sur une méthode capable de fournir une valeur approchée de l'intégrale $\int_{-\infty}^{\infty} F(x) dx$. G. Gourier. Compt. rend. XCVII, 79.

584. Sur une valeur approchée de l'intégrale $\int_{-\varphi}^{\varphi}(x) \cdot e^{-x} \cdot dx$. R. Radau. Compt. rend. XCVII. 157 rend. XCVII, 157.

535. Sur l'évaluation approchée des intégrales. Stieltjes. Compt. rend. XCVII, 740, 798.

536. Sur une classe d'intégrales doubles. E. Goursat. Acta math. V, 97. [Vergl. Nr. 48.] Vergl. Gammafunctionen.

C.

Chronologie.

537. Changements produits sur la durée de l'année julienne par les variations des quantités dont dépend cette durée. A. Gaillot. Compt. rend. XCVII, 151, 564. — E. J. Stone ibid. 484. Vergl. Astronomie 530.

Combinatorik,

588. Die Umkehrung des Grundgedankens von Hindenburg's combinatorischer Analysis. F. Roth. Grun. Archiv LXX, 427.

539. Sur les permutations de n objets et sur leur classement. J. Bourget-N. ann. math. XLII, 433.

540. Sur le nombre des permutations de n éléments qui présentent s séquences. Dés. André. Compt. rend. XCVII, 1356.
541. Eine combinatorische Definition der Zahl e. Th. Sanio. Grun. Archiv LXX, 224; LXXI, 105 — Lampe ibid. LXX, 439. — P. Seelhoff ibid. LXXI, 97, 102. — J. Hermes ibid. LXXI, 103.
Veral Differentiale relief veral veral priferentiale relief veral priferentiale relief.

Vergl. Differential quotient 564. Wahrscheinlichkeitsrechnung.

- 592. Propriété de l'ellipse accompagnée de sa développée. J. Chambon. N. ann. math. XLII, 477.
- 593. Sur deux ellipses concentriques. Lez, N. ann. math. XLII, 325. Vergl Hyperbel 702, 703.

Ellipsoid.

594. On donne un ellipsoïde et un point A, on mène par ce point une sécante variable D; soit D_1 la droite conjuguée de D par rapport à l'ellipsoïde. Trouver le lieu de la projection M du point A sur la droite D_1 . Moret-Blanc. N. ann. math. XLII, 376.

595. Problème sur l'ellipsoide. Ch. Brisse, N. ann. math. XLIII, 323.

Elliptische Transcendenten.

- 596. Complex multiplication of elliptic functions. G. H. Stuart, Quart, Journ math. XX, 18, 221.
- 597. Sur la transformation des fonctions elliptiques. M. Krause. Acta math. III, 93. 598. Sur un point de la théorie des fonctions elliptiques. R. Lipschitz. Comptrend. XCVII, 1411. — Hermite ibid. 1414.
 599. On the quantities K, E, J, G, K', E', J', G' in elliptic functions. J. W. L. Glaisher. Quart. Journ. math. XX, 313.

600. Elliptische Integralfunctionen und ihre geometrische, analytische und dynamische Bedeutung. E. Oekinghaus. Grun. Archiv LXXI, 337.

601, Beiträge zur Theorie der elliptischen Functionen, H. Schroeter, Acta math. V, 205.

602. Beiträge zur Anwendung der Dreitheilung der elliptischen Functionen auf die Theorie der Wendepunkte einer Curve dritter Ordnung. L. Heinze Grun. Archiv LXX, 1.

603. Sur l'usage des produits infinis dans la théorie des fonctions elliptiques. Ch. Hermite. Acta math. IV, 193. - R. Lipschitz ibid. 194. Vergl, Abel'sche Transcendenten 502. Sphärik 865. Zahlentheorie 904.

Factorenfolge.

604. Darstellung der Zahl e als unendliches Product. J. Hermes. Grun. Archiv LXXI, 103.

605. Démonstration élémentaire de la formule de Stirling. E. Cesaro. N. ann. math. XLII, 43. Vergl. Elliptische Transcendenten 603. Gammafunctionen 631, 632.

606. Sur la formation des déterminants irréguliers. Jos. Perott. Crelle XCVI, 327. [Vergl Nr. 145.]
607. Sur les formes binaires indéfinies à indéterminées conjuguées. E. Picard

Compt. rend. XCVII, 745.

608. Sur les formes quadratiques ternaires indéfinies à indéterminées conjuguées et sur les groupes discontinus correspondants. E. Picard. Compt. rend. XCVII, 845.

609. Sur la réproduction des formes. H. Poincaré. Compt. rend. XCVII, 949. Vergl. Invariantentheorie.

- Functionen.
 610. Ueber Tiefgrössen mit gebrochenem Index. P. Lindner. Grun. Archiv LXX, 96.
 611. Ueber die einer beliebigen Differentialgleichung erster Ordnung angehörigen selbstständigen Transcendenten. L. Königsberger, Acta math 111, 1.
- 612. Ueber die Grundlagen der Theorie der Jacobi'schen Functionen. G. Frobenius. Crelle XCVII, 16, 188.
- 613. Allgemeine Untersuchungen über Rectification der Curven. L. Scheeffer. Acta math. V, 49.
- 614. Zur Theorie der stetigen Functionen einer reellen Verlinderlichen. L. Scheeffer. Acta math. V, 183, 279.

615. Beweis und Erweiterung eines algebraisch-functionentheoretischen Satzes des Herrn Weierstrass. M. Nöther. Crelle XCVII, 224.

616. Ueber den Zusammenhang der Werthe einer algebraischen Function. C. Runge. Crelle XCVII, 337.

617. Démonstration nouvelle du théorème de Laurent. G. Mittag-Leffler. Acta math. IV, 80.

- 618. Beweis des Laurent'schen Satzes. L. Scheeffer. Acta math. IV, 375.

- 619. Sur les groupes Kleinéens. H. Poincaré. Acta math. III, 49.
 620. Sur les groupes des équations linéaires. H. Poincaré. Acta math. IV, 201.
 621. Sur les fonctions zétatuchsiennes. H. Poincaré. Acta math. V, 209.
 622. Sur les formes quadratiques ternaires indéfinies à indéterminées conjuguées et sur les fonctions hyperfuchsiennes correspondantes. Em. Picard.
 Acta math. V, 121. [Vergl. Bd. XXIX, Nr. 169.]
 623. Sur la représentation analytique des fonctions monogloss miferance.
- 623. Sur la représentation analytique des fonctions monogènes uniformes d'une variable indépendante. G. Mittag-Leffler. Acta math. IV, 1.
- 624. Décomposition en éléments simples des fonctions doublement périodiques de
- troisième espèce. Appell. Compt. rend. XCVII, 1419.
 625. Sur le genre d'une relation algébrique entre deux fonctions uniformes d'un point analytique (x, y). E. Goursat. Compt. rend. XCVII, 1048.
- 626. Représentation des fonctions d'une ou de plusieurs variables, entre de certaines limites de ces variables, par des series. A. Picart. N. ann. math. XLII, 109.
- 627. Sur les fonctions de deux variables indépendantes, restant invariables par les substitutions d'un groupe discontinu E. Picard. Compt. rend. XCVII,
- 628. Sur un théorème de Riemann relatif aux fonctions de n variables indépendantes admettant 2n systèmes de périodes. H. Poincaré & E. Picard. Compt. rend. XCVII, 1284.
 - Vergl Abbildung. Abel'sche Transcendenten. Bernoulli'sche Zahlen. Bestimmte Integrale. Cylinderfunctionen. Differentialgleichungen. Differentialquotienten. Elliptische Transcendenten. Factorenfolge. Gammafunctionen. Integration (unbestimmte). Kettenbrüche. Potential. Quaternionen. Reihen. Rectification. Taylor's Reihe. Thetafunctionen. Ultraelliptische Transcendenten. Umkehrungsproblem. Variationsrechnung.

G.

Gammafunctionen.

- 629. Zur Theorie der Functionen $\Gamma(z)$, P(z), Q(z). 1. Scheeffer. Crelle XCVII, 230.
- 630. Eine Verallgemeinerung der Gleichung $\Gamma(1+x) \cdot \Gamma(1-x) = \frac{\pi x}{\sin \pi x}$. H. Mellin. Acta math. III. 102. Acta math. III, 102.
- 631. Ueber gewisse durch die Gammafunction ausdrückbare unendliche Producte. H. Mellin. Acta math. III, 322.
- $\left[\frac{\Gamma(\frac{1}{4})}{\Gamma(\frac{3}{4})}\right]^2 = 8 \cdot \frac{9}{8} \cdot \frac{24}{24} \cdot \frac{49}{8} \cdot \frac{80}{81} \dots \quad \text{L. B. N. ann. math. XLII, 429.}$ Vergi. Factorenfolge 605.
- Geodäsie. 633. Proposition sur une question de mécanique relative à la figure de la terre. E. Brassinne. Compt. rend. XCVII, 637. [Vergl. Nr. 693.]

Geometrie (abzählende).

- 634. Sur les pentaèdres complets inscrits à une surface cubique. H. G. Zeuthen. Acta math. V, 203.
- 685. Einige Anzahlen für Kegelflächen. H. Krey. Acta math. V, 88.

- Geometrie (descriptive).

 636. Sur la ponctuation. J. Caron. N. ann. math. XLII, 161.
 637. Zur perspectivischen Projection. E. Hain. (frun. Archiv LXX, 281.
 638. Beleuchtungsconstructionen für Flächen, deren zu einer Axe normale Schnitte ähnlich und ähnlichliegend sind, bei orthogonaler und bei perspectivischer Darstellung. J. Bazala. Grun. Archiv LXXI, 266.
 639. Construction des points doubles en projection dans l'intersection de deux sur-
- faces du second degré. L. Lefèvre. N. ann. math. XLIII, 5.
- 640. Construction des tangentes au point double de la section du tore par son plan tangent. Doucet. N. ann. math. XLIII, 430.

Geometrie (höhere).

- 641. Theorie der trilinearen Verwandtschaft ebener Systeme. G. Hauck. Crelle XCVII, 261. [Vergl. Nr. 207.]
- 642. Mehriache Collineation von zwei Dreiecken. J. Valyi. Grun. Archiv LXX. 105. — R. Hoppe ibid. 334.

21

- 43. Sur les anticaustiques par réflexion de la parabole, les rayons incidents étant parallèles. Laguerre. N. ann. math. XLII, 16.
 644. Sur quelques propriétés des cycles. Laguerre. N. ann. math. XLII, 65.
- 645. Sur les courbes de directions de la troisième classe. Laguerre. N. annmath. XLU, 97.
- 646. Sur la transformation par semi-droites réciproques. M. d'Ocagne. N. ann. math. XLII, 249.
- 647. Semi-droites réciproques parallèles a l'axe de transformation. M. d'Ocagne. N. ann. math. XLIII, 23.
 648. Sur les quadrilatères qui ont leurs six sommets sur une cubique. Weill. N. ann. math. XLIII, 401.
- 649. Sur les cubiques gauches passant par sinq points donnés. G. Koenigs. N. ann. math. XLII, 301; XLIII, 47.
- 650. Sur quelques courbes enveloppes. Weill. N. ann. math. XLIII, 376.
- 651. Recherche d'une courbe plane possédant un lieu géométrique de poles principaux d'inversion. G. Fouret. N. ann. math. XLII, 259.
- 652. Sur un mode de génération des ovales de Descartes proposé par Chasles. M. d'Ocagne. Compt. rend. XCVII, 1424.
- 653. On plane curves of the fourth class with a triple and a single focus. Jeffery. Quart. Journ. math. XX, 273.
- 654. Das Strahlensystem vierter Ordnung zweiter Classe. W. Stahl. Crelle XCVII, 146.
- 655. Das allgemeine räumliche Nullsystem zweiten Grades. Ad. Ameseder. Crelle XCVII, 62.
 - Vergl. Differentialgleichungen 544. Elliptische Transcendenten 602. Gleichungen 680, 681. Kegelschnitte. Maxima und Minima. Oberflächen. Oberflächen zweiter Ordnung. Singularitäten.

Geometrie (kinematische).

- 656. Théorème de cinématique. E. Dewulf. N. ann. math. XLII, 297. 657. Sur une question de cinématique. L. Jacob. N. ann. math. XLIII, 29. 658. Sur l'enveloppe de certaines droites variables. M. d'Ocagne. N. ann. math. XLII, 252.
- 659. Dans quels cas certaines surfaces sont-elles développables? E. Cesaro. N. ann. math. XLIII, 434.
 - Geometrie (der Lage).
- 660. Zur Theorie der Raumcurven vierter Ordnung erster Art. Milinowski. Crelle XCVII, 277.
- 661. Beitrag zur Geometrie der Lage. L. Klug. Grun. Archiv LXX, 446. 662. Zwei Sätze über Linienschnitte. Fr. Hofmann. Grun. Archiv LXX, 443.

Geschichte der Mathematik.

- 663. Geschichte der Factorentaseln. P. Seelhoff. Grun. Archiv LXX, 413. 664. Mort de Mr. Maillard de la Gournerie † 25. Juin 1883. E. Blanchard.
- Compt. rend. XCVII, 5. J. Bertrand ibid. 6.
 665. Mort de Victor Puiseux † 9 Sept. 1883. E. Blanchard. Compt. rend.
 XCVII, 655. J. Bertrand ibid. 655.
- 666. Mort de J. A. F. Plateau † 15. Sept. 1883. Faye. Compt. rend. XCVII, 687. 667. Mort de Louis Breguet † 26. Oct. 1883. E. Blanchard. Compt. rend. XCVII,
- 927. Janssen ibid. 967. Cloué ibid. 971. 668. Mort d'Yvon Villarceau + 23. Déc. 1883. E. Blanchard. Compt. rend. XCVII, 1453. - Perrier ibid. 1454. - Faye ibid. 1459. - Tisserand ibid. 1460.

Gleichungen.

- 669. Démonstration nouvelle du théorème fondamental de la théorie des équations algébriques. H. Dutordoir. Compt. rend. XCVII, 742. 670. Démonstration du théorème de d'Alembert. Walecki. N. ann. math. XLII, 241.
- 671. Sur le calcul des fonctions symétriques des racines d'une équation. Ch. Biehler. N. ann. math. XLIII, 218.
- 672. A new theorem in symmetric functions. P. A. Mac Mahon. Quart. Journ. math. XX, 365.
- 673. Note on Sylvester's canonical form of binary quantics of the degree 2n-1.
- W. Booth. Quart. Journ. math. XX, 270.
 674. On the trinomial unilateral quadratic equation in matrices of the second order. J. J. Sylvester. Quart. Journ. math. XX, 305.
 675. Sur la règle des signes. H. Poincaré. Compt. rend. XCVII, 1418.

- 676. Sur la réduction des équations. A. E. Pellet. Compt. rend. XCVII, 85. 677. Sur la transformation des équations. Ch. Biehler. N. ann. math. XLIII, 209.
- 678. Problème sur les aiguilles du cadran d'une montre. Moret-Blanc. N. ann. math. XLII, 523. - C. A. Laisant ibid. XLIII, 383.
- 679. Quelques formules relatives à l'équation complète du troisième degré. C. Margerie. N. ann. math. XLIII, 32.
- 680. Geometrische Untersuchungen über kubische und höhere Curven und Gleich-
- ungen. E. Oekinghaus. Grun Archiv LXX, 370.
 681. Mechanisch-graphische Lösung der kubischen und biquadratischen Gleichungen. C. Bartl. Grun. Archiv LXXI, 1.
- 682. Sur le discriminant de l'équation du quatrième degré. Weill. N. ann. math. XLII, 265.
- 683. Trigonometrische Auflösung biquadratischer Gleichungen in geometrischer Darstellung. E. Oekinghaus. Grun. Archiv LXX, 133.
 684. Équation aux carrés des différences de l'équation générale du quatrième degré.
- Forestier. N. ann. math. XLII, 209.
- 685. Décomposition d'un certain polynôme du quatrième degré en deux facteurs du second degré. N. Goffart. N. ann. math. XLIII, 442. — H. Plamenevsky ibid, 530.
- 686. Sur la substitution $x = \frac{\alpha y + \beta}{\gamma y + \delta}$ dans une équation de degré pair 2*m*, pouvant se partager en m groupes de deux racines x_1 , x_2 satisfaisant à la relation $ax_1x_2 + b(x_1 + x_2) + c = 0$. E. Fauquembergue. N. ann. math. XLIII, 386.
- 687. Sur quelques points de la théorie des équations numériques. E. Laguerre. Acta math. IV, 97.
- 688. Sur l'approximation des racines des équations algébriques. Laguerre. N. ann. math. XLIII, 113.
- 689. Calcul à $\frac{1}{10^n}$ près des racines incommensurables d'une équation numérique
- dont toutes les racines sont réelles. C. Margerie. N. aun. math. XLIII, 38. 690. Die Auflösung dreigliedriger Gleichungen nach Gauss. A. M. Nell. Grun. Archiv LXXI, 311.
- 691. Résolution de deux équations du 4º degré ayant deux racines communes.
 N. ann. math. XLIII, 348.
 692. Ueber lineare Gleichungen. C. Prediger. Grun. Archiv LXX, 319.
- Vergl. Analytische Geometrie der Ebene 517. Elimination. Reihen 852.

H.

Hydrodynamik.

- 693. Application d'une proposition de mécanique à un problème relatif à la figure de la terre. E. Brassinne. Compt. rend. XCVII, 1137. [Vergl. Nr. 633.] 694. Recherches hydrodynamiques. C. A. Bjerknes. Acta math. IV, 121. 695. On hydro-kinetic symmetry. J. Larmor. Quart. Journ. math. XX, 261.
- 696. Des vitesses que prennent, dans l'intérieur d'un vase, les divers éléments d'un liquide pendant son écoulement par un orifice inférieur, et des moyens simples qui peuvent être employés pour déterminer très approximativement les restes numériques de séries doubles peu convergentes. De Saint-Venant & Flamant. Compt. rend. XCVII, 1027, 1105.
- 697. On the motion of spherical and ellipsoidal bodies in fluid media. K. Pearson. Quart. Journ. math. XX, 60, 184.
- 698. On the motion of a liquid in and about certain quartic and other cylinders.
 A. B. Basset. Quart. Journ. math. XX, 234.

Hyperbel.

- 699. Propriétés de l'hyperbole. C. Chateau. N. ann. math. XLII, 133. L. Chauchat ibid. 136.
- 700. Trouver le lieu des foyers d'une hyperbole dont on connaît un sommet et une asymptote. Sequestre. N. ann. math. XLIII, 318. — Gerono ibid. 319.
- 701. Lieu géométrique du point d'intersection d'une asymptote de l'hyperbole avec une directrice, le foyer correspondant décrivant une ligne droite donnée. H. Cartier. N. ann. math. XLII, 420. — Gerono ibid. 421. 702. Sur une hyperbole tangente aux axes d'une ellipse, les asymptotes de l'hyper-
- bole étant tangentes à l'ellipse. Juhel-Rénoy. N. unn. math. XLIII, 352.

703. Hyperbole lieu des points de contact de toutes les ellipses confocales avec des droites parallèles à une direction donnée. Goffart. N. ann. math. XLII, 353.

704. L'angle de deux hyperboles équilatères concentriques est double de l'angle de leurs asymptotes. Giat. N. ann. math. XLII, 332.

Vergl. Ellipse 590. Hyperboloid.

Hyperboloid.

705. Anwendung der Eigenschaften des einmanteligen Rotationshyperboloides sur Lösung einiger Aufgaben über die Hyperbel. W. J. Hübner. Grun Archiv LXX, 435.

Integration (unbestimmte).

706. Valeur d'une intégrale contenant la racine carrée d'un polynôme du degré ». Ch. Chabanel. N. ann. math. XLII, 378.

707. Valeur de deux intégrales contenant la racine carrée du polynome **x*-1 $+(n-1)x^{n-2}+...+2x+1$. Rebuffel. N. ann. math. XLII, 374.

Interpolation.

Einfache Methode, beim Interpoliren die zweiten Differenzen in Rechnung zu ziehen. Nell. Grun. Archiv LXX, 302.

Invariantentheorie.

709. On a theorem relating to semiinvariants. Cayley. Quart Journ. math. XX, 212. 710. Operations in the theory of semiinvariants. P. A. Mac Mahon. Quart. Journ. math. XX, 362.

711. Sur les invariants des équations différentielles linéaires du quatrième ordre.

G. H. Halphen. Acta math. III, 325.
712. Sur le système complet des combinants de deux formes binaires biquadratiques. C. Stephanos. Compt. rend. XCVII, 27. Vergl. Formen.

K.

Kegelschnitte.

718. Ueber die Bestimmung der Unterscheidungscharaktere für die Kegelschnitte, wenn die Gleichungen derselben in trimetrischen Liniencoordinaten gegeben sind. A. Ehlert. Grun. Archiv LXXI, 51.
714. Zur elementargeometrischen Kegelschnittslehre. K. Lauermann.
Archiv LXXI, 126.

715. Sur les triangles conjugués à une conique et sur les tétraèdres conjugués à une quadrique. Humbert. N. ann. math. XLII, 167.

716. Eine Verallgemeinerung der Sätze von Pascal und Brianchon und das Problem von Castillon. B. Sporer. Grun. Archiv LXXI, 333.

717. Démonstration et conséquences du théorème que deux coniques quelconques sont polaires réciproques, G. Tarry. N. ann. math. XLIII, 270.
718. Réciprocité du centre d'une conique et d'un point d'un triangle inscrit. J. Richard. N. ann. math. XLIII, 490.

719. Relations entre les distances d'un foyer d'une conique à quatre points ou à quatre tangentes. X. Antomari. N. ann. math. XLII, 193, 337, 385.

720. Lieu des sommets de triangles circonscrits à une conique donnée. H. Faure. N. ann. math. XLIII, 144. [Vergl. Bd. XXVII, Nr. 68.]

721. Perspectivische Dreiecke, die einem Kegelschnitte einbeschrieben sind. L. Klug. Grun. Archiv LXXI, 292. [Vergl. Nr. 661.]

722. Cercle inscrit d'un triangle dont les sommets sont les foyers d'une conique donnée et un point donné de la même conique. N. ann. math. XLIII, 449.

723. Quadrilatères inscrits dans une conique le point de concours des diagonales étant fixe. M. d'Ocagne. N. ann. math. XLIII, 528.

724. Sur la condition pour qu'un polygone soit inscrit et circonscrit à deux coniques.
Weill. N. ann. math. XLIII, 128.

725. Propriété des tangentes à une coniques menées de deux points situés sur l'axe des x et équidistants de l'origine. Moret-Blanc. N. ann. math. XLII, 522. — Barisien ibid. XLIII, 441.

726. Conique engendrée par le point d'intersection de deux tangentes à une conique donnée. L. Kien. N. ann. math. XIII, 511.

- 727. Propriété d'une conique et de deux tangentes. N. Goffart. N. ann. math. XLII, 375
- 728. En chaque point d'une conique on mène un diamètre et la normale. Trouver le sieu de l'intersection du diamètre et de la tangente à l'autre extrémité de la corde normale. Moret-Blanc. N. ann. math. XLII, 471.
- 729. Bestimmung der Osculationskreise der Kegelschnitte mit Hilfe von Eigenschaften der Sehnen, welche ein Kegelschnitt mit seinen Osculationskreisen gemein hat. Jos. Zimmermann. Grun. Archiv LXX, 30.
- 730. Ueber die Mittelpunkte der Sehnen, welche ein Kegelschnitt mit seinen Osculationskreisen gemein hat. Jos. Zimmermann. Grun. Archiv LXX, 38.
- 731. Coniques passant par les points d'intersection de deux circonférences et tangentes à toutes les deux. A. Hilaire. N. ann. math. XLII, 504. [Vergl. Bd. XXVIII, Nr. 618.]
- 732. Cordes parallèles aux tangentes menées d'un point à une conique. N. Goffart. N. ann. math. XLIII, 492.
- 733. Propriété des segments d'une droite passant par deux coniques homothétiques et leur sécante commune. E. Fauquembergue. N. ann. math. XLII,
- 734. Sur les coniques qui coupent à angle droit une conique donnée. Weill. N. ann. math. XLIII, 320.
- 735. Théorèmes sur trois coniques d'un faisceau linéaire. Weill. N. ann. math. XLUI, 19.
- 736. Ueber einige Eigenschaften einer besonderen Kegelschnittschaar. C. Hossfeld. Grun. Archiv LXX, 253.
- 737. Einige Sätze über das Viereck und Kegelschnittbüschel. L. Klug. Grun. Archiv LXXI, 304. Vergl. Ellipse. Hyperbel. Kreis. Parabel.

Kettenbrüche.

738. Sur un développement en fraction continue. L. Fuchs. Acta math. IV, 89. Ch. Hermite ibid. 91. Vergl. Optik 813.

Kreis.

- 739. Relation entre les distances deux à deux de quatre points du cercle ou de cinq points d'une sphère. H. Faure. N. ann. math. XLIII, 196.
 740. Propriété des deux droites de Simson. N. Goffart. N. ann. math. XLIII, 397.
 741. Cercle enveloppé par une droite. Colin. N. ann. math. XLIII, 248.
 742. Sur le cercle qui a pour diamètre une corde d'une conique à centre. Weill. N. ann. math. XLIII, 136. Juhel-Rénoy biold 336.
 748. Sur le circulture des neut points. E. Catalann. N. ann. math. XLIII 82.

- 748. Sur la circonférence des neuf points. E. Catalan. N. ann. math. XLII, 82. 744. Nouveau point situé sur le cercle des neuf points. V. de Strékalof. N. ann. math. XLII, 326.
- 745 Sur deux cercles tangents entre eux et touchant chacun une de deux droites fixes. Moret-Blanc. N. ann. math. XLHI, 542.
- 746. Sur les cercles tangents à trois cercles et les sphères tangentes à trois ou à quatre sphères. A. Pellet. N. ann. math. XLIII, 316.
- 747. Recherche des cercles coupant trois cercles donnés sous des angles déterminés. E. M. Laquière. N. ann. math. XLII, 272, 348.
 748. A group of circles. R. Tucker. Quart. Journ. math. XX, 57.

M.

Magnetismus.

- 749. Comparaison des hypothèses des fluides magnétiques et des courants moléculaires. P. Le Cordier. Compt. rend. XCVII, 478.
- 750. Sur l'induction. P. Le Cordier. Compt. rend. XCVII, 625.

Mannichfaltigkeiten.

- 751. De la puissance des ensembles parfaits de points. G. Cantor. Acta math. IV, 381.
- 752. Beweis eines Satzes aus der Mannichfaltigkeitslehre. E. Phragmén. Acta math. V, 47.
- Maxima und Minima. 758. Bemerkungen und Zusätze zu Steiner's Aufsätzen über Maximum und Minimum, R. Sturm. Crelle XCVI, 36.

Optik.

- 813. Formules générales des systèmes dioptriques centrés. Monoyer. Compt. rend. XCVII, 88.
- 814. Ueber optische Strahlensysteme. M. Blasendorff. Crelle XCVII, 172.
- 815. Ueber die Lage der Brennlinien eines unendlich dünnen Strahlenbundels gegen einander und gegen einen Hauptstrahl L. Matthiessen. Acta math IV, 177.
- 816. Construction géométrique des caustiques par réflexion. Laquière. N. ann. math. XLII, 74.
- 817. Rückblick auf eine Schattenfläche von Laplace. A. Wittstein. Grun Archiv LXX, 239.
- 818. Zu einem Aufsatze von Dr. E. Maiss. A. Wangerin. Grun. Archiv LXX, 111. [Vergl. Bd. XXVII, Nr 204.]
- 819. Vitesse des ondes. Rayleigh. Compt. rend. XCVII, 567. Guy ibid. 1476. 820. Sur la dispersion de la lumière. C. E. de Klercker. Compt. rend. XCVII, 707.
- 821. Détermination des constantes optiques d'un cristal biréfringent à une axe. L. Lévy. Compt. rend. XCVII, 1296.

Vergl. Geometrie (descriptive) 638. Geometrie (höhere) 643.

Parabel.

- 822. Propriété des normales à une parabole. N. Goffart. N. ann. math. XLII, 331. 823. Sur les trois normales menées d'un point à une parabole. A. Chambeau N. ann. math. XLU, 500.
- 824. Sur les trois cercles osculateurs d'une parabole qui touchent une tangente à cette courbe. Ch. Brisse. N. ann. math. XLIII, 388.
- 825. Contour polygonal inscrit dans une parabole. More t-Blanc. N. ann. math. XLU, 322.
- 826. Propriété d'une parabole ayant une certaine droite pour directrice et un certain point pour sommet. E. Barisien. N. ann. math. XLII, 415.
 827. Construire une parabole tangente à une circonférence donnée, connaissant l'are
- et le paramètre de la parabole. Moret-Blanc. N. ann. math. XLIII, 894.
- 828. Paraboles tangentes à la fois deux droites rectangulaires et un cercle tangent
- à ces deux droites. E. Barisien. N. ann. math. XLIII, 535. 829. Théorème sur deux paraboles. L. Clément. N. ann. math. XLIII, 487. Vergl. Geometrie (höhere) 643.

Paraboloid.

830. Sur les lignes de courbure du paraboloïde équilatère. P. Barbarin. N. ann. math. XLIII, 97.

Pendel.

- 831. Einfaches Pendel im Raume bei Anziehung von einem Punkte in endlicher Entfernung. R. Hoppe. Grun. Archiv LXX, 405.
 832. Oscillationen eines Bifilarpendels. R. Hoppe. Grun. Archiv LXX, 188.

Planimetrie.

- 833. The symmedian-point axis of an associated system of triangles. R. Tucker. Quart. Journ. math. XX, 167.
- 834. Sur la symédiane. M. d'Ocagne. N. ann. math. XLII, 450; XLIII, 25.
- 835. Sur les propriétés segmentaires du triangle. M. d'Ocagne. N. ann. math. XLII, 497. De Saint-Germain ibid. XLIII, 302.
- 836. Propriété du centre du cercle circonscrit à un triangle en rapport avec le point d'intersection des trois hauteurs. E. Lemoine. N. ann. math. XLII, 525.
- 837. Point d'intersection de trois droites. M. Raclot. N. ann math. XLII, 478. 838. Théorème sur le triangle rectangle. Goffart. N. ann. math. XLII, 527.
- 839. Sind in einem geradlinigen Dreieck zwei Winkelhalbirende gleich, so liegen die halbirten Winkel an der Grundlinie eines gleichschenkligen Dreiecks. P. Seelhoff. Grun. Archiv LXX, 223.
- 840. Aufgabe über das gleichschenklige Dreieck. H. Simon. Grun. Archiv LXXI, 222. [Vergl. Bd. XXVIII, Nr. 337.]
- 811. Trouver les côtés d'un triangle, la somme de leurs cubes étaut donnée et sup posant qu'ils soient multiples du rayon du cercle inscrit. N. san. math. XLIII, 444.

785. Sur le fonctionnement d'une turbine. M. Deprez. Compt. rend. XCVII, 697. Vergl. Akustik. Analytische Geometrie der Ebene 508, 517. Elasticität. Elektricität. Geodäsie. Hydrodynamik. Magnetismus. Optik. Pendel. Schwerpunkt. Wärmelehre.

Mehrdimensionale Geometrie.

786. Ausdehnung einiger elementarer Sätze über das ebene Dreieck auf Räume von beliebig vielen Dimensionen. R. Mehmke. Grun. Archiv LXX, 210.

Oberflächen.

- 787. Sur la génération des surfaces. J. S. & M. N. Vanèček. Compt. rend. XCVII, 1473, 1548.
- 788. Sur les surfaces du troisième ordre, C. Le Paige. Compt. rend. XCVII,
- 789. Sur les surfaces du troisième ordre. C. Le Paige. Acta math. III, 181.
- 790. Nouvelles recherches sur les surfaces du troisième ordre. C. Le Paige. Acta math. V, 195.
- 791. Lineare Constructionen zur Erzeugung der kubischen Fläche. H. Schroeter. Crelle XCVI, 282.
- 792. Sur un faisceau de surfaces d'ordre quelconque. A. Legoux. N. ann. math. XLII, 233; XLIII, 161.
 793. Ueber Canalflächen. R. Hoppe. Grun. Archiv LXXI, 280.
 794. Sur la surface des ondes. G. Darboux. Compt. rend. XCVII, 1089, 1133.

- 795. Sur une famille de surfaces développables passant par une courbe gauche donnée. L. Lévy. Compt. rend. XCVII, 986.
- 796. Sur la construction des plans tangents d'une surface de révolution qui passent par une droite donnée. Rouquet. N. ann. math. XLIII, 194.
- 797. Sur une famille de surfaces algébriques; considérations sur des surfaces orthogonales et homofocales. A. Legoux. Quart. Journ. math. XX, 1.
 798. Sur les systèmes triples de surfaces orthogonales. Doucet. N. ann. math. XLIII, 315.
- 799. Sur l'équation aux dérivées partielles du troisième ordre des systèmes ortho-
- gonaux. G. Darboux. Acta math. IV, 93.
 800. Sur les cercles géodésiques. G. Ossian Bonnet. Compt. rend. XCVII, 1360.
- 801. Sur le système de coordonnées polaires géodésiques. G. Ossian Bonnet, Compt. rend. XCVII, 1422.
- 802. Sur les diverses courbures des lignes qu'on peut tracer sur une surface. Issoly. N. ann. math. XLIII, 522.
- 803. Krümmungslinien in den Nabelpunkten von Flächen. R. Hoppe. Grun, Archiv LXX, 289.
- 804. Ueber die Krümmung der Flächen. O. Böklen. Crelle XCVI, 152.
- 805. Sur les surfaces dont la courbure totale est constante. G. Darboux. Compt. rend. XCVII, 848.
- 806. Sur les surfaces à courbure constante. G. Darboux. Compt. rend. XCVII, 892, 946.
- 807. Zur Theorie der Flächen gerader Ordnung. Ed. Mahler. Grun. Archiv LXX, 313.
- 808. Ueber die Singularitätenflächen quadratischer Strahlencomplexe und ihre Haupttangentencurven. Th. Reye. Crelle XCVII, 242. Vergl. Geometrie (abzühlende).

Oberflächen zweiter Ordnung.

- 809. Théorie des surfaces du second ordre en coordonnées obliques. S. Gundel-
- finger. N. ann. math. XLIII, 7. [Vergl. Bd. XXVIII, Nr. 694.] 810. Sur le complexe formé par les axes d'une surface du second ordre. G. Koenigs. N. ann. math. XLII, 267.
- 811. Sur l'intersection de deux quadriques réglées. E. Lebon. N. ann. math. XLII, 47.
- 812. Ueber die Durchdringung gleichseitiger Rotationshyperboloide von parallelen Axen. W. Fiedler. Acta math. V, 331.

 Vergl. Ellipsoid. Geometrie (descriptive) 639. Hyperboloid. Kegelschnitte 715. Paraboloid. Sphärik.

- 866. Ein Problem über berührende Kugeln. R. Hoppe. Grun. Archiv LXXI, 148. 867. Théorème sur trois cordes d'une sphère passant par un même point intérieur. H. Faure. N. ann. math. XLIII, 534.
- 868. Sphère passant par les pieds de quatre normales à un paraboloïde elliptique partant d'un même point. Fontené. N. ann. math. XLIII, 423. Vergl. Kreis 746.
- Stereometrie. 869. Sur l'existence de certains polyèdres. E. Cesaro. N. ann. math. XLII, 46. 870. Sur certaines plus courtes distances dans un tétraèdre. H. Brocard. N. ann. math. XLIII, 531.
- 871. Angle compris entre deux faces latérales d'une pyramide à base carrée. J. Richard. N. ann. muth. XLIII, 493.

Substitutionen.

- 872. Quelques propriétés élémentaires des groupes plusieurs fois transitifs. E. Cesaro. N. ann. math. XLIII, 471.
- 873. Sur les groupes d'ordre fini, contenus dans le groupe des substitutions quadratiques homogènes à trois variables. L. Autonne. Compt. rend. XCVII, 567.

Taylor's Reihe. 874. Sur le théorème $f(x+h) - f(x) = h \cdot f'(x+\Theta h)$. J. Peans. N. ann. math. XLIII, 45, 252. — C. Jordan ibid. 47. — Ph. Gilbert ibid. 153, 475.

Thetafunctionen.

- 875. Zur Transformation der Thetafunctionen. Ferd. Müller. Gran. Archiv LXXI, 161.
- 876. Verallgemeinerung einer Relation der Jacobi'schen Functionen. R. Hoppe. Grun. Archiv LXX, 400.
- 877. Ein neuer Beweis für die Riemann'sche Thetaformel. F. Prym. Acta math. III, 201.
- 878. Ableitung einer allgemeinen Thetaformel. F. Prym. Acta math. III, 216. 879. Ueber die Verallgemeinerung der Riemann'schen Thetaformel. A. Krazer & F. Prym. Acta math. III, 240.
- 880. Ueber Gruppen von Thetacharakteristiken. G. Frobenius. Crelle XCVI, 80. 881. Ueber Thetafunctionen mehrerer Variabeln. G. Frobenius. Crelle XCVI, 100.
- 882. Ableitung des Weierstrass'schen Fundamentaltheorems für die Sigmafunction mehrerer Argumente aus den Kronecker'schen Relationen für Subdeterminanten symmetrischer Systeme. F. Caspary. Crelle XCVI, 182
- 883. Zur Theorie der Thetafunctionen mehrerer Argumente. F. Caspary. Crelle XCVI, 324.
- 884. Ueber das Additionstheorem der Thetafunctionen mehrerer Argumente. F. Caspary. Crelle XCVII, 165.

Trigonometrie.

- 885. Sur quelques identités trigonométriques. G. Fouret. N. ann. math. XLII, 262. 886. Note de trigonométrie élémentaire. N. Goffart. N. ann. math. XLIII, 104. 887. Propriété de tout point intérieur à un triangle. N. Goffart. N. ann. math. XLIII, 443.
- 888. Diviser un triangle par des perpendiculaires tirées d'un point intérieur sur les côtés en trois quadrilatères équivalents. Laser. N. ann math. XLIII, 332. 889. Condition sous laquelle un triangle se trouve isoscèle. N. Goffart. N. ann.
- math. XLII, 521.
- 890. Ein Dreieck zu construiren aus einem Winkel, der Winkelhalbirenden und der durch die Winkelspitze gehenden Mittellinie, P. Seelhoff. Grun. Arch. LXXI, 97.
- 891. Calculer un triangle connaissant deux côtés et sachant qu'il est équivalent au triangle équilatéral construit sur le troisième côté. Moret-Blanc. N. ann. math. XLU, 466.
- 892. Sur un triangle et quadrilatère équivalents. Moret-Blanc. N. ann math XLIII, 494.
- 898. Calcul de l'angle entre le diamètre d'un cercle passant par un point donné et une sécante passant par le même point. Moret Blanc. N. ann. math XLII, 464.

Vergl. Gleichungen 633. Sphärik.

Ultraelliptische Transcendenten.

894. Zur Theorie der Transformation hyperelliptischer Functionen zweier Argumente. Wiltheiss. Crelle XCVI, 17.

895. Sur le multiplicateur des fonctions hyperelliptiques de premier ordre. M. Krause. Acta math. III, 283.

896. Sur la transformation des fonctions hyperelliptiques du premier ordre. M. Krause. Acta math. III, 153.

Umkehrungsproblem.

897. Sur la généralisation d'une formule d'Abel. N. Sonine. Acta math. IV, 171.

Variationsrechnung.

898. Théorie nouvelle du calcul des variations. A. Picart. N. ann. math. XLII, 49.

Wärmelehre.

899. Sur la mesure des chaleurs spécifiques et des conductibilités. Morisot. Compt. rend. XCVII, 1426.

900. Mode de répartition de la chaleur développée par l'action du forgeage. Tresca. Compt. rend. XCVII, 222. Vergl. Mechanik 779.

Wahrscheinlichkeiterechnung.

901. Probabilité pour qu'une permutation donnée de n lettres soit une permutation alternée. Dés. André. Compt. rend. XCVII, 983.
902. Sur une question de probabilité géométrique. E. Lemoine. N. ann. math.

XLUİ, 118.

903. Une question de rentes viagères. L. Lindelöf. Acta math. HI, 97.

Z.

Zahlentheorie.

904. Sur quelques conséquences arithmétiques des formules de la théorie des fonc-

tions elliptiques. Ch. Hermite. Acta math. V, 297.

905. Beweise des Reciprocitätsgesetzes für die quadratischen Reste. L. Kronecker. Crelle XCVI, 348; XCVII, 98.

906. On the fonction z(n). J. W. L. Glaisher. Quart. Journ. math. XX, 97.

907. Propriétés d'une fonction arithmétique. E. Cesaro. N. ann. math. XLIII, 431.

908. Sur un théorème de Liouville relativ aux nombres de classes de formes qua-

dratiques. Stieltjes. Compt. rend. XCVII, 1858, 1415.

909. Sur la fonction f(n) qui dénonce le nombre des solutions de l'équation $n = x^2 + y^2$. Stieltjes. Compt. rend. XCVII, 889.

910. Nombre total des solutions entières d'un certain système d'équations. N.

Goffart. N. ann. math. XLIII, 589.

911. Nombre des solutions entières (non négatives) des équations x + 2y = n - 1, 2x + 3y = n - 8, 3x + 4y = n - 5 etc. E. Cesaro N. ann. math. XLII, 380.

912. Résolution complète, en nombres entiers, de l'équation générale du second degré, homogène et contenant un nombre quelconque d'inconnues. Desboves. N. ann. math. XLIII, 225.

913. Le nombre $\frac{(\sqrt{2}+1)^{2n-1}+(\sqrt{2}-1)^{2n-1}}{(\sqrt{2}-1)^{2n-1}}$ - est la somme des carrés de deux nombres 2 V 2

entiers. E. Fauquembergue. N. ann. math. XLII, 476.

914. a, b, n étant des nombres entiers et n > 1, la quantité $(a + \sqrt{a^2 + b^2})^{2n-1} + (-a + \sqrt{a^2 + b^2})^{2n-1}$

$$\frac{(a+\sqrt{a^2+b^2})^{2n-1}+(-a+\sqrt{a^2+b^2})^{2n-1}}{(a+\sqrt{a^2+b^2})^{2n-1}}$$

 $2 \sqrt{a^2 + b^2}$

est la somme de deux carrés et aussi la somme de trois carrés. E. Catalan. N. ann. math. XLIII, 342.

915. Tout nombre dont le carré se compose des carrés de deux nombres entiers consécutifs est égal à la somme des carrés de trois nombres entiers dont deux, au moins, sont consécutifs. Romero. N. ann math. XLII, 822. 916. a, x, y étant des nombres entiers chaque valeur de x qui vérifie l'équation $(a^2+1)x^2=y^2+1$, en dehors de x=1 et de x=4 a^2+1 , est la somme de trois carrés. E. Fauquembergue. N. ann. math. XLIII, 345.

917. La somme des puissances 4n de deux nombres entiers inégaux est une somme de quatre carrés, dont deux sont égaux entre eux. E. Catalan. N. ann.

math XLIII, 347.

918. On the representations of a number as the sum of four uneven squares, and as the sum of two even and two uneven squares. J. W. L. Glaisher Quart. Journ. math. XX, 80

919. Sur la décomposition d'un nombre en cinq carrés. Stieltjes. Compt. rend.

XCVII, 981.

920. Résoudre en nombres entiers l'équation $x^2 + y^2 = u^2 + v^2 + 1$. E. Fauquembergue. N. ann. math. XLIII, 346.

921. Sur quelques équations indéterminées. S. Réalis. N. ann. math. XLII, 289,

494, 535; XLIII, 305. 922. Insolubilité de l'équation $y^3 = x^2 + (x+1)^2$ en nombres entiers à moins de x=0. A. Fauquembergue. N. ann. math. XLII, 430. — P. D. ibid. XLIII, 301.

928. Trouver les solutions entières de l'équation $x^3 + x^2 + x + 1 = v^2$. E. Fauquembergue. N. ann. math. XLIII, 538. 924. Involubilité de l'équation

$$(2+\sqrt{3})^{2x+1}+(2-\sqrt{3})^{2x+1}=\frac{2}{\sqrt{2}}\left[(1+\sqrt{2})^{2y+1}-(1-\sqrt{2})^{2y+1}\right]$$

en nombres entiers au res que x=y=0. E. Fauquembergue, N. ann. math. XLII, 372.

925. Propriété de la somme des $2a^{bmos}$ puissances des nombres $1, 2, \ldots p-1$ en prenant pour p un nombre premier > 3. Moret-Blanc. N. ann. math. XLIII, 395.

926. On the divisors of numbers and products of factors. S. Roberts. Quart. Journ. math. XX, 370.

927. Somme de produits des nombres premiers à N et non supérieurs à ce nombre. Moret Blanc. N. ann. math. XLIII, 483.

928. Congruence de deux produits par rapport à un module premier. Ch. Chabanel N. ann. math. XLII, 427.
 929. Zu Euler's Recursionsformel für die Divisorensummen. Chr. Zeller. Acta

math. IV, 415.

930. Théorème sur les quotients des divisions d'un nombre donné par les nombres moindres consécutifs. Ch. Chabanel. N. ann. math. XLII, 474

931. Démonstration d'un théorème de Fermat. A. Genocchi. N. ann. math. XLII, 306.

932. Befreundete Zahlen. P. Seelhoff. Grun. Archiv LXX, 75.

Vergl. Formen. Geschichte der Mathematik 663. Reihen 852.







